クワモザイク病の病徴発現と温度との関係

石 家 達 爾*・河 上 双 葉*

Tatsuji ISHIE and Futaba KAWAKAMI: Effect of temperature on the appearance of symptoms of mulberry mosaic disease.

I. 緒 言

現在、モザイク病と総称されているクワのウイルス病にはいくつかの異なつた病徴が含まれる。それらの病徴は果して同一のウイルスによるものか、あるいは異なつたものに起因するかは明らかでないが、その発病は河川の沿岸地帯に限られていることが特徴とされている。

モザイク病の病徴に関しては、これまでに多くの記載があり^{1,2,3,4,7)}、またその季節的消長についても調査がなされているが⁵⁾、いずれも自然条件下でのものである。

われわれはこれらの異なつた病徴を起す病原ウイルスの異同を明らかにする手はじめとして、病徴の発現と環境条件、とくに温度との関係をたしかめるための試験に着手し、若干の結果をえたのでここに報告する。

本稿を草するに当り、供試材料の採取にご便宜を与えられ、かつ有益なご意見をいただいた滋賀県蚕業試験場の保野場長、辻技師および群馬県蚕業試験場岡部技師に深謝の意を表する。

II. 実験材料

1963年3月群馬県蚕業試験場構内桑園および滋賀県下から採取した罹病桑条と魯桑実生苗に接木をして育成した罹病苗を供試した。接穂として用いた罹病条のうち、群馬産のものは前年まで典型的なヒダ症状を呈したものであつたが、一部に輪紋症状が混生していたおそれのあるもので品種は一の瀬である。滋賀県下での採取条は、冬芽の位置のみだれおよびその形の不規則などの点から、前年はヒダ症状を示していたと思われたもので品種は改良鳳返である。

同年4月、常法による袋接を行ない、その後2週間保温、保湿条件下で保護し、活着した苗を直径21cmの素焼鉢に3本ずつ移植し、1鉢あたり肥料として丸桑約1gを施用した。

* 農林省蚕糸試験場

III. 実験方法

温度処理は温度調節育苗室コイトロン3S型を使用し、31°C、23°C、15°Cの3段階とし、5月11日より開始した。

穂木より生育伸長した新梢1本のみを残して他の芽をすべて摘除し、その新梢について毎月2~3回、新梢長、着葉数および桑葉1枚ごとの病徴の種類、程度を調査した。

生育にともない種々の病徴が現われたが、記録の集計に当つては便宜上、ヒダ、輪紋、黄斑の3つに、また各病徴の程度を重症、中症、軽症に区分し、それぞれに10、5、2の重みをつけ、次の算出方法で発病指数を表わした。

$$\text{発病指数} = \frac{\sum \text{葉数} \cdot \text{重み}}{\text{総葉数} \times \text{最大の重み}(=10)} \times 100$$

6月24日に新梢の基部1、2芽を残して第1回の伐採を行ない、温度条件をかえて生育させ新たに伸長した新梢1本について同様の方法で発病調査を実施し、さらに10月7日に同様の方法で2回目の伐採をして再び調査を継続した。以下、第1回伐採までを第I期、第2回伐採までを第II期、それ以降を第III期と記述する。

IV. 実験結果

A. 温度による発病程度の差異

穂木の採取地、病徴の区別などを考慮に入れず、第I期から第III期までの発病程度の経時的推移を前記の発病指数をもとにして総括的に図示したのが第1図である。その上欄には参考として着葉数の推移を示したが、その中で第I期31°C区で6月前後の増加率が鈍っているのは、一時的な乾燥害により一部に落葉をみたためであり、また第III期での増加が第I、第II期に比較して少ないのは、休眠時期のため生育が停止したためである。

発病指数の推移曲線からは、第I、第II、第III期の

第1図 モザイク病桑苗の発病指数の経時的推移

第1表 変温処理を施したモザイク病桑苗の発病指数の推移

変温処理 ^a		C→B→A		B→B→A			B→A→B					A→A→B		
調査月日	桑苗No.	K C	K C	KB ^d	KB ^d	KB ^d	KB ^d	KB ^d	KB	KB	KB	KA	KA	KA
		8-1	8-2	13-1	13-2	13-3	14-1	14-2	7-1	7-2	7-3	11-1	11-2	11-3
第I期	'63. 5.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	10.0	13.0	33.3	33.0	0	100.0	100.0	0	14.3	17.1	0	0	3.6
	24	45.0	40.0	71.3	100.0	50.0	100.0	70.0	2.5	48.8	25.6	2.0	8.4	6.7
	31	45.0	31.7	74.4	100.0	36.3	100.0	40.0	2.0	30.0	15.5	2.7	9.2	0
	6. 8	30.8	45.0	65.5	94.4	39.0	84.6	41.0	0	35.4	12.1	0	0	0
	12	40.0	40.0	50.0	88.9	44.5	89.3	67.0	1.6	45.4	12.7	0	0	0
第II期	22	45.0	50.0	56.9	77.4	71.7	78.6	68.2	0	65.8	12.2	0	0	0
	7. 4	13.0	27.5	— ^b	×	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	48.6	41.0	40.0	×	70.0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 2	55.7	66.7	57.1	×	85.7	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	64.3	87.5	45.1	×	85.7	0	0	0	0	0	0	0	0
	27	64.3	75.0	100.0	×	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
第III期	9. 4	60.0	75.0	78.6	×	85.7	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	55.7	75.0	50.6	×	85.7	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. 4	64.3	75.0	45.0	×	70.0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. 1	×	0	0	×	0	0	0	×	31.1	0	0	3.3	0
	27	×	0	0	×	0	3.8	0	×	45.0	0	0	12.2	3.3
	12. 5	×	0	0	×	0	8.5	0	×	45.0	0	0	17.8	4.4
第III期	'64. 1. 7	×	0	0	×	0	10.8	0	×	45.0	0	0	17.5	5.0

^a A; 31°C, B; 23°C, C; 15°C. C→B→A は第I期 15°C, 第II期 23°C, 第III期 31°C に処理したことを示す。

^b 発芽がみられない。

^c 枯死

^d 群馬県 material, その他の material はすべて滋賀県産

いずれにおいても 31°C, 15°C, 23°C の順に発病が顕著になることが明らかである。31°C ではほとんど病徴が現われず、完全に近く mask されることがわかったが、第 I 期にわずかながら発病のみられたのは、おそらく接木後温度処理までの約 1 カ月近くの間の温度の影響によるものと考えられる。このことは第 I 期前半の発病指数の推移が他の時期のそれより著るしく急増していることからもうかがえる。

第 1 表は第 I 期から第 III 期にかけて温度変化を施した一部の桑苗の発病指数の推移を例示したもので、これによつても 23°C または 15°C で激しい病徴を示していた苗でも、伐採後 31°C におくと病徴が全く mask すること、およびその逆に 31°C で外観健全であつた苗も 23°C に処理することにより病徴が現れることを明示している。すなわち、伐採後の発病は、伐採前の発病程度、生育条件などには関係なく、31°C では mask し、15°C および 23°C では病徴が現われ、と

くに 23°C ではより顕著に発病することが明らかである。

B. 温度による病徴発現の差異

温度によつて病徴およびその出現の推移が異なり、また穂木の採取地によつても大差ある結果が示された。

(1) 31°C の場合：31°C ではほとんど病徴がみとめられず、第 I 期にわずかにみられた病徴はヒダ症状に限られ、しかもそれらはすべて滋質の材料であることが第 2 表からわかる。ここでみられた病徴は、葉全体が肥厚硬化し、光沢がうすれ、葉脈が透明となるもので(図版 B)、いわゆる enation はみられないが、昂進すると enation を生ずる場合のあることからヒダの前駆症状と考え、本報では軽症のヒダとして記載した。

(2) 15°C の場合：第 III 期は実施しなかつたが、出現する病徴の大部分がヒダ症状で、滋質の材料のみ若干の輪紋症状がみとめられた(第 3 表)。群馬の材

第 2 表 31°C におけるモザイク病桑苗の病徴発現の推移

採取地 項目 調査月日		滋 賀								群 馬							
		株 数	葉 数	E ^a		R ^b		YS ^c		株 数	葉 数	E		R		YS	
				葉数	葉率 ^d (%)	葉数	葉率 ^d (%)	葉数	葉率 ^d (%)			葉数	葉率 ^d (%)	葉数	葉率 ^d (%)	葉数	葉率 ^d (%)
第 I 期	'63. 5. 13	10	38	0	0	0	0	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0
	18	10	88	2	2	0	0	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0
	24	10	103	3	3	0	0	0	0	2	17	0	0	0	0	0	0
	31	10	120	4	3	0	0	0	0	2	20	0	0	0	0	0	0
	6. 8	10	116	4	3	0	0	0	0	2	18	0	0	0	0	0	0
	12	10	117	3	3	0	0	0	0	2	21	0	0	0	0	0	0
	22	10	128	3	2	0	0	0	0	2	23	0	0	0	0	0	0
第 II 期	7. 4	9	38	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0
	15	9	59	0	0	0	0	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0
	8. 2	9	97	0	0	0	0	0	0	2	18	0	0	0	0	0	0
	16	9	115	0	0	0	0	0	0	2	22	0	0	0	0	0	0
	27	9	119	0	0	0	0	0	0	2	27	0	0	0	0	0	0
	9. 4	9	120	0	0	0	0	0	0	2	27	0	0	0	0	0	0
	17	9	127	0	0	0	0	0	0	2	33	0	0	0	0	0	0
	10. 4	9	148	0	0	0	0	0	0	2	36	0	0	0	0	0	0
第 III 期	11. 1	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	0	0	0	0	0	0
	27	.	.	.	.	.	.	.	.	3	9	0	0	0	0	0	0
	12. 5	.	.	.	.	.	.	.	.	3	9	0	0	0	0	0	0
	'64. 1. 7	.	.	.	.	.	.	.	.	3	9	0	0	0	0	0	0

^a ヒダ症状 (葉の肥厚硬化, 葉脈の透明化, およびモザイク症状をも含む)

^b 輪紋症状

^c 黄斑症状

^d 総葉数に対する百分率

料では後述の 23°C の場合と同様にヒダ以外の症状が全く観察されなかつたことは注目し得る。この温度でのヒダ症状とは 31°C におけるそれとは異なり、群馬、滋賀の材料とも葉面に凹凸のみられるモザイクで(図版 C)、昂進にともないその淡緑色部に enation を生ずるものでヒダの前駆症状の一つと考えた。この温度でみられた輪紋症状は、黄緑色の不明瞭な輪状病斑で多くはモザイクと併発した。両県の材料とも発病葉の割合が高く、とくに群馬の材料では 100% を示したが、これは低温のために着葉数が増加しないためで、発病の程度としては 23°C には及ばない。

(3) 23°C の場合：前述のごとく、23°C においては発病がもつとも激しいが、病徴も多様でその発病推移も複雑で、時期により材料により特異的な変化を示した(第 4 表)。

まず滋賀県材料についてみると、第 I 期にはじめはヒダが多く現われるが後半になつて輪紋が急増した。しかし第 II 期には、第 I 期に多かつたヒダと輪紋は急減し、それらに代り第 I 期には全くみられなかつた黄斑症状が急に多くなり、第 II 期の後半には半数近い桑葉にみとめられるに至つた。ところが第 III 期になると黄斑は再びみられなくなり、ヒダと輪紋とが現れた。

一方、群馬の材料では第 I、第 II 期にはすべてヒダ

症状で、滋賀の材料で多くみられた輪紋あるいは黄斑は全くみられず、第 III 期になつてわずかに輪紋がみとめられたにすぎなかつた。

両県の材料でみられたヒダ症状を比較した場合、一般に群馬の方が滋賀よりも重症である。すなわち、滋賀の材料では大多数がモザイク症状で enation のみられたものは少なかつたが、群馬のものでは葉の全面あるいは一部に極度の enation を生じ奇型化したものが多く、生育が阻害され枯死したもののさえもみられた(第 1 図版 E, 第 2 図版 I)。両材料のこの関係は第 1 表からもうかがえる。

この温度でみられた輪紋症状は 15°C でのそれよりも顕著で大小さまざまな黄色輪紋が 1 枚の桑葉に多数現れること多く(第 1 図版 F, G), またモザイクとの併発も観察された。

滋賀の材料で第 II 期のみに出現した黄斑症状は、桑葉全面に黄色の小斑が多数生ずるもので(第 1 図版 H) その病徴および発病の様相から輪紋が何らかの条件の影響で変化したものであらうと考えている。

V. 論 議

クワモザイク病の病徴について、遠藤ら²⁾は葉質の肥厚硬化および葉脈の透明化、葉肉の透明、葉裏のヒダ、糸葉、ロゼット、枝条の弱化、枝条の矮小化、病

第 3 表 15°C におけるモザイク病桑苗の病徴発現の推移

採取地 項目 調査月日		滋賀								群馬							
		株 数	葉 数	E ^a		R ^b		YS ^c		株 数	葉 数	E		R		YS	
				葉数	葉率 ^d (%)	葉数	葉率 ^d (%)	葉数	葉率 ^d (%)			葉数	葉率 ^d (%)	葉数	葉率 ^d (%)		
第 I 期	'63. 5.13	9	37	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0
	18	9	49	27	55	0	0	0	0	2	12	8	67	0	0	0	0
	24	9	58	45	78	0	0	0	0	2	12	12	100	0	0	0	0
	31	9	61	49	80	2	3	0	0	2	12	12	100	0	0	0	0
	6. 8	9	62	48	77	4	6	0	0	2	12	12	100	0	0	0	0
	12	9	66	53	80	4	6	0	0	2	12	12	100	0	0	0	0
	22	9	68	53	78	6	9	0	0	2	12	12	100	0	0	0	0
第 II 期	7. 4	12	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.
	15	12	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.
	8. 2	12	28	18	64	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.
	16	12	50	33	66	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.
	27	12	50	37	74	2	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.
	9. 4	12	52	37	71	2	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.
	17	12	53	40	76	2	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.
	10. 4	12	53	43	81	2	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.

^a, ^b, ^c, ^d は第 2 表に同じ

枝の枯死の9項目をあげ、柳沢⁷⁾は贅生透明、糸葉、斑入りの3つに大別し、また石田⁸⁾は変色型と変形型に分類して論述している。

本試験では葉の肥厚硬化、葉脈の透明化、モザイク、enation、輪紋、黄斑などのいろいろの病徴がみられたが、そのうち肥厚硬化して葉脈が透明化した桑葉は病勢の進昂にともないenationを生ずることのある事実から²⁾ヒダの前駆症状とみなし、またモザイク症状も遠藤らや柳沢⁷⁾が斑入りと称したものは異なりenationを生ずることのあることから軽症のヒダと考え両病徴ともヒダの中に包含した。

輪紋症状は遠藤³⁾、柳沢⁷⁾、石田⁸⁾の記載にはないが、岡部⁹⁾が輪紋モザイク病として報告した病徴に酷似していることからそれと同一のものと考えた。

岡部⁹⁾は本病の発病と環境要因との関係を自然発病状況から調査して、ヒダ症状の発現が栄養条件の満されている時に限り、気象とくに気温と相関々係のあることをみとめ、発病の温度範囲を12~25°C、最適温度を23°Cと報告した。

本試験の結果では、31°Cではほとんどmaskし、

15°Cでもモザイク症状のみでenationはほとんどみられず、23°Cでもつとも病徴顕著であつたことから発病の最適温度は23°C附近にあるものと考えられ、岡部の報告と一致した。

岡部⁹⁾はまた輪紋モザイク病の発病と気温との関係についても報告し、発病は18~25°Cで現われ、これより高くても低くてもmaskするとしている。今回の試験では、31°Cでは輪紋は全くみられなかつたが15°Cでは僅かではあるがみとめられており、その発病の温度範囲については岡部の結果と若干こととなるが、発病の適温はヒダのそれとほぼ近似していると思われた。

23°Cの第II期に滋賀の材料に限って出現した黄斑症状は、従来までの記載はないが、その病徴および発病の推移からおそらく輪紋が何らかの条件によつて変化したものと推察される。

一般に気象条件や寄主植物の栄養生理的条件により植物ウイルス病の発病が異なることはよく知られている。一定の温度条件下でこのように激しく病徴の出現が変化することは奇異にさえ感ぜられるが、おそらくクワの生理に急激な変化をもたらす基部伐採という操

第4表 23°Cにおけるモザイク病桑苗の病徴発現の推移

採取地 項目 調査月日		滋 賀								群 馬							
		株 数	葉 数	E ^a		R ^b		YS ^c		株 数	葉 数	E		R		YS	
				葉数	葉率 ^d (%)	葉数	葉率 ^d (%)	葉数	葉率 ^d (%)			葉数	葉率 ^d (%)	葉数	葉率 ^d (%)		
第 I 期	'63. 5.13	18	44	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
	18	18	137	95	79	0	0	0	0	5	26	21	81	0	0	0	0
	24	18	175	92	53	14	8	0	0	5	34	32	94	0	0	0	0
	31	18	208	96	46	41	20	0	0	5	42	38	91	0	0	0	0
	6. 8	18	241	95	39	53	22	0	0	5	53	49	93	0	0	0	0
	12	18	241	99	41	64	27	0	0	5	55	54	98	0	0	0	0
	22	18	266	93	35	66	25	0	0	5	59	52	88	0	0	0	0
第 II 期	7. 4	14	13	0	0	0	0	0	0	5	17	0	0	0	0	0	0
	15	14	85	0	0	1	1	0	0	5	34	29	85	0	0	0	0
	8. 2	14	120	1	1	2	2	3	3	5	39	31	80	0	0	0	0
	16	14	150	1	1	2	1	27	18	5	41	35	85	0	0	0	0
	27	14	170	4	2	4	2	53	31	5	42	37	88	0	0	0	0
	9. 4	14	172	4	2	4	2	74	43	5	43	37	88	0	0	0	0
	17	14	180	5	3	4	2	89	49	5	42	37	88	0	0	0	0
	10. 4	14	192	7	4	4	2	94	49	5	43	37	88	0	0	0	0
第 III 期	11. 1	5	39	3	8	1	3	0	0	2	12	0	0	0	0	0	0
	27	5	53	9	17	9	17	0	0	2	21	0	0	2	10	0	0
	12. 5	5	51	12	24	9	18	0	0	2	21	5	24	2	10	0	0
	'64. 1. 7	5	49	16	33	7	14	0	0	2	21	4	19	2	10	0	0

^a, ^b, ^c, ^d は第2表に同じ

作が微妙に関与した結果によるものと考えられる。

これら各種の病徴を起す病原ウイルスの異同に関しては本試験の結果からは何ら解明されないが、病徴および発病の様相から少なくともヒダと輪紋とは異なつたウイルスによるものと考えたい。そのような仮定を立てた場合、滋賀の材料では輪紋、黄斑、ヒダの各症状が現れたのに対して、輪紋が混在しているおそれのあることを指摘された群馬の材料ではほとんどヒダ症状しかみとめられなかつた事実は、ヒダを起すウイルス濃度が群馬の材料においてとくに大で、たとえ他のウイルスが混在していてもその病徴を現わしえなかつたためと考える。

VI. 摘 要

群馬、滋賀両県から採取した罹病桑条を実生苗に接木した桑苗を供試して、クワモザイク病の病徴発現と温度との関係を試験して次の結果をえた。

1. 病徴は 15°C と 23°C においては現われるが、31°C ではほとんど mask し、発病の程度は 15°C よりも 23°C の方が激しい。
2. 31°C でわずかながら現れた症状はヒダの前駆症状と考えられた葉の肥厚硬化、葉脈の透明化であつ

た。

3. 15°C においてはわずかの輪紋以外はすべてがモザイクで、それが昂進すると enation を生ずることから、それもヒダの前駆症とみなした。

4. 23°C では病徴発現の傾向は複雑で、病穂採取地、クワの生育時期などによつて著るしくおもむきを異にした。群馬の材料ではすべての時期を通して激しい enation を生じ、他の症状はみとめられなかつたが、滋賀の材料ではモザイク、enation、輪紋、黄斑の各症状がみとめられ、それらの出現には特異的な推移が示された。
(1964. 8. 27 受理)

引 用 文 献

1. 青木 清(1949). 蚕桑技術相談 (109): 29~33.
2. 遠藤保太郎・倉沢恒夫(1937). 蚕糸学雑誌 9: 115~132.
3. 石田恕夫(1958). 滋賀蚕試彙報 (9): 58~60.
4. 岡部光波(1950). 群馬要報(10): 237~247.
5. 岡部光波(1950). 群馬要報(21): 6~9.
6. 岡部光波(1961). 日蚕雑 30: 235.
7. 柳沢新一(1951). 埼玉蚕試研究要報(22): 1~6.

Summary

Using mulberry seedlings grafted by diseased stems collected from Gumma and Shiga Prefectures, the mode of symptom appearance of mulberry mosaic disease was examined, when temperature was regulated 15, 23 and 31°C, respectively.

As a rule, plants grown at 23°C and 31°C showed symptoms while symptoms were almost masked at 31°C. Intensity of symptom at 23°C was higher than that at 15°C.

Some of the symptoms on plants kept at 31°C were thickening and hardening of leaves and vein-clearing that were considered to be primary symptoms of enation.

When plants were kept at 15°C, conspicuous mosaic and a very few ring spot symptoms were shown on leaves. Mosaic was also considered to be primary symptom of enation, because typical enation has further appeared on some of the light-colored portions of mosaic leaves.

Mode of appearance of symptoms on the plants kept at 23°C was very complicated and was variable according to the places collected diseased stems and the growing stage. On the materials from Gumma Prefecture, severe enation developed on the leaves in all growing stage, and few other symptoms were observed. On the materials from Shiga Prefecture, various symptoms, i.e., mosaic, enation, ring spot and yellowing spot, appeared, and transition of appearance of these symptoms showed variation to growing stage.

(Sericultural Experiment Station, Tokyo, Japan)

Plate I

Plate II

図版説明

第1図版

- A. 健全桑葉
- B. 肥厚硬化して葉脈が透明化した桑葉
- C. モザイク症状の桑葉
- D. enation のみられる先端葉
- E. 典型的な enation のみられる桑葉
- F, G. 輪紋症状の桑葉
- H. 黄斑桑葉

第2図版

- I. 23°C で発病した重症ヒダ桑苗
- J. 温度による発病程度の比較（左：31°C, 右：23°C）
- K. 23°C において発病した桑苗を途中から 31°C に移して先端が回復した状況

文献紹介

ウイルス局部感染葉の非接種部におけるポリフェノールオキシダーゼの増加

van Kammen A. and D. Brouwer: Increase of polyphenenoxidase activity by a local virus infection in uninoculated parts of leaves Virology 22 (1): 9-14, 1964.

タバコ (Samsun NN) に TMV を接種したところ、ポリフェノールオキシダーゼはウイルスが増殖する接種部分のみでなく、ウイルスが増殖していな

い非接種部分でも7時間以内に増加しはじめ、接種後約4日で最高に達した。ポリフェノールオキシダーゼは健全植物のものと質的な差はない。ここに用いた定量法はクロロゲン酸を基質として入れその322 m μ にピークを有する紫外線吸収が、酸化による変質で減少することに基づくもので、従来のマンメター法などに比べ操作が簡単で早く、サンプルが少量ですむ。

(斎藤 康夫)