咬合変化に関する実験的研究 特に顎関節におよぼす影響について

呉 俊寛

An Experimental Study on Occlusal Change,
Especially Influence to Temporomandibular Joint

Chung-Kuang WU

I. 緒 言

1934年, Costen¹⁾は顎関節異常に基づくと考えられる耳と副鼻腔の症状からなる症候群を発表した。このような症候群は歯の脱落した患者や、著明な被蓋咬合の患者にしばしば認められ、いわゆる顎関節症の Costen の症候群として歯科医学の領域で取り上げられるようになった。

このような咬合に起因するいわゆる顎関節疾患は、爾来、現在まで顎関節症の患者は減少することなく、かえって補綴物修復方法の発達とそれに伴う何らかの原因によって、昨今顎関節疾患が臨床上非常に頻度が高くなってきたといわれている。このような咬合に起因するいわゆる顎関節疾患の病態ならびに病理については明らかでない問題が多い。

顎関節に加えられた慢性的外傷性因子によって機能的、また形態的な変化が種々現れてくることが臨床上知らされているが、従来から特に咬合高径の高さの変化が顎関節に強く影響されることが注目されている。

すなわち、岡 (1967)²⁾は、顎関節症患者を観察した結果、病因論的にみて顎関節部の直接または間接の外來性外傷、あるいは咬合異常などの内在性外傷などに起因するケースが多いと指摘している。そこで顎関節症本態の解明に関しては臨床上の第一主眼は病因と発症機序の追求におくべきであるとし、さらに多種多様な変化を示す複

雑な顎関節の機構が関与していることを指摘し、この複雑さが病態の理解を妨げていると述べている。

また、関 (1968)³⁾は、補綴が原因と思われる顎関節症の患者について咬合の修正を施し、いわゆる咬合要素から顎関節の異常の原因を追求している。

古くは Maves (1935)⁴⁾が Costen の説を支持し、Costen (1934)¹⁾の咬合の高さの増加によって顎関節症の治療は徐々に達成されるということに対し、咬合を高く挙上しすぎた結果について数例の禁忌症を報告している。

また、このすぐ後に咬合高径の増加に対して、Tench (1938)⁵⁾、Mershon (1939)⁶⁾、Schayler (1939)⁷⁾らがその危険性を指摘している。

以上、顎関節症に関する報告はこれら他の多数に及ぶが、いずれも臨床の見地からの報告にすぎず、基礎医学的な病態の解明はヒトの資料では十分とはいえない。また顎関節に関しての報告は加齢的变化を除いては非常に少ない。

すなわちこの種の知見の多くは動物実験によるもので、従来から犬、ラット、サルなどを用い咬合挙上を行い、これに伴う顎関節の変化を検討した報告が散見されるにすぎない。しかしながら顎関節の形態や咀嚼、咬合様式もヒトにきわめて類似しているとされるサルについての知見は非常に少なく、十分な結論を得たとはいえない。そこで著者はカンクイザルの咀嚼機構がヒトと類似しているところに注目して、咬合挙上顎関節に及ぼす影響を病理組織学的に観察するために本実験を企画し、実験を行った。

II. 実験材料と方法

実験に供した動物はカンクイザル（オス，推定年齢5歳）25匹を使用した。主に固形飼料を与え，加えて3日ごとに均等にレモンとリンゴを与えた。

実験を行うにあたりまずネブタール（1cc/kg）により腹腔麻酔を行い，通法により下顎第1大臼歯と第2大臼歯に全部鑄造冠の支台歯形成を行った。つぎにチオールラバー印象材により印象採取を行い，硬石膏模型を作製した。この模型により，金銀パラジウム合金（金12%，パラジウム20%，銀48%，銅17%，その他）の全部鑄造冠を作製した。その作製にあたっては一般に安静空隙量が約1~3mmとされているため，安静空隙の範囲外の5mmを目安として，咬合器上で咬合挙上を行った。つまり，前歯切端部で1mm挙上となるものと，5mm挙上となるものの2群に分けた。また，それぞれの群で鑄造冠を両側に装着するものと片側にのみ装着するものと分類した。これらの全部鑄造冠をサルの口腔内に歯科用セメントで装着した（図1）。片側装着例では左側を装着側とし非装着側と比較検討した。また，両側装着例も両側について観察することとした。

これらの実験期間についてみると，それぞれ冠装着後10，30，60，90，120，180日目に麻酔死させ顎関節部を採取し，10%ホルマリン溶液にて固定後，2%硝酸アルコール溶液で脱灰，ツェロイジン包埋を行った。これらについての正中断面連続切片標本を作成し，ヘマトキシリン-エオジンの重染色を行い検鏡した。なお，関節の観察部位は下顎頭の頭頂部（中央部）を中心にした範囲とし，下顎頭，関節円板，下顎窩壁の変化について検討した。

図1 口腔内に装着した全部鑄造冠

III. 結果

1. 1mm 挙上片側装着群

1) 装着後10日

a) 装着側（図2）

下顎頭前縁部で軽度から中等度の吸収窩が認められた。軟骨層部では表層の被膜をはじめ，休止層，増殖層，肥大層および石灰化開始層の各層が明瞭に区分されて認められ，特記すべき変化は認められなかった。

関節円板はほぼ正常像を示し，緻密な結合組織線維から成り，血管分布はきわめて少なかったが，前方部と後方部では軽度の血管侵入がみられた。

下顎窩壁では特に著変は認められないが，肥大層の発達が悪く，骨髓の一部は線維化を呈し，また血管の拡張充血が認められた。

b) 非装着側（図3）

下顎頭の軟骨層は菲薄となり，前縁部で骨に軽度の吸収像が認められた。

関節円板前方部での周囲組織での充血像が著明であっ

図2 10日片側1mm 挙上装着側

図3 10日片側1mm 挙上非装着側

た。

下顎窩壁では骨質層は明らかでなく、ほとんど消失しており、また窩壁後方で軽度な吸収像がみられた。なお、窩壁の骨質層では一部の骨髓腔に滲出液の貯留が認められた。

2) 装着後 30 日

a) 装着側 (図 4)

下顎頭の軟骨層は休止層、増殖層、肥大層および石灰化開始層の各層は分明であるが被膜はやや肥厚し、関節円板と合体化している所見も一部にみられた。また被膜の一部は軽度の変性をみた。骨髓は一般に広大で骨の緻密化はみられなかった。

関節円板の一部は明らかに硝子様変性が認められた。

下顎窩壁は被膜の著明な肥厚と変性がみられ、窩壁の骨化が進み、緻密骨から構成されていた。また軟骨層では肥大層のみ分明であった。

b) 非装着側 (図 5)

下顎頭での軟骨層は前縁部に向かって菲薄化の傾向が強く、全体に軟骨層の菲薄化が著明であった。被膜はやや肥厚し、硝子化を呈していた。

関節円板は中央部でやや菲薄となつてはいるが、ほぼ正常に近い厚さを保っていた。しかし、硝子変性が著明であった。また前方部では血管の拡張が認められた。

下顎窩壁では軟骨層は明らかな変性がみられ、細胞の消失による均質無構造化と被膜の変性により被膜層と軟骨層の区別が不明であった。

3) 装着後 60 日

a) 装着側 (図 6)

下顎頭の被膜は全般に菲薄で軟骨層は分明であった。特に肥大層と増殖層は明らかであった。骨質層は骨化が顕著で緻密となり、骨髓腔の消失ないし狭小化が認められた。下顎頭の前縁部では骨吸収が著明であった。

関節円板は明らかな硝子様変性が認められたが、菲薄化は認められなかった。

下顎窩壁では被膜は菲薄化を呈し、さらに軟骨層は休止層、増殖層と肥大層が分明であり、各層の幅は狭かった。

b) 非装着側 (図 7)

下顎頭の所見はほぼ装着側と同様であったが、軟骨層は装着側のものよりも明らかに厚かった。また、骨化の程度もやや弱かった。下顎頭前縁部では著明な骨吸収をみた。

関節円板の前方部では血管侵入が顕著であり、中央部では強い硝子様変性を示した。

図 4 30 日片側 1 mm 挙上装着側

図 5 30 日片側 1 mm 挙上非装着側

図 6 60 日片側 1 mm 挙上装着側

下顎窩壁の被膜は軽度の肥厚を示し、窩壁表面は平坦化が認められた。軟骨層はきわめて幅狭く各層は分明でなかった。

4) 装着後 90 日

a) 装着側 (図 8)

下顎頭の被膜および軟骨層は強度の菲薄化を呈した。特に肥大層は明らかでなく、軟骨化骨が著明であった。また、下顎頭前縁部では強い吸収がみられたが、後縁部で軟骨層の各層が分明で、かつ、軟骨層の肥厚が認めら

図 7 60 日片側 1mm 挙上非装着側

図 10 120 日片側 1mm 挙上装着側

図 8 90 日片側 1mm 挙上装着側

図 11 120 日片側 1mm 挙上非装着側

図 9 90 日片側 1mm 挙上非装着側

れた。

関節円板は菲薄化し、明らかな硝子様変性化の傾向が認められた。

下顎窩壁では被膜層が肥厚し、軟骨層はきわめて菲薄となり不分明であった。骨質部は緻密化が進行し、緻密な層板骨から成り、osteon の形成も顕著であった。骨髓腔は全般に狭小化の傾向にあった。

b) 非装着側 (図 9)

下顎頭前縁部では骨の吸収が中等度を示し、頭頂部の

軟骨層は全体に菲薄化の傾向であった。また、この軟骨層の分明度は前縁部への移行部ではさらに菲薄化が著明となり各層は不分明となっていた。

関節円板はやや菲薄で硝子様変性の傾向を示していた。

下顎窩壁の軟骨層は不明瞭となっていて、線維組織層が肥厚していた。骨質層は緻密な層板状骨から成り、osteon 形成も明らかであったが、装着側の所見に比べると劣っていた。

5) 装着後 120 日

a) 装着側 (図 10)

下顎頭の軟骨層は分明であった。軟骨層は、軟骨細胞の柱状配列はみられず、菲薄化を呈していた。また骨化も顕著でなく、随所に骨質中に軟骨細胞の埋入がみられた。なお、骨髓腔は広大であった。

関節円板の菲薄化は明らかでなかったが、硝子様変性は著明であった。

下顎窩壁の被膜は分明であった。軟骨層では不分明で菲薄化が認められた。また、骨化が著明で、骨化の進行により軟骨細胞の埋入が観察された。全体に緻密骨の形

成から成り立っていた。

b) 非装着側 (図 11)

下顎頭の軟骨層は菲薄化の傾向を示していた。骨質層では骨化は著明でなく、広大な骨髓腔が随所にみられた。なお、前縁部では著明な骨吸収が認められた。

関節円板は強い硝子様変性を呈していた。

下顎窩壁の軟骨層は菲薄化を呈していた。また軟骨層は骨化により軟骨細胞の埋入がみられたが各層の区別は明らかでなかった。被膜は肥厚し、硝子様変性を呈していた。

6) 装着後 180 日

a) 装着側 (図 12)

下顎頭の中央部から前方部では、被膜層および軟骨層は菲薄であった。特に、前方部において軟骨層は消失し、被膜直下で骨化を呈し、骨組織から成っていた。

関節円板は菲薄化、硝子様変性が著明で、後上方部において肉芽が形成されていた。

下顎窩壁の軟骨層は菲薄で、かつ細胞の配列不正がみられた。また骨質層では著明な骨化が認められ、緻密な層板骨で形成され、骨髓では充血が著明で一部に脂肪組織がみられた。また骨質層では著明な骨化が認められ、緻密な層板骨で形成され、骨髓では充血が著明で一部に脂肪化がみられた。

b) 非装着側 (図 13)

下顎頭の被膜層は分明で菲薄となっていた。軟骨層の各細胞層は消失して認められなかった。わずかに軟骨細胞が散在性にみられるのみで化骨していた。また、後縁部では軟骨層の増殖は分明で、休止層は消失しており、肥大層は菲薄化を呈していた。そして骨化が著明であった。また、被膜は頭頂部のものに比し明らかに肥厚していた。

関節円板は中央部で菲薄化を呈し、硝子様変性がみとめられた。後方部では、一部に脂肪化が認められた。

下顎窩壁は被膜層が菲薄となっていたが、一部では肥厚をみた。軟骨層はみられたが、骨化により凹凸が著しく、不規則性を呈していた。骨髓には特記すべき変化は認められなかった。

2. 5 mm 挙上片側装着群

1) 装着後 10 日

a) 装着側 (図 14)

下顎頭は全体に吸収窩を認めた。また、後方部では被膜層の肥厚がみられた。なお、下顎頭の変形が著明で強い扁平化を呈し、一部に凹陷が認められた。凹陷部は結

図 12 180 日片側 1 mm 挙上装着側

図 13 180 日片側 1 mm 挙上非装着側

図 14 10 日片側 5 mm 挙上装着側

合組織で満たされていた。軟骨層は頭頂部では肥大層が不分明で全体に均質無構造を呈していた。また、前方部においては、ほとんど消失していた。骨質層では骨梁の配列が不規則で、一部では骨化が進み緻密な層板骨の形成がみられた。

関節円板はほとんどみられず、一部に破損と、穿孔が認められた。

下顎窩壁の被膜層は肥厚し、軟骨層は消失し骨化が著明で、osteon の形成が顕著であった。

b) 非装着側 (図 15)

装着側とは全く異なり、関節腔は広く、したがって関節円板も比較的幅広く存在していた。下顎頭の軟骨層はほとんど消失して不分明となって線維化していた。したがって、被膜層と線維化した部分との境界も不分明でなかった。骨質層との境界では軟骨細胞の残存が明らかとなっていた。骨髓腔は狭小化し、骨質部は層板骨から成っていた。

関節円板は、中央部でやや菲薄化がみられたが、菲薄化は余り著明でなかった。一部で硝子様変性が認められた。前方および後方部では血管の侵入、拡張がみられた。

下顎窩壁は、下顎頭と同様軟骨層は不分明で被膜層と軟骨層の線維により線維組織の肥厚が認められた。窩壁骨質部では osteon の形成が著明であった。また骨梁は、総体的に細く、骨髓腔は広大で骨髓の脂肪化や充血像がみられた。

2) 装着後 30 日

a) 装着側 (図 16)

下顎頭では軟骨層および被膜層が菲薄化する傾向を示していた。一部では軟骨層は消失し、認められなかった。また被膜の一部は関節円板と癒着している所見が認められた。軟骨骨化は著明でなく、細い骨梁の形成と広大な骨髓腔が認められた。

関節腔の狭小化により、関節円板は菲薄化して、著明な硝子様変性が認められた。

下顎窩壁の被膜層は明らかで、緻密であった。軟骨層は全般に不分明で一部消失していた。窩壁の骨化は頭著で緻密な層板骨から成っていた。また骨髓では一部で軽度の脂肪化がみられた。

b) 非装着側 (図 17)

下顎頭の被膜層および軟骨層は菲薄化し、軟骨層の一部はきわめて不分明で、消失が認められた。また軟骨細胞の柱状配列はみられなかった。骨質層の骨化は著明でなく、全般に細い骨梁の形成より成り、海綿骨様構造を呈していた。

関節円板はやや菲薄化を呈し、強い硝子様変性が認められた。

下顎窩壁では被膜がやや肥厚し、軟骨層は菲薄化がみられ、骨化が著明で、緻密骨から成っていた。

3) 装着後 60 日

a) 装着側 (図 18)

下顎頭の軟骨層はきわめて菲薄で、特に肥大層はほとんどみられず骨化していた。なお、後縁部の軟骨層の各

図 15 10 日片側 5 mm 挙上非装着側

図 16 30 日片側 5 mm 挙上装着側

図 17 20 日片側 5 mm 挙上非装着側

層は分明であったが前縁部は不分明であった。骨質層の骨梁は総体的に太くなっていた。

関節円板は菲薄で緻密となって、一部に硝子様変性がみられた。

下顎窩壁の中央部では被膜層が著しく肥厚し、前方部では菲薄していた。なお窩壁の軟骨層は特に肥大層が明瞭に認められた。また、骨質部は緻密となっていた。

b) 非装着側 (図 19)

下顎頭の被膜は肥厚し、軟骨層では増殖層と肥大層は

図 18 60 日片側 5 mm 挙上装着側

図 21 90 日片側 5 mm 挙上非装着側

図 19 60 日片側 5 mm 挙上非装着側

図 20 90 日片側 5 mm 挙上装着側

分明であった。肥大層は狭小化を呈し、細胞は萎縮を呈していた。化骨層は幅広く、骨梁の形成は顕著で比較的大きかった。前縁部も骨吸収をみるが、前縁部の方が著明であった。

関節円板は太い膠原線維より成り、幅広く存在した。

下顎窩壁では被膜と軟骨層は不分明で、幅もきわめて狭小化を呈し、個々の軟骨細胞は明らかでなかった。骨質部は緻密な層板骨より成り、osteon の形成状況は中等度であった。

4) 装着後 90 日

a) 装着側 (図 20)

下顎頭の被膜層および軟骨層は菲薄化し、肥大層の部分は骨化がみられた。増殖層は分明であった。骨化は顕著でなく骨の緻密化も明らかでなく骨髓腔も比較的大きかった。

関節円板はやや菲薄化し、硝子様変性が著明に認められた。

下顎窩壁被膜は明らかに肥厚し、軟骨層は不分明で軟骨細胞の消失により菲薄化を呈していた。骨質層では骨梁が融合し緻密な層板骨を形成し、osteon の形成も著明であった。

b) 非装着側 (図 21)

下顎頭の軟骨層に菲薄化が認められた。被膜層増殖層肥大層で軟骨細胞がみられたが、いずれの層も幅は狭く、骨質層の骨梁は互いに融合し緻密で層板骨の形成をみ、この層も狭く大部分は骨髓の広大な海綿骨様構造を示していた。

関節円板は軽度で菲薄化を呈して、一部に軽度の硝子様変性が認められた。

下顎窩壁中央部で、被膜層は著明な肥厚増殖をして、軟骨層の一部を置換していた。肥大層の一部を構成する軟骨細胞と骨化して埋入された軟骨細胞をみたが、骨化

の状態は不規則であった。

5) 装着後 120 日

a) 装着側 (図 22)

下顎頭の被膜層には著変は認められなかった。増殖層は比較的幅広く分明であり、骨質肥大層は幅が狭く、化骨層は明らかであった。骨質部の骨髓の占める割合は多く、骨髓腔は比較的広大で、赤色骨髓によって充満されていた。

関節円板は著変はなく、一部に軽度の硝子様変性が認められた。

下顎窩壁中央から前方部では、被膜層は比較的幅が広いが、軟骨層は菲薄で骨化が著明で骨質層の境界では osteon の形成が著しかった。

b) 非装着側 (図 23)

下顎頭では軟骨層が菲薄化し、軟骨化骨が顕著で、そのため肥大層は狭小化を呈していた。また前縁部で骨の吸収が中等度に認められたが、後縁部での骨吸収はみられなかった。骨質層の骨梁は融合し、緻密化を呈し、骨髓は赤色骨髓から成っていた。

関節円板はやや菲薄化を呈し、硝子様変性が著明であった。

下顎窩壁の被膜層はやや肥厚し、軟骨層の所見は下顎頭部の所見とほぼ同様であった。軟骨層と骨化による骨質層との境界は不規則であった。

6) 装着後 180 日

a) 装着側 (図 24)

下顎頭の軟骨層は骨化によりほとんど消失して、わずかに軟骨細胞の埋入をみた。しかし、これらの骨化の幅は狭く、多くは広大な骨髓腔がみられ、骨髓は一部脂肪化を呈していた。

関節円板は極度に菲薄化し、硝子様変性が認められた。

下顎窩壁は被膜のみがみられ、軟骨層は消失し明らかでなく、一部でわずかに軟骨細胞の埋入をみた。また骨質部はきわめて緻密で osteon の形成も著明であった。

b) 非装着側 (図 25)

下顎頭の前縁部で中等度の骨吸収がみられ、後縁部では認められなかった。被膜層、休止層、増殖層の各層は分明であったが、それぞれ幅が狭くなっていた。また肥大層は骨化により幅が著明に狭くなっていた。骨質層は層板状骨を形成していた。

関節円板の中央部はやや菲薄化がみられ、一部に硝子様変性が認められた。

下顎窩壁の被膜層は肥厚し、軟骨層は骨化により消

図 22 120 日片側 5 mm 挙上装着側

図 23 120 日片側 5 mm 挙上非装着側

図 24 180 日片側 5 mm 挙上装着側

失、不明明となっていた。また骨質層は骨化が緻密で骨髓腔は狭小となっていた。しかし上方部では骨髓腔は広大で脂肪髓を呈するものが認められた。

3. 1 mm 挙上両側装着群

1) 装着後 10 日 (図 26, 27)

両側の下顎頭の被膜層、軟骨層、化骨層の各層は比較的分明であるが、休止層は不明明であった。骨梁形成状態は不十分で、骨髓の占める割合が多く、充血が著明で

図 25 180 日片側 5 mm 挙上非装着側

図 28 30 日両側 1 mm 挙上左側

図 26 10 日両側 1 mm 挙上左側

図 29 30 日両側 1 mm 挙上右側

図 27 10 日両側 1 mm 挙上右側

あった。

関節円板は菲薄化はほとんど認められず、前方部において軽度血管の侵入、拡張が認められた。また、硝子様変性もほとんど認められなかった。

下顎窩壁は軟骨層に菲薄傾向がみとめられ、特に前縁部ではほぼ消失していた。骨質層は層板骨で構成されていた。また、一部の骨髄では充血が著明であった。なお、一部では骨髄腔に滲出による血漿の貯留をみるものもあった。

2) 装着後 30 日 (図 28, 29)

下顎頭の被膜ならびに軟骨層の菲薄化が明らかで、また軟骨化骨も著明であった。骨化部は緻密骨から成るが、やや深部では細い骨梁と広大な骨髄腔の形成による海綿骨様構造を示していた。また、骨髄は著明な血管の拡張と充血所見をみるが、脂肪化はみられなかった。

関節円板は著明な関節腔の狭小化により、菲薄化を呈していた。また硝子様変性も明らかであった。

下顎窩壁は被膜と軟骨層の区別は明らかではなかった。軟骨層は骨化が進行し、軟骨化骨となり、諸所に軟骨細胞の埋入をみるが、分明ではなかった。骨化部はきわめて緻密で osteon の形成も著明であった。

3) 装着後 60 日 (図 30, 31)

下顎頭の軟骨層は 10 日例に比べて菲薄化を呈し、特に肥太層の幅が狭かった。骨質層では骨梁が融合して緻密な層板状骨を形成する傾向がみられた。骨髄腔は赤色骨髄で満たされていた。

関節円板は下顎頭ならびに窩壁の被膜と合体して両者の境界は不分明となり、一部では硝子様変性が認められた。一方、右側では関節円板前方部の一部に脂肪化が認

図 30 60 日両側 1 mm 挙上左側

図 33 90 日両側 1 mm 挙上右側

図 31 60 日両側 1 mm 挙上右側

図 34 120 日両側 1 mm 挙上左側

図 32 90 日両側 1 mm 挙上左側

められた。

下顎窩壁の軟骨層も骨化の進行による菲薄化がみられたが、軟骨層と骨質層の区別は分明であった。また骨質層における骨化は顕著で、緻密化を呈し骨髓が少なかった。

4) 装着後 90 日 (図 32, 33)

下顎頭の被膜には著変をみないが、軟骨層は中央から前方部にかけて菲薄化が著明であった。また、骨化の状態もそれ程著明でなく、化骨層の幅も余り広くなかった。

た。また、骨質部は細い骨梁と広大な骨髓腔の形成をみた。なお、下顎頭の前縁部では吸収窩が認められた。

関節円板は関節腔の狭小による菲薄化が明らかで、総体的に中等度の硝子様変性が認められた。

下顎窩壁の被膜層は肥厚増殖し、軟骨層の一部で消失をきたして、全体に軟骨層の菲薄化を呈していた。また骨化が著明で、緻密な層板骨の形成をみた。

5) 装着後 120 日 (図 34, 35)

両側下顎頭は化骨の進行により軟骨層の菲薄化がみられた。被膜層は分明で増殖層はきわめて狭く、肥大層はやや狭い傾向を示していたが、後縁部ではやや厚くなっていた。化骨部では、軟骨細胞の埋入をみた。特に、右側の下顎頭被膜層の一部では関節円板と癒着傾向が認められた。また、下顎頭前縁部での骨吸収が著明であった。なお、骨質層は骨化が著明で、骨梁は融合して緻密化の傾向を呈していた。

関節円板はやや菲薄化を呈し、軽度の硝子様変性が認められた。

下顎窩壁の被膜層は肥厚し、軟骨層の各層は不分明で著明な肥厚をみるが、軟骨層の化骨不全を示す所見を呈

図 35 120 日両側 1mm 挙上右側

図 38 10 日両側 5mm 挙上左側

図 36 180 日両側 1mm 挙上左側

図 39 10 日両側 5mm 挙上右側

図 37 180 日両側 1mm 挙上右側

していた。また、骨質層の骨梁は不規則となり軟骨層との境界は不明瞭で骨化が著明で、緻密な層板骨から成っていた。骨髄には特記すべき変化はなかった。

6) 装着後 180 日 (図 36, 37)

下顎頭の軟骨層は著明な菲薄化を呈し、また、石灰化層と骨質層との境界部では骨化が進行し、骨梁は太く、一部で融合が認められた。後縁部では、被膜層と関節円板との境界は不明瞭であった。また、軟骨層の各層は不分明であった。

関節円板は菲薄となり、硝子様変性を呈していた。後方部では限局性の石灰化層が認められた。

下顎窩壁では被膜層の肥厚と軟骨層の退縮による線維化で境界は不明瞭であった。骨質層は緻密化が進み、著明な骨化傾向が認められた。

4. 5mm 挙上両側装着群

1) 装着後 10 日 (図 38, 39)

両側の下顎頭の軟骨層の菲薄化がみられたが、各層は比較的分明であった。特に肥大層の幅は狭かった。骨質層では骨梁形成は少なかった。骨髄の形成は顕著で、骨髄の占める割合は多かった。

関節円板はやや菲薄化の傾向が認められ、緻密化を呈していた。

下顎窩壁は前縁部では軟骨層はほぼ消失し、頭頂部でもきわめて幅が狭くなっていた。骨質層は骨化が進み、緻密骨の形成を認めた。

2) 装着後 30 日 (図 40, 41)

両側の下顎頭中央部の軟骨層は不分明で、肥大層の軟骨細胞をみるのみで、全体に軟骨層は菲薄となり、被膜

図 40 30 日両側 5 mm 挙上左側

図 43 60 日両側 5 mm 挙上右側

図 41 30 日両側 5 mm 挙上右側

図 44 90 日両側 5 mm 挙上左側

図 42 60 日両側 5 mm 挙上左側

図 45 90 日両側 5 mm 挙上右側

層と骨質層の近接が認められた。骨質層は緻密で、層板骨を形成しているが、その他の部分では骨髓腔は広大で骨梁の形成も著明でなかった。

関節円板はやや菲薄化が著明で、強い硝子様変性が認められた。

下顎窩壁の被膜層は肥厚し、軟骨層の状態は上述の下顎頭の所見とほぼ同一で、骨質層と近接していた。なお、骨化部は緻密で層板骨から成り立っていた。

3) 装着後 60 日 (図 42, 43)

下顎頭の頭頂部では軟骨層は比較的分明で、被膜は肥厚していた。また、軟骨層の菲薄化は著明でなかった。骨化も比較的規則性をもっており、骨質の緻密化も著明でなかった。

関節円板の菲薄化も著明でないが、一部に硝子様変性が認められた。

下顎窩壁の軟骨層の幅はかなり広いが、各層の区分は明らかではなかった。

4) 装着後 90 日 (図 44, 45)

図 46 120 日両側 5 mm 挙上左側

図 48 180 日両側 5 mm 挙上左側

図 47 120 日両側 5 mm 挙上右側

図 49 180 日両側 5 mm 挙上右側

両側の軟骨層および石灰化層は頭頂部から前方部にかけて菲薄化が著明であった。また、軟骨層は肥大層の軟骨細胞のみ分明で他は明らかでなかった。また肥大層の軟骨細胞は柱状配列を示していなかった。なお、一部の例では被膜直下の増殖を認めるものもあった。骨質層の骨梁は融合し、一部では層板骨から成っているが、他は広大な骨髓腔を形成していた。

関節円板は関節腔の著明な狭小化により菲薄化が顕著で、かつ硝子様変性が明らかであった。

下顎窩壁の被膜層はやや肥厚し、軟骨層の境界が不明瞭な部位が存在していた。なお軟骨層の各層は不明で骨化が顕著であった。骨化部は緻密な層板骨から成り立っていた。

5) 装着後 120 日 (図 46, 47)

下顎頭の外形は扁平化を呈し、表面は頭頂部から前縁部にかけて、やや凹凸がみられ、変形が著明であった。同部位では軟骨層はほとんど完全に消失し線維化を呈し、被膜と合体して、線維組織の肥厚がみられた。したがって、被膜層と骨質層は接近してみられた。骨質層は緻密であった。また、骨髓は明らかに脂肪化を呈していた。

た。

関節円板は関節腔の極度の狭小によりほとんど存在しておらず、窩壁と下顎頭が密接する程に接近する所見を認めた。

下顎窩壁の下顎頭と対向する部では軟骨層は不明で変性を呈し均質無構造であった。

6) 装着後 180 日 (図 48, 49)

下顎頭は平坦化を呈し、軽度の変形が認められるものがあった。また関節円板のみられる例でも圧平化が強く硝子様変性も著明であった。頭頂部軟骨層は不明で、化骨開始層相当部は変性により均質無構造を呈していた。そして、被膜層と軟骨層との区別も不明であったが、前縁部は吸収像をみた。

関節円板は中央部から前方部にかけて菲薄化しているが、一部では消失が認められた。また、中等度の硝子様変性をみた。なお、後方部では血管の侵入、脂肪化が認められた。

下顎窩壁では被膜層、軟骨層、増殖層の細胞は分明であるが菲薄化を呈し、軟骨層の一部は吸収、骨質層は層板状かつ緻密骨化を呈していた。

IV. 考 察

いわゆる顎関節症の成因については諸説があり、幾多にものぼる報告が、岡 (1967)²⁾、野口 (1970)²⁸⁾、Furstman (1967)²⁹⁾、鈴木 (1971)³⁰⁾、檜山 (1968)³¹⁾らによりなされている。なかでも咬合異常、歯牙欠損などの内在性因子、すなわち咬合の不調和から生じる場合は上野 (1957)⁸⁾、中村 (1959)⁹⁾、岡 (1967)²⁾、Griffin (1975)¹⁰⁾の報告によると症状を訴える患者の過半数以上を占めている。この咬合の不調和から生じる顎関節機能の異常は、顎口腔系の正常な機能の回復と維持を最終目的とする補綴学に重要な課題であり、近年、多くとりあげられてきた。

Costen (1934)¹⁾ は大白歯または小白歯の喪失後に、下顎頭の遠心移動により耳介側頭神経にぶつかるか、あるいは耳の組織または耳管を直接圧迫するために顎関節機能障害症候群を惹起する事実を強調した。しかし、咬合や下顎運動の研究が進むにつれて、Tench (1938)⁵⁾ Schayler (1939)⁷⁾、Sicher (1954)¹²⁾ らは批判的であり、さらに Schwarz (1959)¹³⁾ らは解剖学的根拠からその Costen 症候群を否定している。

下顎頭は顎関節の解剖学的な特徴からいろいろな位置をとることが可能であり、顎運動は下顎窩の形態、付随している靱帯の伸張度、円板、神経筋機構、歯の誘導斜面によって決定される。Gerber (1970)¹⁴⁾、Nairn (1976)¹⁵⁾、Steinhardt (1967)¹⁶⁾、Hekneby (1974)¹⁷⁾、Griffin (1975)¹⁸⁾ らは正常な下顎頭と下顎窩の関係は安静咬合、中心咬合にあることを重視した。つまり下顎頭の正常な中心位からズレを引き起こす要因は、大白歯、小白歯の喪失あるいは臼歯部の咬合接触の欠如、早期接触、平衡側の咬頭干渉、前方滑走の咬頭干渉であるとしている。このために顎関節が負担過重の状態となったり、片側の咀嚼筋群の緊張活動の増加を来し、これが症候群の始まりであると考察している。

過去、サルの臼歯部に咬合の高いアマルガムを充填した実験的研究は Jankelson (1955)¹⁹⁾ が、また、イヌやサルに咬合の高いインレーや冠を装着した実験的研究は Glickmann (1962)²⁰⁾ が報告している。しかし、顎関節の経日的変化の報告は山崎 (1979)²⁵⁾ 喜久田 (1980)²⁶⁾ らが報告しているに過ぎない。

なかでも山崎 (1979)²⁵⁾ は、本実験と同様に片側の咬合を挙上した結果を報告している。

本実験では、顎関節を中心とした咬合の早期接触を重

要視し、咬頭干渉を実験的に惹起せしめたものである。その結果より、片側挙上群においても 1 mm 挙上群も 5 mm 挙上群も装着後 10 日後に病理学的異常が認められた。特に、5 mm 挙上群においては下顎頭の平坦化と軟骨層の消失および一部の骨梁の配列の異常がみられ、関節円板は一部破損し、穿孔が認められることから、急激な咬合の変化が著しく顎関節組織に影響を与えたことが推察される。この傾向は、山崎 (1979)²⁵⁾ も実験後 5 日後で顎関節の中央狭窄部より後縁にかけて硝子軟骨細胞の膨化が観察され、実験側でも同様の変化が認められたと報告している。

また山崎 (1979)²⁵⁾ は、実験側は非実験側に比べて、実験側の細胞の膨化が強いと指摘している。しかしながら、著者の実験では片側装着例に関しては非機能側の顎関節の方に著明な変化がみられた点で山崎 (1979)²⁵⁾ の報告とやや差異があった。この差については野口 (1970)²⁸⁾ が、短時間の刺激によって顎関節に一過性の代謝異常が生ずることを報告している。本実験では、咀嚼運動時の早期接触のみならず、いわゆる安静空隙の消失によって急速に惹起された症状ではないかと推察される。しかしながら、本実験においては初期における 1 mm の両側挙上群の場合、同じ 1 mm の片側挙上群と比較してその組織像は著明でなく、経日的に関節円板が菲薄化する傾向が認められた。

以上のことから片側性挙上群より両側性の方が、やはり組織に対してやや安定していると推察される。過去の実験報告では、両側を挙上した実験はみられないが、片側の歯牙欠損による顎関節の変化の報告によると非機能側の関節頭軟骨層に幅の縮小を認め、機能側は正常と変わらないという報告もみられる。Furstman (1967)²⁹⁾、鈴木 (1971)³⁰⁾、檜山 (1968)³¹⁾、本実験での両側性の 1 mm 挙上群の場合、顎関節組織に初期において著明な症状が認められないことから、前述したように、安静空隙の消失限界をまぬがれていたことが重大な要素となっているものと考えられる。

この初期での所見で、咬合のバランスと安静空隙の有無およびその許容範囲は、顎関節に対するかなりの機能変化の可能性をもつものと考えられる。また、本実験で経日的にもっとも著明に変化したものは、片側性の 5 mm 挙上群であって、ついで両側性 5 mm 挙上群のつぎに 1 mm の片側性の挙上群があり、最後に 1 mm 挙上両側群であった。両側 1 mm 挙上群については病理的所見は認められたが、一番軽症で遅延した。このことは、やはり早期接触と常時の咬合状態の急激な変化、す

なわち安静空隙の喪失によるものと考えられる。安静空隙の喪失は顎関節の負担となることは勿論であるが、神経筋機構に対する影響も生じてきており、そのため絶えず生理的に不安定な状態が発見されているといえよう。

本実験結果を咬合高径の変化に伴う下顎窩壁、関節円板および下顎頭の変化についてみるとこの3要素は常に相互の関係を保っているが、片側装着群と両側装着群では左右の関節部には明らかな組織変化の違いがみられ、特に片側装着群ではその変化が著明であった。このことは、片側装着群、すなわち歯列のどちらかに咬合の高い補綴物が装着された場合には、片側性の干涉性咬合が生じ、そのためそれをさけるような片側性の咀嚼が行われる、その影響は、干涉性咬合接触が発現している歯(牙)および対合歯の動揺と移動、そして歯周組織の変化として現れる。Glickmann (1962)²⁰⁾ は、咬合の高い修復物を装着して早期接触を起こした場合、最初は著明な動揺が起こってくるが、やがて歯(牙)が歯槽窩内へ嵌入したり、咬耗が起こって早期接触を軽減し、歯(牙)の動揺は正常にもどってしまうと報告している。また、Jankelson (1955)⁹⁾ はサルに咬合の高いアマルガムを充填した場合には grinding を生じると報告している。このことは、健全な歯周組織ではかなり強い咬合圧にも十分耐える構造になっており、その咬合の不調和を補償するため神経筋機構や顎関節に影響がおよぶものと考えられる。さらに咬合の不調和により中心咬合位の欠如が生じ、無意識に中心咬合位を探そうとすることと、この位置に至るまでの干涉の排除が顎運動に現れ、この偏心運動が顎関節におよんで、左右顎関節の組織変化の差として現れてくると考えられる。

装着側顎関節の下顎頭では頭頂部から前方にかけて骨の吸収像、下顎頭前壁、後壁の軟骨細胞の増殖がすすみ、さらに下顎頭の位置的变化が関節円板を介して下顎窩に加わりその影響によって関節円板を介して逆に下顎頭に作用して、下顎窩の変形と同じ変化や変形を生じさせると考えられる。また、関節腔に介在する関節円板は両者の影響をうけ、同じような形態の変形が現れてくるものと考えられる。

処置された補綴物により生ずる咬頭干涉、いわゆる咬合の不調和は個々の歯周組織に病変をきたすのみならず、対合歯、反対側の歯(牙)、特に対角線上の歯周組織に強く現れることは知られている。このような周囲組織の病変は短時間のうちに症状が現れるのに対し、顎関節に生じる病変は長時間の経過後に出現する傾向にあり、その現れ方、発現部位もさまざまであり諸説があるのも

うなずける。すなわち Furstman (1967)²⁹⁾ は、関節頭前縁の骨吸収の原因は下顎骨の強い側方の偏位を防ぐための結果であろうと推測している。また鈴木 (1971)³⁰⁾ は骨吸収について臼歯の欠損によって、過蓋咬合の結果関節頭の後上方への移動結果であろうと述べている。これらのことは本実験で先に述べたように、いずれも咬合の高さの変化によって生ずるものであることは明らかである。

しかし、咬合の異常がすべて顎関節症になるとは限らず、顎関節は補償性の機構を有し下顎運動の許容範囲内での小さな不自然な運動が長期間続くと、改造機転によって絶えずわずかな変形をきたし、咬合の不調和を補償していることは知られている。

このような下顎窩表面、関節円板、下顎頭の同じような形態の変化は 1 mm 挙上群では装着後 30~90 日で現れ、また非装着側の関節円板の前方部の周囲組織には充血像、血管の拡張などの炎症性変化として認められた。この所見は装着側より非装着側の方が、炎症性変化が著明に現れるものであり、むしろ装着側より非装着側に影響を与えることを指示しているものといえよう。

しかしながら、装着後 180 日にあっても顎関節部の形態的变化はわずかなものであった。1 mm 挙上群にみられるように下顎運動の許容範囲内であれば、不自然な運動による顎関節部への影響は遅発する傾向にあり、形態的变化や変形もわずかで、生体はその咬合の不調和に順応するものと考えられる。われわれが日常、臨床で遭遇する顎関節症症状としては現れてこないであろう。

一方、5 mm 挙上群では下顎頭頭頂部からやや前方にかけて骨の吸収像、下顎頭前壁および後壁の軟骨細胞の増殖、下顎窩の関節結節には骨の吸収像、天蓋から後方で軟骨の添加像が認められ、特に、1 mm 挙上群と同様に非装着側において組織変化が著明であった。このことは、不自然な運動が長期間続くと、顎関節は改築によって絶えずわずかな変形し、平坦化する傾向を示すといえる。

挙上量が下顎運動の許容範囲を越えるような高い咬合の場合は、非装着側の関節部に著明に現れるのが特徴的であり、高い補綴物を支点とした下顎のシーソー運動による下顎窩内での下顎頭の位置的变化が非装着側関節部に大きく起こるのであろうし、これは咬合関係を持続させようとするための生理的生体反応といえよう。

Morris (1951)²¹⁾ は下顎骨をつり下げて緊張させたりすることによって、顎関節に障害をきたす原因になると下顎のシーソー運動を説明している。

また、De Boever (1969)²²⁾、佐藤 (1974)²³⁾らは口腔内に高いアンレーを装着して、人工的に早期接触を引き起こした場合の影響を筋電図学的に観察し、神経筋機構の変化を報告している。すなわち、早期接触歯が存在すると、その歯(牙)に過大な力が加わらないように生体の防御反応として顎運動に変化が起こるものであろう。咀嚼時などの機能運動時において早期接触歯を保護するため、その歯(牙)の強い衝撃を避けるために顎運動時に作用する靱帯や筋に異常が生じ、その部位に症状として出現するものと考えられる。

下顎頭は下顎窩内で前後、左右、上下、回転などの方向へ移動できる。Rees (1954)²⁴⁾によると開口運動時に下顎頭は前方に5~6mm動き、関節結節に最も近づく。本実験で、サルとヒトとの下顎運動の許容量を比較することは困難であるが、1mm 挙上群、5mm 挙上群とも関節結節の吸収や下顎頭の平坦化などの組織変化は同様な傾向が得られた。特に5mm 挙上群ではその変化が著明であったことから、5mm 挙上量はサルの安静空隙量を越えるだろうし、下顎の運動の許容範囲も越えるものと推察できる。さらに、5mm 挙上群では組織変化の発現は10~30日と早期であり、90日で下顎頭の平坦化が認められた。180日後には顎関節の変形、平坦化が著明に認められたが、その機序は営まれている。下顎頭の平坦化は顎運動、咀嚼運動、筋肉その他の作用、食餌などあらゆる要素が集まった結果にみられた組織変化であろうし、関節部の形態的変化が生じて下顎運動が営まれることは、顎関節は補償性を有するということが強調できるものである。さらに、下顎運動の許容範囲を越えるような補綴物による咬合の不調和が顎関節の変形、形態の変化を早めるともいえる。この形態の変化は生体の防御反応であり、形態の変化により下顎運動が正常に行えない場合に様様な症状として現れてくるのであろう。

本実験の全般的傾向として受けとめた結果、片側性、両側性ともに初期における組織変化は、1mm 挙上両側例を除いて著明で、末期の所見では退行性変化を示した。このことは補綴物の咬合高径の許容範囲を越えたとしても、顎口腔機能は徐々に機能的に対応する可能性を示している。

この結果によって、直ちに臨床的な推論を下すことはできないかもしれないが、補綴物は下顎頭の正常な中心位、すなわち左右前後への咬合状態にズレを起こすことは顎関節は勿論のこと口腔機能系に重大な起因となることは明らかといえよう。

V. ま と め

1) 1mm 挙上片側装着群の観察で、つぎのことが明らかとなった。

装着側では、下顎頭前縁部で骨吸収が認められた。関節円板は、硝子様変性が認められた。下顎窩壁は、被膜の肥厚、線維化、変性が認められた。骨層は菲薄化が認められた。

非装着側では、下顎頭の軟骨層が前縁部で菲薄化、下顎頭の被膜は肥厚が認められた。関節円板は硝子様変性が認められた。下顎窩壁は、軟骨層が変性して、被膜層と軟骨層が均質構造化したことが認められた。

2) 5mm 挙上片側装着群の観察で、つぎのことが明らかとなった。

装着側では、下顎頭の前部で骨吸収が認められた。関節円板は極度に菲薄化して、硝子様変性をきたした。下顎窩壁は、被膜層が肥大し、軟骨層は消失して、骨化が著しく進み、osteonの形成も顕著であった。

非装着側では、下顎頭の前縁部で骨吸収が生じ、その他の部位で軟骨層が菲薄化して、軟骨化骨が認められた。関節腔は拡大したが、関節円板はやや菲薄化して、硝子様変性が認められた。下顎窩壁の被膜層は肥厚し、軟骨層は骨化により消失して、軟骨層と骨質層との境界は、不明瞭であった。

3) 1mm 挙上両側装着群の観察で、つぎのことが明らかとなった。

下顎頭の軟骨層は骨化の進行により菲薄化して、骨質層では骨化が顕著で、骨梁も太く融合が認められた。

関節円板は菲薄化して、硝子様変性が認められた。

下顎窩壁は、被膜層は肥厚、軟骨層では線維化が、骨質層では骨化が認められた。

4) 5mm 挙上両側装着群の観察で、つぎのことが明らかになった。

下顎頭の軟骨層が菲薄化して、外形が平坦となった変形が認められた。被膜層は線維化をきたし、骨質層は緻密となって、骨髓は脂肪化が認められた。

関節円板は、関節腔の狭小により極度に菲薄化して、消失あるいは、硝子様変性をきたしていた。

下顎窩壁では、被膜層は菲薄化し、軟骨層は吸収して、軟骨細胞も消失して均質無構造となり、骨質層は骨化が著明であった。

稿を終わるにあたり、ご指導、ご校閲を賜りました 歯科補綴学第一講座柳生嘉博教授、口腔病理学講座 内海順夫教授に深く感謝致します。また、本研究を行うにあたりご教示いただいた新倉久市講師、ならびに 歯科補綴学第一講座と口腔病理学講座の諸先生方に心からお礼申し上げます。

Summary

An experimental study on occlusal change of monkey by increasing vertical dimension to 1 mm and 5 mm sections with crown work was done. There were two groups used for study, one was setting crown work at only one side while the other was at both sides. The period were divided into 10 days, 30 days, 90 days, 120 days and 180 days after crown setting. The histological studies of temporomandibular joint were taken with the following results;

1. The tissues of the temporomandibular joint were changed at both 1 mm and 5 mm sections, especially the 5 mm sections.

2. Pathological changes on condyle head, disc and condyle fossa were present at both groups, especially on the opposite side to the crown work setting side.

3. Hyaline degeneration was present in all sections of the disc, and the disappearance of the cartilage layer on condyle head and fossa made the tissues retrogress.

4. Bone absorption was present in the anterior portion of condyle head and the cartilage proliferation at the posterior portion of condyle head was recognized at both groups.

5. The condyle head and fossa of both groups on the 120 day and 180 day divisions were flat.

文 献

- 1) Costen, J.B.: A syndrome of ear and sinus symptoms dependent upon disturbed function of the temporomandibular joint, *Ann. Otol. Rhinol. Laryngol.*, 43: 1~15, 1934.
- 2) 岡 達: 顎関節症の研究, *口科誌*, 16: 116~123, 1967.
- 3) 関 秀孝: 顎関節症の補綴学的研究, 第1報, *口科誌*, 35: 213~227, 1968.
- 4) Maves, T.W.: Repositioning of the mandible relative to the temporomandibular joint, correcting cases of subarthrosis and dysarthrosis, *J. Am. Dent. Assoc.*, 22 (5): 763~784, 1935.
- 5) Tench, R.W.: Dangers in dental reconstruction involving increase of the vertical dimension of the lower third of the human face, *J. Am. Dent. Assoc.*, 25 (4): 566~570, 1938.
- 6) Mershon, J.V.: Bite-opening danger, *J. Am. Dent. Assoc.*, 26: 1972~1979, 1939.
- 7) Schayler, C.H.: Problems associated with opening the which would contraindicate it as a common procedure, *J. Am. Dent. Assoc.*, 26: 234~470, 1939.
- 8) 上野 正, 岡 達, 中村充也: 顎関節症の研究 (第2報) 臨床的所見, 治療成績, 成因に関する2・3の考察, *口科誌*, 6: 273~274, 1957.
- 9) 中村充也: 顎関節症の臨床的研究, *口病誌*, 26: 986~1012, 1959.
- 10) Griffin, C.J.: The treatment of the temporomandibular joint syndrome, *Monogr. Oral Sci.*, 4: 170~187, 1975.
- 11) 中村公雄, 山内哲義, 榎阪 朗, 下総高次: 顎関節症患者の統計的観察, *補綴誌*, 19 (2): 232~237, 1975.
- 12) Sicher, H.: Problems of pain in dentistry, *Oral Surg.* 7: 149~160, 1954.
- 13) Schwarz, H.: Disorders of temporomandibular joint, W.B. Saunders, Co., Philadelphia, 1960.
- 14) Gerber, von A.: Kiefergelenk und Zahnokklusion, *Dtsch. Zahnärztl. Z.*, 26 (2): 119~141, 1971.
- 15) Nairn, R.I. and Cutness, T.W.: Changes in mandibular position following removable of the remaining teeth and insertion immediate complete dentures, *Br. Dent. J.*, 122: 203~306, 1976.
- 16) Steinhardt, E.: Consequences de ledentation pantible et totale, *SSO*, 77 (9): 749~761, 1967.
- 17) Hekneby, M.: The load of the temporomandibular joint: Physical calculations and analysis, *J. Prosthet. Dent.*, 31: 303~312, 1974.
- 18) Griffin, C.J. and Malor, R.: An analysis of controlled mandibular movement, *Monogr. Oral Sci.*, 4: 151~169, 1975.
- 19) Jankelson, B.: Physiology of human dental occlusion, *J. Am. Dent. Assoc.*, 50: 664~681, 1955.
- 20) Glickmann, I. and Smulow, J.B.: Alterations in the pathway gingival inflammation into the underlying tissues induced by excessive occlusal forces, *J. Periodontol.*, 33: 7~13, 1962.
- 21) Morris, H.G.: Pathological temporomaxillary mandibular relation, *J. Periodontol.*, 22: 216, 1951.
- 22) De Boever, J.: Experimental occlusal balancing—contact interference and muscle activity, *Paradentologie*, 23 (2): 59~69, 1969.

- 23) 佐藤文彦, 林 和彦, 佐藤義廣, 加藤 潤, 石川 純: 早期接触の咀嚼系におよぼす影響(第1報), 日歯周誌, 16 (1): 321~327, 1974.
- 24) Ress, L.A.: The structure and function of the mandibular joint, Br. Dent. J., 96: 125~133, 1954.
- 25) 山崎 博: 片側咬合挙上による両側顎関節の変化に関する実験的研究, 九州歯会誌, 33 (3): 257~280, 1979.
- 26) 喜久田利弘: 片側歯牙欠損によるサル顎関節の病理組織学的研究, 九州歯会誌, 34 (3): 254~274, 1980.
- 27) 始平堂弘昌: 外傷性咬合による変形性骨関節症の発症に関する実験的研究, 歯学, 68 (4): 675~699, 1980.
- 28) 野口規久男: 外力を与えた際の幼若ラット下顎骨の研究, 口病誌, 37: 222~241, 1970.
- 29) Furstman, L.: The effect of loss occlusion upon the mandibular joint, Am. J. Orthod., 51 (4): 245~261, 1967.
- 30) 鈴木 禎: 各種動物の顎関節円板にみられる軟骨細胞の分布並びに機能的意義について: 3 実験的咬合異常によって生じるラット顎関節の変化: とくに顎関節の変化について, 歯科学報, 71: 1337~1348, 1971.
- 31) 檜山達郎: 抜歯による実験的咬合変化が顎関節に及ぼす影響に関する病理組織学的研究, 口病誌, 35: 598~612, 1968.