鼻腔より生じた多形腺腫症例

名鉄病院耳鼻咽喉科
林 寿 光, 加 藤 雅 也

Intranasal Pleomorphic Adenoma

Hisamitsu Hayashi, Masaya Kato

Department of Otorhino laryngology, Meitetsu Hospital, Nagoya

We report a rare case of pleomorphic adenoma originating from the vestibule of the nose.

A 52-year-old woman reporting left nasal obstruction and intermittent epistaxis was found in anterior rhinoscopy to have a smooth tumor occupying the left nasal cavity, histologically diagnosed as pleomorphic adenoma.

Contrast-enhanced CT showed a soft tissue mass enhanced inhomogeneously in the anterior nasal cavity. The mass abutted the nasal septum and inferior turbinate, but had not destroyed them.

MR showed that the mass was well-defined hyperintense in T2-weighted images and hypointense in T1-weighted images.

En bloc tumor resection including adjacent normal tissue was done via an intranasal approach.

The 30×20 mm, parenchymatous tumor arose from the vestibule of the nose.

On postoperative pathological examination, it was diagnosed as pleomorphic adenoma consisting of solid and myxoid areas.

The difference between immunohistochemical findings for this tumor and those in pleomorphic adenoma is discussed.

Key words : 多形腺腫, 鼻腔原発, 免疫組織化学

はじめに

鼻腔に発生する多形腺腫は本邦では過去80例余りが報告されている。その発生部位は鼻中隔であるものも多く、鼻中隔以外の部位から発生した報告は比較的まれである。今回我々は鼻腔底から鼻前庭にかけて基部をもつ多形腺腫症例を経験したので、若干の文献的考察を加えて報告する。

症例：52歳 女性
主訴：鼻閉，鼻出血
既往歴：慢性腎不全（血液透析中），腎性貧血，高血圧
家族歴：特記すべきことなし

現病歴：

平成11年秋頃より鼻閉，時に鼻出血が出現し，徐々に増悪してきた。平成13年はじめより左鼻に腫瘤が触れるようになり，平成13年5月26日近医耳鼻咽喉科受診し，鼻腔腫瘍が疑われたため平成13年10月1日当科紹介。

局所所見（図1）：

左外鼻の腫脹を認め，前鼻鏡所見で左外鼻孔を完全に閉塞する表面平滑で軽度発赤し，弾性のある腫瘤を認めた。頸部リンパ節は触知しなかった。鼻腔内側への剥離子の挿入が可能であったため，基部は鼻中隔以外と考えられ，腫瘤前端部からの生検にて多形腺腫と診断された。

画像所見：

単純CT検査（図2）；鼻腔前方部に大きさ20×20mm

図1 局所所見 左：左外鼻の腫脹を認めた。
右：外鼻孔を閉塞する腫瘤を認めた。

の鼻腔を閉塞する軟部組織陰影を認めた。鼻中隔は圧排されているが、骨破壊は認めなかった。造影 CT 検査で内部は不均一に造影された。

MRI 検査 (図 3)；鼻中隔，下鼻甲介との境界明瞭で，T1 強調にて低信号，T2 強調にて高信号を呈する腫瘤を認めた。

術中所見：

平成14年2月14日局所麻酔下に手術を施行した。予め患者に対して鼻外切開や歯肉切開をおこなう可能性もあることを説明し，まず外鼻孔を通しての腫瘍摘出を試みた。腫瘍からの出血と摘出時の腫瘍細胞播種の可能性を考慮して，10Fr バルーンカテーテルを鼻腔から上咽頭へ挿入し，後鼻孔を閉鎖する状態で手術を開始した。外鼻孔を通して腫瘍基部が鼻前庭から鼻腔底に存在することを確認した上で安全域をとって鼻前庭部皮膚を切開し，鼻腔底に沿って剥離をすすめると，腫瘍の可動性が増し，外切開なしで外鼻孔より腫瘍を摘出することができた (図 4)。視診上，鼻腔側壁と下鼻甲介は腫瘍により圧排されていたが，浸潤は見られなかった。

内視鏡下で明らかな腫瘍の残存が無いことを確認するとともに，病理組織学的に切除断端に腫瘍残存が無いことを確認した。術中の出血は少量であった。また，切除部位には人工真皮をおき，早期の上皮化を促すようにし，手術を終えた。摘出した腫瘍は大きさ 30×20mm の楕円形で被膜におおわれ，表面には軽度凹凸がみられ，触診で弾性硬であった (図 5)。

術後病理組織所見 (図 6)：

HE 染色では好酸性の胞体を持つ細胞が胞巣状に増生する部位と粘液腫様の間質に，好酸性の胞体を持つ細胞が散在する部位からなり，多形腺腫と診断された。

免疫組織学的所見 (表)：

細胞骨格の中間径フィラメントである keratin は陽性

図2 造影 CT 検査 腫瘍は不均一に造影された。

であった。

神経系の中間径フィラメントである¹⁾ GFAP，および一般的な間葉系マーカーである¹⁾ vimentin も陽性であった。筋上皮細胞のマーカーと考えられる^{1~4)} actin は陰性であった。結果の一覧を表に示した。

術後経過は良好で，術後 6 カ月目の鼻内所見では鼻前庭から鼻腔底にかけて上皮化がすすみ，腫瘍の再発は認められない。

考察

1. 発生部位，頻度について

多形腺腫の発生部位は耳下腺，顎下腺，口蓋が90%以上を占め⁵⁾，鼻腔から発生した多形腺腫の占める割合は数%と報告されている。副島ら⁶⁾は6年間で多形腺腫23

図 3 MRI 検査 左：T1 強調にて低信号な腫瘍を認めた。
右：T2 強調にて高信号な腫瘍を認めた。

図 4 術中鼻内所見
(矢印は腫瘍基部を，星印は下鼻甲介を示す。)

図 5 摘出標本
30×20mm 大，被膜に覆われ，表面には軽度凹
凸を認めた。

図 6 病理組織所見 (HE 染色)
細胞が胞巣状に増殖する部位 (上) と粘液腫様な
間質部位 (下) を認め，多形腺腫の診断であった。

例中，耳下腺原発が13例 (57%)，鼻腔多形腺腫は1例 (4%) であったと報告している。Bergman⁷⁾ は1961年
から1967年の間の良性多形腺腫243例中，鼻腔発生のも

のは1例であり，その中の悪性多形腺腫11例中，鼻腔発
生のものは1例と報告している。

鼻腔多形腺腫の発生部位として Compagno ら⁸⁾ は40例
中，鼻中隔25例 (62.5%)，鼻腔側壁8例 (20%)，不明
7例と述べている。本邦での鼻腔原発例は1958年から
1998年までの間に70例が報告¹⁾ され，鼻中隔原発が58例
(83%)，鼻腔側壁12例 (17%) であった。これまで本邦
において報告された悪性多形腺腫は非常に稀であり4症
例のみである⁹⁾ が，鼻腔発生の良性多形腺腫は本症例も

表 免疫組織化学検査

		Keratin	CEA	EMA	S-100	GFAP	Vimentin	Actin	Desmin
鼻腔多形腺腫	自験例	+	-	一部+	+	+	+	-	-
	吉田 他 ¹⁸⁾	+	+	+	+	+	+	-	-
	Nonomura ²³⁾	+	-		+	+	+	+	-
耳下腺多形腺腫	Nishimura ²⁷⁾	+			+	+	+	+	-
	Nakazato ²⁵⁾	+			+	+	+	一部+	
	村上 他 ³⁾				+	+		+	
正常唾液腺	Nishimura ²⁷⁾	+			-	-	-	+	-
	Nakazato ²⁵⁾	+			+	-	-	+	
	村上 他 ³⁾				-	-		+	

含め80数例が報告されており、鼻腔内の腫瘍性病変の一つとして鑑別されるべきと考えられた⁹⁾。

2. 画像的特徴について

鼻腔多形腺腫のCT検査では辺縁整な軟部組織陰影を呈し、非特異的な所見とされる¹⁰⁾。骨・軟骨の破壊がみとめられる症例も報告されている^{11, 12)}が、骨破壊を伴わない^{1, 9, 13~17)}ものがほとんどである。本症例においても鼻中隔の圧排はみられるものの、鼻中隔軟骨の破壊は認めなかった。造影検査では腫瘍性病変の内部は不均一に造影されると報告されている^{1, 11, 12)}。耳下腺発生の多形腺腫のCT所見は輪郭が明瞭で均一な陰影を認め、造影効果を認め¹⁸⁾、鼻腔多形腺腫との大きな相違はないと考えられた。

大唾液腺発生の多形腺腫のMRI検査所見はT1強調で低信号、T2強調で高信号とされている^{12, 19)}。小さな多形腺腫の場合、内部が均一となるのに対し、大きな多形腺腫では分葉状発育し、内部不均一となる傾向がある¹²⁾。本症例の場合も境界明瞭、内部は比較的均一であり、大唾液腺の場合と同様なMRI所見が得られており、これまでの報告^{12, 16, 20)}と同様に、大唾液腺発生の多形腺腫との相違は少ないと考えられた。

3. 病理組織学的特徴について

病理組織学的には鼻腔多形腺腫は大唾液腺発生の多形腺腫に比べ粘液腫様な間質部分の割合が小さく、上皮成分の割合が大きいとされている⁸⁾。このため、粘液腫様な部分からの細胞播種の危険が少なくなり、再発率も低くなるという。本症例の術前および術後の病理組織検査においても上皮成分の割合が大きいという印象があった。多くの報告^{1, 5, 9, 10, 12, 17, 20~24)}には記載はないが、これまで報告された鼻腔多形腺腫の病理組織所見をみると、上皮成分の割合が大きい傾向があると考えられた。再発率に関しては、耳下腺発生の多形腺腫の場合8.8%¹³⁾であるのに対し、鼻腔発生の多形腺腫の場合Compagnoら⁸⁾の34例中3例(8.8%)と報告もあるものの、本邦では再発例が3例²⁰⁾のみで、耳下腺多形腺腫のそれより少な

いと思われる。この理由として、先に述べた病理組織学的特徴以外に腫瘍増大に伴う鼻閉症状が比較的早期に出現することと耳下腺における顔面神経のような重要構造物がないため外科的摘出が容易であることが考えられる¹³⁾。

4. 免疫組織化学的特徴について

これまで報告された鼻腔発生の多形腺腫の中で鼻中隔に基部を持つ多形腺腫の免疫組織化学検査についての報告はある^{1, 23)}が、本症例では鼻腔底発生という点が異なっていたため免疫組織化学的検討をおこなった。

これまで報告された正常耳下腺、大唾液腺発生の多形腺腫に対する免疫染色の結果もあわせて表に示した^{3, 25)}。Keratinが陽性という結果はNonomuraら²³⁾、吉田ら¹⁾と、また大唾液腺多形腺腫の報告と同一のものであった。Keratinは上皮性マーカーといわれており^{1, 26)}、鼻腔発生の多形腺腫は上皮性腫瘍の性質も持ち合わせていると考えられた。

Vimentinは一般的な間葉系のマーカーで¹⁾、正常唾液腺以外、本症例を含む多形腺腫に認められることから、多形腺腫は間葉系の性格も持ち合わせていると考えられた。

神経系への特異的タンパク質といわれる²⁵⁾S-100タンパク、GFAPについては鼻腔、耳下腺を問わず、多形腺腫に陽性であった。とくにGFAPは多形腺腫における粘液腫様な部分や軟骨腫様な部分の腫瘍分化に関連すると考えられ²⁷⁾、多形腺腫の腫瘍関連抗原と言われている²⁵⁾。

本症例の特徴として筋上皮細胞のマーカーといわれる²⁾Actinが陰性であり、これまでに報告された鼻腔、耳下腺多形腺腫の性質と異なっていた。さらに症例を重ねて検討する必要があると考えられた。

5. 治療について

この腫瘍は化学療法および放射線療法に対する感受性に乏しく、手術療法が第一選択とされる²⁰⁾。再発および一部に悪性化した組織が含まれる可能性もあり²⁰⁾、鼻腔

内の発生部位、腫瘍の大きさを検討し鼻内法か鼻外法かを選択すべきである。本症例では発生部位が鼻腔前方にあり、外鼻腔を通して摘出可能であったため、患者にとって低侵襲な鼻内法のみで手術は施行できた。

まとめ

1. 鼻前庭に基部をもつと考えられる多形腺腫症例を経験した。
2. 腫瘍基部を確認し、安全域をとり、鼻外切開なしで腫瘍を摘出することができた。
3. 組織化学的には既報告例の多形腺腫と若干異なる可能性が考えられた。

本論文の要旨は第41回日本鼻科学会（平成14年9月27日、広島）にて発表した。

参考文献

- 1) 吉田高史, 松田秀樹, 小勝敏幸, 他: 鼻中隔原発の多形腺腫例. 耳鼻臨床91: 1219-1229, 1998.
- 2) 高橋光明, 北南和彦, 海野徳二: 耳下腺多形腺腫の基底膜成分の免疫組織学的検討. 日耳鼻95: 1759-1764, 1992.
- 3) 村上匡孝, 牧野市郎, 任書熹, 他: 耳下腺多形腺腫の免疫組織学的検討. 日耳鼻96: 1235-1245, 1993.
- 4) 藤田健介, 篠原孝之, 河北誠二, 他: 鼻中隔に発生した筋上皮腫の1例. 耳喉頭頸73: 595-599, 2001.
- 5) 奥野妙子, 洲崎春海, 小田 恂: 鼻腔多形腺腫の2症例. 耳鼻29: 213-217, 1983.
- 6) 副島邦彦, 田中英一, 平出文久, 他: 耳鼻咽喉科領域における多形腺腫. 耳展28: 375-381, 1985.
- 7) Bergman F: Tumor of the minor salivary glands. Cancer 23: 538-543, 1969.
- 8) Compagno J, Wong RT: Intranasal Mixed Tumors (Pleomorphic adenoma). Am J Clin Pathol 68: 213-218, 1977.
- 9) 古宇田寛子, 竹生田勝次, 西郷 渡, 他: 鼻腔に発生した多形腺腫および悪性多形腺腫の2症例. 耳喉頭頸72: 445-449, 2000.
- 10) Clark M, Fatterpekar GM, Mukherji SK, et al: CT of intranasal pleomorphic adenoma. Neuroradiology 41: 591-593, 1999.
- 11) Prager DA, Weiss MH, Buchalter WL, et al: Pleomorphic adenoma of the nasal cavity. Ann Otol Rhinol Laryngol 100: 600, 1991.
- 12) Motoori K, Takano H, Nakano K, et al: Pleomorphic adenoma of the nasal septum: MR features. Am J Neuroradiol 21: 1948-1950, 2000.
- 13) 鈴木賢二, 森部一穂, 馬場駿吉: 稀なる鼻腔側壁多形腺腫の一例. 日耳鼻93: 740-745, 1990.
- 14) 石丸 正, 滝元 徹, 井本浩二: 鼻前庭側壁に生じた多形腺腫例. 耳鼻臨床86: 1567-1570, 1993.
- 15) 高橋英二, 西田 基: 鼻腔側壁多形腺腫の一例. 日鼻誌36: 6-9, 1997.
- 16) 富山要一郎, 吉田淳一, 赤埴詩朗, 他. 耳鼻臨床92: 491-495, 1999.
- 17) 橋口一弘: 鼻腔側壁に発生した多形腺腫の1症例. JOHNS 16(10): 1661-1664, 2000.
- 18) 村上 泰: 唾液腺良性腫瘍. JOHNS 2(4): 391-401, 1986.
- 19) 沼田 勉: 唾液腺腫瘍. ENTONI 2: 61-67, 2001.
- 20) 若見暁樹, 村岡道徳, 中井義明: 鼻腔に発生した多形腺腫の2症例. 日耳鼻99: 38-45, 1996.
- 21) 吉野邦俊, 佐藤武男, 宮原 裕, 他: 再発性鼻中隔多形腺腫の1症例. 日耳鼻89: 1878, 1986.
- 22) 坂口正範, 佐藤圭司, 岡村光憲: 鼻腔側壁に発生した多形腺腫の1症例. 耳喉頭頸61: 561-565, 1989.
- 23) Nonomura N, Nijima H, Kimura O, et al: Immunohistochemical study of pleomorphic adenoma of the nasal septum. Auris Nasus Larynx 19: 125-131, 1992.
- 24) 堀 泰高, 小坂道也, 萩池洋子, 他: 鼻中隔原発の多形腺腫の1症例. 耳喉頭頸73: 401-403, 2001.
- 25) Nakazato Y, Ishizeki J, Tkahashi K, et al: Localization of S-100 protein and glial fibrillary acidic protein-related antigen in pleomorphic adenoma of the salivary glands. Lab Invest 46: 621-626, 1982.
- 26) Caselitz J, Loning T: Specific demonstration of actin and keratin filaments in pleomorphic adenomas by means of immunoelectron microscopy. Virchows Arch (Patol Anat) 393: 153-158, 1981.
- 27) Nishimura T, Furukawa M, Kawahara E, et al: Differential diagnosis of pleomorphic adenoma by immunohistochemical means. J Laryngol Otol 105: 1057-1060, 1991.

(2002年12月19日受稿, 2003年1月30日受理)

別刷請求先 〒451-8511 名古屋市西区栄生2-26-11

名鉄病院耳鼻咽喉科 林 寿光

Tel 052-551-6121 Fax 052-551-6711