日本農村医学会雑誌

第 55 巻 2006 年 7 月 第 2 号

原著：

視触診・超音波・マンモグラフィ各々の 乳癌見落とし例の検討

土屋十次^{*}，浅野雅嘉^{*}，立花 進^{*}，熊澤伊和生^{*}，
川越 肇^{*}，名和正人^{*}

乳腺外来初診時の視触診（以下，PE），超音波検査（以下，US）およびマンモグラフィ（以下，MMG）各々の検査法で検出し得なかった乳癌症例（以下見落とし群）を比較検討した。病理学的に乳癌が確定した90例のうち PE の見落とし症例数は13例，US は7例，MMG は15例で，有病正診率はそれぞれ PE が85.6%，US が92.2%，MMG が83.3%であった。

二者併用診断として見ると，PE・US 併用の検出率が95.6%，PE・MMG 併用が97.8%であるのに対して，US・MMG 併用が98.9%の検出率を示し最も効率が良かった。

PE と MMG 見落とし群は各々の検出群に比し有意に小腫瘍径乳癌が多いが，US 見落とし群では US 検出群に比して有意差を認めず，US の見落としは腫瘍の大小ではなく乳癌の US 画像診断上の問題であることが示唆された。PE 見落とし群は全乳癌症例に比して有意に組織学的悪性度，浸潤度が低いにもかかわらずリンパ節転移症例が多く，なおかつそれらのリンパ節転移症例はいずれも0.8～0.9mmの小腫瘍径乳癌であり，非触知でも看過できないことが示唆された。

現在，厚生労働省主導で PE・MMG 検診が全国的に普及しつつあるが，必ずしも MMG 万能ではなく見落としも多いので，効率の悪い PE を省いて US・MMG 検診を行なうべきである。

乳癌検診	視触診	超音波検査	マンモグラフィ	有病正診率
------	-----	-------	---------	-------

^{*} 〒501 0696 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪2547 4
揖斐厚生病院外科
（受付：2005年11月21日）

はじめに

乳癌の外来初診時における視触診，超音波検査およびマンモグラフィ各々の検査法で検出し得なかった乳癌症例を検討することにより，各々の検査法の乳癌検出における特性とその診断能を比較検証した。

対象および方法

2002年1月から2005年6月までの3年6か月の間に当院乳癌外来を受診してPE，US，MMGの各検査を施行され，手術を施行してその病理検索結果が乳癌として確定している90症例を対象とした。これらの症例の手術適応決定は，生検または超音波ガイド下針生検にて為された。

視触診（Physical Examination；以下，PE）は仰臥位の受診者に視診および触診を行ない，乳頭や乳房皮膚のひきつれ・陥凹などを観察しつつ乳頭分泌の有無，乳腺の抵抗や腫瘍の有無を確認した。

超音波検査（Ultrasound Examination；以下，US）は探触子を手動走査しつつreal timeにWhole Breast Scanningするもので，7.5 MHzメカニカルセクタ方式の超音波診断装置を用いた。低エコー腫瘍の有無や低エコー域，乳管拡張などを主に検索するが，ダブルチェックは行なっていない。又，原則として視触診を行なった外来初診担当医が同じ診察室に設けられた超音波診断装置を手動走査して診断した。

マンモグラフィ（Mammography；以下，MMG）はマンモグラフィ検診精度管理中央委員会の認定放射線技師が撮影した二方向撮影フィルムを，同会の認定読影医がダブルチェックして診断した。

PEに関しては外来初診担当医が腫瘍を触知し得ず「異常なし」としたり，乳腺抵抗などで「要注意」として処理した乳癌症例をまとめてPE見落とし群とした。USに関しては初診担当医がUS所見上異常を指摘し得ず「正常」としたり，嚢胞や乳腺症と判断し「要注意」として処理した乳癌症例をまとめてUS見落とし群

とした。MMGに関してはダブルチェック診断の結果がカテゴリー2以下の症例をMMG見落とし群とした。

各検査法について有病正診率（癌確定症例数／癌確定症例数＋見落とし症例数）を算定した。又，発見乳癌症例の手術摘出標本について実測腫瘤径（以下，腫瘤径），組織型，組織学的な周囲組織波及程度（以下，浸潤度），リンパ節転移（n因子）等を集計し検討した。結果の有意差検定にはT検定， χ^2 検定とMann-WhitneyのU検定を用いた。

結 果

1．三者併用検診におけるPE・US・MMG各々の見落とし群の内訳（表1）

この90例の乳癌症例のうちPE見落とし群は13例，US見落とし群は7例，MMG見落とし群は15例であった。おのおのの有病正診率はそれぞれPEが85.6%，USが92.2%，MMGが83.3%であった。各群の見落とし内容を網掛け欄にして示す（表1～3）。

90例全体の平均年齢は58.3±13.5歳であったが，PE見落とし群の平均年齢は55.8±8.6歳で，US見落とし群の51.3±6.5歳，MMG見落とし群の51.4±10.6歳に比して高齢症例が多い結果であった。

PEで見落とされた13例（表1）のうち，USを併用することによって9例を拾い上げることができ，PE＋US二者併用診断では見落としは4例（表1，2の♠）となる。同様に，MMGを併用することにより11例を拾い上げることができ，PE＋MMGでは見落としは2例（表1，表3の♣）となる。

USで見落とされた7例（表2）のうち，PEを併用することによって3例を拾い上げることができ，MMGを併用することにより6例を拾い上げることができた。

MMGで見落とされた15例（表3）のうち，USを併用することによって14例を拾い上げることができ，PEを併用することにより13例を拾い上げることができた。

US＋MMG二者併用診断の見落としは浸潤

性小葉癌の1例（表2，表3の ）であった。

これらの見落とし群と検出群の関係を図1に示した。X検査法ではa, b, c, dを検出できるが, e, f, gを見落とすことを示している。一方, X+Y二者併用診断ではgのみを見落とすことを示している。PE+US二者併用の有病正診率は95.6%, PE+MMG二者併用は97.8%, US+MMG二者併用は98.9%となりUS+MMG二者併用診断が最も効率が良かった。

2. PE, US, MMG 各々の見落とし群と検出群の腫瘍径比較（表1～3）

90例全体の平均腫瘍径は 2.0 ± 1.9 cm であっ

た。PE見落とし群の平均腫瘍径は 0.8 ± 0.2 cmでUS見落とし群の 1.1 ± 0.4 cm, MMG見落とし群の 1.0 ± 0.3 cmに比して腫瘍径が小さい傾向にあった。更に, 各検査法について見落とし群と検出群の腫瘍径を比較したところ, PEとMMGでは見落とし群の腫瘍径が検出群のそれに比して有意に小さかったが, US見落とし群では有意差を認めなかった（表2の）。PE, MMGの見落としは腫瘍の大小にかかわらず, USの見落としは腫瘍の大小とは異なる要因によることが示唆された。

表1. 視触診見落とし症例13例の内訳および見落とし例と検出例の腫瘍径比較

症例	年齢	視触診診断	超音波所見	カテゴリー分類	腫瘍径	見落とし群と検出群の腫瘍径比較
1	57	乳腺抵抗	所見なし♠	4	0.9	<div>見落とし群平均腫瘍径 0.84 ± 0.22</div> <div>↕ P < 0.05</div> <div>検出群平均腫瘍径 2.14 ± 1.94</div>
2	52	異常なし	良性♠	3	1.1	
3	45	異常なし	良性♠	5	1.2	
4	53	乳腺抵抗	良性♠	5	0.5	
5	61	乳腺抵抗	低エコー腫瘍	1♣	0.7	
6	54	乳腺抵抗	低エコー腫瘍	2♣	1	
7	38	異常なし	低エコー腫瘍	3	0.5	
8	56	乳腺抵抗	低エコー腫瘍	4	0.6	
9	67	異常なし	低エコー腫瘍	4	1	
10	57	異常なし	低エコー腫瘍	4	0.8	
11	58	異常なし	低エコー腫瘍	4	0.8	
12	55	乳腺抵抗	低エコー腫瘍	5	0.8	
13	72	異常なし	低エコー腫瘍	5	1	

平均年齢：55.8 ± 8.6歳

表2. 超音波見落とし症例7例の内訳および見落とし例と検出例の腫瘍径比較

症例	年齢	超音波所見	視触診診断	カテゴリー分類	腫瘍径	見落とし群と検出群の腫瘍径比較
1	57	所見なし	乳腺抵抗♠	4	0.9	<div>見落とし群平均腫瘍径 1.06 ± 0.42</div> <div>↕ P = 0.099</div> <div>検出群平均腫瘍径 2.03 ± 1.91</div>
2	52	良性	異常なし♠	3	1.1	
3	45	良性	異常なし♠	5	1.2	
4	53	良性	乳腺抵抗♠	5	0.5	
14	54	良性	腫瘍触知	4	1.8	
15	40	良性	腫瘍触知	3	1.2	
16	58	所見なし	腫瘍触知	1	0.7	

平均年齢：51.3 ± 6.5歳

症例1, 2, 3, 4は重複症例

3. マンモグラフィ所見，組織型，波及度，n 因子の比較

PE 見落とし群13例のマンモグラフィ所見を見ると，腫瘤所見を指摘された症例は5例，石灰化所見を指摘された症例は9例，両所見とも指摘された症例は3例を数えた（表4）。また，US 見落とし群7例のマンモグラフィ所見

を見ると，腫瘤所見，石灰化所見を指摘された症例はおおの4例，両所見ともに指摘された症例は2例を数えた（表5）。カテゴリー3以上の腫瘤や石灰化がMMG 上確認される症例でもPE やUS では見落とされ易い状況が示唆された。

これに対して，MMG 見落とし群は15例はカ

表3. マンモグラフィ見落とし症例15例の内訳および見落とし例と検出例の腫瘤径比較

症例	年齢	カテゴリー分類	超音波所見	視触診診断	腫瘤径	見落とし群と検出群の腫瘤径比較
5	61	1	低エコー腫瘤	乳腺抵抗♣	0.7	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> 1.01 ± 0.3 </div> <div style="text-align: center;"> $\updownarrow$ $P < 0.05$ </div> <div style="margin-left: 10px;"> 2.15 ± 1.97 </div> </div>
6	54	2	低エコー腫瘤	乳腺抵抗♣	1	
16	58	1	所見なし	腫瘤触知	0.7	
17	44	1	低エコー腫瘤	腫瘤触知	1.2	
18	61	1	低エコー腫瘤	腫瘤触知	1.5	
19	42	1	低エコー腫瘤	腫瘤触知	0.5	
20	49	1	低エコー腫瘤	腫瘤触知	1.3	
21	54	ns	低エコー腫瘤	腫瘤触知	1.3	
22	51	1	低エコー腫瘤	腫瘤触知	1.2	
23	38	2	低エコー腫瘤	腫瘤触知	0.8	
24	42	1	低エコー腫瘤	腫瘤触知	0.7	
25	33	1	低エコー腫瘤	腫瘤触知	1.2	
26	49	1	低エコー腫瘤	腫瘤触知	1.1	
27	72	1	低エコー腫瘤	腫瘤触知	1.2	
28	63	1	低エコー腫瘤	腫瘤触知	0.7	

平均年齢：51.4 ± 10.6歳

ns...Field 外判定不能例

症例5, 6, 16は重複症例

図1. 視触診，超音波，乳房撮影各々の見落とし群と検出群の関係

テゴリー 3 以上の MMG 診断ができなかった（表 6）。全症例 90 例のうち 62 例，68.9% に対しては腫瘍所見を指摘しカテゴリー 3 以上の診断ができたが，他の 28 例に対しては腫瘍所見を指摘できなかった。その 28 例中の 13 例は石灰化所見でカテゴリー 3 以上の診断ができたが，他の 15 例，53.6% が見落とし群となった（表 7 の）。一方，全症例 90 例のうち 32 例，35.6% に対しては石灰化所見を認めカテゴリー 3 以上の診断ができたが，他の 58 例については石灰化所見を認めなかった。そのうち 43 例は腫瘍所見を認めカテゴリー 3 以上の診断ができたが，他の 15 例，25.9% は MMG 見落とし群となった（表

7 の◎）。

全症例 90 例の組織型分類は非浸潤癌 8 例，乳頭腺管癌 22 例，充実腺管癌 22 例，硬癌 30 例，粘液癌 1 例，髄様癌 3 例，浸潤性小葉癌 4 例であったが，そのなかで PE，US，MMG 各々が見落としした乳癌の組織型の内訳を表 8 に示した。この表の左方から右方に向かって順に組織学的悪性度が高くなる¹⁾のでこの順列で Mann-Whitney の U 検定を行なうと，PE 見落とし群は非浸潤性乳管癌を多く見落とすため，PE 検出群に比して有意に悪性度が低かった（表 8 の， $P < 0.01$ ）。これに対して，MMG ではこの非浸潤性乳管癌の見落としは皆無である反

表 4．視触診見落とし症例の乳腺撮影所見と病理学的諸因子

症例	マンモグラフィ所見		組 織 型	組織学的浸潤度	n 因子
	腫瘍所見	石灰化所見			
1	なし	多形集簇	充実腺管癌	g	n +
2	局所性非対称	微細円形集簇	非浸潤性乳管癌	g	0
3	微細分葉	線状集簇	充実腺管癌	f	0
4	なし	多形区域	非浸潤性乳管癌	g	0
5	なし	なし	硬癌	f	0
6	良性	なし	硬癌	f	0
7	辺縁整腫瘍	なし	非浸潤性乳管癌	g	0
8	局所的非対称	なし	非浸潤性乳管癌	g	0
9	なし	微細円形集簇	乳頭腺管癌	g	0
10	なし	不明瞭区域	非浸潤性乳管癌	g	0
11	なし	不明瞭区域	乳頭腺管癌	g	n +
12	なし	微細線状集簇	充実腺管癌	f	n +
13	微細分葉	多形集簇	充実腺管癌	g	0

表 5．超音波見落とし症例の乳腺撮影所見と病理学的諸因子

症例	マンモグラフィ所見		組 織 型	組織学的浸潤度	n 因子
	腫瘍所見	石灰化所見			
1	なし	多形集簇	充実腺管癌	g	n +
2	局所的非対称	微細点形集簇	非浸潤性乳管癌	g	0
3	微細分葉	線状集簇	充実腺管癌	f	0
4	なし	多形区域	非浸潤性乳管癌	g	0
14	微細鋸歯	なし	硬癌	f	n +
15	局所的非対称	なし	髄様癌	g	0
16	なし	なし	浸潤性小葉癌	s	0

表6．マンモグラフィ見落とし症例の乳腺撮影所見と病理学的諸因子

症例	マンモグラフィ所見		組 織 型	組織学的浸潤度	n 因子
	腫瘤所見	石灰化所見			
5	なし	なし	硬癌	f	0
6	良性	なし	硬癌	f	0
16	なし	なし	浸潤性小葉癌	s	0
17	なし	なし	乳頭腺管癌	g	n +
18	なし	なし	硬癌	f	0
19	なし	なし	硬癌	g	0
20	なし	なし	乳頭腺管癌	g	0
21	なし	なし	充実腺管癌	f	0
22	なし	なし	乳頭腺管癌	g	0
23	なし	瀾漫点状	充実腺管癌	f	0
24	なし	なし	硬癌	f	0
25	なし	なし	充実腺管癌	g	0
26	なし	なし	乳頭腺管癌	f	0
27	なし	なし	髄様癌	f	n +
28	なし	なし	充実腺管癌	f	0

表7．マンモグラフィの腫瘤所見と石灰化所見おのこの見落とし群

腫瘍所見 \ 石灰化所見	石灰化所見あり	石灰化所見なし	計
腫瘍所見あり	19	43	62
腫瘍所見なし	13	見落とし群 15	28 (53.6%)
計	32	58 (25.9%)	90

(%) ...見落とし群が占める割合

表8．視触診・超音波・マンモグラフィ各見落とし群の組織型内訳

組織型 \	非浸潤性 乳管癌	乳頭 腺管癌	充実 腺管癌	硬癌	粘液癌	髄様癌	浸潤性 小葉癌	計
全90症例の組織型内訳	8	22	22	30	1	3	4	90
視触診見落とし群	5	2	4	2				13
超音波見落とし群	2		2	1		1	1	7
マンモグラフィ見落とし群		4	4	5		1	1	15

視触診検出群 vs 見落とし群 ... $P < 0.01$, 視触診見落とし群 vs マンモ見落とし群 ... $P < 0.05$

表9．視触診・超音波・マンモグラフィ各見落とし群の浸潤度内訳

浸潤度	乳腺内	脂肪織	皮膚	胸筋	計
全90症例の浸潤度内訳	29	50	8	3	90
視触診見落とし群	9	4			13
超音波見落とし群	4	2	1		7
マンモグラフィ見落とし群	5	9	1		15

視触診検出群 vs 見落とし群 ☼... $P < 0.05$,

視触診見落とし群 vs マンモ見落とし群 ♣... $P = 0.053$

表10．視触診・超音波・マンモグラフィ各見落とし群のn因子内訳

n因子	no	n1 α	n1 β	n2	n3	n4d	n4i	計
全90症例のn因子内訳	69	13	2	2	2	1	1	90 (23.3%)
視触診見落とし群	10	3						13 (23.1%)
超音波見落とし群	5	2						7 (28.6%)
マンモグラフィ見落とし群	13	1				1		15 (13.3%)

☼...n1 α 以上のn+症例 (%) ...リンパ節転移率

面，浸潤癌のなかでも組織学的悪性度が高いとされる硬癌が多く見落とされており，MMG見落とし群はPE見落とし群に比して有意に悪性度が高かった（表8の☼， $P < 0.05$ ）。

全症例90例の浸潤度分類は乳腺内が29例，脂肪織浸潤が50例，皮膚浸潤8例，筋膜浸潤が3例であったが，そのなかでPE，US，MMG各々が見落としとした乳癌の浸潤度の内訳を表9に示した。Mann-WhitneyのU検定を行なうとPE見落とし群では乳腺内限局癌の見落としがPE検出群に比し有意に多い（表9の☼， $P < 0.05$ ）のに対して，MMGではPEに比し浸潤度の高い乳癌の見落としが多い傾向にあった（表9の♣， $P = 0.053$ ）。

リンパ節転移の程度を見ると，全90症例ではn0が69例，n1 α が13例，n1 β ，n2，n3が各2例，n4d，n4iが各1例であったが，そのなかでPE，US，MMG各々が見落としとした乳癌のリンパ節転移の内訳を表10に示した。n1 α 以上のn+症例を破線枠で囲って示すが，PE見落とし群は3例，23.1%，US見落とし群では2例，28.6%，MMG見落とし群では2例，13.3%のn+症例が見られた。

考 察

乳癌は表在性に腫瘤形成する癌であるため，乳癌の診断はPEから始まり，昭和40年代から各地で行なわれるようになった乳癌検診もPE検診が主体であった。このPE検診での発見乳癌の平均腫瘤径の縮小は経年的に見てもほぼ2cm前後が限界²⁾で，硬い乳腺の深層に存在する小腫瘤径乳癌は見落とされ易く，厚生労働省富永班³⁾の報告にあるように，PE検診発見乳癌は自己発見乳癌に対して5年生存率では有意差があるものの10年生存率では有意差が認められなかった。この結果から，PEにUSやMMGの画像診断を上乗せして小腫瘤径乳癌を検出しようとする気運が高まった。

2001年4月の厚生労働省の通達からPEにMMGを併用したMMG併用検診が全国的に普及し，現在，MMG万能と言わんばかりのMMGへの傾倒が見られる。極端な例では，MMG単独で読影もシングルチェックという検診もあると聞く。検診コストを下げることはできるが，検診精度が保たれるのか問題であるし，せっかく検診に受診しても早期のうちに発見される機会を逸することが危惧される。

我々はPE, US, MMG のおのをおを単独で施行した場合、どのような乳癌が、どのような割合で見落とされるのかを外来受診乳癌症例90例を対象として検討し、効率の良い乳癌の診断を行なうにはこれら三検査法をどのように行なうのが良いかを本稿において検証した。

PEは腫瘤を触知できる乳癌であれば乳頭近辺にあっても、逆に、乳腺辺縁にあっても検出できているが、小腫瘍径乳癌を見落としやすく、USと同様に、微細石灰化病変に対しては無力であった。又、我々の案に相違してPE見落とし例は高齢症例が多かったが、これは萎縮が不均一に進行した乳腺内に乳癌が存在すると鑑別しにくいためと考えている。更にPE見落とし群は、PE検出群に比して有意に腫瘤径が小さく、全乳癌症例に比して有意に組織学的悪性度、浸潤度が低い症例が多いにもかかわらずリンパ節転移を来した症例が23.1%に及び、なおかつそれらのリンパ節転移症例はいずれも0.8~0.9mmの小腫瘍径乳癌であったことは、触れないほど小さな乳癌であっても看過できないことを示唆している。PEの有病正診率は85.6%であった。

USは被曝リスクもなく安全に検診でき、乳腺状況に影響されることなく小腫瘍径乳癌も低エコー腫瘤として検出できるが、腫瘤非形成性病変である不定形な低エコー域病変や乳管内進展性病変の検出に難があり、現在、USカテゴリー分類が策定されつつある^{4,5)}。また、表2に示したように、PEやMMGでは見落とし群が検出群に比して有意に小さな腫瘤径を示したのに対して、USでは見落とし群と検出群の腫瘤径比較において有意差を認めなかった。これはUS見落としが腫瘤の大小の問題ではなく、乳癌のUS画像の識別上の問題であることを示唆している。腫瘤が存在しても乳腺内の脂肪や嚢胞が多発していたり、縦横比の低い扁平な腫瘤であったりすると比較的大きな腫瘤でもUS画像上鑑別できず見落とすことも起こり得る。この問題の解決法として、脂肪や嚢胞から乳癌を鑑別する組織弾性の概念(エラストグラフィ)が提唱されている⁶⁾。USの有病正診率

は92.2%と三検査法中最も高率であったが、反面、US見落とし群のリンパ節転移症例は28.6%で三検査法中最も高率であった。

MMGは、本稿で示したように、乳癌症例の40%ほどに出現する微細石灰化病変を検出するにおいては極めて有効であるが、非石灰化症例においてはその25.9%が見落とされていた。腫瘤病変に関しては、ダブルチェックしても31.1%の症例で腫瘤を確認し得ず、そのうちの53.6%が見落とされていた。

MMG見落とし群はMMG検出群に比して有意に腫瘤径が小さかったが、これはPE見落とし群に比してMMG見落とし群の平均年齢が低かったことと同様、若年者に多い高濃度乳房により小腫瘍径乳癌の見落としが多くなったことによると考えている。ただ、PE見落とし群に比して組織学的悪性度、浸潤度が高い症例が多い傾向にあるにもかかわらず、リンパ節転移を来した症例は13.3%にとどまり三検査法中最も低率であった。MMGの有病正診率は83.3%であった。

PE, US, MMG 各々の有病正診率を諸施設の報告⁷⁻¹⁰⁾から見ると、PEは33~81%, USは56~93%, MMGは52~88%であった。本稿ではPEの有病正診率が高いが、これはPEとUSを初診担当医が同時に行なうことによるバイアスがかかっているためと考えている。逆に言えば、本稿でPE見落とし群とした13例はUSの示唆があっても腫瘤を触知し得ない非触知乳癌を集計したものと考えている。

内田⁹⁾ら、白水¹⁰⁾らは三者併用の結果からUSの検出率が高率であったことを指摘し、USとMMGの二者併用診断が最も効率が良くPEを省くことが可能であるとしている。三検査法のうちどうしても一検査法を省くとした場合、当院の集計結果でも示したように、PEを省いたUS・MMG二者併用診断が98.9%と最も効率が高いことが判明した。

2004年4月の厚生労働省指針¹¹⁾では「年齢による乳腺密度やマンモグラフィによる検診体制の整備状況を考慮して、当分の間はPEも併せて実施する」と記載しているが、この表現は将

来的には PE 省略可能と示唆しているようにもとれる。また、この指針において40歳代の若年受診者に対し二方向撮影 MMG 検診を隔年で導入している。二方向撮影を導入したのは、高濃度乳房が高率にみられる若年者において50歳以上に行なっている MLO 一方向撮影では見落としが多くなるため、同様に、隔年検診としたのは被曝リスクと検診コストを上げないためとしている。しかし、1年間の空白期間を置いたために乳癌が拡大進行してしまうことが危惧される^{12,13)}ことと、40歳代の高密度の硬い乳腺を触診しても本稿に示したように10mm以下の小腫瘍径乳癌が見落とされ易いこと、さらに PE が40歳代の生存率を改善させたというエビデンスがいまだ確立されていないことを考慮すると、40歳代の受診者に対しては PE を省いて、逐年で US と MLO 一方向 MMG を併用した検診を目指すべきであると考え。40歳代の乳癌が見落とされて50歳前後の乳癌死が急激に増加しつつある現在(図2¹⁴⁾)、「年齢による乳腺密度やマンモグラフィによる検診体制の整備」を待つ間 PE を併用している猶予はなく、早急に40歳代に US と MMG を併用した検診

体制を導入すべきである。

検診コストを押し上げる要因の一つに医師の介在が挙げられるが、PE を省くことにより触診医のコストを下げ得るし、US 施行者も医師である必要はなく、日本超音波医学会認定の超音波検査士が探触子を手動走査して US 検査を行なうことも可能で¹⁵⁾、医師は MMG 読影と US 結果を総合判断して最終診断に係るのみとすれば検診コストを圧縮でき、検診カバー率向上にも寄与すると考える。

結 語

1. 乳腺外来受診者に対する視触診、超音波、マンモグラフィの有病正診率はおのの85.6%、92.2%、83.3%であった。
2. 二者併用診断として見ると、視触診・超音波併用の検出率が95.6%、視触診・マンモグラフィ併用の検出率が97.8%であるのに対して、超音波・マンモグラフィ併用が98.9%の検出率を示し最も効率が良かった。
3. 視触診見落とし群は組織学的浸潤度の低い症例が有意に多い反面、リンパ節転移症例が多く、更にこのリンパ節転移症例はいずれも0.8cm から0.9cm の小腫瘍径乳癌であった。
4. 視触診は検診効率が悪いので、50歳前後の乳癌死が急増する現在、40歳代の検診受診者に対して視触診を省いて超音波・マンモグラフィ併用検診を逐年で行なうべきである。

謝 辞

本研究は平成16年度全共連委託研究事業の一環として行なったものであり、その趣旨を第54回日本農村医学会学術総会(軽井沢)において報告した。

文 献

- 1) 坂本吾偉. 乳癌検診に必要な病理学的知識. 日乳癌検診学会誌 2001; 10: 153-158.
- 2) 鯉淵幸生, 飯野佑一, 横江隆夫, 他. 群馬県の乳癌集団検診受診者の年代別特徴. 日乳癌検診学会誌 1998; 7: 143-147.
- 3) 厚生省公衆衛生局編. 昭和54年第4次悪性新生物実態調査報告. 日本対癌協会 1980: 68.
- 4) 角田博子. 超音波検診における要請査基準. 日乳癌検診学会誌 2004; 13: 83-87.
- 5) 東野英利子. 超音波検診による乳がん検診の標準

図2. わが国における年齢別乳癌死亡率の経年的変遷

- 化と精度管理に関する研究．厚生労働省がん研究助成金による「乳癌がん検診の精度及び効率の向上に関する研究」．平成15年度研究報告，2004．
- 6) 植野 映，東野英利子，椎名 毅，他．新しい手法 エラストグラフィ．日乳癌検診学会誌 2005；14：190 195．
 - 7) 角田博子，植野 映，東野英利子，他．乳癌検診における超音波検査の意義．日乳癌検診学会誌 1994；3：9．
 - 8) 山崎美樹，那須 繁，井上幹夫，他．乳癌検診における超音波検査とマンモグラフィの有用性．日乳癌検診学会誌 2001；10：273 280．
 - 9) 内田 賢，山下晃徳，高倉俊晴，他．MMG 検診に視・触診は省けるか？ MMG・US・視触診検査の結果から．日乳癌検診学会誌 2003；12：152 156．
 - 10) 白水光紀，渡辺良二，古澤秀実，他．視触診を省略したマンモグラフィ，超音波併用検診．日乳癌検診学会誌 2003；12：147 151．
 - 11) 「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」．厚生労働省，老老発第0427001号，2004年4月27日．
 - 12) 川守田究，東 博，秋山憲義，他．ダブルングタイムとそれに基づく乳癌検診間隔の検討．日臨外医学会誌 1987；48：898 902．
 - 13) 土屋十次，浅野雅嘉，立花 進，他．リアルタイム超音波併用乳癌検診の腫瘤自覚と腫瘤径．日乳癌検診学会誌 2002；11：89 97．
 - 14) Kuroishi T, Hirose K, Tajima K, et al. Cancer Mortality in Japan, Gann Monography on Cancer Research 1999；47：61.
 - 15) 北濱博之，中込 誠，阿部文子，他．超音波検査による乳癌検診の有用性の検討．日乳癌検診学会誌 1999；8：109 114．

Cases of Breast Cancer Undetected by Physical Examination, Ultrasonography and Mammography

Juji TSUCHIYA^{*}, Masayoshi ASANO^{*}, Susumu TACHIBANA^{*},
Iwao KUMAZAWA^{*}, Hajime KAWAGOE^{*} and Masoto NAWA^{*}

We reviewed the cases of breast cancer that had not been detected by physical examination (PE), ultrasound (US) and mammography (MMG). Of 90 cases that were diagnosed as breast cancer definitely on pathological assay, 13 cases had gone unnoticed by PE, seven by US, and 15 by MMG. Thus, the detection rate worked out at 85.6%, 92.2% and 83.3%, respectively. When the diagnoses were made by any combination of one with another, the detection rate for joint PE/US, PE/MMG and US/MMG came to 95.6%, 97.8% and 98.9%, indicating that the combined use of US and MMG was most efficient.

Tumors that had been undetected by PE and MMG were significantly smaller in size than those that had been detected, but this was not the case for tumors that had gone unnoticed by US. Therefore, we considered that oversight during US examination is more likely due to difficulty making diagnostic differentiation between cancer and fatty tissue or cyst, etc. than tumor size. We found that those cases which had gotten past PE had a significantly lower histological grade malignancy and a lower grade of invasiveness than the other cases of breast cancer, even though the former tended to show lymphatic metastasis frequently. Furthermore, all of these metastatic breast cancers had a smaller diameter ranging from 0.8 cm to 0.9 cm. This suggested that we cannot afford to let them pass because they are non-palpable. At present, the Japanese Ministry of Health, Labor and Welfare are recommending the breast cancer mass-screening by use of PE in combination with MMG. However, because MMG is not always omnipotent and lets many breast cancer cases pass, we should conduct the mass screening with US and MMG but without PE.

^{*} Dept. of Surgery, Ibi Kosei Hospital, Gifu, Japan