研究報告：

骨盤底臓器脱に伴う水腎症の頻度と手術経過

平 林 直 樹*・西 澤 理*・矢 花 由 佳*
若 田 真 実*・佐々木 涼子*

骨盤底臓器脱は直接生命に危険があるものでないため、しばしば放置されてきた。その中には水腎症を伴う例があり、腎不全に至った例もある。当院女性骨盤底医学センター受診者のなかに、潜在する水腎症がどの程度存在するか、また治療により改善するか検討した。2016年1月から2017年12月までに女性骨盤底医学センターを受診した555人（のべ2,065人）のうち、骨盤底臓器脱と診断したものは265人であった。このうち手術を希望した192人を対象とした。術前検査として超音波検査を行ない、水腎症を、正常、軽度、中等度、高度に分類した。手術時に骨盤底臓器脱の程度を、ステージⅠ～Ⅳに分類した。水腎症と診断した症例は合計20人（10.4%）であり、その水腎症の程度の内訳は、軽度：9人、中等度：6人、高度：5人であった。脱のステージが高くなると、水腎症になりやすいとされているが、ステージⅣ骨盤底臓器脱20人の中に、水腎症を7人に認め、うち3人が高度水腎症であった。術前中等度水腎症6人、高度水腎症5人ともに術後に水腎症は改善した。骨盤底臓器脱では水腎症を伴う症例があり、上部尿路の検査が必要である。超音波検査は水腎症の発見に有益である。水腎症が改善するまで6～10月間を要した例があり、早期発見が重要である。TVM手術では膀胱脱ばかりでなく、子宮脱でも子宮摘除をせずに治療することが可能で、水腎症の改善も期待できる。

①骨盤底臓器脱 ②膀胱脱 ③水腎症 ④ TVM 手術

緒 言

女性の陰部に丸いものを触れる骨盤底臓器脱は、脱臓器により、膀胱脱、子宮脱（図1）¹⁾、直腸脱と分類される。骨盤底臓器脱は直接生命に危険があるものでないため、しばしば放置されてきた。しかし、骨盤臓器脱には水腎症を伴う例があり²⁾、その頻度は、7.7%³⁾ から30.6%⁴⁾と報告により差がある、そして、その程度は脱の程度が高いと悪いとしている³⁾。従来は、骨盤底臓器脱治療法として、保存的方法ではペッ

サリーが用いられ、その改善率は77.3%⁴⁾とされている。2000年からメッシュを用いて骨盤底臓器脱を治療する方法が開発され⁵⁾、ペッサリーの代わりにメッシュを使うことにより、水腎症を伴う骨盤底臓器脱も治療されている⁶⁾。今回我々は、当地域での骨盤底臓器脱の受診数と、それに伴う水腎症の頻度を調査し、メッシュ手術で改善するかを検討した。

対 象

2016年1月から2017年12月までに、女性骨盤底医学センター外来を受診した555人中（のべ2,065人）、骨盤底臓器脱と診断したものは265人であった。このうち、手術を希望した194人を対象とした。術前超音波検査を行ない、

* 〒399-8695 長野県北安曇郡池田町大字池田3207番地 1
北アルプス医療センターあづみ病院泌尿器科・女性骨盤底医学センター
(受付：2018年5月28日)

正常骨盤臓器と膀胱脱、子宮脱

膀胱脱

子宮脱

図 1

Ellenbogen の分類 (図 2)⁷⁾ にて、水腎症を、グレード 0 : 正常, グレード 1 : 軽度水腎症 (腎盂の拡張のみのもの), グレード 2 : 中等度水腎症 (腎杯の拡張を伴うもの), グレード 3 : 高度水腎症 (腎実質の菲薄化を伴うもの) に分類した。また、手術時麻酔下に骨盤底臓器脱の程度を POP-Q 分類 (図 3)¹⁾ にて、脱先端の位置に応じて、ステージ I : 腔内, ステージ II : 外陰部 ± 1 cm, ステージ III : 外陰部外, ステージ IV : 完全子宮脱に分類した。

方 法

骨盤底臓器脱整復手術は全身麻酔で、Tension-Free-Vaginal Mesh (以下 TVM) 法で行なった。膈前壁補強時のメッシュの脚部は、上側は閉鎖孔上側に (第 1 アーム), 下側は閉鎖孔下側に (第 2 アーム) 通した。膈後壁補強では、メッシュの脚部を坐骨直腸窩から仙棘靱帯に通した (第 3 アーム) (図 4)。症例により膈前壁補強を第 1 アームと第 3 アームで行なう Elevate 法と、前壁補強を第 3 アームだけで行なう Uphold 法を使い分けた。

結 果

対象とした 194 人のうち術前超音波検査を施行したものは 192 人であった。このうち水腎症をともなう症例は 20 人 (10.4%) であった。その内訳は、軽度水腎症 9, 中等度水腎症 6, 高度水腎症 5 であった (表 1)。軽度水腎症の 9 人では、術後超音波検査を行っていない 2 人

図 2. 水腎症のグレード分類 Ellenbogen 分類

をのぞき、改善したものは1人のみであった。中等度水腎症6人、高度水腎症5人はともに術後水腎症は改善した（表2）。軽度水腎症では骨盤底臓器脱以外の原因のこともあり、また腎機能低下に関わることは少ないとされるので、腎機能低下に関わる高度水腎症5人について検討した。その5人の症例を提示する。

図3. 骨盤底臓器脱のステージ分類 POP-Q 分類

膣前壁補正のメッシュの位置

膣後壁補正のメッシュの位置

図4. TVMメッシュの挿入位置とアームの位置（一部改変）

表1

脱 Stage	総数	年齢(中央値)	BMI (中央値)	水腎症	軽度	中等	高度
正常 I	4	76.5 (78.5)	24.2 (25.2)	0			
軽度 II	70	72.3 (73)	23.5 (23.1)	6	2	4	
中等 III	98	70.7 (72)	23.9 (23.4)	7	4	1	2
高度 IV	20	72.3 (70.5)	23.9 (23.4)	7	3	1	3
計	192	71.5 (72)	23.7 (23.4)	20	9	6	5

表2

水腎症	計	術後改善なし	改善あり	術後未検査
軽度	9	6	1	2
中等	6	—	6	—
高度	5	—	5	—

図5．症例1：術前完全子宮脱

図6．症例1：術前と術後32日目の超音波像

症例1：79歳，女性。

経過：14年前から子宮脱のため pessary で様子を見ていた。1年前から膀胱脱も伴い（図5），排尿困難，尿失禁が出現した。残尿検査では自排尿87ml，残尿209mlであった。超音波検査で水腎症（図6）を認めた。2016年手術を行なった。手術法は，Elevate 法に準じ行なった。手術時間は50分であった。術後32日目の超音波検査で水腎症は改善した（図6）。

症例2：74歳，女性。

経過：5年前から子宮脱（図7）があった。脱以外の症状がないことから経過観察をしていた。2年前に e-GFR：75から55 (ml/min/1.73m²) と，腎機能低下を指摘され，超音波検査では水腎症であった（図8）。2017年手術を行なった。手術法は，Elevate 法に準じた。手術時間は65分であった。術後55日目の超音波検査で水腎症は改善した（図8）。

図7．症例2：術前完全子宮脱

図8．症例2：術前と術後55日目の超音波像

症例3：76歳，女性。

経過：76歳女性で，10年前から子宮脱（図9）があり， pessary で経過を見ていた。1年前に水腎症を指摘された，脱がひどくなったので受診した。術前 CT（図10）で，右尿管は，生殖裂孔部で脱に挟まれた部と，伸展された膀胱壁内尿管部で狭窄していた。左水腎症も同部で狭窄していた。2017年手術を行なった。手術法は，Elevate 法に準じた。手術時間91分であった。術後抜管時の努責で，脱が再発してしまった。術後婦人科で pessary 療法としている。術後1，2月後の超音波検査では水腎症は改善していなかったが，5月後の超音波検査（図11）にて水腎症は改善した。

症例4：83歳，女性。

経過：72歳時から子宮脱（図12）として10年前から pessary を入れていた。1年ほど前から残尿感があり，膀胱炎を繰り返すため，受診

図9. 症例3：術前子宮脱

図10. 症例3：CT 生殖裂孔部と膀胱壁内尿管部で狭窄

図11. 症例3：術前と146日後の超音波像

した。ペッサリーを外すと、完全子宮脱で、尿閉となるため、一時的に留置カテーテルとした。超音波検査にて右水腎症と胆のう癌を認めた。2016年 TVM 手術を行なった。手術法は Uphold 法に準じた。手術時間52分であった。胆のう癌は後日手術を行なった。10か月後の超音波検査（図13）にて水腎症は改善した。

図12. 症例4：術前子宮脱還納後

図13. 症例4：術前と323日後の超音波像

症例5：78歳，女性。

経過：21年前に糖尿病の低血糖で救急搬送されたとき子宮脱を指摘されていた。手術を希望して受診した（図14）。超音波検査にて左水腎症（図15）を認めた。2017年手術を行なった。手術法は Elevate 法に準じた。手術時間49分であった。1か月後の超音波検査にて水腎症は改善した（図15）。

考 察

骨盤底臓器脱では、構造的に狭い生殖裂孔部で脱出臓器が挟まれ、臓器がひょうたん型に変形することで閉塞すると考えられる。嵌頓する臓器は主に膀胱か、子宮であるが、骨盤底臓器脱が水腎症を起こす原因としては、脱出膀胱ではなく、嵌頓した子宮体部によって、尿管が生

図14. 症例5：術前完全子宮脱

殖裂孔部で圧迫されるためであるとしている⁸⁾。このことが、膀胱脱より、子宮脱に水腎症が多い原因であろう。また裂孔部の狭さだけでなく、輪状の球海綿体筋による圧迫も関与しているとしている⁶⁾。ペッサリーでも脱は改善するが、抜けることがあり、定期受診のわずらわしさがある。TVM手術では短時間の手術で終了することが多く、子宮摘出を行なわないので低侵襲的という、利点がある。症例3, 4では、手術をするまでの保存的治療の期間が長く、手術により水腎症の改善を見るまでに長期の時間がかかった。腎機能障害を伴う子宮脱で、ペッサリーを使用しても改善しなかった例もあることから²⁾、早期に診断し、治療することが進められる。

結 論

骨盤底臓器脱で術前10.4%に水腎症を認めた。骨盤底臓器脱では水腎症を伴う症例があり、上部尿路の検査が必要である。POP-QステージIV20人では、7人に水腎症を認め、その程度の内訳は、軽度3人、中等1人、高度3人であった。中等度水腎症、高度水腎症例ではTVM手術で水腎症は改善した。

水腎症が改善するまで5～10月間を要した例があり、早期発見が重要である。

骨盤底臓器脱において、超音波検査は水腎症の発見に有益である。TVM手術では膀胱脱ばかりでなく、子宮脱でも子宮摘除をせずに治療することが可能で、水腎症の改善も期待でき

図15. 症例5：術前と30日後の超音波像

る。

(症例1, 2, 3は第66回日本農村医学会学術総会にて発表した。)

著者のCOI開示

本論文発表内容に関連して特に申告なし。

文 献

- 1) 西澤 理編. 過活動膀胱と骨盤臓器脱. 大阪：医薬ジャーナル社, 2013: 53—57.
- 2) Sanai T, Yamashiro Y, Nakayama M, et al. End-Stage Renal Failure Due to Total Uterine Prolapse. *Urology* 2006; 67: 622.
- 3) Beverly CM, Walters MD, Weber AM, et al. Prevalence of hydronephrosis in patients undergoing surgery for pelvic organ prolapse. *Obstet Gynecol.* 1997; 90(1): 37—41.
- 4) Dancz CE, Walker D, Thomas D, et al. Effect of pessary use on hydronephrosis in women with advanced pelvic organ prolapse: a self-selected interventional trial. *Int. Urogynecol. J.* 2017; 28(10): 1589—1593.
- 5) 竹山政美編. 女性泌尿器科テキスト. 大阪：MCメディカ出版, 2009: 106—109.
- 6) 高本 均, 岸本 涼, 真弓友介, 他. 性器脱に伴う水腎・水尿管の検討. *西日泌尿* 2009; 71: 264—270.
- 7) 的場 俊, 森田壮一郎, 辻 晃仁: 腹部超音波ハンドブック: 45.
- 8) Hadar H, Meiraz D. Total uterine prolapse causing hydronephrosis. *Surg. Gynecol. Obstet.* 1980; 150: 711—714.

Prevalence of Hydronephrosis and Surgery Results in Patients with Pelvic Organ Prolapse

Naoki HIRABAYASHI*, Osamu NISHIZAWA*, Yuka YABANA*,
Mami WAKATA* and Ryoko SASAKI*

Pelvic organ prolapse (POP) is not regarded as life-threatening, and has been left undiagnosed on occasion. However, in some cases, the condition has resulted in hydronephrosis and renal failure. We have investigated the prevalence of hydronephrosis in patients with POP at the Female Pelvic Floor Medicine Center, and how it may be improved through surgery. Of the 555 patients examined between January 2016 and December 2017, 265 patients were diagnosed with POP. This study involved 192 of these cases diagnosed with POP as subjects. Using preoperative ultrasound scanning, hydronephrosis was classified into four categories depending on severity. At the time of surgery, the conditions of POP were classified into stages I to IV of the POP Quantification (POP-Q) system. Of these 192 patients, 20 (10.4%) had been evaluated as hydronephrosis (slight hydronephrosis 9, mild hydronephrosis 6, and severe hydronephrosis 5). It is known that as the staging of POP progresses, the likelihood of developing hydronephrosis also increases. In 20 cases with POP-Q stage IV, 7 were confirmed to have hydronephrosis; 3 of these were severe hydronephrosis. The 6 cases of mild, and 5 cases of severe hydronephrosis achieved cure after tension-free vaginal mesh TVM surgery. POP may cause hydronephrosis, so examination of the upper urinary tract is necessary. Ultrasound scans are useful in detecting hydronephrosis. There has been a case where it took 6 to 10 months for hydronephrosis to improve, so early diagnosis and management are crucial in order to prevent hydronephrosis. TVM surgery can be used for repair of not only anterior prolapse, but also uterine prolapse, which can be thus treated without hysterectomy, and this has the potential to improve hydronephrosis.

*Female Pelvic Floor Medicine Center, North Alps Medical Center Azumi Hospital, Nagano, Japan