症例報告：

免疫関連有害事象のためニボルマブ休薬後、 再投与にて重篤な有害事象の再発なく長期奏効を 得たPD-L1陰性進行非小細胞肺癌の1例

千 秋 智 重*・丸 山 総 一*・藤 井 伸 哉*

症例は67歳女性。非小細胞肺癌（扁平上皮癌，cT2bN2M1a，StageⅣA）と診断され，5次治療として免疫チェックポイント阻害剤であるニボルマブが投与された。腫瘍生検組織では Programmed cell death ligand 1（PD-L1）陰性であったものの腫瘍縮小効果が得られた。免疫関連有害事象（irAE）と考えられる皮疹・腸炎症状のため休薬が必要となったが，休薬後も縮小効果は持続，8か月以上の完全奏効が得られた。その後再燃し，ニボルマブ再投与にて病変は縮小し部分奏効を維持，皮疹によって休薬となるまで計27コース投与し2年以上病勢を制御することができた。PD-L1陰性にもかかわらずニボルマブが長期奏効し，irAEによる有害事象は初回・再投与時で同等であり比較的安全に長期投与が可能であった。

①肺癌 ②ニボルマブ ③長期奏効 ④免疫関連有害事象

緒 言

2010年に世界初の免疫チェックポイント阻害剤（Immune checkpoint inhibitor（ICI））であるヒト型抗 Cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4（CTLA-4）抗体イピリムマブの悪性黒色腫に対する有効性が示されて以降¹⁾，多数のICIが開発・承認され肺癌の薬物療法においても重要な位置を占めている。

抗 Programmed cell death 1（PD-1）抗体であるニボルマブは2014年に世界に先駆け日本で悪性黒色腫への適応が承認され，翌年には非小細胞肺癌に対する適応承認に至った。その後も多数のICIが承認され，肺癌薬物療法における位置は非常に大きなものとなっているが，

ICIの長期投与や再投与に関する報告はまだ少数である。

今回 PD-L1陰性進行非小細胞肺癌症例に対し細胞障害性抗癌剤・上皮成長因子受容体チロシンキナーゼ阻害剤（EGFR-TKI）投与後にニボルマブが奏効，免疫関連有害事象（irAE）による休薬後に再燃，ニボルマブの再投与により重篤な有害事象の再発なく長期奏効を得た1症例を経験したので若干の文献的考察を加え報告する。

症 例

症例：67歳，女性。

主訴：咳嗽，喀痰，血痰。

既往歴：子宮筋腫（筋腫摘出術後）

生活歴：15本／日×40年 間 喫 煙（30pack-years）。粉塵曝露歴なし。

現病歴：X年6月より咳嗽・喀痰が出現し近医にて加療されていた。X年8月より症状増悪

* 〒383-8505 長野県中野市西1-5-63
北信総合病院呼吸器内科
（受付：2020年1月17日）

図1. 初診時胸部単純X線
右肺門部腫大と連続した右下葉無気肺を認める。

し追加処方されたが改善せず，X年10月中旬血痰を認めたため近医を再診した。胸部単純X線・CTにて右底幹気管支を閉塞する径約4.5cmの腫瘤影および右下葉無気肺，気管分岐下リンパ節腫大，左上葉小結節影を認め（図1，図2 a, c），肺癌が疑われ当科を紹介され受診した。気管支鏡にて右下葉気管支を閉塞する腫瘍性病変より生検施行，Squamous cell carcinoma, poorly differentiated（EGFR 遺伝子変異陰性，EML4-ALK 融合遺伝子陰性）と診断した。PET-CTで右下葉腫瘤（SUVmax12.5），気管分岐下リンパ節（SUVmax3.2），左上葉小結節（SUVmax1.8）に集積を認めた（図2b, d）。頭部造影MRIでは明らかな頭蓋内転移は認められなかった。手術適応も検討されたが，左上葉小結節については転移巣の他，多発癌・良性病

図2. 初診時胸部CT・PET-CT

a：左上葉に小結節を認める。c：右下葉に径約4.5cmの腫瘤影を認める。b，d：左上葉小結節（SUVmax1.8），右下葉腫瘤（SUVmax12.5），気管分岐下リンパ節（SUVmax3.2）にそれぞれFDG集積を認める。

変の可能性も考えられること、重喫煙歴があり気腫性変化が強いことから左上葉小結節の生検を含めた両肺葉切除は困難と判断、cT2aN2M1a, Stage IV (UICC-7版に準拠、UICC-8版 cT2bN2M1a, Stage IVA に相当)と判定した。X 年12月よりカルボプラチン470mg (Day 1) + S-1 100mg (Day 1~14) による初回化学療法を開始、6コース施行し治療効果は安定 (SD) であった。以後休薬し経過観察されていたが、X+2年2月の胸部 CT にて原発巣・気管分岐下リンパ節の増大を認め、2次治療としてドセタキセル 80mg (Day 1) 投与開始、SD を維持したが全身倦怠感が強くまた高度の好中球減少 (Grade 4) のため6コースで投与終了となった。X+2年9月原発巣の増大を認めエルロチニブ 150mg/日投与開始するもさらに増大し X+3年3月投与中止、カルボプラチン 450mg (Day 1) + nab-パクリタキセル 150mg (Day 1, 8, 15) 投与し原発巣の縮小を認めたものの1コース目で細菌性胸膜炎を合併、患者本人の希望もあり化学療法は中断した。以後無治療で経過観察されていたが X+4年1月頃より気管分岐下リンパ節が再増大し、PET-CT でも高度集積を認めた (図3a, b)。

再燃と考え免疫チェックポイント阻害剤の投与を検討、初回診断時の経気管支生検検体で PD-L1 発現検査 (PD-L1 IHC 22C3) を施行したが PD-L1 陰性 (Tumor proportion score (TPS) < 1 %) であった。X+4年5月ニボルマブ導入目的にて当科入院となった。

入院時現症：身長157cm, 体重 49.3kg, 意識清明, 血圧129/95mmHg, 脈拍64/分整, 体温 36.7℃, 経皮的酸素飽和度98%。結膜に貧血黄疸なし。表在リンパ節触知せず。胸部聴打診上異常所見なし。腹部は平坦軟で圧痛なし。四肢末梢に浮腫なし。神経学的異常所見なし。

入院時検査所見 (表1)：腫瘍マーカーである CYFRA の軽度高値を認めた。

入院後経過：入院後ニボルマブ 140mg/2週の投与を開始、重篤な有害事象なく入院後7日で退院した。X+4年6月初旬より手掌を中心に掻痒感を伴う皮疹 (Grade 1) が出現、免疫関連有害事象 (immune-related adverse events (irAE)) と考えステロイド外用薬・抗アレルギー薬内服により対処した。X+4年7月の CT にて気管分岐下リンパ節は縮小し部分奏効 (PR) と判断、投与を継続したが徐々に皮疹が増悪、Grade 2 相当であったものの本人の希望

図3. ニボルマブ初回投与前後PET-CT

a, b: ニボルマブ初回投与前。c, d: ニボルマブ初回投与後。

表1. X+4年5月入院時検査所見

血算		生化学		腫瘍マーカー	
WBC	6,600/ μ L	TP	7.5g/dL	CYFRA	3.7ng/mL
Neu	65.1%	Alb	4.2g/dL	SCC	0.7ng/mL
Lym	28.0%	T-Bil	0.6mg/dL		
Mon	5.6%	AST	29IU/L		
Eos	0.8%	ALT	17IU/L		
Bas	0.5%	LDH	300IU/L		
RBC	431×10^4 / μ L	ALP	393IU/L		
Hb	14.4g/dL	CK	123IU/L		
Plt	17.0×10^4 / μ L	BUN	16.9mg/dL		
		Cr	0.72mg/dL		
		Glu	117mg/dL		
		Na	141mEq/L		
		K	4.1mEq/L		
		Cl	107mEq/L		
		Ca	9.4mg/dL

図4. ニボルマブ初回投与経過

によりニボルマブはX+4年8月下旬に計8コース実施をもって休薬とした。X+4年9月初旬頃よりGrade 1～2相当の下痢が出現, irAEが疑われたが腹部理学所見に乏しく腹部CTにて腸炎の所見も明らかでなかったため, 当院消化器内科と検討の上ステロイド全身投与は行わず慎重に経過をみた。下痢は次第に軽減し, X+4年10月上旬には消失した。また皮膚症状はX+4年9月上旬より改善傾向を認め徐々に軽快した(図4)。ニボルマブ休薬後も

気管分岐下リンパ節は縮小, X+5年2月のPET-CTでも集積を認めず(図3c, d)完全奏効(CR)と判定された。以後無治療でCRを維持していたがX+5年10月のCTで右下葉に径約2cm(図5a)の結節影が出現し, PET-CTで同部位にFDG集積(SUVmax5.9)を認めたため再燃と判断した。ニボルマブ再投与が有効である可能性を考え, 本人・家族と相談の上X+5年10月下旬よりニボルマブ140mg/2週の再投与を開始した。X+5年11月初旬頃か

図5. ニボルマブ再投与前後胸部CT
a: ニボルマブ再投与前。b: ニボルマブ再投与後。

図6. ニボルマブ再投与経過

ら手掌の発赤・皮疹出現，以後範囲の拡大はみられたが Grade 1 相当で推移した。X+6年1月CTにて右下葉結節影縮小を認め，以後PRを維持（図5b）したが，X+6年7月上旬より Grade 2 の多形紅斑型薬疹が出現，ニボルマブ再投与19コース，計27コースで一旦終了とした（図6）。再投与後腸炎症状の再発は認めなかった。ニボルマブ投与終了後6か月の時点で，Grade 1 相当の皮疹が遷延し継続治療を要したが原病の増悪は認めていない。

なお有害事象の重症度は Common Terminology Criteria for Adverse Events Version 4.0 (CTCAE v4.0) に従って分類した。腫瘍の治

療効果判定は改訂版 RECIST ガイドライン (version 1.1) に準拠した。

倫理的配慮

症例報告に関して，当院の個人情報保護規定に基づき，データの匿名化，プライバシー保護を遵守するとともに，掲載については口頭で患者本人の同意を得た。

考察

治療歴を有する進行非小細胞肺癌患者におけるニボルマブとドセタキセルの効果を比較した第Ⅲ相試験である Check Mate-017および

Check Mate-057試験の結果が2015年に発表された。試験ではニボルマブ投与群においてPD-L1発現量にかかわらず、ドセタキセル投与群と比較して全生存期間の有意な延長が認められている^{2,3)}。これを受けて本邦の肺癌診療ガイドラインでは、進行非小細胞肺癌の二次治療においてTPS<1%あるいはPD-L1発現未測定 of 症例にニボルマブの投与を提案するに至った。またCheck Mate-017およびCheck Mate-057試験の長期統合解析結果では、ニボルマブ投与群の4年生存率は14% (PD-L1発現が1%以上では19%, 1%未満では11%)と報告された⁴⁾。PD-1抗体の効果予測因子としてもっともよく知られているのは腫瘍におけるPD-L1発現であるが、本症例のごとくPD-L1陰性にもかかわらず長期奏効例がみられる一方で、PD-L1陽性でも無効あるいは奏効後無効となる症例も少なくない。こうした治療反応の多様性には複数の要因が考えられる。

第一に腫瘍組織におけるPD-L1発現の評価が十分でない可能性が考えられる。腫瘍組織内におけるPD-L1発現は不均一であると考えられており、本症例の生検組織でのPD-L1発現検査結果が腫瘍組織全体のPD-L1発現を反映していない可能性がある。また保存検体でのPD-L1発現検査結果については新鮮検体と保存検体で差がないとする報告や、経年変化により発現が低下するという報告があり一定の見解は得られていない⁵⁾。さらに腫瘍微小環境において、周囲の免疫細胞やInterferon- γ に代表されるサイトカインの刺激などによりPD-L1の発現が容易に変動することも報告されている⁶⁾。本症例のPD-L1は初回診断時の検体で測定されており(再生検も検討したが同意が得られなかった)、ニボルマブ投与時の腫瘍内にPD-L1陽性細胞が存在した可能性は否定できない。

第二にPD-L1が免疫チェックポイント阻害剤の効果予測に関するバイオマーカーとしては不完全であることが挙げられる。腫瘍浸潤リンパ球(Tumor-infiltrating lymphocytes (TIL))を用いた免疫細胞評価や、腫瘍遺伝子変異量

(Tumor mutation burden (TMB))の測定がICI投与後の効果と相関する可能性が報告されている^{6,7)}。IV期非小細胞肺癌に対するニボルマブの治療効果を検討したCheckMate-026試験とその探索的研究において、高TMB群でニボルマブ投与群の無増悪生存期間中央値の延長(9.7か月 vs 5.8か月)、奏効率改善(46.8% vs 28.3%)が示されている^{8,9)}。本症例のTMBは未測定であるが、遺伝子変異量には喫煙が大きく関連しており、重喫煙者である本症例が高TMBでありPD-L1陰性にもかかわらずニボルマブが長期奏効した可能性がある。

本症例はニボルマブ初回投与時にirAEと考えられるGrade 2相当の皮疹を認め一時休薬、その後にirAEを疑う腸炎症状が出現した。原病は8か月以上CRを維持したのち再燃したが、初回投与時のirAEが比較的軽症かつ軽快しており、ニボルマブが奏効している段階での休薬であり再度奏効する可能性も期待されたため再投与を行なった。その結果、腫瘍は再度縮小、有害事象についてはGrade 2相当の皮疹を認めたが腸炎症状の再発はみられなかった。Simonaggioら¹⁰⁾はPD-1/PD-L1阻害剤投与後にGrade 2以上のirAEを認めICI投与中断した症例において再投与の安全性をレトロスペクティブに検討している。それによると93例のうち40例(43%)が中断前と同じICIを再投与され、うち22例(55%)が2回目のirAEを生じ、17例は初回のirAEと同様、5例は異なる症状を認めたが、全ての症例で2回目のirAEは初回よりも重症ではなかったと報告している。また三留ら¹¹⁾はPD-1阻害剤投与により下痢・腸炎を発症した肺癌症例14例のうち4例に再投与を行ない、全例で腸炎の再燃を認めたと報告している。本症例においてはニボルマブ再投与後に皮膚障害はみられたもののその重症度は初回と同等であり、また腸炎症状の再発は認めず比較的安全に投与継続可能であった。irAEによるICI投与中止後に再投与を行なった症例に関する報告はまだ少なく、再投与の安全性に関して今後更なる症例の蓄積が望まれる。

結 論

PD-L1陰性進行非小細胞肺癌症例に対し細胞障害性抗癌剤・EGFR-TKI投与後にニボルマブが奏効，免疫関連有害事象（irAE）による休薬後に再燃，ニボルマブの再投与により重篤な有害事象の再発なく長期奏効を得た1症例を経験した。本症例が長期奏効を得た要因としては診断時の検体におけるPD-L1の測定がニボルマブ投与時の腫瘍内のPD-L1を反映していなかった可能性の他，重喫煙歴からの高TMBの関与などが考えられた。また再投与に際してirAEの重症度は初回と同等であり比較的長期の投与継続が可能であった。

著者のCOI開示

本論文発表内容に関連して特に申告なし。

文 献

- 1) Hodi FS, O'Day SJ, McDermott DF, et al. Improved Survival with Ipilimumab in Patients with Metastatic Melanoma. *N Engl J Med*. 2010 ; 363 : 711—723.
- 2) Brahmer J, Reckamp KL, Baas P, et al. Nivolumab versus Docetaxel in advanced squamous-cell non-small-cell lung cancer. *N Engl J Med*. 2015 ; 373 : 123—135.
- 3) Borghaei H, Paz-Ares L, Horn L, et al. Nivolumab versus Docetaxel in advanced nonsquamous non-small-cell lung cancer. *N Engl J Med*. 2015 ; 373 : 1627—1639.
- 4) Antonia SJ, Borghaei H, Ramalingam SS, et al. Four-year survival with nivolumab in patients with previously treated advanced non-small-cell lung cancer: a pooled analysis. *Lancet Oncol*. 2019 ; 20 (10) : 1395—1408.
- 5) 日本肺癌学会バイオマーカー委員会. 肺癌患者におけるPD-L1検査の手引き 第1版, 2017年 ; https://www.haigan.gr.jp/modules/guideline/index.php?content_id=29 (2020.2.1アクセス)
- 6) Gibney GT, Weiner LM, Atkins MB, et al. Predictive biomarkers for checkpoint inhibitor-based immunotherapy. *Lancet Oncol*. 2016 ; 17 : e542—e551.
- 7) Pan A, Davis AA. et al. Biomarkers for PD-1/PD-L1 blockade therapy in non-small-cell lung cancer : is PD-L1 expression a good marker for patient selection? *Clin Lung Cancer* 2016 ; 17 : 350—361.
- 8) Carbone DP, Reck M, Paz-Ares L, et al. First-line nivolumab in stage IV or recurrent non-small-cell lung cancer. *N Engl J Med*. 2017 ; 376 : 2415—2426.
- 9) Peters S, Creelan B, Hellmann MD, et al. Abstract CT082: Impact of tumor mutation burden on the efficacy of first-line nivolumab in stage IV or recurrent non-small cell lung cancer: An exploratory analysis of CheckMate 026. *AACR* 2017 ; 77(13) : Supplement, pp.CT082.
- 10) Simonaggio A, Michot JM, Voisin AL, et al. Evaluation of Readministration of Immune Checkpoint Inhibitors After Immune-Related Adverse Events in Patients With Cancer. *JAMA Oncol*. 2019 ; 5(9) : 1310—1317.
- 11) 三留典子, 齋藤春洋, 柴田祐司, 他. Programmed cell death protein 1 (PD-1) 阻害剤投与により下痢・腸炎を発症した肺癌症例の臨床経過・検査所見に関する検討. *肺癌* 2018 ; 58 : 262—270.

Long-Term Response in PD-L1-Negative Advanced Non-Small Cell Lung Carcinoma With Discontinued and Restarted Nivolumab Therapy Due to Immune-Related Adverse Event

Tomoshige CHIAKI*, Soichi MARUYAMA* and Shinya FUJII*

The patient was 67-year-old woman with non-small cell lung carcinoma (squamous cell carcinoma, T2bN2M1a, Stage IVA) who was started on fifth-line therapy with nivolumab, an immune checkpoint inhibitor. Although tumor biopsy was negative for programmed cell death ligand 1 (PD-L1), the tumor size decreased. Nivolumab had to be discontinued due to suspected immune-related adverse events (i.e., skin rash and enteritis symptoms), but the tumor size reduction persisted after discontinuation and complete response was maintained for ≥ 8 months. After disease recurrence, nivolumab therapy was restarted. The tumor size decreased, and partial response was achieved and maintained. The disease was successfully controlled for ≥ 2 years (27 courses of nivolumab), when nivolumab therapy was again discontinued due to skin rash. Despite the PD-L1-negative status, the patient achieved long-term response to nivolumab therapy. The immune-related adverse events in this case were comparable between the initial and reintroduced nivolumab therapy, suggesting that nivolumab is safe to administer over the long term.

* *Dept. of Respiratory Medicine, Hokushin General Hospital, Nakano, Nagano, Japan*