広島県東部地区の日本脳炎

永 田 三 六*・塚 本 寛**

日本脳炎の病原体は、一般に **Virus** と思われ、つねに中枢神経系に非化膿性の炎症を招来し、本邦で明治4年(1878年)ごろ吉原風邪として記述された疾病ならびに大正の中期ごろ岡山県に流行した仮性脳脊髄膜炎は、ともにおそらく日本脳炎とみなされ、これは1917年に **v. Economo** が記述した嗜眠性脳炎とは異なり、嗜眠性脳炎は、比較的秋、冬に多く、嗜眠性が著しい。この日本脳炎は、1924年日本で大流行した際、はじめて独立した疾患とみなされ、日本脳炎(以下日脳と略す)と命名された。今回、最近10数年間の広島県および広島県福山保健所管内における日脳の発生状況等を調査し、2~3の認むべき所見を得たので、ここに報告する。

疫 学 的 観 察

日脳の発生、流行は、一般に岡山、広島、山口、福岡、高知、宮崎、鹿児島等の西日本の諸県にしばしばみられるが、長野、新潟、石川、山形、福井等の諸県に発

生することはきわめて稀で、ことに北海道では未だかつてその発生、流行をみたことはない。ただし、東京、大阪、神戸等の大都市にも時によりその発生、流行をみることもある。

本疾患は、昭和21年伝染病と指定され、統計の対称となっているが、1)日本全国で最も流行した年は、昭和31年(1956年)で、日脳患者数は、実に4,538名(死亡者1,600名、致命率(Letalität) 35.2%, 罹患率(Morbilität, Morbidity) 5.0)に達し、次に昭和27, 30, 33年度では、患者数は、それぞれ3,545名, 3,699名, 3,900名におよび、さらに昭和26, 36, 39年度では、それぞれ2,188名, 2,053名, 2,683名の患者数となっている。

2)広島県では、昭和25年には149名の患者を出し、以後増減を繰返していたが、昭和39年には実に201名を算して、むしろ増加し、3)福山保健所管内(福山市、加茂町、神辺町、沼隈町、内海町)でも、昭和25年には32名の日脳患者を出し、以後患者数は増減しつつあった

表A 全国、広島県、福山保健所管内の日本脳炎発生比較

年次 (昭和)	全 国				広 島 県					福山保健所管内			
	患者数	死亡数	致命率	罹患率	患者数	死亡数	致命率 (b)	致命率	罹患率	患者数	死亡数	致命率	罹患率
25	5,196	2,430	46.7	6.2	149	69	46.3	46.3	7.2	32	11	34.3	1.7
26	2,188	956	43.6	2.6	105	44	47.6	41.9	5.0	27	11	40.7	1.4
27	3,545	1,437	40.5	4.1	105	51	54.3	48.5	5.0	10	5	50.0	0.5
28	1,729	720	41.6	2.0	36	10	58.3	27.7	1.7	6	4	66.6	0.3
29	1,758	732	41.6	2.0	13	6	46.2	46.2	1.2	3	3	100.0	0.1
30	3,699	1,373	37.1	4.1	58	31	53.4	53.4	2.7	7	4	57.1	0.3
31	4,538	1,600	35.2	5.0	58	16	41.4	27.5	2.7	14	3	21.4	0.7
32	1,793	774	61.4	2.0	35	13	37.1	37.1	1.6	12	3	25.0	0.6
33	3,900	1,349	34.5	4.2	56	16	28.6	28.6	2.6	7	2	28.5	0.3
34	1,979	723	36.5	2.1	33	17	57.6	51.5	1.5	5	3	60.0	0.2
35	1,607	650	40.4	1.7	24	9	37.5	37.5	1.1	2	0	0	0.1
36	2,053	825	40.1	2.2	49	16	32.7	32.7	2.2	7	0	0	0.3
37	1,363	568	41.6	1.4	32	12	37.5	37.5	1.5	3	2	66.6	0.1
38	1,205	566	46.9	1.3	70	25	35.7	35.7	3.2	17	6	35.3	0.8
39	2,683	1,344	50.0	1.3	201	68	33.8	33.8	9.2	33	6	18.1	1.6

*広島県 福山保健所 **広島県厚生連 尾道総合病院
受付:昭和40年10月18日

が、昭和39年には再び33名となり、少しも減少の傾向を示さない。要するに、日脳患者の年間発生数は、日本全

国、広島県、福山保健所管内のいずれにおいても、昭和25年のそれと昭和39年のそれと比較すると、むしろ後者は前者に比し、少しも減少せず、意外にも逆に増加の傾向が認められる(表A)。

日脳患者の月別発生数の年次推移

1) 日本全国的にみた日脳患者の初発月日、終発月日

等に関し、昭和21年ないし39年の19年間の厚生省の統計(表B)より按ずると、次のことが明らかになった。

初発月日：昭和21、35年度の両年では正月に、昭和27、29、34年度の3年では2月に、昭和32、36ないし38年度の4年では3月に、昭和26、31、39年度の3年では4月に、昭和25、30、33年度の3年では5月に、昭和22ないし24、28年度の4年では6月に、それぞれ初発患者を出

表B 日脳月別患者発生数の年次推移(厚生省伝染病精密統計年表)

年次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	総計
昭和 21	1	2	6	4	3	15	49	53	42	16	4	6	201
" 22	1	-	-	-	-	4	6	64	134	47	-	7	263
" 23	-	-	-	-	-	2	17	3,787	910	41	-	-	4,757
" 24	1	-	-	-	-	3	13	106	818	320	23	-	1,284
" 25	-	-	-	-	1	2	17	3,031	1,856	260	15	8	5,196
" 26	-	-	-	1	4	5	27	160	1,221	160	120	40	2,188
" 27	-	1	1	3	4	10	36	771	2,194	422	73	39	3,545
" 28	2	1	-	1	-	14	46	407	791	336	87	44	1,729
" 29	-	3	2	3	12	16	41	287	990	341	45	18	1,758
" 30	2	-	1	-	5	14	113	1,853	1,378	212	65	56	3,699
" 31	-	1	-	1	8	33	77	2,092	1,723	431	96	76	4,538
" 32	-	-	1	5	11	33	118	704	701	155	54	11	1,793
" 33	-	-	-	-	7	30	200	1,990	1,386	232	37	18	3,000
" 34	-	2	1	3	8	28	157	1,014	581	151	14	20	1,979
" 35	1	2	3	1	14	40	169	801	413	107	22	34	1,607
" 36	-	-	4	1	16	38	319	936	575	129	22	13	2,053
" 37	2	-	2	1	5	17	71	424	645	131	30	35	1,363
" 38	1	-	1	2	3	21	90	385	538	113	25	26	1,205
" 39	1	-	-	1	4	16	165	1,602	752	93	22	23	1,239

し、換言すると、日脳の初発患者は、一般に1ないし6月に出現し得ることを知る。

終発月日：昭和29年度では翌30年1月に、36年度ないし38年度では、それぞれその翌年の1月に、昭和27年度では、翌28年2月に、それぞれ終発患者を出し、さらに昭和22、23年度の両年では10月に、昭和24年度では11月に、昭和25、26、31ないし34年度、39年度の7年では、ことごとく12月に終発患者を出している。要するに、日脳終発患者は、一般に12月に発生するが、時により1ないし2ヶ月、早くまたは遅れて出現することを知った。

以上から、日脳患者の月別発生数を日本全国的にみると、日脳患者は、症例数は少ないながら、四季常存し、正月ないし2月のごとき寒冷期においてすら、日本のいずれかの地区に発生していることは、注目する必要がある。

2) 次で広島県における日脳患者の初発月日、終発月

日等についての調査を昭和24ないし39年度の16ケ年間施行せるところ、次のごときことを知り得た(表F)。

初発月日：昭和29、32、34年度の3ケ年では5月に、昭和26、33、36、37、39年度の5年では6月に、昭和27、28、30、31、35、38年度の6年では7月に、昭和24、25年度の両年では8月に、それぞれ日脳の初発患者を出している。要するに日脳の初発患者は概して6、7月出る傾向を示す。

終発月日：昭和32、33、34、39年度の4年では9月に、昭和29ないし31年度、35ないし37年度の6年では10月に、昭和24、25、38年度の3年では11月に、昭和26ないし28年度の3年では12月に、それぞれ日脳の終発患者を出している。要するに広島県では、日脳の終発患者は、主として9、10月に出る傾向を示す。さら表Fよりして、毎年1ないし3月には、日脳患者は1例すら発生しないことを知った。

表 F 月別年別患者発生数 (広島県)

年次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	総 計
昭和 24	-	-	-	-	-	-	-	2	39	41	2	-	84
" 25	-	-	-	-	-	-	-	87	57	4	1	-	149
" 26	-	-	-	1	-	2	1	10	53	29	7	2	105
" 27	-	-	-	-	-	-	1	7	76	14	6	1	105
" 28	-	-	-	-	-	-	2	5	21	6	1	1	36
" 29	-	-	-	-	1	2	1	3	5	1	-	-	13
" 30	-	-	-	-	1	-	3	30	21	3	-	-	58
" 31	-	-	-	-	-	-	2	25	30	1	-	-	58
" 32	-	-	-	-	1	2	5	10	16	-	1	-	35
" 33	-	-	-	-	-	6	9	25	16	-	-	-	56
" 34	-	-	-	-	1	1	9	16	5	-	1	-	33
" 35	-	-	-	-	-	-	3	13	6	2	-	-	24
" 36	-	-	-	-	-	1	2	35	9	2	-	-	49
" 37	-	-	-	-	-	2	2	6	16	6	-	-	32
" 38	-	-	-	-	-	-	4	34	30	1	1	-	70
" 39	-	-	-	-	-	1	11	153	36	-	-	-	201

3) 広島県福山保健所管内における日脳患者の初発月・日・終発月日、流行期間等の調査を昭和27ないし39年の13ヶ年施行せるところ、次のごときことを知り得た(表C)

表 C 福山保健所管内
日脳の初発、終発患者の発生月日と其経過日数

年 (昭和)	発生 初発月日	終発月日	流行 期間	患者数	死亡数	罹患率
27	25.8	22.9	29	10	5	0.5
28	10.7	17.10	70	6	4	0.3
29	17.6	14.8	59	3	3	0.1
30	8.5	1.9	111	7	4	0.3
31	28.7	29.8	32	14	3	0.7
32	17.8	12.9	27	12	3	0.6
33	12.8	6.9	26	7	2	0.3
34	22.5	27.8	96	5	3	0.2
35	7.7	2.9	58	2	0	0.1
36	7.8	27.8	21	7	0	0.3
37	28.5	26.9	121	3	2	0.1
38	6.7	8.11	125	17	6	0.8
39	12.7	24.9	74	33	6	1.6
40	9.8	-	-	-	-	-

初発月日：昭和30、34、37年度の3年では、5月に初発患者の発生をみたが、これは少数例で、昭和28、31、35、38、39年度の5年では7月に、昭和27、32、33、36、40年度の5年には8月に、それぞれ初発患者の出現を認めた。すなわち日脳患者は、概ね7、8月に初発するものとみなされる。

終発月日：これは昭和28年度では10月17日、昭和38年度では11月8日であったが、これらはいずれも例外と思われる、昭和27、30、32、33、35、37、39年度の7年では9月に、昭和29、31、34、36年度の4年では8月に、それぞれ日脳の終発患者を出している。すなわち、日脳患者の終発月日は、一般に9月と解して、大過はない。なお表Cよりして、福山保健所管内では、日脳患者は、毎年12月ないし4月には1例すら発生しないことを知った。

日脳の流行期間

日脳が流行する直前の気象として、1ないし2週間降雨がなく、気温摂氏28度ないし32度の酷暑の日が続くのを常とすると称されているが、福山保健所管内において、昭和27ないし39年度の13年間、年間における日脳の流行期間を調査せるところ、21ないし125日、平均70日弱であった。さらに福山保健所管内における調査成績よりして、予期のごとく一般に日脳患者の初発月日が早い場合には、その終発月日はかなり遅く、その初発月日が遅い場合には、その終発月日は比較的早いことを知った(表C。)

日脳の罹患率 (Morbilität, Morbidity)

1) 日本全国、広島県、福山保健所管内の何れにおいても、特定人口対す日脳の罹患率の大なる年には一般に日脳患者は多いが(表C、D)、日脳患者の年間における早期発生は、必ずしも上記罹患率の大なることを意味

せず、すなわち必ずしも大流行を招来する前兆とはみなし得ないことを知った。

表D 日脳患者発生次表と其罹患率

年次 (昭和)	全 国		広 島 県	
	患者数	罹患率	患者数	罹患率
21	201	0,3	12	11,1
22	263	0,3	5	0,2
23	4,757	5,9	10	0,5
24	1,284	1,6	84	4,1
25	5,196	6,2	149	7,2
26	2,188	2,6	105	5,0
27	3,545	4,1	105	5,0
28	1,729	2,0	36	1,1
29	1,758	2,0	13	0,6
30	3,699	4,1	58	2,7
31	4,538	5,0	58	2,6
32	1,793	2,0	35	1,6
33	3,900	4,2	56	2,6
34	1,979	2,1	33	1,5
35	1,607	1,7	24	1,1
36	2,053	2,2	49	2,2
37	1,363	1,4	32	1,4
38	1,205	1,3	70	3,1
39	2,683	1,3	201	9,2

2) さらに福山保健所管内において、昭和39年度の管内の全人口に対する日脳の粗罹患率は1,6であるが(表A, C), 市部(福山市)のそれは1,4で、これを町村部

(加茂町, 神辺町, 沼隈町, 内海町)のその2,3に比すると小であるが(表H), この現象は, おそらく **Virus** を保有するコガタアカイエカの密度の人口密度に対する比が, 都市ではかなり小であるが, 町村部では比較的大である事実によるものと解される。因に福山保健所管内においては, 日脳患者数の男女間の性差は著しくない。(表I)

表H 福山保健所管内
日脳患者都市部, 町村部発生数比較

年次 (昭和)	福山市部		町 村 部	
	患者数	死亡数	患者数	死亡数
27	2	1	8	4
28	1	1	5	3
29	1	1	2	2
30	1	0	6	4
31	4	2	10	1
32	8	1	4	2
33	5	2	2	0
34	5	3	0	0
35	0	0	2	0
36	2	0	5	0
37	3	2	0	0
38	15	6	2	0
39	21(1,4)	2	12(2,3)	4
総 計	68	21	58	20

括弧内、粗罹患率

表I 福山保健所管内日本脳炎患者年令別年度別発生表

括弧内、死亡者数

年 令	年次 (昭和)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	小 計	総 計
0—9	♂	4(1)	2(1)	1(1)	1	4	2	1(1)	—	—	2	—	—	1	18(4)	31(8)
	♀	2(1)	2(1)	—	—	1	3(1)	—	—	1	—	—	—	4(1)	13(4)	
10—19	♂	1(1)	—	—	1(1)	4(1)	1	1	1	1	—	1	2(1)	7	20(4)	33(7)
	♀	1(1)	—	1(1)	—	—	2	2	2(1)	—	—	—	1	4	13(3)	
20—29	♂	1(1)	—	—	1	1(1)	1	—	—	—	—	—	1	3	8(2)	22(8)
	♀	—	—	1(1)	1(1)	2(1)	—	—	—	—	—	—	5(2)	5(1)	14(6)	
30—39	♂	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
	♀	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	
40—49	♂	1	—	—	1(1)	1	—	—	—	—	—	—	2	—	5(1)	9(2)
	♀	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1(1)	—	2	4(1)	
50—59	♂	—	—	—	—	—	—	—	1(1)	—	2	—	1(1)	—	4(2)	9(4)
	♀	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1(1)	2(1)	5(2)	

表 E 日脳患者年次別発生表
(広島県, 全国)

年次 (昭和)	広 島 県			全 国
	患者数	罹患率	致命率 (b)	罹患率
21	12	11,1	75,0	0,3
22	5	0,2	120,0	0,3
23	10	0,5	160,0	5,9
24	84	4,1	48,8	1,6
25	149	7,2	46,3	6,2
26	105	5,0	47,6	2,6
27	105	5,0	54,3	4,1
28	36	1,1	58,3	2,0
29	13	0,6	46,2	2,0
30	58	2,7	53,4	4,1
31	58	2,6	41,1	5,0
32	35	1,6	37,1	2,0
33	56	2,6	28,6	4,2
34	33	1,5	57,6	2,1
35	24	1,1	37,5	1,7
36	49	2,2	32,7	2,2
37	32	1,4	37,5	1,4
38	70	3,1	35,7	1,3
39	201	9,2	33,8	1,3

の致命率は、昭和27年ないし39年度の13年間では、全般的には32.5、男子では25.8（患者62名中、死亡16名）女子では39.0（患者64名中、死亡25名）（表I）であった。

日脳の感染について

日脳なる疾患の病原体は、一般に Virus とみなされ、もっぱらコガタアカイエカ (*Culex tritaeniorhynchus*) が、この Virus を保有し、該蚊はこの Virus

をまず豚、羊、馬等の動物に移して感染させ、次に上記動物よりさらに人類に感染させるものと思われ、該蚊は人の日脳患者の初発より約2週間以前に概してその発生の最盛期を示すものと称えられている。1962年岡山県が調査せるところによれば、コガタアカイエカの発生は、岡山市で6月19日、水島市で6月8日、倉敷市で6月6日に初めて確認され、その最盛期は岡山市で7月30日ないし8月17日、水島市で7月24日ないし8月3日、倉敷市で7月31日ないし8月3日で、それ以後は急減する。昭和40年（1965年）広島県福山保健所管内では、コガタアカイエカの初発生は、6月14日で、7月30日前後是最盛期とし、その後漸減した。

しかしながら、既述せるとく、日本全国的にみると日脳患者は僅少例ながら、四季不断に常存し得る事が容認されているので（表B）、コガタアカイエカは、環境の条件いかんによっては、年中生存し得るものなる事を、絶えず念頭に置く事が肝要である。

日脳の予防対策

日脳の感染は、ことにコガタアカイエカと密接の関連性があるため、かかる蚊から身を守る事が根本的の予防策である。同時に平素より一般的の注意として過労を避け、睡眠を充分にとり、適当に栄養を摂取し、長時の直射日光曝露を避ける等の事を行い、身体の抵抗力を蓄える事がもちろん必須である。

次に重要な対策は、予防接種である。日脳には大部分の人は不顕性感染によって多少の免疫を得ている場合が多いが、この際とても必ずしも発病を阻止し得るに足る免疫を得るとは限らない。従って予防接種によって、強毒の Virus が体内に侵入した万一の場合に備えなければならぬが、一般に年令の増加とともにその自然免疫も増大して行くものと考えられるが、年少者にはかかる

表 J 福山保健所管内にて市町村より届出た日脳予防接種実施人員

	福 山 市		神 辺 町		沼 隈 町		加 茂 町		内 海 町	
	初 回	追 加	初 回	追 加	初 回	追 加	初 回	追 加	初 回	追 加
昭和 38	5230	14773	602	2363	—	—	—	—	—	—
	20003		2971		—		—		—	
" 39	5741	17896	914	2732	365	2174	28	—	300	2100
	23637		3646		2539		28		2400	
" 40	17656	23672	2601	3559	1952	1691	3100	50	121	1830
	41328		6110		3643		3150		1951	

自然免疫は弱いものと思われ、ために特に年少者、就中11才までの児童に対しての予防接種の意義が重要視され、厚生省の方針として、保育所、小学校等の協力により、これが励行を期せられていたが、上述のごとく、近來、特に昭和38、39年度では、60才以上の老人にも日脳が、幼、少年者以上に頻発する傾向が著しい事が明らかになったので(表C)、60才以上の老人にも可及的に予防接種を行う事の重要性が認められている。

因に福山保健所管内においては、日脳の予防接種は、昭和38年度より施行しはじめ、福山市部、町村部では、昭和38年度にはそれぞれ29,003名、2,971名、昭和39年度にはそれぞれ23,637名、8,633名、昭和40年度にはそれぞれ41,328名(人口148,964名の約27.7%)、14,845名(人口52,093名の約28.5%)に日脳の予防接種を施行したが(表J)、昭和40年度においては、一人の沼隈町民は、予防接種の効なく、軽症の日脳に罹患したが、幸にも全治した。

コガタアカイエカの駆除対策

コガタアカイエカの幼虫(ポーフラ)の駆除:日脳のVirusのTrägerとして重要視されているコガタアカイエカは、主として沼、水田等に産卵し、ここではポーフラ(Mückenlarve)は成育する。従って沼、水田等において上記蚊のポーフラが、最も盛んに発生する時機を選んで、ポーフラの駆除対策をたてる事が肝要で、従来より薬剤使用による外、鯉、鯰等が養殖されている。

コガタアカイエカの成虫の駆除:この際先ず留意すべき事は、イ)成虫の蚊は、好んで夜間並びに夜の明方に活動、飛翔し、ロ)ことによく人を螫し、危険と考えられる雌の蚊は、好んで比較的温い、湿気の多い洞穴、地下倉、縁の下、床下等を選んで、容易に越冬し得る事等である。従ってこれらの事実留意して、成虫の棲息せる疑いのある場所には、D. D. T. リンデン(主成分は $r=B. H. C$)等の諸種殺虫剤を散布し、その付近の雑草は、これを刈り取る等の方法が講ぜられている。

ただし、上述の駆除法が決して満足すべき効果を挙げていない事は、日脳患者は、現在なお日本全国では依然としてその数を減じない事実(表C, D)よりしても容易に理解し得る所であろう。

結 論

1) 昭和40年(1965年)広島県福山保健所管内(都市部:福山市、人口148,964人:町村部:加茂町、神辺町、沼隈町、内海町、人口52,093人)では、日脳Virusの運搬者なるコガタアカイエカは、6月14日に初発生し、7月30日前後を最盛期とし、以後漸減した。

2) 昭和39年度の福山保健所管内での調査では、管内全人口に対する日脳の粗罹患率は1.6、うち町村部は、2.3、都市部は1.4で、女性の日脳患者数は、昭和38年度と同様に、男性よりも大である事が明らかになった。

3) 日脳患者の初発月日、終発月日を、昭和24年ないし39年の16年間、広島県と福山保健所管内とで調査せるところ、イ)初発患者は、前者では概ね6月または7月に、後者では概して7月または8月に発生し、ロ)終発患者は、前者では概ね9月または10月に、後者では一般に9月に発生し、福山保健所管内での日脳の年間の流行期間は、約70日である。

4) 日脳患者の年間無発生期間は、イ)広島県(昭和24ないし39年)では概ね冬季の正月ないし3月、ロ)福山保健所管内(昭和27ないし39年)では一般に冬季の12月ないし翌年4月であった。

5) 日脳患者の年間発生数を広島県ならびに福山保健所管内(昭和25ないし39年)で調査したところ、昭和39年度の患者数は、昭和25年度のそれに比し、むしろ増加の傾向がみられた。

6) 日脳患者の年令別発生数を、広島県と福山保健所管内とで調査したところ、イ)広島県(昭和24ないし39年)では、ことに昭和38、39年の両年では70才以上の患者が最も多く、60才ないし69才の患者がこれに次で多く、福山保健所管内(昭和27ないし39年)では、1才ないし29才の患者が最も多い。

7) 日脳患者の致命率は、イ)広島県(昭和25ないし39年)では平均39.0、ロ)福山保健所管内(昭和27ないし39年)では、一般的には32.5、都市部のそれは約30.8、町村部のそれは約34.4であり、男の患者のそれは約25.8、女のそれは約39.0であった。

8) 日脳の予防接種は、60才以上の老人にもぜひ実施する必要がある、福山保健所管内にても昭和38年以降これを実施し、昭和40年には、都市部の住民の27.7%に、町村部の夫の28.5%にこれを実施したが、被予防接種者5,6万名強の中の1名のみが、予防効果なく、軽症の日脳に罹患したが全治した。

文 献

- 1) 福山保健所調査資料(1965)
- 2) 平山 雄:日本脳炎の疫学, 最新医学, 17巻6号, 1272頁(1962)
- 3) 広島県衛生統計年報(1948)
- 4) 広島県衛生部昭和40年度防疫資料(1965)
- 5) 広島県統計年鑑(1954)
- 6) 厚生省伝染病精密統計(1949)

7) 厚生指標 (1951ないし1964)	東京医学会雑誌, 10巻8号, 176頁 (1933)
8) 岡山県衛生部調査 (1962)	11) <i>Gerhard Kloos</i> ,: Grundriss der Psychiatrie und Neurologie (1962)
9) 大谷 明: 蚊を中心とした日本脳炎
最新医学17巻6号, 1281頁 (1962)	12) <i>M. Zetkin u. H. Schaldach</i> ,: Wörterbuch der Medizin (1964)
10) 山口信一郎: 流行性脳炎と蚊との関係,	
-

ENCEPHALITIS JAPONICA IN DER ÖSTLICHEN REGION DER PROVINZ HIROSHIMA

Von

S. Nagata und H. Tsukamoto

Aus dem allgemeinen Krankenhaus des Landwirtschaftlichen Vereins (Direktor: Prof. Dr. H. Tsukamoto), Onomichi und aus dem Gesundheitsamt (Direktor: Prof. Dr. S. Nagata), Fukuyama, Provinz Hiroshima, Japan

1) Im Jahr 1965 innerhalb des Bezirks des Gesundheitsamts Fukuyama, nämlich sowohl in einer starkbevölkerten Stadt Fukuyama, welche eine Bevölkerung von etwa 148964 hatte, als auch in 4 an ihr anliegenden schwach bevölkerten Städten wie Kamo, Kannabe, Numakuma, Utsumi usw., die in Gesamtheit eine Bevölkerung von etwa 52093 hatten, wurde erstes Umfliegen des als die Versender der pathogenen Viren der Encephalitis jap. angesehenen *Culex tritaeniorhynchus*, dessen Weibliche besonders verschiedene Säugetiere stechen, am 14. Juli beobachtet, welche Mücken sich etwa am Ende Juli am stärksten vermehrten, um darauf allmählich abzunehmen.

2) In Bezug auf den Bezirk des Gesundheitsamts Fukuyama wurde bestätigt, dass 1) im Jahr 1964 das Verhältnis der Encephalitiskranken zur Gesamtbevölkerung d. h. die Morbilität (Morbidity) 1, 6 betrug und dass 2) diejenige der Stadt Fukuyama 1, 4 zeigte, während diejenige der oben genannten ländlichen Städte 2, 3 betrug und dass 3) im Jahr 1963 wie auch 1964 die Anzahl der Encephalitiskranken bei den Weiblichen grösser war als bei den Männlichen.

3) Die Zeit, wo jährlich erster wie auch letzter Fall der Encephalitiskranken zum Vorschein traten, wurde von 1949 bis 1964 innerhalb des Bezirks sowohl der Sanitätsbehörde der Provinz Hiroshima als auch des Gesundheitsamts Fukuyama untersucht, was uns folgende Ergebnisse erheben liess: Der erste Encephalitiskranke trat beim vorderen im allgemeinen im Juni oder Juli, beim letzteren im grossen und ganzen im Juli oder August auftrat, während sich der letzte Encephalitiskranke beim vorderen gewöhnlich im September oder Oktober, beim letzteren in der Regel im September zeigte; Innerhalb des Bezirks des Gesundheitsamts Fukuyama erreichte die Frist der Epidemie der Encephalitis jap. ungefähr 70 Tage in der Sommerzeit.

4) Was von 1949 bis 1964 die Jahreszeit betrifft, wo kein Encephalitiskranke in Erscheinung trat, so befand sie sich hinsichtlich der Provinz Hiroshima in der Winterzeit zwischen Januar und März, während von 1952 bis 1964 diejenige bezüglich des Bezirks des Gesundheitsamts Fukuyama analog in der Winterzeit zwischen Dezember und April des folgenden Jahres existierte.

5) Die jährliche Verrückung der Anzahl der ausgebrochenen Encephalitiskranken von 1950 bis 1964 nicht nur betreffs des Bezirks der Sanitätsbehörde der Provinz Hiroshima sondern auch des Gesundheitsamts Fukuyama wurde nachforscht, was uns feststellen liess, dass sich die Anzahl der Encephalitiskranken im 1964 im Vergleich mit derjenigen im 1950 nicht verminderte, sondern vielmehr vermehrte.

6) Aus der Einteilung der Anzahl der Encephalitiskranken durch das Alter der betreffenden Kranken ergab sich, dass 1) in der Provinz Hiroshima von 1949 bis 1964, insbesondere im 1963 sowie 1964 die Anzahl der Patienten über 70 Jahre an erster Stelle, diejenige der Patienten von 60 bis 69 Jahre an zweiter Stelle war und dass 2) innerhalb des Bezirks des Gesundheitsamts Fukuyama von 1952 bis 1964 die Kranken von 29 Jahren und darunter am meisten waren.

7) Einerseits betrug das Verhältnis der Sterbefälle zur Gesamtzahl der von der Encephalitis jap. betroffenen Menschen d. h. die Letalität der Encephalitiskranken in der Provinz Hiroshima von 1950 bis 1964 durchschnittlich 39, 3. Andererseits verriet diejenige Letalität innerhalb des Bezirks des Gesundheitsamts Fukuyama von 1952 bis 1964 etwa 32, 5 und nach eingehender Erkundigung zeigten diejenige der Stadt Fukuyama sowie der 4 ländlichen Städte jeder für sich 30, 8 und 34, 4, während diejenige bei den Männlichen 25, 8, bei Weiblichen 39, 0 betrug.

8) Die Schutzimpfung gegen Encephalitis jap. soll unbedingt selbst auch bei den Alten von 60 Jahren und darüber ausgeführt werden. Innerhalb des Bezirks des Gesundheitsamts Fukuyama war die Schutzimpfung gegen diese Krankheit bei 27, 7% der Bevölkerung der Stadt Fukuyama, bei 28, 5% der Bevölkerung der ländlichen Städte vorgenommen. Aber 1 unter etwa 56 tausend Geimpften hatte eine leichtgradige Encephalitis erlitten, die jedoch schnell abgeheilt war.