◇ セミナー ◇

神経因性膀胱の治療について

総合せき損センター泌尿器科 岩坪 暎二*

はじめに

神経因性膀胱治療の最大の狙いは腎臓障害を予防して日常生活に支障をきたさない、できれば尿失禁のない排尿を回復することにある。そのためには、まず細菌感染を起こさない予防的治療に最大の努力をはらわねばならない。なぜなら、神経因性膀胱は感染に弱く、細菌性炎症に侵された組織は回復しにくいからである。

次に、神経回復にみあった膀胱機能を引き出す排尿訓練が必要になる。しかし訓練ですべてが良くなるわけではない。排尿訓練が限界と判断される場合には漫然と訓練を続けるのではなく、次の治療に移るべきである。

尿路の合併症は細菌感染による炎症と尿が出にくいことによる高圧病態で発現すること、それを発見するには尿路造影検査が不可欠であることを強調しておきたい。今日では抗生物質の発達と保険医療の充実によって神経因性膀胱による腎死亡率は激減しており、障害者の Quality of Life に対する認識と要求は逆に高まってきている。診断の面では、尿流動態検査法が発達し、排尿筋括約筋不協調(dyssynergia)などの病態が明らかにされるようになった。また、以前は禁忌とされた自己導尿法が画期的な治療法と認識されるなど十数年昔にくらべ、神経因性膀胱の治療にはいくつかの大きな変化と進歩がある。

尿路の解剖と生理

泌尿器は血中の老廃物を尿として体外に排泄するためのシステムで腎臓が主役である。膀胱は低圧環境を維持し、腎臓から送られてくる尿を絶えず受け入れている。膀胱と括約筋には仙髄を介する神経系が支配し排尿反射運動が起こる。これら神経を介する刺激は脊髄を通して脳幹部および大脳に伝えられ、社会生活に適した排尿に調節される。蓄尿時は膀胱が弛緩して括約筋が閉じ、排尿時は膀胱が収縮して括約筋が開く（排尿筋括約筋協調）という生理的な動きが維持される。尿は膀胱に残ることはなく腎臓へ逆流することもない。つまり、蓄尿と排尿は膀胱と括約筋部尿道の内圧関係で決まり、その詳細は尿流動態検査で明らかにすることができる（図1）。

神経因性膀胱障害の病態

骨髄自律神経経路に障害がある脳卒中、脊髄損傷、二分脊椎などでは、麻痺によって尿意がわからない、排尿できない、尿が近い、尿が漏れるなどの愁訴を伴う神経因性膀胱障害が発生する。排尿困難の病態は、末梢神経障害にみられる弛緩麻痺のために、

① 膀胱が働かない。

② 脊髄障害にみられるような痙性麻痺のために膀胱と括約筋が同時に痙攣する（排尿筋括約筋不協調）。

* 〒820 飯塚市大字伊岐須字道坂 550-4

図 1 正常排尿の尿流動態検査所見
(排尿筋括約協調)

(1)

(2)

(3)

図 2 排尿困難の病態

上段は正常排尿を示す。膀胱内圧が上昇している間、尿道圧は下がり正常な排尿が起こっている。いわゆる排尿筋と括約筋が協調した動きをしている。

(1) 膀胱内圧が低く尿道内圧が高いままのために排尿が起こっていない。

(2) 膀胱収縮に同期して括約筋の痙攣収縮が起こる、いわゆる不協調のために尿線は途切れ途切れである。

(3) 排尿筋と括約筋が協調した動きをしているが長続きせず排尿は不完全で残尿がある。

③ 脳疾患によくみられるように、排尿筋括約筋協調が長続きしない、収縮が弱い。

に分類される (図 2)。

排尿異常が長く続くと神経因性膀胱には合併症が起こる。残尿があるために細菌感染がとれず高圧排尿状態と重なって、膀胱壁が固く萎縮変形してしまう病態である。膀胱に不可逆性の変化が起こってしまうと排尿困難が続くだけでなく、尿のうづ滞や尿管逆流が発生し、ついには水腎症、腎盂腎炎など腎臓障害 (腎不全) に陥ることになる。腎臓障害があっても腎不全尿毒症になるまで、患者には何の症状も自覚されない。尿路の合併症はこの順をおって進むので、排尿訓練の早期から尿流動態検査によって排尿病態を分析し、膀胱に変形が認められる前に治療することが望ましい。定期的な尿路造影検査は合併症を早期に発見するために大切である。

尿失禁の病態は、① 残尿が多い (横溢性尿失禁)、② 膀胱括約筋が開いたままで尿道括約筋がゆるい (腹圧性尿失禁)、③ 排尿筋の痙攣が強すぎる (反射性尿失禁)、あるいはこれらの複合したものである。

神経因性膀胱の治療

神経障害の原因や程度、傷病の時期によって異なる。特に傷病の時期の違いは重要なので、急性期、回復期、固定期の治療に分けて述べる。

1. 急性期の治療

膀胱が弛緩麻痺している尿閉の時期は「膀胱の過伸展と細菌感染」を予防する必要がある。これには Guttman と Frankel によって始められた無菌間歇導尿¹⁾が最良であるとされている。留置カテーテルが長期にわたって行われると尿道に褥創ができて膀胱の回復は妨げられ、難治性尿路感染症で苦しむことになる。これに対し、無菌間歇導尿は予防的に抗生物質を用いずとも半年以上も無菌尿を保つことが可能であり、膀胱に伸縮のリズムを与えるのでより生理的である。水分を制限し、成人では膀胱容量が 300 ml ないし 400 ml を

越えないうちに導尿する。導尿操作を終了するのに 5 分間とはかからない。急性期尿誘導法の違いと尿感染率について著者ら²⁾の脊損患者データをみると、男性 126 名の無菌間歇導尿継続期間 (平均 9 週間) 中の尿感染率は 5.6% にすぎなかった。これらの患者が退院するまでのそれは 53 週間で、19.8% となった。最初から膀胱瘻を行った 7 例 (平均 45 週間) は 29.7% となり、留置カテーテル 4 例 (平均 42 週間) は 48.2% の尿感染率となった。ちなみに入院当初から排尿していた 11 名は退院するまで (平均期間 17 週間) に 7% の尿感染率を示した。

無菌間歇導尿法による管理は急性期に始まる大切な尿路治療の一つであることを認識しなければならない。間歇導尿の合間に尿失禁が起こり始めたら膀胱が回復した証拠である。これは冷水テストが陽性 (冷蔵庫で約 4℃ に冷却した滅菌水を膀胱に注入した時、カテーテル周囲から押し出されてくる現象) になる時期に一致するが、膀胱内圧測定で確認できる。ところで、留置カテーテル症例では時間おきにカテーテルをクランプすることが行われているが、この操作で膀胱の反射出現を知ることではできても、決して排尿反射の回復を促すものではない。膀胱壁の過伸展や細菌性炎症を増悪させ腎盂腎炎を起こす危険があるので、クランプするのではなく、冷水テストで回復を確認する必要がある。

2. 回復期の治療

冷水テストが陽性になると膀胱壁には緊張と収縮力が高まるので排尿訓練を始めることができる。排尿訓練の要点は、① 膀胱に尿が貯まったかどうか分かるようにすること、② 有効な排尿法を修得させること、である。尿意がなければ自律神経を介するある種の感覚、いわゆる「しらせ」、膀胱拡張によるお腹の張った感じや手で触れた感触で尿充満を察知する必要がある。有効な排尿法をつかむには、手圧や腹圧のかけ方、排尿反射を起こしやすい刺激部位と刺激のリズムなどにコツがある。

著者らが急性期から管理した頸損 126 名 (不完

全麻痺の 94 名と完全麻痺の 32 名)についてみると、排尿訓練を開始できるまでの期間は不完全麻痺が受傷後 8 週、完全麻痺が 10 週で、回復までの期間に違いはなかった。バランス膀胱(残尿 50 ml 以下で感染の危険が少ない状態)になるには、不完全麻痺で 10 週、完全麻痺では 33 週を要した。

3. 固定期の治療

1) 排尿訓練の限界

排尿訓練をいかに熱心に行ってもすべてがバランス膀胱になりうるわけではないので、排尿訓練を続けるべきかどうか早目に判断しなければならない。排尿筋括約筋不協調があるために高圧排尿となったり残尿が多い症例に、漫然と排尿訓練を続けてはいないだろうか。逆に無用な留置カテーテルがなされていないだろうか。排尿訓練の結果、コントロール排尿(バランス膀胱で尿失禁がない状態をいう)となったのは不完全麻痺の 57 名(61%)のみで、完全麻痺者はすべて尿失禁となった。また、間歇導尿(自己または介助者による)管理となったのは前者で 14 名(15%)、後者で 6 名(19%)、留置カテーテル管理は両者 1 名ずつである。排尿訓練の限界と判断される病態を①尿流動態検査上の排尿筋括約筋不協調所見、② 50 ml 以上の感染性残尿の持続、③膀胱変形の出現、④自律神経過緊張反射、とすると、126 症例のうちなんらかの理由で経尿道的括約筋切開術(以下 TUR と略す)が必要であったのは 31 名(25%)にものぼっている。つまり、無菌間歇導尿で厳密に急性期の尿路管理に努めても、およそ 25%の症例が泌尿器科的に積極的治療が必要になることを示している。

以上述べたように不完全麻痺では膀胱機能の回復も良い。尿意がはっきりしている症例は神経障害も比較的軽いし、肛門括約筋を締めることができるものには神経因性膀胱はない。中心性麻痺例や Brown-Séquard 麻痺例の排尿はほぼ正常に回復する³⁾。

2) 薬物療法

薬物療法としては排尿筋の緊張を高めるコリン剤、緊張を解く抗コリン剤、括約筋の緊張をとる

アルファ節遮断剤などが使われる。排尿困難や残尿の原因が排尿筋収縮減弱によると考えられる時は、臭化ジスチグミン(ウブレチド® 5 mg 錠 1~4 錠/日)、塩化ベサネコール(ベサコリン® 30~45 mg/日)、ネオスチグミンメチル硫酸塩(ワゴスチグミン® 15~45 mg/日)などを投与する。自覚的に放尿力が高まり、残尿を減らすことができる。しかし低コンプライアンス膀胱⁴⁾(膀胱壁に軟らかさがなく緊張した状態)のなかには容量が減って尿失禁したり、水腎症が起こることもあるので、長期に投与する時は注意しなければならない。消化性潰瘍や喘息患者への投与は禁忌である。括約筋の緊張が高い、あるいは膀胱頸部の開きが悪いものの中にはアルファ節遮断剤である塩酸プラゾシン(ミニプレス® 1.5~3 mg/日)が効くこともある。低血圧発作に注意する。

膀胱の痙攣が強いと起こる反射性尿失禁に対しては、臭化プロパンテリン(プロバンサイン® 15 mg 錠 3~4 錠/日)、息化ブチルスコポラミン(ブスコパン® 10 mg 錠 3~6 錠/日)、あるいは塩酸オキシブチニン(ポラキス® 3 mg 錠 3~4 錠/日)、塩酸テロリジン(ミクトロール® 12 mg 錠 1~2 錠/朝または夕)などを用いる^{5,6)}。緑内障には禁忌。口渇、満腹、便秘の増悪、排尿困難の増加などに注意し、残尿が増えていないかどうか時々調べる必要がある。

3) 括約筋切開手術

脊髄膀胱に多い排尿筋括約筋不協調には尿道括約筋の切開⁷⁾を行う。高圧排尿や感染性残尿で合併症を起こす懸念がある男性で、すでに集尿器対策がなされている症例に適応となる。末梢神経障害にみられる排尿筋弛緩麻痺には膀胱頸部切除術が行われる。低圧排尿が可能となつて水腎症も改善するが、尿失禁を起こしてはならない。排尿困難感は完全にはとれず、早晚再発することも少なくない。四肢麻痺例では排尿動作が困難なので、残尿を減らすには両者を併用することが効果的である。しかし尿失禁は増強する。

4) 自己導尿

脊損の排尿管理はカテーテルフリーにすることが細菌感染をコントロールする上で大切である

と考えられてきた。1972年および1974年にLapides^{8,9)}によって提唱された非無菌的または清浄間歇導尿法は「低圧で完全に尿が排除できるので、懸念されたほど尿感染は起こりにくい」という理由から自己導尿法として臨床的評価を受けている。しかし、非無菌的でよいと強調されすぎたため、不潔な操作を許しすぎているきらいもある。

著者らは安全で手軽に使用できる自己導尿キットを実用化し、脊損者や一部の頸損者を社会復帰せしめ、その有用性を実証している¹⁰⁾。カテーテルは1%ポビドンヨードグリセリン液¹¹⁾を入れたキット内で消毒しておく。外尿道口周囲の陰茎亀頭部あるいは陰前庭部を清浄綿で拭き導尿させる。女性ではカテーテルの挿入を確実ならしめるために指鏡をつけて行わせる。患者が精神的身体的に自己導尿できるかどうか見きわめ、具体的にキットを提供して操作法を指導する。成功の秘訣は、不安感、煩わしい感じを与えずにやる気を起こさせることである。

自己導尿が安全な管理法であるとの見通しから、著者は1979年に総合せき損センターが開院して以来、膀胱過伸療法を臨床応用してきた¹²⁾。完全麻痺の脊損症例に限って急性尿閉の時期に膀胱を過伸状態にしておけば、反射性尿失禁が起こりにくくなり自己導尿ができるであろうという仮説を証明したことになる。この試みは無菌間歇導尿ができるという環境下で初めて可能であった。尿感染が避けられない留置カテーテル管理下では危険だからである。1日2回の無菌間歇導尿管理下で膀胱を1 l 程度過伸展しておく、排尿反射は起こりにくくなるか弱くなる。過伸展療法した86名(男73名、女13名：脊損74名、頸損12名)は引き続き自己導尿を試みた。無菌間歇導尿期間(平均17週)中の尿感染率(男女平均)は19.8%で、自己導尿期間(平均32ヵ月)中のそれは24.1%となり、両者の間に有意差がなかった。ほとんどが失禁性排尿となり、集尿器装着が避けられない完全麻痺者の尿失禁防止効果は、尿失禁なき者48名(56%)、軽度ある者24名(28%)、集尿器が必要で自己導尿の適応がなくなった者14名(16%)となり、72名(84%)に尿失禁が回避できた。

自己導尿は横溢性尿失禁には最適な方法であるが、反射性尿失禁に対しても抗コリン剤の大量投与で尿閉にすると、かえって患者を尿失禁の苦しみから救うことができる。抗コリン剤が効かない女性では10%フェノールグリセリンを用いたクモ膜下腔のサドルブロックによっても自己導尿ができるようになる。自己導尿は回復期の一時的な方法として脊損領域でもComarrらにより採用されていた。排尿訓練中に自分で残尿を調べ、バランス膀胱になったら自己導尿を止めれば良い。尿が出なければ、まず自己導尿をさせると良い。コンタクトレンズ、入歯、補聴器、義足などと同じように、自己導尿カテーテルキットは今やQuality of Lifeを高める泌尿器科領域の重要な補装具であり、一生使ってもよいと考える。

5) 陰茎プロテゼ挿入手術

治せない尿失禁には集尿器を用いるが、集尿器による陰茎皮膚の絞扼性潰瘍はよくみられるトラブルである。勃起すると締めすぎになり、縮むと抜け落ちることからコンドームタイプの集尿器の装着加減は難しい。一旦できた陰茎の褥創を治すには留意カテーテルが必要になり、難治性尿路感染症の原因になる。プロテゼを挿入する手術はインポテンス治療の効果が期待できるとともに、陰茎の伸び縮みをなくしてコンドームタイプの集尿器がフィットするので、絞扼性潰瘍を作りにくくなる¹³⁾。

6) 留置カテーテル管理

便利なバルーンカテーテルが泌尿器科治療に果たした貢献は大きい。しかし、神経因性膀胱にはできるだけ用いたくない。しかし、あらゆる努力をしても留置カテーテルが避けられない症例もあり、介助者を束縛しないためにはこれも一つの治療であることには変りない。しかし女性ではカテーテルが尿道から脱出する事故、男性では尿道憩室や瘻孔ができることも少なくないので、むしろ膀胱瘻法を選ぶべきである。カテーテルは14~16Fr程度の細めで刺激が少ないシリコン製を用い、留置中は水分を多くとって尿の濁りを少なくする。毎日1回は膀胱を洗浄し、汚濁沈殿残渣を除去する、1~2週毎に交換するなど清潔管理が大切であ

る。留置しているかぎり感染を根治することはできないので、抗生物質を投与するのは有害無益で、膀胱洗浄に抗生物質を用いるなど論外である。感染はあっても尿流を確保してさえおけば、腎障害を招くことはほとんどない。

おわりに

急性期における無菌間歇導尿管管理の必要性、回復期における排尿訓練の限界と対策、自己導尿管管理の有用性などについて述べた。肢体の麻痺とは違って、内臓、特に尿路は症状固定しても完全治癒の結論を下すことは困難な場合が多い。したがって、社会復帰した後も、患者自身が自己管理に努め、年に1～2回程度の尿路造影検査で検診を続けていくことが必要になる。尿路の管理は画的ではなく、泌尿器科的視点から麻痺と障害に応じたきめ細かい配慮が必要で、またそれが可能な時代を迎えていると思う。

文 献

- 1) Guttman L, Frankel H : The value of intermittent catheterization in the early management of traumatic paraplegia and tetraplegia. *Paraplegia* 4 : 63-84, 1966.
- 2) Iwatsubo E, Iwakawa I, Koga H, Imamura A, et al : Functional recovery of the bladder in patients with spinal cord injury—prognosticating programs of an aseptic intermittent catheterization—. *Acta Urol Jpn* 31 : 775-783, 1985.
- 3) 岩坪暎二, 小嶺信一郎, 倉本 博, 岩川愛一郎 : 脊損尿路 (回復期, 固定期) に対する治療法の選択. *西日泌尿* 44 : 386-394, 1982.
- 4) 岩坪暎二, 益田幸行, 岩淵直人 : 膀胱のコンプライアンスと尿路障害. *脊椎脊髄ジャーナル* 3 : 337-343, 1990.
- 5) 岩坪暎二, 北田真一郎, 熊沢浄一, 小嶺信一郎, 他 : 神経因性膀胱に対する塩酸オキシブチニンの臨床効果—とくに尿失禁に対して—. *西日泌尿* 48 : 697-705, 1986.
- 6) 北田真一郎, 武井実根雄, 熊沢浄一, 小嶺信一郎, 他 : 神経因性膀胱に対する塩酸テロリジンの臨床効果. *西日泌尿* 49 : 299-306, 1987.
- 7) 小嶺信一郎 : 脊髄損傷膀胱の機能回復と仙髄領域の知覚に関する臨床的研究. *日泌尿会誌* 78 : 403-410, 1987.
- 8) Lapides J, Diokno AC, Silber SJ, Lowe BS : Clean, intermittent self-catheterization in the treatment of urinary tract disease. *J Urol* 107 : 458-461, 1972.
- 9) Lapides J, Diokno AC, Lowe BS, Kalish MD : Follow up on unsterile intermittent self-catheterization. *J Urol* 111 : 184-187, 1974.
- 10) 岩坪暎二, 小嶺信一郎, 山下博志, 岩川愛一郎, 他 : 脊損者にたいする自己導尿法の検討—カテーテルセットの開発と無菌間歇導尿操作の可能性について—. *日泌尿会誌* 73 : 732-739, 1982.
- 11) 岩坪暎二, 魚住二郎, 安藤三英, 今井勝博, 他 : 自己導尿カテーテル用消毒薬剤の検討. *臨泌* 41 : 961-964, 1987.
- 12) Iwatsubo E, Komine S, Yamashita H, Imamura A, et al : Over-distension therapy of the bladder in paraplegic patients using self-catheterization. A preliminary study. *Paraplegia* 22 : 210-215, 1984.
- 13) Iwatsubo E, Tanaka M, Takahashi K, Akatsu T : Non-inflatable penile prosthesis for the management of urinary incontinence and sexual disability of patients with spinal cord injury. *Paraplegia* 24 : 307-310, 1986.

こ 案 内

発達障害児の治療教育夏季セミナー

会 期 : 1991年8月4日(日)～6日(火)
 午前9時30分～午後4時30分(最終日は午後3時30分まで)
 会 場 : 上智大学10号館講堂(東京都千代田区紀尾井町7-1)
 受 講 料 : 12,000円(ただし、1日だけの出席の場合は5,000円。受付後、受講料は返却不可、代理出席は可能。)
 定 員 : 250名
 問合せ先 : 〒123 東京都足立区梅田7-12-15 うめだ・あけぼの学園夏季セミナー係
 ☎ 03-3848-1190 FAX 03-3848-1191