症 例

Trisomy8 陽性骨髄異形成症候群に併発した腸管 Behçet 病穿孔の 1 例

田附興風会北野病院消化器センター外科¹⁾, 同 血液内科²⁾, 同 リウマチ膠原病内科³⁾

川 崎 有 亮¹⁾ 寺 嶋 宏 明¹⁾ 上 田 修 吾¹⁾

福 永 明 子²⁾ 八木田 正 人³⁾

症例は trisomy8 陽性骨髄異形成症候群と Sjögren 症候群で当院加療中の 32 歳の女性。右下腹部痛と発熱を主訴に緊急入院し、絶食と抗生剤加療で症状は改善したが、入院 9 日目に腹痛が再燃、腹部 CT 検査で消化管穿孔に伴う汎発性腹膜炎と診断された。緊急開腹術で上行結腸および終末回腸の穿孔と判明し、結腸右半切除 + 回腸人工肛門造設術を施行した。回盲部病変は病理学的診断で非特異的潰瘍であり、口腔内アフタ性潰瘍・顔面の痤瘡様皮疹・手指関節炎の特徴的な臨床症状もふまえて、不全型 Behçet 病の回腸潰瘍穿孔の確定診断に至った。近年、本邦における trisomy8 陽性骨髄異形成症候群に腸管 Behçet 病を併発する報告が増えており、このような場合は穿孔のリスクを有する回盲部領域の潰瘍合併の可能性を念頭に置き、できるだけ早期の下部消化管検査を施行するべきである。

索引用語：trisomy8 陽性骨髄異形成症候群、腸管 Behçet 病、潰瘍穿孔

はじめに

Behçet 病（以下 BD）は原因不明の慢性炎症性疾患であり、特殊病型の 1 つに腸管の潰瘍性病変を示す腸管 BD がある。腸管 BD は穿孔などの急性腹症をきたした場合には緊急手術を要し、術後も縫合不全や再穿孔を起こしやすく治療に難渋する疾患である。近年、BD に骨髄異形成症候群（以下 MDS）が併発する症例報告が増えている。これらの症例のほとんどが trisomy8 陽性骨髄異形成症候群（以下 MDS+8）であり、腸管病変の合併が多いと報告されている¹⁾。今回われわれは MDS+8 で経過観察中の患者の消化管穿孔に対して緊急手術を行い、その所見から腸管 BD の確定診断に至った稀な症例を経験したので報告する。

症 例

患者：32 歳、女性。

主訴：発熱、右下腹部痛。

既往歴：Sjögren 症候群、MDS8+、特発性血小板減少性紫斑病、子宮頸部上皮内癌。

家族歴：自己免疫性疾患の家族歴なし。

嗜好歴：喫煙歴なし、機会飲酒。

現病歴：Sjögren 症候群と MDS8+ で当院リウマチ膠原病内科および血液内科で経過観察中であった。入院半年前より顔面の痤瘡、口内炎の緩解・増悪、手指の変形を伴わない関節炎を認めていた。今回、発熱・右下腹部痛・水様便を認め、感染性腸炎を疑って当院リウマチ膠原病内科に入院となった。絶食、輸液、抗生剤加療によって腹痛は軽快し、入院 9 日目に経口摂取を再開したところ、右下腹部痛が再燃した。腹膜刺激徴候を認め、画像所見では腸管穿孔による汎発性腹膜炎が疑われたため、手術目的で当科転科となった。

転科時現症：血圧 125/75 mmHg、体温 37.6℃、心拍数 95 bpm。意識清明。顔面に痤瘡あり。口腔内に多発性有痛性アフタあり。針反応なし。結節性紅斑なし。手指関節に圧痛あり。胸部所見異常なし。腹部は全体に筋性防御と反跳痛を認め、右下腹部に特に強い圧痛あり。

血液・生化学検査所見（Table 1）：CRP、Fibrinogen の著明な上昇を認めた。また本症例では MDS による汎血球減少が背景にあり（通常時 WBC 2,000–3,000/uL）、この時点で好中球優位の白血球増加と判断した。

腹部単純 CT 所見（Fig. 1）：回盲部周囲脂肪織の濃

Table 1. Laboratory data on admission

Blood Chemistry		Peripheral blood	
TP	5.4 mg/dL	RBC	$342 \times 10^4 / \text{mm}^3$
BUN	7.3 U/L	Hb	12.3 g/dL
Cre	0.55 mg/dL	Hct	36.0 %
Na	138 mEq/dL	WBC	$7,200 / \text{mm}^3$
K	3.7 mEq/dL	Plt	$10.3 \times 10^4 / \text{mm}^3$
Cl	107 mEq/dL	Neutro.	93.6 %
AST	19 U/L	Lymph.	4.7 %
ALT	13 U/L	Mono.	1.5 %
LDH	155 IU/L	Eosino.	0.0 %
γ -GTP	17 U/L	Baso.	0.2 %
ALP	142 IU/L	Coagulofibrinolysis	
Amy	303 U/L	Fibrinogen	414 mg/dL
Lypase	45 U/L	D-dimer	6.1 ug/dL
T.Bil	0.8 mg/dL	FDP	13.0 ug/dL
CRP	13.62 mg/dL

Fig. 1 : The abdominal CT image demonstrates elevated density of the surrounding fatty tissue of the ileocecal region (white arrow head) and multiple signs of free air (black arrow).

度上昇と多数のfree air像を認めた。

以上より消化管穿孔に伴う汎発性腹膜炎と診断し、緊急手術の適応と判断した。

手術所見：腹部正中切開で開腹すると多量の膿性腹水を認めた。上行結腸Bauhin弁の肛門側腸間膜側に約10mmの穿孔を認め、これを責任病変と考えて結腸右半切除術を施行した。吻合前に残存腸管を検索すると回腸断端より約15cm口側に別の穿孔部位（径3mm）を認めたため、約20cmの回腸を追加切除した。腸管の浮腫は軽度で一期的回腸結腸吻合も可能であったが、多発潰瘍でかつ膠原病の既往歴を有することから、炎症性腸疾患併存の可能性とそれによる術後縫合

Fig. 2 : The macroscopic findings of the resected specimen include a large circular ulcer with perforation in the cecum (arrow) and multiple small ulcers in the terminal ileum (arrow head) (a). The microscopic findings show a non-specific ulcer lesion extending to the submucosal layer with a mild lymphocyte infiltration (b) (H.E. $\times 10$).

不全や再穿孔のリスクを考慮して、単孔式回腸人工肛門造設術を選択した。

病理組織学的所見：回腸末端から結腸の広範囲に、打ち抜き状の円形潰瘍を多数認めた (Fig. 2a)。組織学的には、非穿孔潰瘍病変は粘膜下層までのリンパ球浸潤を伴う非特異的潰瘍であった (Fig. 2b)。これらの所見と臨床症状より、主症状2つ（口腔内アフタ性潰瘍、皮膚症状）と副症状2つ（変形を伴わない関節炎、非特異的回腸潰瘍）を認めた不全型BDの回腸潰瘍穿孔の診断に至った。

術後経過：周術期は合併症もなく経過し、術後第4病日で経口摂取が可能となった。一方、腸管BDの病勢を鎮静化させるために抗炎症剤投与が必要であったが、本症例ではMDSによる免疫低下もあり、感染症発症時の即時の投与中止が困難であるステロイドは使

Table 2. Reported cases of MDS+8 associated with intestinal BD requiring surgical treatment.

No.	Year	Age (years)/sex	Country	Timeline of diagnosis	Ulcer site	Perforation site	Author
1	2000	39/M	Japan	Op → BD → MDS	I, IC	I	Tanaka ⁶⁾
2	2001	40/F	Japan	BD → Op → MDS	IC	IC	Ando ¹¹⁾
3	2002	64/M	Japan	MDS → BD → Op	Ce, Co, R	-	Chen ⁹⁾
4	2003	28/F	Japan	MDS → BD → Op	IC	-	Kawabata ²⁾
5	2003	39/F	Japan	BD → MDS → Op	IC	-	Kawabata ²⁾
6	2005	49/M	Japan	Op → MDS → BD	I	IC	Ogawa ⁷⁾
7	2008	46/F	Korea	MDS/BD → Op	Co	-	Fujita ¹⁰⁾
8	2012	24/F	China	Op → BD → MDS	I	I	Ahn ⁸⁾
9	2012	32/F	Japan	MDS → Op → BD	IC	I, IC	Our case

Op : surgical treatment, BD : diagnosed as intestinal Behçet disease, MDS : diagnosed as MDS+8, MDS/BD : diagnosed as MDS+8 associated with intestinal BD, I : ileum, IC : ileocecal region, Ce : cecum, Co : colon, R : rectum

用せず、colchicineや免疫抑制剤のcyclosporine Aを選択した。しかし、術後3カ月で腹痛の再燃と回腸潰瘍の再発を認めた。Inflixmabの導入で一時的に潰瘍は軽快するも、術後9カ月で治療不応となり、adalimumabへ変更した。それでも病勢コントロールは不良で、ストマから数cm口側に潰瘍が多発し、それによる狭窄や炎症性癒着でイレウスを繰り返している。MDS進行に伴う汎血球減少から人工肛門閉鎖術も施行困難な状況であり、術後1年を経過した現在でも人工肛門形成状態からは離脱できていない。現在、MDSに対するthalidomideの使用や、MDSと共にBDの根治も期待できる造血幹細胞移植を検討中である。

考 察

BDはトルコ、イラク、イラン、韓国、日本といったシルクロード沿いの地域に多く見られる。一方、MDS/BD併発例は比較的稀でそのほとんどは本邦からの報告である。ハワイ在住の日本人での発症例が無いことより、遺伝的素因のみでなく環境要因の関与も考えられる²⁾。本邦でのMDS/BD併発例は眼病変を欠き、消化管病変、特に回盲部潰瘍を合併しやすく、72%が腸管病変を持つ不全型BDである¹⁾。また、腸管病変を有する不全型BDとMDS合併例の88%がtrisomy8を有しており³⁾、自験例もこれに合致する。MDS全体のtrisomy8発現率が20%であること⁴⁾⁵⁾を考えれば、BDを併発するMDSでのtrisomy8発現率は極めて高いこととなる。

PubMedと医学中央雑誌で「MDS」「Trisomy8」

「Behçet」などをキーワードとして期間を設けずに検索したところ、1989年の最初の報告以降自験例を含め27例の関連文献を集計しえた。このうち14例（52%）では内科的治療のみで腸管病変のコントロールが可能であったが、4例は症状増悪で死亡している。一方、外科的治療を要した症例は9例であり、原因不明の消化管穿孔に対する手術後にMDS+8/BD併発例と診断された症例が3例^{6)~8)}、MDS+8/BD併発の確定診断後に、穿孔・出血・難治性などの理由で手術に至った症例が4例²⁾⁹⁾¹⁰⁾、BD加療中に手術となり術後にMDS+8と診断された症例が1例¹¹⁾であった。自験例はMDS+8のみ診断されており、腸管穿孔緊急手術後にBDと診断された初めての症例であった（Table 2）。

腸管BDに対する手術の有効性については議論が分かれる。潰瘍部の切除により全身性の炎症が軽快した報告¹⁾がある一方で、手術侵襲そのものがBD増悪の誘因になるとの報告¹²⁾¹³⁾もある。腸管BDの術後再発率は約50%と高頻度であり、その半数は2年以内に再発し、しかも吻合部が再発好発部位である¹⁴⁾。そのような点からは、病変を含む腸管切除+人工肛門造設後に抗炎症療法を導入して炎症の沈静化を待ち、然る後にストマからの内視鏡的検査による潰瘍再発の有無を評価しつつ、タイミングを見ながら二期的に人工肛門閉鎖術を行う治療戦略も選択し得る。本症例では薬物療法による病勢コントロールに難渋しており、実際ストマからの内視鏡検査で再発潰瘍の診断が可能であっ

腸管BDに対する抗炎症療法には、一般的にステロイド¹⁵⁾やazathioprine¹⁶⁾が選択される。前述のMDS+8/BDの報告例でも、26例中12例でprednisoloneが使用されている。一方で、MDS併発BDにおいては、MDSの白血病化のリスクからazathioprineの使用は避けられている。一方、BDの病因としてTNF- α の関連が考えられており¹⁷⁾、抗TNF- α 抗体であるinfliximabの有用性が示唆されている。実際、BDの眼病変に対してはinfliximabの使用は保険適応であり、術後吻合部潰瘍を含めたBDによる腸管病変やMDSに対するinfliximabの有効性はすでに報告がなされている^{18)~22)}。Infliximab無効例に対する治療法は未だ確率されていないが、Crohn病など他の炎症性腸疾患ではinfliximabから完全ヒト型の抗TNF- α 抗体であるadalimumabへの変更が有用であるとされ²³⁾、実際BDによる腸管病変にもadalimumabの有用性が報告されている²⁴⁾。自験例では潰瘍の術後再発に対してinfliximabやsecond lineとしてのadalimumabを投与したが、残念ながら病勢のコントロールには至らなかった。

近年、MDS併発BDに対する造血幹細胞移植の有効性が報告された¹¹⁾。自験例の様な若年者の薬物療法不応例には造血幹細胞移植も治療の選択肢になりうるが、移植前の前処置療法で使用する大量の抗癌剤および放射線照射に起因する腸管粘膜障害によって、腸管穿孔が再発する可能性も無視できないので、その適応には十分な検討が必要である。本症例では患者自身の強い希望があり、他院での造血幹細胞移植治療を予定している。

結 語

MDS+8の患者にBDの症状が出現した場合は、穿孔のリスクを有する消化管潰瘍、特に回盲部から結腸の潰瘍合併の可能性を念頭に置き、できるだけ早期の下部消化管検査や免疫抑制療法導入が必要である。

文 献

- 1) Adachi Y, Tsutsumi A, Murata H, et al : Behçet's disease accompanied by myelodysplastic syndrome with trisomy 8 : two case reports and review of 15 Japanese cases. *Mod Rheumatol* 2003 ; 13 : 90-94
- 2) Kawabata H, Sawaki S, Kawanami K, et al : Myelodysplastic syndrome complicated with inflammatory intestinal ulcer : Significance of trisomy 8. *Intern Med* 2006 ; 45 : 1309-1313
- 3) 鏑田利恵子, 鈴木文仁, 杉原毅彦他 : 腸管Behçet' 病の仙腸関節炎および第8トリソミーを伴う骨髄異形成症候群 (RAEB-t) を合併した1剖検例. *日臨免疫会誌* 2005 ; 28 : 48-55
- 4) Heim S : Cytogenetic findings in primary and secondary MDS. *Int J Hematol* 1996 ; 63 : 43-46
- 5) Sole F, Woessner S, Florensa L, et al : Cytogenetic study of 93 myelodysplastic syndromes. *Med Clin* 1998 ; 110 : 94-98
- 6) 田中栄一, 西成田真, 上里雅史他 : 異常骨化を呈し、小腸穿孔後頸在化した骨髄異形成症候群合併腸管ペーチェット病の1症例. *リウマチ* 2000 ; 40 : 711-718
- 7) Ogawa H, Kuroda T, Inada M, et al : Intestinal Behçet's disease associated with myelodysplastic syndrome with chromosomal trisomy 8-a report of two cases and a review of the literature. *Hepatogastroenterology* 2001 ; 48 : 416-420
- 8) Ahn JK, Cha HS, Koh EM, et al : Behçet's disease associated with bone marrow failure in Korean patients : clinical characteristics and the association of intestinal ulceration and trisomy 8. *Rheumatology* 2008 ; 47 : 1228-1230
- 9) Chen HC, Chiu TM : Large vessel thrombosis in intestinal Behçet's disease complicated with myelodysplastic syndrome and trisomy 8. *World J Gastroenterol* 2012 ; 18 : 1137-1140
- 10) Fujita H, Kiriya M, Kawamura T, et al : Massive hemorrhage in a patient with intestinal Behçet's disease : report of a case. *Surg Today* 2002 ; 32 : 378-382
- 11) Ando S, Maemori M, Sakai H, et al : Constitutional trisomy 8 mosaicism with myelodysplastic syndrome complicated by intestinal Behçet's disease and antithrombin III deficiency. *Cancer Genet Cytogenet* 2005 ; 162 : 172-175
- 12) Choi IJ, Kim JS, Cha SD, et al : Long term clinical course and prognostic factors in intestinal Behçet's disease. *Dis Colon Rectum* 2000 ; 43 : 692-700
- 13) Naganuma M, Iwao Y, Inoue N, et al : Analysis of clinical course and long-term prognosis of surgical and nonsurgical patients with intestinal

- Behçet's disease. *Am J Gastroenterol* 2000 ; 95 : 2848–2851
- 14) Lee KS, Kim SJ, Lee BC, et al : Surgical treatment of intestinal Behçet's disease. *Yonsei Med J* 1997 ; 38 : 455–460
 - 15) 鈴木 温, 関下芳明, 塩野恒夫他 : 特発性腹膜炎を呈した腸管ペーチェット病3手術例. *日消外会誌* 2002 ; 35 : 1817–1820
 - 16) Yazici H, Pazarlı H, Colın G, et al : A controlled trial of azathioprine in Behçet's syndrome. *N Engl J Med* 1990 ; 322 : 281–285
 - 17) Yamashita N, Kaneoka H, Kaneko S, et al : Role of $\delta\gamma$ T lymphocytes in the development of Behçet's disease. *Clin Exp Immunol* 1997 ; 107 : 241–247
 - 18) Lee JH, Kim TN, Choi ST, et al : Remission of intestinal Behçet disease treated with anti-tumor necrosis factor R monoclonal antibody (infliximab). *Korean J Intern Med* 2007 ; 22 : 24–27
 - 19) Travis SPL, Czajkowski M, McGovern OPB, et al : Treatment of intestinal Behçet's syndrome with chimeric tumor necrosis factor α antibody. *Gut* 2001 ; 49 : 725–728
 - 20) Hatemi G, Silman A, Bang D, et al : EULAR recommendations for the management of Behçet disease. *Ann Rheum Dis* 2008 ; 67 : 1656–1662
 - 21) Raza A, Candoni A, Khan U, et al : Remicade as TNF suppressor in patients with myelodysplastic syndrome. *Luek Lymphoma* 2004 ; 45 : 2099–2104
 - 22) Naganuma M, Sakuraba A, Hisamatsu T, et al : Efficacy of infliximab for induction and maintenance of remission in intestinal Behçet's disease. *Inflamm Bowel Dis* 2008 ; 14 : 1259–1264
 - 23) Sandborn WJ, Rutgeers P, Enns R, et al : Adalimumab induction therapy for Crohn disease previously treated with infliximab. *Ann Intern Med* 2007 ; 146 : 829–838
 - 24) Ariyachaipanich A, Berkelhammer C, Nicola H : Intestinal Behçet's disease : maintenance of remission with adalimumab monotherapy. *Inflamm Bowel Dis* 2009 ; 15 : 1769–1771

A CASE OF INTESTINAL BEHÇET'S DISEASE WITH PERFORATED ULCER CONCURRENT WITH MYELODYSPLASTIC SYNDROME AND TRISOMY 8

Yusuke KAWASAKI¹⁾, Hiroaki TERAJIMA¹⁾, Shugo UEDA¹⁾,
Akiko FUKUNAGA²⁾ and Masato YAGITA³⁾

Department of Gastroenterological Surgery and Oncology¹⁾,
Department of Hematology²⁾ and Department of Clinical Immunology and Rheumatology³⁾,
Kitano Hospital, The Tazuke Kofukai Medical Research Institute

A 32-year-old female with trisomy 8 and Sjögren syndrome who had been treated for myelodysplastic syndrome was admitted for the evaluation of right lower quadrant pain and fever. Fasting and antimicrobial therapy provided temporary symptomatic improvement, but the abdominal pain relapsed on the 9th day after admission, and the patient was diagnosed on abdominal CT scan as having an acute generalized peritonitis possibly due to perforation of the gastrointestinal tract. On emergent open surgery, two perforated lesions were found, one in the ascending colon and the other in the terminal ileum ; thus, the patient required a right hemicolectomy with a temporary end ileostomy. On histopathology, the ileocecal lesions were classified as non-specific ulcers. The patient had characteristic clinical findings such as oral aphthous ulceration, acne-like facial eruption, and finger arthritis which, in addition to the ileal ulcer perforations, allowed a definitive diagnosis of intestinal Behçet's disease to be made. An increasing number of intestinal Behçet's disease cases associated with myelodysplastic syndrome and trisomy 8 have been recently reported. In such cases, lower gastrointestinal studies must be planned as early as possible, since the ulcer lesions in the ileocecal region are at risk of perforation.

Key words : myelodysplastic syndrome with trisomy 8, intestinal Behçet's disease, ulcer perforation