編 集 後 記

岡 本 高 宏

コロナでスポーツジム通いをやめ、皇居周辺をジョギングしている。春分の日を過ぎて、東京の桜は八分咲きである。とくに戦没者墓苑のある千鳥ヶ淵、そして半蔵門から桜田門にかけてのお濠端には誇らしげに花を咲かせた木々が観る者を幸せな気分させてくれる。学校では晴れて卒業の日を迎えた子供たちを、薄紅のソメイヨシノが祝福しているようである。

10年ほど前、米国への出張の際に機内で観た映画のタイトルは「さくら、さくら」であった。その副題は「サムライ化学者高峰譲吉の生涯」である。消化剤タカチアスターゼを開発した高峰譲吉博士は1900年、牛の副腎エキスに含まれる昇圧物質の純粋な結晶の精製に成功しこれを“アドレナリン”と名付けたことでも知られている (Takamine J. Am J Pharm, 1901)。博士の亡きあと、精製に初めて成功したのは自分であると暗に主張した米国の John Abel 教授 (Abel JJ. Science 1927 ; 66 : 337-346) の命名になる“エピネフリン”が永らく使われるようになり、その呪縛は日本にも及んだ。いわば盗作の疑いを晴らす根拠となったのは、博士の片腕となり結晶精製に成功した上中啓三助手が残した克明な実験ノートであったという。わが国で“アドレナリン”の名称が復権を果たしたのは2006年のことである (「サムライ化学者、高峰譲吉博士」、北國新聞社編集局編)。

19世紀終わりから20世紀初めにかけては内分泌学の黎明期でもあった。セクレチンを発見した Earnest Starling が初めて「ホルモン」という言葉を使ったのは1905年である。近代外科学のパイオニア達も内分泌学に興味をもって取り組んだ。ヨード欠乏による地方病性甲状腺腫が多かったスイスのベルン大学で外科教授を務めていた Theodor Kocher は1909年、甲状腺の臨床でノーベル医学・生理学賞を受賞している。定型的乳房切除術で知られる ジョーンズ・ホプキンス大学の William Halsted はイヌを使って副甲状腺自家移植の実験を行い、その成果を報告している。英国の John Bland-Sutton, オーストリアの Oscar Hirsh, Felix Mandl らは副甲状腺腫瘍の摘出に挑んだ。甲状腺ホルモンや副甲状腺ホルモンが同定される以前のことである。そして Halsted とそのレジデントであった Cushing は、Kocher ととも親交があったという。今のようなデジタルな通信手段はもろんなかったが、先達は経験したことや観察したことを記録に残した。それらは必ずしも成功物語ではないが、事実をありのままに記述し、残すことの大切さを教えてくれる。私たちは試行錯誤の歴史から学ぶのである。本誌に掲載される論文にも同じような役割がある。投稿された論文に査読者として係わらせていただく機会に感謝し、真剣に向き合い、それが世に送り出される時の喜びを分かち合いたいと思っている。

ところで、高峰博士と桜である。米国ではワシントン市ボトマック河畔の桜が有名である。しかし、日本からのこの桜の寄贈に高峰譲吉博士が一役買っていたことは、案外知られていないのではないかと思う (私も件の映画を観るまでは知らなかった)。来年はニューヨークで67歳の生涯を閉じた博士の没後100年を迎える。