短 報**痔に対する鍼灸の臨床的研究**

金子 佳平*

I 緒 言

痔は比較的多い疾患で、一生の間に、一度位は誰でも経験する疾患の一つである。痔を大きく区別すると、痔瘻という化膿性疾患。脱肛、イボ痔等が代表する血液循環障害。肛門の外傷である肛門出血、今回は痔瘻を除く脱肛と痔出血について発表する次第です。

II 目 的

治療の目的は、痔の殆どは、血液循環障害にもとづくものが多く、鍼灸によって体質を整え、局所の血液循環の悪いものは、灸頭鍼を応用し、その血液の、うっ滞するものは、瀉法鍼を応用して、局所の血液の過剰を除去し、痔を治癒させようとするのが目的である。

III 方 法

経穴は、大腸俞、小腸俞、命門、天枢、氣海、郗門、温溜、足三里、大谿に小灸一壯。肛門部に実の場合は、瀉鍼。虚の場合は、補鍼である灸頭鍼を用いる。

IV 臨 床 例

図は臨床例で、実証例10例、虚証例10例を示したものであります。実の場合は、肛門近くに刺鍼する程効果があります。そして速刺速抜することが基本であります。虚の場合は、実の場合と同様に肛門の近くに灸頭鍼を行う程よく奏効します。

ここに第1例を詳述してみましょう。患者は30歳で妊娠10ヶ月。みかんの大きさ位肛門が出ていた。激痛甚だしく動けない、医師は、痔を治さな

ければ出産が出来ない、どこかで治して来いとのことで、私が治療を頼まれた。痔の一番近いところに大瀉法鍼を6ヶ所刺鍼した。翌日行って見ると1回で全治した。

V 考 察

諸先生の御案内の通り、痔は、上、中、下、痔静脈のうっ滞。拡張した静脈溜であるとされている。静脈のうっ滞、又は、静脈溜とすれば、静脈を支配する血管運動神経の、緊張か、弛緩か、いずれかであることが考えられる。臨床の結果より逆算すれば、痔は、実証の場合は、痔静脈血管運動神経の緊張緩和が想定され、虚証の場合は、弛緩した痔静脈血管運動神経の緊張したことが想定される。鍼の補瀉の方法が、血管運動神経を調節して好結果をもたらすものと私は考察する

補瀉に対しては、色々と議論があり、又異論もあるが、経験医学である漢方は、これを解明するにあたって、理論的には、非常に困難なる問題であるが、臨床を通じて始めて解明し易い事を、私は経験を通して、一言つけ加えたい次第である。

VI 結 論

1. 痔の治療にあたって、最先に考えられることは、局所を清潔にすることである。2. 補瀉と言う事を、之等の臨床を通じて考えて見ると、単なる刺激の強弱と言う事だけではなく其の他色々の意味を含んでいると思う。3. 痔の治療にあたって、鍼灸は有力なる治療法であると私は思考する。4. 漢方の一般的考え方であるが、痔疾患を病む人は、大方腸が弱い、体質まで治す事が、痔の再発を防止し又、之を根治する最も良い方法であると考ええる。

* Kahei KANEKO 皇漢堂漢方医学研究所、埼玉地方会

Key Words :

図1 臨床例

番号	職業	年月日	年齢	性別	鍼法	虚实	症 状	備 考
1	主婦	昭40. 5	30歳	女	瀉法	実	妊娠10ヶ月、みかん位肛門突出、激痛で動けない。このままでは出産不能との事	肛門近くに瀉鍼6ヶ所 1回で全治
2	主婦	昭35. 10	25歳	女	瀉法	実	妊娠10ヶ月、みかん位肛門突出、激痛動作不能、このままでは出産不能	肛門附近に瀉鍼6ヶ所 7回で全治
3	主婦	昭45. 10	35歳	女	瀉法	実	痔が、みかんの半分位突出、疼痛激甚、かろうじて来院	肛門附近に瀉鍼6ヶ所 3回で全治
4	農業	昭60. 7	35歳	女	瀉法	実	レーザー光線で手術した、肛門突出して押込んだ、激痛で動作不能	肛門附近に瀉鍼10ヶ所 3回で大体よくなり、其の後3回
5	魚屋	昭39. 4	65歳	男	瀉法	実	6 cm 位、ドーナツ形に肛門突出、激痛、動作不能	肛門附近に瀉鍼8ヶ所 3回で治り、其の後3回
6	主婦	昭59. 8	60歳	女	瀉法	実	3 cm 位肛門突出、発赤・疼痛	肛門附近に瀉鍼6ヶ所 1回で全治
7	八百屋	平 1. 1	30歳	女	瀉法	実	3 cm 位肛門突出、発赤・疼痛	肛門附近に瀉鍼6ヶ所 1回で全治
8	運転手	昭60. 4	40歳	男	瀉法	実	2 cm 位肛門突出、発赤・疼痛	肛門附近に瀉鍼6ヶ所 1回で全治
9	学生	平 1. 8	19歳	男	瀉法	実	2 cm 位肛門突出、発赤・疼痛	肛門附近に瀉鍼6ヶ所 発赤・疼痛、1回で全治
10	主婦	昭55. 8	56歳	女	補法	虚	痛みは少いが、2 cm 位肛門突出	肛門部に灸頭鍼4ヶ所 7日で全治
11	主婦	平 1. 10	73歳	女	補法	虚	痛みは少いが2 cm 位肛門突出	肛門部に灸頭鍼2ヶ所 10日で全治
12	主婦	昭60. 5	70歳	女	補法	虚	痛み少く、2 cm 位肛門突出	肛門部に灸頭鍼2ヶ所 10日で全治
13	主婦	昭61. 5	35歳	女	補法	虚	痛み少く、1 cm 位肛門突出	肛門部に灸頭鍼2ヶ所 5日で全治
14	主婦	平 1. 4	35歳	女	補法	虚	痛み少く、2 cm 位肛門突出	肛門部に灸頭鍼2ヶ所 8日で全治
15	主婦	平 1. 10	75歳	女	補法	虚	痛み少く、2 cm 位肛門突出	肛門部に灸頭鍼2ヶ所 5日で全治
16	主婦	昭50. 5	45歳	女	補法	虚	痛み少く、1 cm 位肛門突出	肛門部に灸頭鍼2ヶ所 3日で全治
17	元社長	平 1. 10	75歳	男	補法	虚	人工透析実施中、1 cm 位肛門突出出血	肛門部に灸頭鍼2ヶ所 5日で全治

18	会社員	平 1. 5	50歳	男	補法	虚	肛門 1 cm 突出, 殆ど全快	大体よくなった
19	会社員	平 2. 3	40歳	女	瀉法	実	直径 2 cm 発赤・疼痛	肛門部に 6ヶ所瀉鍼 2回で全治
20	主婦	平 2. 4	40歳	女	補法	虚	肛門部に出血疼痛	2回で全治