原著論文

胸部大動脈瘤 107 例の麻酔

古家 仁*¹ 北村 豊*¹ 奥 史郎*¹ 佐藤和子*¹
 岸 義彦*¹ 大住寿俊*¹ 高木 治*¹ 鈴木隆雄*¹
 杉本 久*¹ 小堀正雄*¹ 矢作直樹*¹ 奥村福一郎*¹
 畔 正和*² 上藤哲郎*³

要旨 国立循環器病センターにおいて、1977年12月から1983年6月までの5年7ヵ月にわたって行なわれた胸部大動脈瘤107例について検討を加えた。術前診断としては、解離性動脈瘤36例、非解離性46例、AAE25例であった。手術術式としては、grafting, extra-anatomical bypass, Bentallの手術の順で多かった。麻酔は殆どがNLAにて行なった。平均麻酔時間は、extra-anatomical bypassが最も長く、上行大動脈のgrafting + 大動脈弁置換が最短で、全症例の平均時間は11時間45分であった。術前の合併症では高血圧、大動脈閉鎖不全、腎不全、気管偏位などが多く、術中の合併症としては大量出血、気道出血、不整脈等がみられた。また術後は、循環、呼吸及び脳、腎と多臓器に及ぶ合併症が多く見られた。

I はじめに

近年、術中管理やモニターの進歩、更に術後管理の進歩により心臓及び大血管の手術成績は著しく進歩し、従来は手術不可能であった患者でも手術が行なわれ好結果が得られるようになってきた。このことは胸部大動脈瘤の手術についても同様で、各種補助手段の利用により更に手術成績の向上が図られている。しかし胸部大動脈瘤は術前より合併症も多く術中や術後の管理にもいろいろな問題を呈する。今回われわれは、経験した107例の胸部大動脈瘤手術の麻酔

症例について、麻酔方法および術前・術中・術後の合併症とその管理について報告する。

表1 術前診断

Diagnosis	No
Dissecting Aneurysm	36
I	9
II	6
III a	4
III b	15
II + III	2
Non-dissecting Aneurysm	46
Ascending	6
Arch	9
Discending	28
Thoraco-abdominal	3
Annulo-Aortic Ectasia + Aortic insufficiency	25

*¹国立循環器病センター麻酔科*²奈良県立医科大学麻酔科*³香川医科大学麻酔救急医学講座 受理日 1984.1.19

図1 Preoperative complications

II 対 象

対象は、国立循環器病センターにおいて、1977年12月から1983年6月までの5年7ヵ月にわたって行なわれた胸部大動脈瘤107例で、年齢は平均53歳で、男性70例、女性37例であった。大動脈瘤の種類は、解離性大動脈瘤36例、非解離性大動脈瘤46例、大動脈弁輪拡張+大動脈弁閉鎖不全症（Annulo Aortic Ectasia + Aortic Regurgitation : AAE + AR）25例でその内訳は表1に示す。成因は動脈硬化性64例、中膜壊死30例、動脈炎7例、外傷性2例、感染性2例、大動脈縮窄症2例であった。

III 結 果

術前の合併症としては、図1に示すように高血圧が107例中46例に見られ、また今回AAE + ARの症例を含んでいるため、術前ARを呈した症例が25例あり、また術前よりクレアチニン値が1.3以上に上昇し、腎機能障害を呈した

図2 Preoperative medications

症例は17例に見られた。気管が1気管の太さ以上の偏位をしていた症例が16例あった。

術前の投薬としては、利尿剤が高血圧及び心不全に対する治療の目的で用いられることが多く107例中28例に投薬されていた。また同様にカルシウム拮抗剤や β -blockerも10例以上に投与されていた（図2）。

107例の内緊急手術として行なわれた症例は13例で、この内10例は死亡し5例はtable deathであった。予定手術の内、死亡例は18例で、このうちtable deathは1例のみであった。麻酔方法としては、GO + Morphine 60例、GO + Fentanyl 40例、GO + Halothane 3例、O₂ + Fentanyl 2例、GO + Enflurane 1例、O₂のみ1例であった。術中の血圧のモニターとして、橈骨動脈のみで行なわれた症例33例、橈骨動脈と下肢の動脈の両者で行なわれたもの53例、橈骨動脈、下肢の動脈に加えて浅側頭動脈をモニターした症例は21例であった。補助手段として

表2 手術術式

Operation	No.	Anesth time		Op time		Trans-fusion ml	Infusion ml
		h	m	h	m		
Grafting	50	12	5	10	43	3743	3618
Extra-anatomical bypass	19	14	35	13	13	4984	4758
Closure of tear	8	10	50	9	24	3604	3020
Bentall's operation	18	9	7	7	43	2365	2301
AVR + Repair of vessels	3	10	2	8	30	3320	2543
AVR + Grafting of assending Ao.	4	7	45	6	47	1783	1760
Grafting + Repair	4	13	24	12	8	2803	3713
Explorative thoracotomy	1	1	40	1	20	—	—
	107	11	44	10	23	3596	3452

図3 Intraoperative complications

は、人工心肺使用例は63例で、この内、頭への分離体外循環を行なった症例は16例であり、一時bypassを施行した症例は25例であった。また気管内チューブとしてdouble lumen tubeを利用した症例は11例であった。

手術術式として、grafting 50例、extra-anatomical bypass 19例、開口部の閉鎖のみ8例、Bentallの手術18例、大動脈弁置換+血管修復3例、上行大動脈のgraftingと大動脈弁置換4例、graftingと血管再建をしたもの4例であった(表2)。平均麻酔時間は、最長のextra-anatomical bypassの14時間35分から最短の上

SNP: Nitroprusside soda, TNG: Nitroglycerin, CPZ: Chlorpromazine, HYD: Hydralazine, TM: Trimetaphane, PGE1: Prostaglandin, PH: Phentolamine, DOR: Dopamine, AD: Adrenaline, DOB: Dobutamine, ISP: Isoproterenol

図4 Cardiovascular drugs administered during the operation

行大動脈のgrafting+大動脈弁置換の7時間45分で、全症例の平均は、11時間44分であった。術中の輸血量の平均は、3600 ml、輸液量は3450 mlであった。術中自家輸血 Autotransfusionを施行した症例は12例であった。

術中の合併症(図3)としては大出血があり、5000 ml以上輸血した症例が20例見られ、また、10例に気道からの出血がみられた。不整脈も重症の心室性不整脈を含めて14例に見られた。

図5 Postoperative complications

術中使用薬剤(図4)としては、血管拡張剤、catecholamine, digitalis, 利尿剤が多くつかわれている。特に利尿剤は殆ど全例に使用された。血管拡張剤の種類としては、nitroprusside soda (SNP) が32例に使われ、また nitroglycerin (TNG) の使用例も多くみられた。Catecholamine としては、dopamine が最も多く、他の薬剤、例えば adrenaline などを必要とした例は、重症の低心拍出量症候群(LOS)を示した。術後の合併症としては、循環系、呼吸系の補助を必要とする症例が多く見られた(図5)。循環系ではLOSあるいは、catecholamine を必要とする症例が多く見られ、呼吸器系では、長期間呼吸管理を要した症例は12例あり、また腎不全に陥り、透析を要した症例は12例であった。術後死亡する例としては、sepsisやDICあるいは、消化管からの出血などを合併したり、更に重症例では、いわゆる multiple organ failure に陥って死亡する症例が見られた。更に術後11例に脳障害をきたしており、また6例であるが、四肢あるいは下肢の不全麻痺を合併した。ただ

し脳障害を起こした症例には、ICUにて、蘇生術を行った症例も含まれている。

IV 考 察

胸部あるいは胸腹部大動脈瘤は、術前より種々の合併症を伴ない、術式も複雑で、モニターも多岐にわたり、そのうえ手術時間が長く、また術中の出血量も多いので麻酔管理も困難を伴なうことが多い。麻酔方法としては、当センターでは morphine あるいは fentanyl を中心とした NLA 麻酔が主流である。硬膜外麻酔は、術中に heparin を使用することがあり合併症のリスクをさけるため我々は利用していない。麻酔管理上の要点については次の様になる。

1. 術前、術中の高血圧

高血圧を持つ患者は、術前より内科的にコントロールされていることが原則である。当センターでは、緊急手術のケース以外は内科的にコントロールされており、そのため術前より降圧利尿剤を投与されていることが多く、術前の電解質、中でもカリウム値に注意しておく必要がある。術中の血圧のコントロールは、できるだけ高血圧を防止するようこころがけ、特に大動脈を遮断するような症例では、手術早期より末梢血管拡張にこころがける。血圧を最もすみやかに降下させる薬剤としては、SNP があり胸部大動脈瘤手術の血圧管理には非常に有効である。また胸部大動脈瘤の手術をうける患者は高齢者が多く、心筋保護のためにも TNG を麻酔開始直後より使用することも有用であろう。ただこの場合動脈側を開くような薬剤、例えば hydralazine を同時に使用することも一考の価値がある。

2. 気道の確保、肺保護

胸部大動脈瘤では、瘤の圧迫により気管が偏

位していることがある。我々の症例においては、特に弓部あるいは下行大動脈に瘤が存在する場合に偏位していることが多かった。極端な場合は、偏位だけではなく術前より狭窄による呼吸困難を呈し、狭窄部での挿管チューブによる瘤の損傷がきずかわれることがある。このような場合気管支ファイバーによる誘導やX線透視下での挿管も有用である。またDeBakeyのIII型や下行大動脈瘤のように術中左開胸をするような場合、肺保護のためにdouble lumen tube¹⁾ (Endobronchial twin lumen tube[®], 1-Bronchocath[®]など)を用いることが推奨される。我々はdouble lumen tube 使用時には挿管をX線透視下にて行ないチューブの位置を確認しているが、体位を左上側臥位に変換した場合、チューブの位置のずれにより換気や気道分離が困難となる例がある。更に気管が偏位している場合、チューブの側口(右肺換気用の側口)が気管壁に密着し、右肺の換気が出来なくなることがあり注意する必要がある。開胸時の換気をどのようにするかは、いろいろ問題があるところである。片肺換気になった場合シャント血の増加により当然PaO₂の低下が起こる。この低下を防ぐ手段として、一時的に左肺動脈遮断を行なうこともある²⁾。又、右肺にPEEPを加えPaO₂を保つ試みや³⁾、PEEPを用いないで換気量を増加させる方法⁴⁾、左肺にinsufflationを行なう方法などがある。いずれの方法にしても、頻回に血液ガスの検査を行ない、注意深い管理が必要である。

3. 大出血

瘤が破裂して、すでにショック状態にある場合や、胸骨と瘤が癒着して胸骨切開により瘤破裂の恐れのある患者では、局麻下で大動脈静脈に人工心肺の送脱血管を挿入してから麻酔を行

なう。人工血管や吻合部、あるいは癒着剥離面からの出血は、時に大量になることがあり、常に大出血の可能性を念頭に置く必要がある。又、特に下行大動脈瘤の場合、瘤を開いた時に、脊髄への血流を供給している動脈(肋間動脈など)より出血することがある。この場合、動脈性の出血であるため、大量出血になる恐れもあり、注意を要する。大動脈瘤の手術には、しばしば術野より自己血を吸引し過剰再輸血するAutotransfusionを用いるが、これは輸血量の軽減や、大量出血に対してもかなり有力な手段であり、また大きな合併症もなく、有効であると考えられる⁵⁾。いずれにしても手術前より太い静脈を確保しておく必要がある。

4. 心機能保護

胸部大動脈の患者は高齢者であることが多く、また手術時間も長く、心機能に影響を及ぼすような手術操作も多い。特に、大動脈を遮断あるいは遮断解除した時には、血行動態が著明に変化する⁶⁾。遮断時には急激に後負荷が上昇するため、心臓に対する負荷は大きく、特に虚血心や大動脈弁閉鎖不全症の存在するような時には憂慮すべき結果になる⁷⁾。当センターでは、大動脈を遮断する場合、出来るだけ後負荷の上昇を軽減するため、あらかじめ他のバイパスを作製したりあるいは部分遮断で行なうことが多い。いずれにしても、遮断前に血管拡張剤を積極的に使用して、後負荷の軽減を図るとともに、遮断時の血圧上昇には、SNP等にてすみやかに対処する必要がある。遮断解除時には、逆に急激な血管床の増加により低血圧を来す。このためには、十分な容量負荷を行ない、また遮断中に使用していた血管拡張剤も軽減あるいは中止する。また遮断により末梢への流れが完全に断たれていた場合、遮断解除により大量の乳酸の

循環系への還流も念頭におき血液ガスのチェックなどもおこたらず行なう必要がある。

5. 脳、脊髄保護

胸部大動脈瘤の手術では、その部位により、脳や脊髄にいろいろな影響を及ぼす。弓部大動脈瘤の手術では、弓部を遮断し、脳への血流をシャントや分離体外循環で行なうことがある。この場合、脳の保護のためには十分な脳血流が保たれている必要がある。術中の脳血流のモニターとしては、EEG、血圧、内頸静脈酸素分圧 (PjO_2)、体位感覚誘発電位 (somatosensory evoked potential : SEP) などがある。脳血流 (CBF) は、種々の因子により影響される。特に血圧、動脈血炭酸ガス分圧、動脈血酸素分圧は重要な因子である。脳分離体外循環中の血圧を橈骨動脈でモニターできない場合は、浅側頭動脈を cut down してモニターする。動脈血酸素分圧は、当然正常値以上に保つ必要があり、また動脈血炭酸ガス分圧は、周知のように脳血流に非常に関与しているため、呼吸は normocapnea, になるように努力し、またこの指標として呼気終末炭酸ガス濃度をモニターすることも有用である。EEG は、多くの施設で利用されているが、長時間の電極固定が困難で、電気メスのノイズが入り、また麻酔剤によっても影響される。最近では、Berg Fourier 解析や EEG filter processor (AB monitor[®]) などを用いられているが、やはり電気メスのノイズを省くことが出来ず、術中モニターとしては不十分である。当センターでは SEP⁸⁾ や brainstem auditory evoked potential (BAEP) をモニターとして使用する機会がふえ、その有効性を検討中である。弓部の遮断中脳分離体外循環以外に脳循環を保つ方法としては一時的に内シャント造設を行なう場合がある。脳虚血を生じない

一応の stump pressure は、平均動脈圧で 60 mm Hg 以上で、この血圧では EEG 上虚血性変化を認めないとの報告があり⁹⁾、血圧をそれ以上に保つようところがける。しかし出来ればこのような症例では術前 Willis 輪における cross circulation を血管撮影にて確認しておく必要がある。他に脳分離体外循環循環中に有用なモニターとしては、 PjO_2 がある¹⁰⁾。 PjO_2 は、脳の酸素消費量が一定と考えたとき、CBF に比例して変化する。しかし、 PjO_2 は、内頸静脈に還流してくる脳全体の酸素分圧を示しており、必ずしも脳血流を反映しているわけではない。しかし、一応の目安となるため、少なくとも PjO_2 を 30 mmHg 以上に保つように心がける。

下行大動脈瘤の場合、大動脈の遮断により脊髄機能障害を発生する恐れがある¹¹⁾。この対策としては、低体温、temporary bypass, FF bypass などを利用するが、最近まで術中の脊髄機能のモニターはなかった。しかし SEP が用いられるようになり、将来 SEP が最も有用なモニターになるであろうと思われる。

6. 腎機能保護

胸部大動脈瘤の患者では、術前より血清クレアチニン値が高く腎機能不全を呈していることが多い。特に腎動脈が障害されている場合は、術中の管理も困難になることがある。方針としては、出来るだけ尿量を保つように、furosemide や mannitol の使用、腎動脈の血流を増すような薬剤たとえば hydralazine や dopamine 等の使用も有効である。我々の症例では、腎血流を保つために遮断前に一時的あるいは永久的なバイパス等の補助手段を用いることが多い。腎虚血を防ぐには、腎動脈の平均圧が 32 mmHg 以上あればよいとの報告もあるが¹²⁾、最も重要なことは遮断時間を出来るだけ

短くするように心がけ、少しでも腎臓の血流がとだえないようにすることであると思われる。

以上胸部大動脈瘤の手術の麻酔について術中管理を中心に考察した。

なお、本研究の要旨は第3回日本臨床麻酔学会にて発表した。

参考文献

- 1) Das BB, Festermacher JM, Keats AS : Endobronchial anesthesia for resection of aneurysms of the descending aorta. *Anesthesiology* 32 : 152, 1970
- 2) Alfery DD, Zamost BG, Benumof JL : Unilateral lung lavage : Blood flow manipulation by ipsilateral pulmonary artery balloon inflation in dogs. *Anesthesiology* 55 : 376, 1981
- 3) Brown DR, Kafer ER, Roberson VO et al : Improved oxygenation during thoracotomy with selective PEEP to the dependent lung. *Anesth. Analg.* 56 : 26, 1977
- 4) Katz JA, Laverme RG, Fairley HB et al : Pulmonary oxygen exchange during endobronchial anesthesia : Effect of tidal volume and PEEP. *Anesthesiology* 56 : 164, 1982
- 5) 安藤太三, 中島伸之, 川副浩平ほか : 一時的体外バイパス併用胸部大動脈瘤手術と術中自家輸血. *日胸外会誌*

- 31 : 2146, 1983
- 6) Silverstein P, Caldera D, Cullen DJ et al : Avoiding the hemodynamic consequence of aortic cross-clamping and unclamping. *Anesthesiology* 50 : 462, 1979
- 7) Attia RR, Murphy JD, Snider MT et al : Myocardial ischemia due to infrarenal aortic cross-clamping during aortic surgery in patients with severe coronary artery disease. *Circulation* 53 : 961, 1976
- 8) Grundy BL : Intraoperative monitoring of sensory-evoked potentials. *Anesthesiology* 58 : 72, 1983
- 9) Cucchiara RF, Messick JMJr : Anesthesia for carotid artery surgery. in *Cardiovascular anesthesia and postoperative care*. Edited by Tarhan S. Year Book Medical Publishers, Inc., Chicago 1982, 289~301
- 10) 上藤哲郎, 古家仁, 岸義彦ほか : 胸部大動脈瘤手術の麻酔 4 : 14017, 1980
- 11) Szilagyi DE, Hageman JH, Smith RF et al : Spinal cord damage in surgery of the abdominal aorta. *Surgery* 83 : 38, 1978
- 12) Morris GC, Witt RR, Cooley DA et al : Alterations in renal hemodynamics during controlled extracorporeal circulation in the surgical treatment of aortic aneurysm. *J. Thorac. Cardiovasc. Surg.* 34 : 590, 1957

著者連絡先 古家 仁

〒 565 大阪府吹田市藤白台 5-125

国立循環器病センター 麻酔科

Anesthesia for thoracic aortic aneurysm in 107 patients

Hitoshi FURUYA, Yutaka KITAMURA, Shiro OKU, Kazuko SATO
Yoshihiko KISHI, Hisatoshi OSUMI, Osamu TAKAKI, Takao SUZUKI
Hisashi SUGIMOTO, Masao KOBORI, Naoki YAHAGI, Fukuichiro OKUMURA

Department of Anesthesiology, National Cardiovascular Center

Masakazu KURO

Department of Anesthesiology, Nara Medical University

Tetsuro UEFUJI

Department of Anesthesiology and Emergency Medicine, Kagawa Medical School.

Abstract Retrospective studies were performed on 107 patients with thoracic aortic aneurysm (TAA) who had had the operation in National Cardiovascular Center from December, 1977 to June, 1983. These TAA included 36 of dissecting aneurysm, 46 of non-dissecting aneurysm and 25 of AAE. Operations performed were grafting to the aorta using temporary bypass or cross clamp, extra-anatomical bypass, Bentall's operation and so on. Anesthesia was usually done with NLA. The longest anesthetic time was for extra-anatomical bypass and the shortest was grafting to the ascending aorta with AVR. The mean anesthetic time was 11 hours and 45 minutes. Preoperative complications included hypertension, aortic regurgitation, renal insufficiency and deviation of the trachea. Massive bleeding, bleeding from the airway, arrhythmias were found intraoperatively and multiple organ failures including circulatory, respiratory, cerebral, or renal were found as postoperative complications.

The Journal of Japan Society for Clinical Anesthesia Vol. 4 No. 2, 1984