招待講演

パラコート中毒

ALAN TALBOT M.D.

Director :
Department of Anesthesia and Critical Care Medicine
Changhua Christian Hospital Changhua, Taiwan 500 ROC
Associate Professor :
Department of Anesthesia
Kaohsiung Medical College
Kaohsiung, Taiwan ROC

抄録 彰化は、台湾の中央にあり、広大な農業圏の中心です。当病院におけるパラコート中毒の最初の症例は、1977年にみられ、それ以来その数は年毎に増大し、全体として600症例以上となった。中毒時、妊娠していた9症例を含む興味深い症例を報告した。羊水、胎児及び臍帯血からのデータは、パラコートが胎盤を通過し、母体血より4～5倍の濃度に濃縮されることを示している。いくつかの意見の分かれている新しい治療法を検討した。低線量の放射線療法が9症例に対して行なわれ、うち3例は生存した。改善された「持続血液灌流法」は、100症例以上に臨床的に用いられており、DHP-1カラムの活性炭のパラコート吸着に関する実験的検討も行なわれた。低酸素療法は、通常用いられており特定の症例（妊婦又は小児）においては、麻酔中も用いられた。これらの試みは、私たちの生存例における血中濃度が5年前における $0.68\mu\text{g}/\text{ml}$ から今年における $8.9\mu\text{g}/\text{ml}$ と増大するという結果をもたらした。

パラコート中毒

パラコート中毒の問題において、信頼すべき統計を得ることは困難である。多くの症例は、地方の開業医において治療され、保存的に管理されたり又は治療されない。そして、しばしば報告されない。さらに、国際分類(ICD-9-CM)は、パラコートを農業薬品の間にまぎれこませている。すなわち分類コード989.4は、有機リン又はカルバメイト以外の殺虫剤、他に分類できない殺虫剤又は殺虫剤の混合物に対してであり、

E分類は塩素酸塩剤によるまたは植物性食物と除草剤、ダイコート、2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acidを含む肥料との汚染による事故または災難に対するものであり、パラコートはこれらの中にまぎれてしまっている。それゆえ国際統計は問題のひろがりを通少評価している。

私の勤務している病院は、台湾の中央の彰化郡にあり、広大な農業圏の中心である。多くの患者は、近在から来るが、私達は、台湾全体から移送されてくる患者も受け入れている。例え

ば北は基隆，南は高雄という風である。東海岸にも患者がいるが，山岳の為治療開始が遅れるため受け入れ難い。しかし，私達はしばしば電話により助言をしている。

私達の症例の多くは，パラコート（Paraquat）を故意に飲用している。事故率の正確な統計は明らかでない。というのは，もし自殺だとすると治療費が医療保険から払われないということを患者の家族はすぐ知るので，救急室からは通常「誤飲」として入院して来るからである。しかし，ここ台湾において私達は興味深い現象を発見した。図1は，1986年に私達のICUに入院した人達を月日でみたものである。ピークは毎月の5・10・25日からの3日間に見られる。これらの日は，政府の宝くじの発表日である。

この病院における最初のパラコート中毒の症例は1977年にみられた。それ以来，その数は増大し，その結果殺虫剤中毒の症例を越えてしまった（図2）。通常，私達は毎年300例以上の農薬中毒を治療している。1983年に私達は，これ

Figure 1. ADMISSIONS TO ICU FOR PARAQUAT POISONING (1986) RELATED TO DAY OF MONTH (図1)

Figure 2. CHANGHUA CHRISTIAN HOSPITAL EMERGENCY ROOM STATISTICS (図2) FOR POISONING WITH AGRICULTURAL AGENTS

らの患者の予備的な報告をした¹⁾。そのときまでに、69例を経験し、死亡率は74%であった。皆様もよくご存じの症状は咽頭痛(36%)、腹痛(34%)、嘔吐(24%)、中枢神経症状(20%)と下痢(14%)であった。内臓障害は肝不全(47%)、腎不全(52%)又は、肺不全(46%)であった。まれに咽頭痛又は口腔内潰瘍が唯一の所見ということもあった。もし患者がパラコート飲用を告げない時は、この所見により血液と尿のパラコート濃度を診断の助けの為に、提出することになる。

この時は、血液灌流法(以下HP)を私達の治療法として用いはじめたばかりだった。普通10時間のアンバーライトXD-4(レジエン交換)が1981年の10月迄使われていた。その後、通常4時間の活性炭カラム(DHP-1、クラレ社製、大阪、日本)が直接的HPとして使われた。これら2つの比較は、死亡率でアンバーライトは、88%(15/17)そして活性炭は70%(7/10)であった。さらに、出血と血小板減少症といった問題は活性炭(7.14%)よりアンバーライト(50.1%)により多く認められた。DHP-1カラムによる血中よりのパラコートのクリアランスは66ml/分から、135ml/分の範囲であった。私達の臨床経験はこれら2つの吸着剤の実験的比較結果と一致している²⁾。

HPの使用、又は未使用による死亡率の比較が次に為された。血漿パラコート濃度が、 $0.2\mu\text{g}/\text{ml}$ 以下では、生存率はHP使用で71%(5/7)であり、未使用で80%(4/5)であった。血漿パラコート濃度が $0.2\mu\text{g}/\text{ml}$ と $1.0\mu\text{g}/\text{ml}$ の間では、HP使用で67%(2/3)であり、未使用で0%(0/4)であった。より高濃度のときは、生存者はなかった。すなわちHP使用で0%(0/19)であり、未使用で0%(0/1)であった。この予備的

な検討において生存した患者の血漿パラコート濃度の最高値は $0.68\mu\text{g}/\text{ml}$ であった。

現在の私達の治療法を表1に示す。吸着剤としてのケイキセレートの使用はNokataら³⁾の仕事に基づいている。Okonekら⁴⁾のすすめに従い、全腸洗浄を私達は付け加えた。この方法は治療法として繁雑で問題がある。すなわちファイバ

Table 1. PROTOCOL FOR TREATMENT OF
(表1) PARAQUAT POISONING IN ICU

1. On CVP, foley, N-G tube, npo
2. On gastric lavage protocol (5 days)
 - a. gastric irrigation with normal saline 3000 ml stat
 - b. Fuller's Earth (60 g), mannitol (200 ml), Saline (200 ml) through N-G tube stat
 - c. MgSO_4 (30 g), Kayexalate (50 g), mannitol (150 ml), saline (1000 ml) through N-G tube q3h
3. On continuous hemoperfusion protocol
 - a. On femoral vein catheters (x2)
 - b. Check platelet, APTT q4h; Na, K, Cl, q6h
 - c. Continue until urine paraquat (quantitative) negative for 2 consecutive days
4. On forced diuresis (alkaline) protocol (5 days)
 - a. Check CVP q1h and keep CVP 8-12 cm H_2O
 - b. 5% G/S (2000 ml), N/S (2000 ml), L/ringer (6000 ml) qd KCl (5 amp) + Liovita-C (2 amp) + vitamin E (2 amp) + Calcium gluconate (5 amp) added into daily iv fluids.
 - c. Keep urine output > 400 ml/h
 - If CVP > 12 cm H_2O and urine < 400 ml/h
try doubling doses of lasix (1-2-4 amps) every 20 mins. If no response with 4 amps, consider early hemodialysis (in combination with HP)
 - If CVP < 12 cm H_2O and urine < 400 ml/h
fluid challenge (200 ml/10 min) until CVP = 12 then as above
 - d. Check urine pH and keep urine pH > 7.5
If urine pH < 8 add NaHCO_3 (1 amp) to i. v. fluid stat
5. Symptomatic treatment for sore throat/ulcers
2% xylocaine viscus for gargling prn; better-iodine gargling q2h
6. Check CXR, ABG, Ccr daily (5 days) then qod (1 week)
7. Check CBC & diff, BUN, Cr, GOT, GPT, Bil (D/T) qod (1 week)
8. Psychiatric consultation if ingested deliberately
9. Check pulmonary function (incl. diffusion) before discharge

ースコープにより、十二指腸チューブを挿入すること(食道潰瘍を伴う患者では危険である)、又は Sengstaken-Blakemore (以下 SB) チューブを挿入すること、大量の水様便がおこること、肛門周囲と性器の擦過傷の予防、そして常にぬれたベッドを換える為の看護婦への負担が挙げられる。しかしながら、ここ4年間以上の良好な結果という事実は殆どこの積極的な吸収の予防の為であると私達は思っている。まず、第1にファイバースコープで十二指腸チューブを留置する。そしてこの時ついでに食道潰瘍を検索することができる。というのは、飲用3時間目の陽性所見は致命的⁵⁾とされているからである。その他、SBチューブを用いず通常の胃管チューブを用いる。又私達は直腸チューブと採集バッグシステムを用いる。同様なシステムはここ日本でも用いられている⁶⁾。予備的な研究において、ビタミンCのようなアンチオキシダントが大量に使われた(最高で4000mg/day)。しかしここ2年間アンチオキシダントとナイアシンの少量維持量のみを使うことに変えた。これらについては私達自身で、研究していない。しかしながら、文献によるとそれらが有効なのは動物実験の場合でパラコート投与前投与のとき(酵素系誘導のため)又は、パラコート中毒がそれらの不足により、より重態なときのみとされている。

妊婦におけるパラコート中毒

600例以上のパラコート中毒患者を検討することにより、1例報告では不分明ないくつかの臨床的疑問を解消しようとしている。例えば、妊婦の患者ではたった2つの症例報告^{7),8)}と1例の剖検の報告⁹⁾があるだけである。私達の症例では妊娠中にパラコートを飲用した患者が9例ある(表2, 3)。

ただちに直面する問題は、胎児を取り出す為の早期手術を行なうか否かということである。1968年という早期の Fenelly による症例報告は、パラコートは胎児中に検出されなかったとしているので、私達は原則的には胎児をパラコート

Table 2. PATIENTS WHO WERE PREGNANT (表2) AT THE TIME OF PARAQUAT POISONING

Wk: duration of pregnancy in weeks; Time: time from ingestion to arrival at emergency room; Urine: qualitative test (sodium dithionite) for paraquat; Plasma: paraquat level (μg/ml); Result: time from ingestion to death (d=days h=hours ?=death confirmed after transfer to other hospital but details unknown)

No	Age	Wk	Amount ingested	Time	Urine	Plasma	Result
1	23	12	1 mouthful	6 d	—		17 d
2	18	8	1 mouthful	4 d	—		?
3	23	32	several mouthfuls	30 h	3+	0.85	2 d
4	19	40	3 mouthfuls	7 h	3+	1.67	14 h
5	24	40	2 mouthfuls	4 h	3+		?
6	20	32	half a cup	2 h	3+	5.60	30 h
7	24	22	unknown	3 h	3+	6.30	2 d
8	23	24	2 mouthfuls	1 h	4+	3.60	alive
9	18	8	2 mouthfuls	1 d	1+	0.08	alive

Table 3. CLINICAL DETAILS OF THE FETUS IN (表3) EACH PATIENT.

Mode: delivery of intra-uterine fetus. D&C: dilatation and curettage, PBED: partial breech extraction, C/S: cesarean section, SD: spontaneous vaginal delivery, IUFD: intra-uterine fetal death; Time: time from ingestion of paraquat until delivery of fetus (d=day h=hour); Weight: birth weight; Apgar: score at 1 min/5 min.

No	Mode	Time	Weight	Apgar	Fate of fetus
1	D&C	11 d			IUFD at unknown time
3	PBED	2 d	1.5 kg	0/0	IUFD 2 days after ingestion
4	C/S	4 h	1.8 kg	1/3	Unable to resuscitate at delivery
6	C/S	4 h	1.9 kg	6/7	Blood exchange; died 19 h after birth
7	IUFD	2 d			Mother died 1 day after IUFD
8	SD	15 d	0.7 kg	2/2	Unable to resuscitate at delivery
9	D&C	28 d			Abortion after discharge

が大量にある母体から取り出すという早期手術にかたむいていた。しかし、1人の胎児も救えなかった。それゆえ、私達は胎児循環のパラコート濃度の検討をはじめた。症例8では、パラコート飲用1週間後に羊水鏡検査が行なわれた。その時、羊水中にパラコートが検出され、さらに $0.05\mu\text{g}/\text{ml}$ という濃度は、母体中の濃度($0.03\mu\text{g}/\text{ml}$)より高値だった。しかし、これらの濃度はパラコート測定用の私達の比色法の感度の限界に近いといえる¹⁰⁾。

この時までには私達は、緊急帝王切開術を中止していたので、この患者は母体血中のパラコートが検出されなくなるまで数回のHPが行なわれた後、自発分娩が行なわれた。分娩時、パラコートは母体及び胎児血中で検出されなかった。この患者は生存し、それ以来3年間以上経過観察されている。彼女は、パラコート中毒後2年経って第2の正常な新生児を得た。そして彼女自身には、なんらの後遺症はみられていない。

胎児の肺、心臓、肝臓の解剖所見は、症例6でのみ得られた。というのは、台湾の宗教的習慣の為である。組織のパラコート濃度は測定されていないが、所見はパラコートに特異的なものではなかった。

他の患者の胎児において、パラコートに関する私達の発見を検討してみた(表4)。母体血の濃度は、 $5.6\mu\text{g}/\text{ml}$ であるが、胎児血は3~4倍高値であった。パラコートは又、分娩時の臍帯血中にも検出された。それゆえパラコートは胎盤を通過し、母体血中より濃縮されて高値になる。私達は1人の胎児も救うことができなかったが、最近の2人の患者は中毒の急性期をのりきり、それぞれのその後の妊娠経過は正常である。胎児がパラコートの巨大な貯蔵庫であるという発見は、私達に治療の再検討を促した。母

体を救うための試みとして胎児の早期の除去は、母親の生命を救う観点から適応されるかもしれない。

パラコート中毒治療法としての放射線療法

1984年にパラコートによる肺障害が全肺のX線照射により、回復されることを示唆する報告があった¹¹⁾。私達は、1986年の初期に特定の症例でこの治療法を始めた。私達の最初の成功した症例は、自殺目的で 15ml のパラコートを飲用し、4月に入院した17歳の女学生であった。7.5時間後のパラコート濃度は、 $2.1\mu\text{g}/\text{ml}$ であった。9時間後に私達のICUに移送されたが、この時点では彼女の胸部は臨床的には正常であった。

放射線療法は、入院2日目に開始されたが、HPの為にヘパリンが使用されていたので肺生検は行なわれなかった。左右両方の肺をコバルト60を用い、前方、後方、斜方からとわけて照射した。それぞれの肺は、11日間にわたって 11.25GY (1125Rad)が5回に分けられて照射された。この方法は、放射線療法の副作用である線維症の発生の危険を最小限にする為にとられた。

Table 4. BIOCHEMISTRY IN PATIENTS 6 & 8 (表4) OF PREGNANT SERIES.

GOT: aspartate aminotransferase (mu/ml); GPT: alanine aminotransferase (mu/ml); SAP: serum alkaline phosphatase (mu/ml); BUN: plasma urea nitrogen (mg/dl); Cr: plasma creatinine (mg/dl). Blood was taken simultaneously from the baby and mother at birth. In Case 6, the plasma paraquat was $5.6\mu\text{g}/\text{ml}$ in maternal blood, $20.6\mu\text{g}/\text{ml}$ in the baby's blood, and $25.85\mu\text{g}/\text{ml}$ in cord blood. All three were undetectable in Case 8.

	GOT	GPT	SAP	BUN	Cr
Normal range	< 40	< 40	19-82	8-23	0.7-1.5
Mother (#6)	288	89	78	15.5	2.3
Baby (#6)	6170	540	—	31	1.0
Mother (#8)	142	65	154	17	1.2
Baby (#8)	62	20	—	8	1.7

第2病日の夜より患者は、呼吸不全の症状を示しはじめた。空気による自発呼吸で40~50回という頻呼吸と動脈血酸素分圧が70.8mmHgであり、同時に胸部X線にて左肺底部に小さな浸潤像が見られた。続く2日の間肺が悪化すると同時に肝及び腎の生化学的異常が見られた。動脈血酸素濃度は8日目には35.7mmHgであった。白血球数は、パラコートの刺激により増大し(図3)、細菌感染は、頻回のグラム染色と喀痰の培養により除外された。腎機能は強制利尿に徐々に反応し、HPは行なわれなかった。動脈血酸素分圧の45.5mmHgへという第2の転落は第12病日に起こったが、ハイドロコチゾンの1回投与とデキサメサゾンを毎日の治療法に付加することにより治療された。第17病日までに PO_2 が81.7mmHgと回復した。患者は、熱発もなく過換気でもなかった。

胸部X線上の変化の時期の同定は非常に重要である。第2病日において(図4)に小さな浸

潤像が左肺底部にあった。第8病日において同部の浸潤像はエアブロンコグラムを伴ない増大した。そして右肺の肺紋理は全体的に増強した(図5)。この時の PO_2 は、35.7mmHgであった。第12病日において左肺底部の浸潤像は不変であるが、肺紋理は増強し、右肺の周辺部に浸潤像がみられた(図6)。第20病日では両肺野の浸潤像はほぼ完全に消失した。

患者は1年7ヶ月の間経過を観察された。3ヶ月の時、左肺底部と右前第2間隙に小さな残存散布像がみられた。10ヶ月の時、X線写真は正常であった。患者は、無症状のままであり、血液ガスは空気にて正常であった。呼吸機能テストにおいて、中毒時には一酸化炭素の1回換気拡散能は、予測値の55%であったが、1年2ヶ月には84%に回復した。

オリジナルの報告においては放射線療法を決定せしめた胸部写真上の変化の同定は第4病日になされた。しかしながら走査電子顕微鏡はラ

Figure 3. CLINICAL COURSE OF PATIENT WITH PARAQUAT POISONING (2.1 $\mu\text{g}/\text{ml}$ at 7.5 h) AND LUNG CHANGES TREATED BY RADIOTHERAPY (図3)

Figure 4. CHEST X-RAY (DAY 2) SHOWING EARLY
(図4) CHANGES IN LOWER LEFT LUNG

Figure 5. CHEST X-RAY (DAY 8)
(図5) SHOWING PROGRESSION
TO RIGHT LUNG

Figure 6. (図6)
CHEST X-RAY (DAY 12) SHOWING
BILATERAL INVOLVEMENT
(PaO_2 35.7 mmHg)

ットで、パラコート投与48時間には肺胞の変化を示しており、5日目には線維芽細胞の塊が容易に同定される¹²⁾。もし呼吸機能の明らかな悪化を待って、低線量の放射線療法を始めるならば線維芽細胞はすでにコラーゲンを放出しはじめているかもしれない。そこで、私達は照射を直ちに始めることにしている。免疫抑制剤は肺を放射線に対して、過敏にするので使用しない。

放射線療法を治療法に加えるか否かについての決定には多くの因子について考えねばならない。たとえば、放射線照射の設備があるかということ、放射線療法の為にHPといった通常の治療を中断しなければならないこと、多岐にわたる治療法(表1)において1つの治療法をもつ意義を評価する困難さなどです。たった9例しか経験していませんが、すでに3例の生存例

Table 5. PATIENTS TREATED WITH RADIOTH-
(表5) ERAPY FOR PARAQUAT POISONING.

Amount: estimate of amount ingested; Plasma: paraquat ($\mu\text{g}/\text{ml}$); Time: time from ingestion to measurement of plasma paraquat in emergency room; End: outcome (S=survive D=died); X-ray: day that changes were first recognized on chest x-ray (... =no changes); Death: time from ingestion to death (hours); %age: prognosis according to computer centile charts (ref 17)

No.	Sex	Age	Amount (ml)	Paraquat		Time (h)	End	X-ray (day)	Death (h)	%age
				Plasma	Urine					
1	F	17	120	2.10	4+	7.5	S	2	...	15
2	M	35	30	0.34	2+	9.5	D	...	141	60
3	F	22	250	10.20	4+	5.0	D	...	52	<10
4	M	24	60	6.50	4+	1.5	D	...	137	<10
5	M	30	30	2.00	4+	9.0	S	5	...	11
6	F	19	30	6.80	3+	3.0	D	3	144	<10
7	F	31	30	0.98	3+	8.0	D	3	171	27
8	M	37	?	0.50	trace	50.0	S	4	...	?
9	M	18	30	3.20	2+	9.0	D	3	83	<10

を得ることができた(表5).死亡例の6例では、胸部X線上で変化が起こるまでこの治療法を待ってしまった。しかし、放射線療法をうけていなくてもパラコート血中濃度が2~3 $\mu\text{g}/\text{ml}$ と同程度で生存している症例もあるので、放射線療法が決定的な利点をもつかどうかについては、未だ明らかとは言えない。この問題の解決の為に、私達はコントロールスタディを、これは約2年間を要すると思うが、今年から始めて現在進行中である。

パラコート中毒に対する血液灌流法

1983年の予備的な発表以来、私達はHPの再評価を何回か行なった。その結果、クラレDHP-1に使用されている活性炭がパラコートの吸着に最も効果的であることを発見したが、このことは他の人達からも支持されている。しかし、1回のHPに要する費用はその当方で15万円以上であり、現在でも5万から10万円もする。台

湾では多くの場合医療費を直接払わなければならない。それも前金である。更に、自殺を図るような人達はいいてい家族関係が良好とはい難く、経済的理由の為に十分な治療が行なわれる以前に退院してしまうといった臨床上不満足な局面に遭遇することがしばしばあります。

HPの使用に関しては、国によって様々である。HPは高価である。または利用できない、またはパラコートの様な大きな分布をもつ物質に対しては適応できないという理由づけでHPは多くの国々で使用されていない。

表6は、いくつかの報告の詳細である。日本と台湾でHPは広く用いられている。台湾では、クラレDHP-1が広く用いられている。ヨーロッパでは、Gambroがよく文献に出てくる。普通、1回のHPには3~8時間かけているようである。通常のプロトコルではその後患者を休ませている。この休止時間はしばしば翌日までとなるが、いくつかの施設では数時間に短縮されている。病院内でパラコートの血中濃度が測定できるところでは、検出されなくなるまでHPが繰り返される。

最初に「持続HP」という言葉が用いられたのは1979年だった¹³⁾。1日8時間のHPを2,3週間続けることがすすめられた。報告された2人

Table 6. HEMOPERFUSION THCHNIQUES IN
(表6) WORLD LITERATURE

AUTHOR	COUNTRY	YEAR	HOURS	PARAMETER
Yoshida	Japan	1979	3-4	Urine (qual)
Okonek	Germany	1979	8	Blood
Tabei	Japan	1980	4	Urine (qual)
Hoffman	Israel	1983	8	Blood
Winchester	England	1983	8	Blood
Chen	Taiwan	1983	4	Blood
Potgieter	S. Africa	1984	4	Blood
Tashiro	Japan	1985	2-4	Blood
Huang	Taiwan	1986	4	Blood

の患者では、3日目には検出されない程、血中のパラコート濃度は減少したが、尿中には依然としてパラコートが排出されていたのでHPは3週間続けられた。

1983年の時点では、私達は2回以上のHPは殆ど行なわなかった。その後2年程してから、Okonekの方法を採用した。またこの時期に一致して、イオン交換カラムを通したのち比色するという方法で、パラコートの測定を私達自身で始めた。以前は、検体を台北へ送っていたのでデータの結果は治療法を検討するには間に合わなかった。その上、外部へ依頼すると経費がかかり、救急室で初期の濃度を測定するだけに終わることが普通だった。

いったん、パラコート濃度の頻回の測定が開始されてみると、図7に示すようなことが分り

Figure 7. PARAQUAT LEVELS BEFORE AND DURING HEMOPERFUSION IN PATIENT COMING LATE FOR TREATMENT (図7)

始めた。患者は31歳の男性で、パラコートを1口飲んだ後、7時間経って救急室にきた。その時のパラコート濃度は $1.4\mu\text{g}/\text{ml}$ だった。最初、患者は治療を拒否していたが、12時間後になって家族の説得によりHPを受けることになった(この図ではHPと書いてある)。幸いなことに、この時期の血中濃度の推移を追うことができた。

最初に気づいていただきたいのは、初期濃度よりも高い血中濃度のピークがしばしばみられることである。これらのピークは患者が非協力的でひどい暴れ方をした時期と一致している。

第2に、血中濃度はここに示した7～8時間の間以上にわたって減少していないし、特にHP開始直後も急激な減少を示していない。通常の3～8時間に1回のHPでは血中濃度を検出できなくなるまで減少させることはできなかった。

図8は、はじめ治療を拒否した似たような別な患者だが、この方はもっと早く病院に来ていた。飲用してからたった30分後だったが、血中濃度は $32.9\mu\text{g}/\text{ml}$ だった。そして5時間後にHPを受けることを了解した時点で $2.99\mu\text{g}/\text{ml}$ に著減していた。そして同様にパラコートが検出されなくなるまでのHPの時間は8時間以上かかることを発見した。更に測定を続けると、HPを止めてから30分以内にパラコート濃度の再上昇がみられることを発見した。他の患者でも、体動に一致してピークがあることをみている。

この様な発見から、次のHPを翌日まで待つことは理想的な治療でないと断定した。そこでHPの間の時間を患者が耐えられるなら、できるだけ短くすることに方法を変更した。そしてついに休止時間をなくすことに成功した。DHP-1の装置を少し改良し持続できるようにした。

しかし、頻回のHPは経費がかかりすぎるという問題を残している。また、報告されている

Figure 8. PARAQUAT LEVELS BEFORE AND DURING HEMOPERFUSION IN PATIENT COMING EARLY FOR TREATMENT (図8)

方法は HP の使用時間を 3～8 時間としているが、DHP-1 のカラムを交換すべきか否かについては明らかにしていない。多分、活性炭がパラコートで飽和され、効力が落ちることが心配でカラムを交換しているものと思われる。この点に関して検討してみると公表されたデータが少ないことに気がついた。

初期の研究の結果¹⁴⁾は、物質によって様々な飽和率を示すとしている。そこで今回はパラコートに限ってみていく。効力は、除去率で表わされているが、開始時 (15分) から 3 時間まで保たれている。

次に日本と西ドイツで 1979 年から 1980 年にかけての実験的研究の文献をみてみた¹⁵⁾。3 種類の異った濃度のパラコートと 2 種類のポンプの速

さで、パラコートが検出されなくなるまでの時間が検討された。200ml/分の速度ならば初期濃度が 100 μ g/ml でもパラコートは 3 時間以内に除去されるというのが彼らの結論だった。

台湾では、セールスマンと医師との (よその医師ですが) 言葉だけの検討からこれらの結果が誤って引用され、DHP-1 カラムは 3～4 時間しか効力がないということになってしまった。実際のところ、元々の報告は決して効力の減少は示していない。ポンプの速度が 100ml/分の時、臨床的には患者の状態によってしばしば必要となる速度だが、パラコートの濃度は 3 時間では検出不能まで減少していない。更に考慮しなくてはならないのは、この結果が実験的には正しいとしても、必ずしも臨床と一致するとは言えない事である。つまり、人体ではパラコートは常に血管外から血中へ移行するので、検出不能の値までパラコートを減少させるには更に長時間かかるわけである。

私達の症例で HP のクリアランスと除去率を測定してみた。普通、最初は HP のみを使用するが、入院時のパラコート濃度が非常に高いとき、または急性腎不全を合併しているときに血液透析 (以下、HD) を付け加えている。

図 9 で、A は HD に入る直前の血中濃度である。B は HD の直後だが、HP の前の血中濃度である。そして C は HP の後で患者に戻される直前の血中濃度である。初期の頃は、HD もパラコートの除去に役立つと思われた (A から B における減少)。このことは以前に報告したことがある。しかし HP はもっと有効である。実際 C の時点でパラコートは検出できなくなるから、1 回回路を通るだけで 100% 除去されたことが分かる。おおよそ 6 時間というこちらの初期の研究において、C の時点の濃度は検出されないままで

Figure 9. PARAQUAT LEVELS DURING TREATMENT OF PARAQUAT POISONING BY COMBINED HOMODIALYSIS AND HOMOPERFUSION (図9)

ある。そこで臨床においては、新しいカラムに交換するまでの HP の時間を長くすることにした。最初は慎重に 9 時間へと長くし、ついで 10, 11, 12 時間と長くしたが、C の時点でパラコートは検出されないという同様な結果が得られた。そこで次に何時カラムの効力が消失するかについて研究を始めた。Yoshida と Okonek らと同様の実験を検討したが、私達の場合の DHP-1 カラムは患者で使用済のものだった。

最初に実際に患者で 6 時間の HP が行われた後のカラムが、初期研究用パラコート溶液の

Figure 10. ADSORPTION OF PARAQUAT BY CHARCOAL COLUMNS AFTER THEY HAD BEEN USED TO TREAT PATIENTS WITH PARAQUAT POISONING (図10)

濃度が $10\mu\text{g}/\text{ml}$ に対して用いられた (図10, B)。ポンプの速度はこの患者に使われたのと同じ 1 分間に 120ml に設定した。この研究においてパラコートの濃度を HP 開始より 15 分後、30 分後、1 時間後、2 時間後に測定した。最初の 15 分間で $10\mu\text{g}/\text{ml}$ から $1\mu\text{g}/\text{ml}$ と減少し、2 時間以内に検出できなくなった。次に 97 時間患者に使用されたカラムを用いて同様な実験をしてみたが (図10, A), Yoshida と Okonek らが未使用のカラムを用いて得たのと同様な結果が得られた。また、臨床的なパラコートの血中濃度なら、カ

ラムは5日間の持続HPの後でも効力を保持しているという研究結果を得ることができた。それなら活性炭は飽和され効力が消失するのだろうか。そこで、パラコートの濃度を $135\mu\text{g}/\text{ml}$ (図10, C) と $627\mu\text{g}/\text{ml}$ (図10, D) と高値にして検討してみた。(臨床では、私達の経験した最高値は $300\mu\text{g}/\text{ml}$ だった)。これらのカラムは120時間のHPに使用されたものであり、患者は 2.1 および $2.4\mu\text{g}/\text{ml}$ という初期濃度にもかかわらず救命された。図においてパラコート濃度は半対数表示で4時間以内に検出不能まで直線的に減少した。臨床的なレベルでのパラコートでは、カラムの活性炭を飽和するのに十分でないことは明らかである。補助的にこの実験は3日間続けられた。そして、ケースCの場合は、回路が交換され、カラムは生食で洗浄された。ケースDの場合は何も変更されなかった。

つまり、この様な長時間のHPが最終的にパラコートの回路への再放出をひきおこすかどうかを知りたかったわけである。両方共、パラコートは検出不能だった。活性炭とパラコートがどのような結合をしているか不明だが、そうとう強く結合していると思われるので臨床的には、解離しないといえる。

現在、私達はこの持続HPを基準治療の1つとしている。患者の体動により、パラコートの血中濃度の増大が見られることを考慮して、理学療法すなわち患者の家族によるマッサージおよび患者にできる限り、手足を動かすように励ましたりしている。この目的は、HPの施行中に組織のパラコートを血中へ移行させることである。組織からのパラコートの放出の機序は不明だが、様々な組織への灌流血流量を単純に機械的に増加するということだと思う。

現在1年間以上にわたって、この方法を行な

っています。昨年この方法が患者に悪影響を及ぼすか否かを、血液学および生化学的に検討してみた。表7は症例を示している。彼らはICUに収容された患者達だが、特に選ばれた症例というわけではない。何人かは私達が確信している長時間のHPが、2つまたは3つのカードリッジにより行なわれている。

Table 7. PATIENTS STUDIED IN CONTINUOUS (表7) HEMOPERFUSION

No	Sex	Age	Amount	Time	Blood	Urine	HP
1	M	27	80-100	12	0.9	+	12
2	M	41	?	11	3.9	++++	14
3	M	47	?	14	0.4	+	24
4	M	76	100	4.5	30.2	++++	12
5	F	32	15-30	2	1.5	++	20
6	M	21	?	?	98.0	++++	30
7	F	16	450	4	13.1	++++	30
8	M	26	15	4	2.3	+++	66
9	M	26	100	13	1.4	+++	7
10	M	34	70	96	0.8	+	15

私達は特に、患者の免疫系が障害されないかと気掛りだったが、免疫グロブリンは影響をうけていない(表8)。補体も免疫グロブリンと同様に、HP前と比し、有意な変化を示していない(表9)。当然これらの検査が多くのパラメータを網羅しているとはいえないが、経験上、HPに起因するような感染症はなかった。しかし、回路の取り扱い時には無菌的操作が大切である。また予防的な抗生物質の投与を私達は一切行っていない。

この方法を1歳半の女児に行なったことがある。パラコートの入った清涼飲料水のビンの内容を飲んでしまい、母親が私達の所へ連れて来た時は、よその病院で助からないと言われた後だった。体外回路に要する血液量が少量ですむ様な小さなカラムもあるが、常時備えておくことは経費の面から私達にはできない。回路にク

Table 8. EFFECT OF CONTINUOUS HEMOPERFUSION (DHP-1) ON SERUM IMMUNOGLOBULINS (n=10)

	NORMAL(g/L)	BEFORE	AFTER
IgA	1.60 - 3.17	2.34 ± 0.85	2.29 ± 0.61
IgG	0.83 - 2.05	1.36 ± 0.44	1.34 ± 0.47
IgM	8.00 - 18.00	13.48 ± 3.38	13.02 ± 3.32

ロス・マッチを行なった血液を充填することで、非常に安定した循環動態が HP の期間中得られた。この子供は20時間の血液灌流により救命された。

1987年5月に、パラコート飲用後4時間で入院した女性の患者がいる。患者の血中濃度は8.9 $\mu\text{g}/\text{ml}$ だった。患者は急速に口と咽頭の壊死性潰瘍、急性腎不全を呈し、左肺下部の小さな浸潤像がみられた。

ついで、嘔吐によりパラコートが目に入り、接触性結膜炎もひきおこした。尿中のパラコートが検出不能になるまでに305時間の HP を要したが、カラムは6本ですんだ。患者は生存した。持続 HP の臨床的副作用といえるのは、血小板減少症のみであろう。しかしこれは患者間の差があるようである。例えば、この患者では治療中血小板減少症を起こさなかった。しかし、血小板が3万～5万以下になったら血小板浮遊液を HP 期間中は投与するというのが、私達の治療方針である。大体10人のうち、1人か2人に投与されている。「持続 HP」の方法は今なお多くの論点を抱えている。しかしながら、私達の患者に経費の面からも HP を行なえる可能性を開いたと思っている。しかし、理想的な使用法、及び HP の中止時期は今後の課題として残っている。私達は治療した患者の全ての経過観察をしているが、自殺目的の患者の場合、接触を嫌がるという問題がある。しかし、予備的な研究

Table 9. EFFECT OF CONTINUOUS HEMOPERFUSION (DHP-1) ON COMPLEMENT COMPONENTS (n=10)

	NORMAL (mg/dl)	BEFORE	AFTER
C3	83.0 - 123.0	88.7 ± 21.8	81.1 ± 24.7
C4	11.4 - 24.6	16.1 ± 4.3	15.9 ± 3.9

では興味深いことに退院後、肺線維症をおこした症例がないという結果を得た。多くの生存者は入院早期には肺合併症をひきおこさなかった。何人かは肺機能テストで悪化を示し、そして持続したが、私達がこの研究を始めてからの3年間に、より悪くなったということはなかった。胸部 X 線写真で典型的な変化を示した人達は、大抵私達の所へ来るのが1日以上経ってからというように遅く、死亡率は100%近くになっている。血中のパラコート濃度を検出不能まで急速に減少させること、そしてパラコートが尿中に排出されている間は2週間にわたって積極的な治療を行なうことが私達の症例で遅い時期の肺線維症の発生が無いことに関与しているかもしれない。私達は全症例の経過観察を望んでいるが、もし私達が生存者の退院時に今後の問題は少ないと自信を持って言えるならば、彼らに大変な精神上的の違いをもたらすといえる。

低酸素療法

昨年の始めより、空気より低い濃度の酸素を使用することを基準の治療法として、加えている。これは低酸素にするとラットの生存率が増大したという報告を基にしている¹⁶⁾。

最初、フェイス・マスクまたは鼻腔カテーテルに窒素を付加してみたが、現在では気管内挿管し、次いで人工呼吸器に酸素の代わりに窒素を接続するという方法が、一番信頼できると考

えている。ヘリウムガスも粘度が低いということで使ってみたが、経費がかかりすぎた。この方法を始めたころは、酸素消費量を抑えるために患者を不動化したり、鎮静の為にケタラールやジアゼパムを使ったりしていた。しかし、患者は低酸素の状態に良く耐えることが分かり、今では鎮静剤の投与は行っていない。それに先程お話したように、今まで患者を励まして手足を動かして組織のパラコートを血中へ移行させる様にしているし、同時にこれは血栓症の予防になっている。患者は HP の為 1 から 2 週間はベッドから動けないので、患者管理上重要といえる。

酸素飽和度が 77~83%の間になるように、指尖オキシメータを用い、これをシーメンス 900C 人工呼吸器と閉鎖回路で接続し、自動的に人工呼吸器の酸素濃度が調節される装置を用いている。この酸素飽和度は Pao_2 で 40 から 50 mmHg に相当する。

この装置を用いることによって、もし手術が必要なときでも、酸素投与の悪影響なしに麻酔を維持することができると自信をもっている。麻酔はしばしば必要というわけではないが、最初お話した様にパラコート中毒の妊婦の緊急帝王切開を行なわねばならないことがある。酸素を付加することなしに行なえる麻酔法はたくさんあるが、妊婦のときには脊椎あるいは硬膜外麻酔を第 1 選択とすることになっている。ジアゼパムとケタラールを用いた NLA 変法も 1 例で行なわれた。パラコート中毒の治療としての肺移植に関する 3 つの報告があり、全例とも酸素を用いる通常の麻酔であったが、詳細についてはふれていない^{18)~20)}。HP の為のカテーテルにより大腿動脈が損傷されたパラコート中毒の子供に大腿動脈のバイパス手術を全身麻酔下に行な

ったことがある。その子には、すでに私達の低酸素療法が行なわれていて、パルス・オキシメトリーにてモニターされていた。この装置は手術中、またその後の ICU にても活用された。

結 語

放射線療法、持続 HP そして低酸素療法は臨床的に安全で有用に利用できる様になったと思っている。しかし、これらの 1 つ 1 つについて、いつ始めるのか、いつ終わるのか、いかにして様々な治療を受けている患者においてその役割を評価するのかといったことが解決されるべき問題として残っている。これに対して、治療法の 1 つの方法を変える、つまり使用または未使用についてのコントロールスタディをそれも症例のパラツキがない様に遂行しようと現在努力しているところである。私達の携わる症例数の多いことが統計学に基づいた解答を出してくれると期待している。最後に、本日この機会を与えて頂いたことに対して、日本臨床麻酔学会、および会長の山本道雄教授に感謝の意を表します。また座長の小坂二度見教授に感謝の意を表します。先生の教室で大変楽しく実り多い 6 年間を送ることができました。

ご静聴ありがとうございました。

参考文献

(英文の References の項を参照のこと)

PARAQUAT POISONING

ALAN TALBOT M.D.

Director :

Department of Anesthesia and Critical Care Medicine

Changhua Christian Hospital Changhua, Taiwan 500 ROC

Associate Professor :

Department of Anesthesia

Kaohsiung Medical College

Kaohsiung, Taiwan ROC

ABSTRACT

Changhua is the centre of a large agricultural area in central Taiwan. The first case of paraquat poisoning was seen in 1977, and, since then, the numbers have increased yearly to a total of more than 600 patients. Some interesting cases are presented, including a series of 9 patients who were pregnant at the time of ingestion. Data from amniotic fluid, fetal and cord blood indicates that paraquat crosses the placenta and is concentrated to levels 4-5 times that of maternal blood. Some controversial new modalities of treatment have been investigated. Low-dose radiotherapy has been tried in 9 patients, with 3 survivors. "Continuous hemoperfusion" has been modified, used clinically in over 100 patients, and supplemented by in vitro experiments related to the adsorptive ability for paraquat of DHP-1 columns of activated charcoal. Hypoxic atmospheres have been used in patients as a routine, and continued during anesthesia in selected cases (pregnant and pediatric patients). These changes have resulted in an increase in our survival blood levels from 0.68 $\mu\text{g}/\text{ml}$ five years ago to 8.9 $\mu\text{g}/\text{ml}$ this year.

PARAQUAT POISONING

It is difficult to get reliable statistics on the problem of paraquat poisoning. Many cases are treated by the local medical practitioner and managed conservatively or not treated; they often are not reported. Moreover, the international classification (ICD-9-CM) hides paraquat under a mixed classification of agricultural agents: the code of 989.4 is for pesticides other than organophosphate or

carbamate, pesticides not elsewhere classified, or mixtures of pesticides; and the E code for accidents or misadventure (E863.5) combines paraquat with chlorates, mixtures of plant foods and fertilizers with herbicides, diquat, 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid, and 2, 4, 5-trichlorophenoxyacetic acid. National statistics, therefore, underestimate the extent of the problem.

The hospital where I work is in the county of Changhua, in central Taiwan, and is the

centre of a large agricultural district. Most of our patients come from nearby, but we do have patients transferred to us from all over Taiwan: places such as Keelung in the north, and Kaohsiung in the south. There is also quite a lot of patients on the east coast, but these are rarely transferred because of the mountains which make the delay until treatment can be commenced unacceptable. However, we do often receive telephone requests for advice.

By far the majority of our patients have ingested paraquat deliberately. The exact statistics for accidents are not clear because the patients' families soon learn that medical insurance will not pay for treatment of "suicide", so admissions from the emergency room are usually cases of "mistaken ingestion". However, here in Taiwan, we have an interesting phenomenon.* Figure 1 shows the admissions to our intensive care unit in 1986 related to the day of the month. Peaks that last about 3 days occurred after the fifth, tenth, and twenty-fifth of each month. These are the dates that the Government lottery results are announced.

Our first case of paraquat intoxication was seen at this hospital in 1977. Since then, the numbers have increased so that now they outnumber cases of pesticide poisoning (figure 2). In general, we see over 300 cases of poisoning with agricultural agents each year.

In 1983, we published some details of a preliminary series of these patients¹⁾. Up to that time, 69 cases had been seen, with a mortality of 74%. The symptoms that are well known to you all were sore throat (36%), abdominal pain (34%), vomiting (24%), CNS symptoms (20%) and diarrhea (14%). Visceral damage occurred as failure of liver (47%),

kidney (52%), or lung (46%). Quite often, sore throat or buccal ulceration was the only finding. If the patient does not give a history of paraquat ingestion, this finding is so suggestive in our patient population that we order blood and urine paraquat level as part of the diagnostic workup. At that time, we had just introduced hemoperfusion as part of our treatment protocol. Amberlite XD-4 (exchange resin) had been used up until October, 1981, usually for an average time of 10 hours. Thereafter, activated charcoal columns (DHP-1, Kuraray, Osaka, Japan) were used for direct hemoperfusion, usually for an average of 4 hours. A comparison of these two showed a mortality of 88% (15/17) with Amberlite, and 70% (7/10) with charcoal. Moreover, problems with bleeding and thrombocytopenia were more marked with Amberlite (50.1%) than with charcoal (7.14%). The clearance of paraquat from the blood with the DHP-1 columns ranged from 66 ml/min to 135 ml/min. Our clinical experience agrees with the results of *in vitro* comparisons of these two adsorbents²⁾.

A comparison of mortality rates in relation to whether hemoperfusion was used or not was then made. At plasma paraquat levels below 0.2 $\mu\text{g/ml}$, the survival rates were 71% (5/7) with hemoperfusion and 80% (4/5) without hemoperfusion. For plasma paraquat levels between 0.2 $\mu\text{g/ml}$ and 1.0 $\mu\text{g/ml}$, the rate was 67% (2/3) with hemoperfusion, and 0% (0/4) without. There were no survivors at higher plasma paraquat levels: 0% (0/19) with hemoperfusion and 0% (0/1) without hemoperfusion. For this preliminary series, the highest plasma paraquat level in a surviving patient was 0.68 $\mu\text{g/ml}$.

Our present treatment protocol is shown in

*英文中の図表省略。訳文参照。(以下同)

Table 1. The use of kayexalate as an adsorbent is based on the work by Nokata et al³⁾. We added whole gut lavage following the recommendations of Okonek et al⁴⁾. The physical inconvenience of this technique is considerable: insertion of a duodenal tube by fibroscopy (dangerous in a patient with oesophageal ulceration), or of a Sengstaken-Blakemore tube; the massive watery diarrhea that ensues, the prevention of perianal and genital excoriation, and the nursing load of changing continually wet bedding. However, we feel that the fact that we have had better results over the most recent 4 years is mostly due to this aggressive prevention of absorption. We place a duodenal tube by fibroscopy as first choice, and take the opportunity to inspect for oesophageal ulceration since a positive finding at 3 hours after ingestion has been correlated with a fatal prognosis⁵⁾. Otherwise we rely on ordinary naso-gastric tubes and have abandoned the use of S-B tubes. We also use a rectal tube and collection bag system. Similar systems have been used here in Japan⁶⁾.

In the preliminary study, anti-oxidants such as vitamin C were used in massive doses (up to 4000 mg/day), but during the past 2 years, we have changed to using only token maintenance doses of anti-oxidants and niacin. We have not done any studies on these ourselves; however, the literature indicates that they are only of use in animal experiments if given BEFORE the paraquat (to induce enzyme systems) or that paraquat intoxication is more severe in patients with depleted levels.

PARAQUAT POISONING IN PREGNANT PATIENTS

Using the series of more than 600 paraquat patients, we have tried to clarify several clinical questions that are unclear when one relies on single case reports. Pregnant patients, for example, have only been reported in the literature as two case reports^{7),8)} and one autopsy⁹⁾. In our series, there have been nine patients so far who ingested paraquat during a pregnancy (table 2, 3).

One is immediately faced with the problem of whether or not to perform an early operation to remove the baby. Because the early case report by Fenelly in 1968 said that paraquat was not detected in the fetus, we originally favored early operation to remove the fetus from the paraquat-containing environment of the mother. However, none of the fetuses survived.

Therefore, we started to investigate paraquat levels in the fetal circulation. In Case 8, an amniocentesis was performed one week after the ingestion of paraquat. Paraquat was detected in the amniotic fluid; moreover, the level ($0.05 \mu\text{g}/\text{mL}$) was higher than that of the maternal blood ($0.03 \mu\text{g}/\text{mL}$). However, these levels are close to the sensitivity of our colorimetry technique for the measurement of paraquat¹⁰⁾.

By this time, we had stopped giving emergency Cesarean operations, so this patient was allowed to deliver spontaneously after undergoing several courses of hemoperfusion until the maternal blood was negative for paraquat. At delivery, paraquat could not be detected in the maternal or fetal blood. This patient survived, and has been followed for more than 3 years now. She has had a second normal baby two years after the episode of paraquat poisoning, and has suffered no residual effects herself.

Autopsy findings of the fetal lung, heart, and liver were available only in Case 6 because of the local Chinese religious customs. The picture was not specific for paraquat, although tissues levels of paraquat were not determined.

We have followed up our finding of paraquat in the fetus in another patient (table 4). The maternal blood had a concentration of $5.6 \mu\text{g/ml}$, but the fetal blood was 3-4 times higher. Paraquat was also detected in the cord blood at delivery. Paraquat, therefore, crosses the placenta, and appears to be concentrated to levels much higher than the maternal blood. So far, we have been unable to save a single fetus, but our latest two patients have survived the acute poisoning episode and each has gone on to have a normal pregnancy later.

The finding that the fetus is a large reservoir of paraquat however has made us reconsider our treatment. It is possible that early removal of the fetus may be indicated in any attempt to save the mother.

RADIOTHERAPY AS TREATMENT FOR PARAQUAT POISONING

In 1984 a case report suggested that paraquat-induced pulmonary damage might be reversed by whole-lung irradiation¹¹⁾. We began this treatment in selected cases early in 1986. Our first successful case was a 17 year old female student admitted in April after deliberate ingestion of 15 ml of paraquat. The plasma paraquat at 7.5 h after ingestion was $2.1 \mu\text{g/ml}$. She was transferred to our ICU 9 hours after ingestion. The chest was clinically clear at this time.

Radiotherapy was commenced on day 2 but no biopsy was performed since the patient

was on an infusion of heparin for hemoperfusion. The right and left lungs were irradiated sequentially using a cobalt-60 unit with opposed anterior and posterior portals. Each lung received 11.25 Gy as 5 fractions over 11 days. This course was selected to minimize the risk of fibrosis occurring as a side-effect of the radiotherapy.

From late in the second day, the patient began to show signs of respiratory distress. Tachypnea of 40-50/min and arterial Po_2 of 70.8 mm Hg with spontaneous respiration using room air was accompanied by a chest x-ray which showed minor infiltrations at the left lung base. During the next 2 days, abnormal hepatic and renal biochemistry developed as the lung worsened. The arterial oxygen pressure was 35.7 mm Hg on day 8. Leucocytes showed the elevations due to paraquat stimulation (figure 3) and bacterial infection was excluded by repeated gram stain and culture of sputum. The renal function gradually responded to the forced diuresis and hemodialysis was not performed. A second fall in the arterial oxygen tension to 45.5 mm Hg on day 12 was treated by a bolus dose of hydrocortisone and the addition of daily dexamethasone to the protocol. Arterial blood gases had returned to normal by day 17 with a Po_2 of 81.7 mm Hg. The patient was afebrile and not hyperventilating.

The identification of the timing of changes in the chest x-ray extremely important. On the second day (figure 4), there were minor infiltrations at the left lung base. On day 8, there was an increase in the infiltrations at the left lung base with air bronchograms present. There was a generalized increase in the lung markings in the right lung field (figure 5). The Po_2 at this time was 35.7 mm

Hg. On day 12, the infiltrations at the left lung base were unchanged, but there was an increase in the lung markings and an infiltration was present peripherally in the right lung field (figure 6). On day 20, the chest x-ray showed almost complete clearing of the infiltrations in both lung fields.

The patient has been followed for 19 months. At 3 months, the chest x-ray showed minimal residual scarring in the left lung base and right second anterior interspace. At 10 months, the film was normal. The patient remains asymptomatic and her blood gases are normal on room air. Her lung function tests showed a single-breath diffusion capacity for carbon monoxide of 55% of the predicted value at the time of the poisoning, and this had recovered to 84% after 14 months.

The chest x-ray identification of changes that resulted in the decision to use radiotherapy in the original report was made on day 4. However, scanning electron microscopy has shown changes in the alveoli as early as 48 hours after paraquat administration in rats which, by 5 days, were easily identified as masses of fibroblasts¹²⁾. If one waits for progressive deterioration of pulmonary function before beginning low dose radiotherapy, fibroblasts may have already begun laying down collagen. We therefore elected to begin irradiation immediately. Immunosuppressants were not used, as these also radiosensitize the lung.

The decision to add radiotherapy to the treatment protocol needs to consider many factors such as the availability of radiotherapy facilities, the interruption to treatment such as hemoperfusion while radiotherapy is being done, and the difficulty of assessing the

role of one specific treatment against the background of the complex protocol (table 1). So far in a small series of 9 cases, we have had three survivals (table 5). In two of the non-survivors, we waited until changes occurred on the chest x-ray before beginning radiotherapy. However, we have had survivals with similar blood levels of 2-3 $\mu\text{g}/\text{ml}$ but treated without radiotherapy, so it is unclear still whether the radiotherapy was of any definite benefit. We have just begun a controlled trial for a possible 2 year period which we hope will make the situation clearer.

HEMOPERFUSION FOR PARAQUAT POISONING

Since the publication of our preliminary study in 1983, we have spent some time reassessing hemoperfusion. Our finding that the activated charcoal as used in the Kuraray DHP-1 system was the most efficient for absorption of paraquat has been supported by the work of others. However, the cost of a single course of hemoperfusion was more than 150,000 yen in those days, and is still between 50,000 and 100,000 yen. In Our area, the majority of patients have to pay for their own medical treatment (usually in advance); moreover, patients who attempt suicide usually already have a bad family situation, so we often were placed in the unsatisfactory clinical position of having the patient leaving the hospital before treatment has been completed because of financial reasons.

The use of hemoperfusion varies from country to country. Many countries do not use it because it is too expensive, or it is not available, or because they theorize that it is not indicated in the treatment of a substance like paraquat that has a large volume of

distribution.

Table 6 shows the details of some representative publications. Both in Japan and Taiwan, hemoperfusion is widely used. In Taiwan, the Kuraray DHP-1 is in wide use. In Europe, most publications refer to the German Gambro system. In general, a single hemoperfusion lasts for a period of 3-8 hours. A common protocol is to do hemoperfusion, then let the patient rest. This rest period is often until the next day, but is shortened to a number of hours in some places.

If the hospital has the ability to measure blood paraquat levels, these are checked and hemoperfusion repeated until the blood levels become undetectable.

The original use of the term "continuous hemoperfusion" was made in 1979¹³⁾. A course of 8 hours/day hemoperfusion for 2-3 weeks was recommended. In the 2 patients reported, the blood paraquat concentrations had dropped to undetectable by day 3, but hemoperfusion was continued for up to 3 weeks because paraquat was still being excreted in the urine.

At the time of our preliminary paper in 1983, we rarely did hemoperfusion more than twice. Over the next 2 years, we started to use Okonek's method. During this period, we also started to measure paraquat ourselves using colorimetry after an ion-exchange column. Previously, we had to send the specimens to Taipei and the data was never back in time to influence our treatment; moreover, the cost of having it done outside meant that we usually only measured an initial level in the emergency room.

Once we started doing more measurements of blood paraquat concentrations, however, we found results such as figure 7 shows. The

patient was a 31 year old male who had swallowed 1 mouthfuls of paraquat and presented to the emergency room 7 hours later. At that time, the blood paraquat was 1.4 $\mu\text{g}/\text{mL}$. At first, the patient refused treatment, but at 12 hours after ingestion, he finally acceded to his family's entreaties and underwent hemoperfusion (indicated by "HP" on the figure). Fortunately, we were able to follow his blood levels during all of this time.

The first thing to notice is that peaks occurred that were often higher than the initial blood level. These coincided with periods of uncooperation and movement by the patient.

Second, the blood level has not dropped much over the period of 7-8 hours shown here, and especially not dramatically so after the start of hemoperfusion. The usual time of 3-8 hours for a single course of hemoperfusion did not reduce the blood level to undetectable.

Figure 8 is another patient with a similar story of initially refusing treatment, but who came to the hospital much earlier. At only 30 minutes after ingestion, the blood level was 32.9 $\mu\text{g}/\text{mL}$, but this had dropped to 2.99 $\mu\text{g}/\text{mL}$ by the time the patient agreed to hemoperfusion 5 hours later. Once again, the time for hemoperfusion to reduce the blood level to undetectable was greater than 8 hours. Moreover, the blood paraquat rose again within 30 minutes of ceasing hemoperfusion. In other patients, we have had peaks associated with physical activity of the patient too.

As a result of these findings, we decided that waiting until the next day before beginning the next hemoperfusion was not optimal treatment. So we changed to reducing the time between hemoperfusion as long as the

patient would tolerate it; and, in fact, succeeded in doing away with any “rest” period. We just changed the DHP-1 system and continued.

However, this still left the problem of the expense of multiple courses of hemoperfusion. Moreover, the published techniques for hemoperfusion ranged from 3 to 8 hours, but did not make clear exactly when the DHP-1 cartridge should be changed.

Presumably the activated charcoal cartridges were being changed because of fears of decreased efficiency as it became saturated with paraquat. However, once we started looking into this aspect, we found that there was very little data published.

The results of early work¹⁴⁾ show different rates of saturation depending on the compound being adsorbed, so what I am going to say is only investigated in regard to paraquat. The efficiency (as expressed by removal) was just as good at 3 hours as at the beginning (15 mins).

Next we looked at a number of in vitro experiments published in Japan and West Germany around 1979-1980¹⁵⁾. Using 3 different concentrations of paraquat and 2 different pump speeds, the authors investigated how long it took to reduce the paraquat concentration to undetectable levels. Their conclusions were that at a speed of 200 ml/min, even a solution with an initial level as high as 100 $\mu\text{g/ml}$ is cleared of paraquat in less than 3 hours.

In Taiwan, word-of-mouth discussions with the salesmen and other centres has resulted in these results being misquoted as saying that the DHP-1 cartridge can only be efficiently used for 3-4 hours. Actually, the original report shows no decrease in efficien-

cy during the period actually studied; and at a pump speed of 100 ml/min (something that is often necessary depending on the patient's condition), the levels are not reduced to undetectable with only 3 hours hemoperfusion.

A further factor to consider is that although the results are accurate under the experimental conditions, they do not represent the clinical situation where paraquat is continually added to the blood from extravascular compartments, resulting in even further prolongation of the time required to reach undetectable levels.

We measured clearance and removal rates during hemoperfusion of our patients. Usually, we use homoperfusion alone as the first choice, but in patients with high blood paraquat levels on admission, or with acute renal failure, we add hemoperfusion to the system.

In figure 9, A is the blood level after leaving the patient. B is the blood level after hemodialysis but before hemoferfusion, and C is the level after hemoperfusion as the blood is returned to the patient.

Firstly, hemodialysis is of some benefit (the drop from A to B) in removing paraquat. This has been reported previously. Hemoperfusion is much more efficient, however; in fact, since the level at C was undetectable, there was a 100% removal with one pass. In these early experiments of approximately 6 hours duration, the levels at C remained undetectable.

Clinically, therefore, we began to increase the time of each hemoperfusion before changing to a new cartridge. At first, we very cautiously increased to 9 hours, then to 10, 11, 12 but the results remained the same: undetectable levels at C. So we began to investi-

gate the problem of just when the cartridge efficiency begins to fail.

We repeated the in vitro experiments of Yoshida and Okonek but, in our case, we used the DHP-1 cartridges AFTER they had been used to treat a patient. First, the cartridge from a patient who had undergone hemoperfusion for 6 hours (figure 10, B) was used with an in vitro solution of paraquat made up to an initial concentration of $10 \mu\text{g}/\text{mL}$. The pump speed was set to $120 \text{ mL}/\text{min}$, which was the speed used in this patient. The paraquat concentration was measured at 15 mins, 30 mins, 1 hour and 2 hours after beginning this in vitro hemoperfusion. The level fell from $10 \mu\text{g}/\text{mL}$ to $1 \mu\text{g}/\text{mL}$ within the first 15 minutes, and was undetectable within 2 hours.

We repeated this experiment with a cartridge that had been used for 97 hours (figure 10, A). Once again we got results comparable to those of Yoshida & Okonek who had used NEW columns.

We now had data that indicated the columns were still efficient for clinically meaningful levels of paraquat after continuous hemoperfusion of up to 5 days; but we still had no data on when exactly the activated charcoal began to be saturated. So we repeated the experiments with paraquat solutions of $135 \mu\text{g}/\text{mL}$ (figure 10, C) and $627 \mu\text{g}/\text{mL}$ (figure 10, D). (Clinically, the highest level that we have seen in a patient so far is $300 \mu\text{g}/\text{mL}$). Both of these cartridges had been used for 120 hours continuous hemoperfusion, and the patients had survived after initial blood levels of 2.1 and $2.4 \mu\text{g}/\text{mL}$.

As you can see, the semilogarithmic plotting shows a straight line decrease in the paraquat concentration to undetectable levels within 4 hours. So the levels of paraquat

encountered clinically are obviously not enough to cause saturation of the activated charcoal.

As a subsidiary experiment, we continued this experiment for 3 days; in case C, the circuit was changed and rinsed with normal saline; in case D, nothing was changed. We were attempting to see if such prolonged hemoperfusion would result in release of paraquat back into the circulation. In both cases, the levels remained undetectable; so although the nature of the bond between paraquat and activated charcoal is unclear, it appears to be a very strong one that does not break down under clinical conditions.

We now use this method of continuous hemoperfusion in our standard protocol. In consideration of the peaks in blood paraquat that occur with patient movement, we also add physiotherapy, massage by the patient's family, and encourage the patient to move his limbs as much as possible. Our aim is to promote the transfer of tissue paraquat to the blood while the patient is undergoing hemoperfusion. The mechanism of the release from the tissue is not known, but is possibly a simple mechanical effect of increased blood flow to the various tissues.

We have been using this method for over a year now. Last year, to reassure ourselves that this prolonged hemoperfusion was not having any adverse effects on the patient, we did a small study of a number of hematological and biochemical parameters. Table 7 shows the patients that were studied. They were taken in order of admission to the ICU, but were otherwise not selected. Some patients underwent longer hemoperfusion times on the second or third cartridges as we gained confidence.

We were particularly concerned about possible impairment of the patient's immune defence system. However the immunoglobulin levels (table 8) were not affected. The complement levels studied also showed no significant variation (table 9) from the prehemoperfusion levels. Although these studies do not cover many parameters, clinically we see no evidence of infection that can be blamed on the hemoperfusion. We emphasize an aseptic technique during insertion of the blood lines, and we do not use antibiotics prophylactically.

We have used this technique in a child aged 18 months. She had drunk from a soft-drink bottle which contained paraquat and the mother brought her to us after being told by another hospital that there was no hope. There is a smaller DHP-1 column available which would minimize the blood volume in the extracorporeal circuit, but it is not economically feasible for us to have these in stock. By priming the circuit with cross-matched blood, we have been able to give a very hemodynamically stable hemoperfusion. This child was hemoperfused for 20 hours and survived.

In May, 1987, an adult patient was admitted four hours after ingestion of paraquat. Her blood level was $8.9 \mu\text{g/ml}$. She very quickly developed severe necrotic ulceration of the mouth and throat, acute renal failure and small infiltrates in the left base of the lung. She also developed contact conjunctivitis from splashing of paraquat after she vomited. The feature of her clinical course was that she underwent hemoperfusion of 305 hours until her urine paraquat was undetectable. This required only 6 columns. The patient survived.

The only clinically troublesome side-effect of "continuous hemoperfusion" is thrombocytopenia. This seems to be related to patient differences mostly. This patient, for example, did not at any time, develop thrombocytopenia. Our current protocol is that if the platelet count drops below $30,000\text{--}50,000/\text{mm}^3$, we give a transfusion of platelet concentrate as we continue hemoperfusion. Our current rate of transfusion is about 1-2 patients in every 10 patients.

The technique of "continuous hemoperfusion" still has many points of controversy; however, we feel that at least now we have made hemoperfusion available in our patients at an economically feasible level. The optimal usage and when to cease hemoperfusion still require clarification.

We are in the process of following up all of the patients that have been treated at our hospital; however, this has problems associated with the fact that patients originally admitted for suicide are reluctant to be contacted later. Our preliminary results, however, are very interesting in that it seems that we have not had any cases of pulmonary fibrosis occurring after discharge from hospital.

Most survivors have developed no pulmonary problems during the acute admission to hospital. Some had decreased lung function tests, that remain worse than normal; but these have not deteriorated in the 3 years that we have been doing this study. Those that develop typical changes on chest x-ray have usually come to us for treatment later than the first day. In these cases, the mortality rate is close to 100%.

We feel that the rapid reduction of blood paraquat to undetectable levels, and the ag-

gressive treatment during the first two weeks of treatment when paraquat is still being excreted from the urine, may be related to the absence of delayed onset pulmonary fibrosis in our series. We want to followup the whole group, however, first; but it will mean a big difference psychically to the surviving patients if we can confidently say to them when they are discharged that the possibility of later problems is slight.

HYPOXIC RESPIRATORY THERAPY

Since early last year, our routine protocol has also included the use of inspired oxygen concentration less than that of room air. This is based on the results with rats that showed increased survival rates under such conditions¹⁶⁾.

We experimented with nitrogen supplements to a face mask or nasal catheter, but we now think that the most reliable system is to intubate the patient. We use nitrogen instead of oxygen as the gas source for the ventilator. Helium was used initially because of its low viscosity, but proved to be too expensive. Initially, we paralyzed and sedated (ketalar or valium infusion) the patient, so that the oxygen consumption would be minimized.

However, we found that the patient tolerated the hypoxic atmosphere very well, and now do not use sedation. Rather, we encourage movement by the patient himself of his limbs to promote transfer of tissue paraquat to the blood, and to prevent thrombosis. The patient may be immobilized on the hemoperfusion system for 1-2 weeks, so this is very important. Finger oximetry is used in a closed-loop system with a Siemens 900C ventilator to adjust the inspired oxygen so

that the saturation remains between 77%-83%. This is consistent with a P_{aO_2} of 40-50 mm Hg.

Using this system, we are now confident that if the patient requires surgery, we can perform the anesthesia and, at the same time, minimize the bad effects of oxygen administration in a paraquat patient. Anesthesia is not often required, but I have already mentioned that we have done, and are considering continuing, emergency cesarean sections in pregnant patients. There are a number of anesthesia techniques that can be performed without necessarily using supplemental oxygen. So far, we have used spinal and epidural anesthesia as first choice in pregnant patients. One patient was anesthetized using a modified neuroleptic combination of valium and a ketalar infusion.

There are three reports of lung transplantation for the treatment of paraquat, but all used conventional oxygensupplemented anesthesia, although the details are not given¹⁸⁾⁻²⁰⁾. We have done general anesthesia on one child for a femoral bypass graft due to peripheral arterial occlusion related to insertion of the femoral catheters for hemoperfusion catheters. The patient was already on our low oxygen therapy system and being monitored by pulse oximetry. This was continued into the operating room, throughout the operation, and later back in the intensive care unit.

IN CONCLUSION

We now feel, therefore, that we have available to us clinically safe and usable techniques of radiotherapy, continued hemoperfusion, and low oxygen therapy. Each of these, however, still is beset by the common

problems of when to begin, when to finish, and how to assess their role when the patient is receiving such a complex regimen of treatment. We are now endeavouring to do a controlled trial of matched subsets of patients where only the one modality is changed, that is, used or not used, in the hope that the large numbers of patients that we are dealing with lead to some answers based on statistics.

I would like to express my thanks to the Japanese Society of Clinical Anesthesia, and to Professor Yamamoto, for giving me the opportunity to be here today. I would also like to thank the chairman, Professor Kosaka, in whose department I spent a very happy and fruitful 6 years.

Thank you very much for your attention today.

REFERENCES

- 1) Chen CH, Yang T, Shih RS. [Clinical experience with paraquat poisoning]. *Taiwan Medical Journal* 1983 ; 26 (4) : 62-65 (in Chinese)
- 2) Okonek S, Reininghaus I, Setyadharma H, Gaudron P. An economical hemoperfusion system to determine in vitro clearance of various poisons with different adsorbents. *Arch Toxicol* 1980 ; 46 : 215-9
- 3) Nokata M, Tanaka T, Tsuchiya K, Yamashita M. Alleviation of paraquat toxicity by kayexalate and kalimate in rats. *Acta Pharmacol Toxicol* 1984 ; 55 : 158-60
- 4) Okonek S, Hofmann A, Henningsen B. Efficacy of gut lavage, hemodialysis, and hemoperfusion in the therapy of paraquat or diquat intoxication. *Arch Toxicol* 1976 ; 36 : 43-51
- 5) Frelon JH, Merigot P, Garnier R, Bismuth C, Efthymiou ML. [Prognostic factors of acute paraquat poisoning. Retrospective study of the cases collected in 1981 at the Poiso Control Center of Paris] *Toxicol Eur Res* 1983 ; 5 (4) : 163-9 (in French)
- 6) Aoyagi M. [Whole gut lavage using Sengstaken-Blakemore tube and "stool-bag"] *ICU to CCU* 1986 ; 10 (10) : 911 (in Japanese)
- 7) Fennelly JJ, Gallagher JT, Carroll RJ. Paraquat poisoning in a pregnant woman. *Br Med J* 1968 ; 3 : 722-3
- 8) Musson FA, Porter CA. Effect of ingestion of paraquat on a 20-week gestation fetus. *Postgrad med J* 1982 ; 58 (685) : 731-2
- 9) Takeuchi K, Takayama K, Tomichi N, Kan E, Yagawa K, Iwabuchi K. [Paraquat poisoning in a pregnant woman] *Kyobu Shikkan Gakkai Zasshi* 1980 ; 18 (10) : 747-52 (in Japanese)
- 10) Jarvie DR, Fell AF, Stewart MJ. A rapid method for the emergency analysis of paraquat in plasma using second derivative spectroscopy. *Clin Chim Acta* 1981 ; 117 (2) : 153-65
- 11) Webb DB, Williams MV, Davies BH, James KW. Resolution after radiotherapy of severe pulmonary damage due to paraquat poisoning. *Br Med J* 1984 ; 288 : 1259-60
- 12) Torre C, Pavanelli PL, Varetto L, Belliardo F. Lung morphology in experimental acute paraquat poisoning. SEM observations. *Am J Forens Med Pathol* 1984 ; 5 : 125-9
- 13) Okonek S, Baldamus CA, Hofmann A, Schuster CJ, Bechstein PB, Zoller B. Two survivors of severe paraquat intoxication by "continuous hemoperfusion" *Klin Wochenschr* 1979 ; 57 (18) : 957-9
- 14) Nakashima T, Takakura K, Komoto Y, Nakabayashi N, Inou T. [Basic study of PHEMA coated bead active carbon for direct hemoperfusion] *Jinko Zoki* 1979 ; 8 (4) : 460-5 (in Japanese)
- 15) Yoshida K, Asano Y, Nakajima I, Iwama G, Shindou Y, Okamoto K, Takeda K, Terukina S, Oinuma T, Kusano E, Hosoda S. [The treatment of 10 cases of paraquat poisoning using charcoal haemoperfusion] *Nippon Jinzo Gakkai Shi* 1980 ; 22 (8) : 1001-12 (in Japanese)
- 16) Rhodes ML, Zavala DC, Brown D. Hypoxic protection in paraquat poisoning. *Lab Invest* 1976 ; 35 (5) : 496-500
- 17) Hart TB, Nevitt A, Whitehead A. A new statistical approach to the prognostic significance of plasma paraquat concentrations. *Lancet* 1984 ; 2 : 1222-3
- 18) Matthew H, Logan A, Woodruff MFA, Heard B. Paraquat poisoning - lung transplantation. *Br Med J* 1968 ; 3 : 759-63
- 19) Kamholz S, Veith FJ, Mollenkopf F, Montefusco C, Nehlsen-Cannarella S, Kaleya R, Pinsker K, Tellis V, Soberman R, Sablay L, Matas A, Gliedman M, Goldsmith J, Fell S, Brodman R, Meray A, Shander A, Hollinger I, Nagashima H. Single lung transplantation in paraquat intoxication. *NY State J Med* 1984 ; 84 (2) : 82-4
- 20) Saunders NR, Alpert HM, Cooper JD. Sequential bilateral lung transplantation for paraquat poisoning. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1985 ; 89 (5) : 734-42