原 著

子宮頸部前癌病変および癌の走査型電子顕微鏡的観察

慶応義塾大学医学部産婦人科学教室（指導：栗原操寿教授）

木 村 博 子

はじめに

子宮頸癌診断法として確立された細胞診および腔拡大鏡診を臨床的に常用するようになって以来、子宮頸部では癌発生途上にある異形成上皮や上皮内癌の発見は年々著しい増加をみている¹⁾。なかでも細胞診の進歩は著しく、現在では細胞診のみでかなりの高い確率で、その組織背景を推定できるまでになっている。ここで細胞診は子宮頸部表面より剝離してきた細胞を観察していることを考えると、子宮頸部表面の細胞を、あるがままの状態を観察することはきわめて興味深いといえよう。従来この目的のためには腔拡大鏡診²⁾や腔頭微鏡診^{3,4)}が用いられてきたが、腔拡大鏡診は個々の細胞ではなく細胞集団の表面を 10~40 倍という低倍率で観察しており、また腔頭微鏡診においてはある程度個々の細胞の観察は可能であるが、その倍率は 100~400 倍と比較的高倍率のため手技上の困難を伴い、また核を生体染色するため、その表面が壊死におちいった進行癌では染色性も不良となり、十分な観察ができない。また、今日までに数多くの子宮頸部の透過型電顕による超微形態^{5~16)}の報告がされてきたが、透過型電顕の写真より組織表面の立体構造を再構築することはきわめて困難である。ところで近年、表面の超微構造を観察する手段として走査型電子顕微鏡（以下走査電顕）が英国（1964）および日本（1965）で開発された。その原理は電子 probe の照射によって試料面から発生した 2 次電子を検出器で受け、光電子増倍管と陰極線管とを組合わせて検出するものである^{17~19)}。生物試料では 10 万倍の倍率が可能であり、また 250~100 Å の解像力を有し、光学顕微鏡の約 300 倍の焦点深

度をもち、透過型電顕よりはるかに広い視野をもち、比較的大型の試料の導入が可能である。さらに試料作製も透過型電顕と比較してより容易である^{20~22)}。これらの利点をもつ走査電顕を用いて、子宮頸部各種病変における細胞表面の超微構造を観察してえられた知見を報告する。

研究材料および方法

慶応義塾大学医学部産婦人科癌クリニックを受診し、すでに細胞診と組織診において診断の確定した患者より、punch biopsy にて組織を採取した。ここで、上皮の表面を自然の状態を観察する目的から、諸検査や処置を加えた場合には回復を待ち、数ヵ月後に組織を採取した。組織試料はできるだけ早く 2% N-acetyl-L-cysteine でふい洗いをして粘液を除去し、ついで生食水にて洗滌後、余分の水分をろ紙にてすいとり、すみやかに 1% glutaraldehyde に一昼夜固定した。前固定の後に phosphate buffer にて 5~6 回洗浄し、後固定の目的で 1% OsO₄ に 2 時間浸した。phosphate buffer にて数回洗浄後脱水を行った。脱水は 50%, 75%, 95

Fig. 1 走査電顕にて観察した試料の縦断面。癌組織の遊離面に一層の黒い蒸着膜がみられる。

Scanning Electron Microscopic Studies on Precancerous and Cancerous Lesions of Cervix Uteri.

Hiroko KIMURA

Director : Professor Soju KURIHARA M.D. MIAC.

Department of Obstetrics and Gynecology,
Keio University School of Medicine,

昭和 50 年 5 月 20 日受付

%, 100% ethanol 中で5分間ずつ2回, ついで 100% acetone 中で10分間ずつ3回行った. 次いで試料をろ紙上に出し, 空气中で自然乾燥を行った. また, 臨界点乾燥法は, acetone にて脱水後, isoamyl acetate 中に移し, 次いで CO₂ 臨界点乾燥装置を使用した. 蒸着を行う前に実体顕微鏡にて試料の表面の確認を行った. 次いで真空内にて約 100~250 Å の厚さに炭素および金の蒸着を行い, JSM-U3, JSM-SI, JEM-100B+ASID 走査電顕にて観察を行った. 撮影後の試料は acetone に浸した後, epoxy resin で包埋し, 0.5~2.0 μ の thin section を作製し, 脱エボン処理後, haematoxylin-eosin にて染色し, 光学顕微鏡にて観察を行い, 縦断面と表面構造の比較検討を行った (Fig. 1).

研究成績

1. 正常扁平上皮: 光顕的に正常扁平上皮は基底, 旁基底, 中間, 表層に分けられ, 表面に向かって分化するにつれて細胞質は扁平かつ豊富となり, 核は小さく濃縮性となる. 正常扁平上皮最表層の走査電顕像では, 多角形で敷石状に規則正しく配列した薄い扁平上皮細胞がみられる. 細胞のほぼ中央にわずかに膨隆した小円形の核がみられ, 細胞質は豊富で, 核一細胞質比は小である. また, 細胞境界はわずかに隆起している (Fig. 2). 細胞質表面の強拡大像では, 多くの細胞において無数の短い絨毛様小突起 (microvilli) が不規則に配列しているのがみられる (Fig. 3, 4). ときとして表面よりはがれかかった細胞がみられるが, この像より扁平細胞はかなり薄いということがわかる (Fig. 5). はがれかかった細胞の裏面を観察すると表面とは異なり, 小さな溝 (micro-

Fig. 2 正常扁平上皮 (1,000×): 敷石状に規則正しく配列した多角形細胞のほぼ中央にわずかに膨隆した小円形の核が見られる.

Fig. 3 正常扁平上皮 (6,000×): 細胞境界はわずかに隆起していて, 短い microvilli が不規則に配列している.

Fig. 4 正常扁平上皮 (30,000×): さらに拡大したもので, 短い microvilli が不規則に配列している.

Fig. 5 正常扁平上皮 (3,000×): はがれかかっている細胞の裏面が観察される.

Fig. 6 正常扁平上皮裏面 (10,000×): 細胞の裏面の強拡大像では, 不規則な多数の溝 (microgroove) がみられる。

Fig. 7 正常扁平上皮 (10,000×): より下層の細胞の表面で不規則な細胞質小隆起 (microridge) がみられる。

groove) が不規則に走っているのがみられる (Fig. 6). 超音波処理または表面擦過により最表層をはがし, より下層の細胞表面を観察すると, 最表層の所見とは異なり, 種々の方向に走る多数の細胞質小隆起 (microridge) がみられる (Fig. 7).

2. 扁平-円柱上皮移行部: 光顕的には, 層形成のはっきりした扁平上皮領域と一層の円柱上皮との境界ははっきりと区別される. 走査電顕像では円柱上皮領域は低く見え, 多角形の細胞の密集した扁平上皮領域は高く, 両領域は明らかに区別される (Fig. 8).

3. 化生上皮: 子宮頸部では, 円柱上皮下の予備細胞は予備細胞増殖症 (reserve cell proliferation) および予備細胞過形成 (reserve cell hyperplasia) を経て, 扁平上皮への化生を営むのが普通である. 中期~分化期化

Fig. 8 扁平-円柱上皮移行部 (200×): 左側の低くみえる部分が円柱上皮領域で, 右側の高くみえる部分が扁平上皮領域である。

Fig. 9 化生上皮 (3,000×): 円形ないし楕円形で, 大小不同を示す. 核の膨隆はなく細胞質は厚味がある。

生上皮の走査電顕所見は, 円形ないし楕円形の大小不同のある細胞が表面をおおっている. 正常扁平上皮においてみられたような核の膨隆は認められず, 細胞に厚味の増していることを示している (Fig. 9). また細胞表面の微細構造は正常扁平上皮のような棒状の microvilli とは異なり, 丸味のある細胞顆粒状を呈している (Fig. 10, 11). この細胞間隙には各細胞を連絡している細胞間橋ともいふべき細い細胞質突起が観察される (Fig. 10, 11).

4. 異形成上皮: この病変は, 正常扁平上皮と上皮内癌の中間に位置し, 上皮内癌に進むかと思えば自然消滅するなど, 癌への必然性をまだ具えていない良性上皮である. 組織学的には, a) 上皮細胞の異型性の獲得, および, b) 上皮の明らかな正常分化能の保持にある. すなわち, 癌細胞に類似する異型核をもった細胞が程度に

Fig. 10 化生上皮 (10,000×): 拡大した細胞間隙の強拡大像で細胞間橋がみられる。

Fig. 11 化生上皮 (30,000×): さらに拡大した像で、表面は丸味のある細顆粒状を呈している。細胞間橋もあきらかに認められる。

Fig. 12 異形成上皮 (5,000×): 細胞の重なり合いのため、隆起した細胞境界はなく、細胞には厚味があり、核の膨隆はみられない。

Fig. 13 異形成上皮 (30,000×): 強拡大像では microvilli は正常扁平上皮に比し、太く短くなり、また丸味をおびてきている。

Fig. 14 異形成上皮 (3,000×): 異形成上皮のなかには細胞質の薄いものもあり増大した核の膨隆がみられる。細胞の重なり合いのために隆起した細胞境界はみられない。

Fig. 15 異形成上皮 (3,000×): 膨隆した増大核をもつ細胞で、細胞診でみられる dyskaryotic cell に相当する。

Fig. 16 異形成上皮 (10,000×): Fig. 15 の核の部分の強拡大像で, 細胞質は正常扁平上皮に類似した微小突起をもつ. 扁平上皮としての分化を示していると考えられる.

Fig. 17 異形成上皮 (20,000×): さらに拡大した像で, 膨隆した核をおおった細胞質の微小突起が認められる.

差はあれ, 上皮全層に散らばっているけれども, 上皮はなお基底層から表層に向かい明らかな正常の分化を示しているものをいう.

走査電顕像は, 正常扁平上皮にみられた敷石状の整然とした配列はもはやみられず, その配列は不規則となり, 細胞相互間に重なり合いがみられ, 細胞質が他の細胞の核の上にまでおおいかぶさっていることもある (Fig. 12, 14). それと同時に, 隆起した細胞境界はなくなり, 細胞に厚みを増し, したがって核の隆起はみられなくなる (Fig. 12). 細胞表面の微細構造は, 正常扁平上皮と比して microvilli が太く短くなり, 同時に丸味をおびてくる (Fig. 13).

他方, 異形成上皮のなかにも正常扁平上皮に類似し,

Fig. 18 上皮内癌 (3,000×): 深層型悪性細胞に相当すると思われる類円形の細胞が密集し, 比較的単調な像を呈する.

Fig. 19 上皮内癌 (5,000×): 配列は全く不規則であり, 重なり合いも強い.

細胞質もよく発達し, その厚さの薄い細胞もみられるが, これらの細胞では核の大きさは正常扁平上皮と比較してかなり大きく, 核—細胞質比は増大している (Fig. 14, 15). これらの細胞の表面では, 正常扁平上皮より microvilli が多少短くなっている傾向がみられるが, 既述した細胞に厚味のある核異型細胞表面の microvilli に比して長さを保持し, 正常扁平上皮との類似点をもっている (Fig. 16, 17).

5. 上皮内癌: 癌類似の細胞が上皮全層をしめて分化を示さず, まだどこにも浸潤のないものをいう. 組織学的基準は, a) 上皮の正しい分化の欠如, b) 細胞の十分な異型性, c) 極性の消失, d) 核分割の増加とくに異常核分割である. 著者らのいう上皮内癌とは, すでに悪性性格を具えた最初期の癌と見做される.

Fig. 20 上皮内癌 (5,000×): 類円形の細胞が密集し、細胞の重なり合いが強くもはや膨隆した細胞境界はみられない。

Fig. 21 上皮内癌 (10,000×): 細胞質微小突起は異形成上皮よりさらに丸味を増し、顆粒状に近くなっている。

Fig. 22 初期浸潤癌 (1,000×): 円形または類円形の細胞の中に、分化型悪性細胞に相当すると考えられる細長い細胞質突起をもつ細胞をみる。配列は不規則で細胞の重なり合いがみられる。

Fig. 23 初期浸潤癌 (3,000×): 細胞質突起をもつ細胞の頭部の拡大像。円形または類円形細胞の重なり合いがみられる。

走査電顕像は、異形成上皮でみられたような細胞の大小不同は少なくなり、類円形の細胞が密集し割合に単調な像を呈している (Fig. 18)。しかし、各細胞の配列は全く不規則となり、正常扁平上皮にみられたような軽度に膨隆した規則正しい細胞境界はほとんどみられず、重なり合いが強くなる (Fig. 19, 20)。細胞表面の微細構造は異形成上皮のそれと比較すると microvilli はさらに短くなり、丸味を増し、表面は顆粒状に近くなってくる (Fig. 21)。

6. 初期浸潤癌: 上皮内癌の位相をすぎて基底膜を一部破壊し、浸潤の浅く表在性の微小浸潤癌を初期浸潤癌という。走査電顕像は上皮内癌の時にみられた類円形細胞が主体をしめるが、そのなかに細長い細胞質突起を有する、いわゆる分化型悪性細胞がまじってくるようにな

る (Fig. 22, 23, 24)。細胞表面の微細構造には、正常扁平上皮でみられたような microvilli はもはやみられず、顆粒状になる。この構造は細長い細胞質突起の表面でも同様である (Fig. 25)。

7. 浸潤癌: 組織学的には、癌細胞が基底膜を破壊し、粘膜下間質に進行性に蔓延したものをいう。この走査電顕像は、大小不同の著しい形の不ぞろいな細胞が不規則に、屋根瓦状に重なり合っている (Fig. 26)。正常扁平上皮にみられた細胞境界のわずかな隆起は、細胞相互の強い重なり合いのためにもはやみられず、また、敷石状の規則正しい配列は全く失われる。核の膨隆がみら

Fig. 24 初期浸潤癌 (3,000×): 分化型悪性細胞に相当すると考えられる細胞質突起をもつ細胞で, 細胞質表面は扁平化している.

Fig. 25 初期浸潤癌 (10,000×): Fig. 22 にみられる分化型悪性細胞の細胞質突起の尾部の拡大像. 細胞質表面は正常扁平上皮に比して, 扁平化し, 顆粒状に近い.

Fig. 26 浸潤癌 (1,000×): 大小不同の著しい, 形の不揃いな細胞が, 全く不規則に屋根瓦状に重なり合っている.

Fig. 27 浸潤癌 (3,000×): 正常扁平上皮でみられたような膨隆した細胞境界は, 細胞の重なり合いのためにみられず, 配列は不規則となり, 膨隆した核もみられない.

Fig. 28 浸潤癌 (10,000×): 細胞相互の重なり合いが強くみられる. 細胞の表面の微小絨毛はより扁平化している.

Fig. 29 浸潤癌 (3,000×): tadpole cell, fiber cell に相当するものと思われる分化型悪性細胞. 細胞の表面は, より扁平化しわずかに凹凸を認めるにすぎない.

Fig. 30 浸潤癌 (3,000×): 奇怪な形をした細胞の一つである。表面はやはり扁平化傾向を示し、わずかな凹凸を示すにすぎない。

Fig. 31 浸潤癌 (10,000×): 癌細胞のなかには、正常扁平上皮に類似した表面構造を示すものが時にみられる。

れないことから細胞に厚さのあることがわかる (Fig. 27). 腫瘍の表面には種々の奇怪な細胞がみられる (Fig. 29, 30). とくにしばしばみられるものはひも状の細胞質突起である (Fig. 29). 細胞表面の微細構造は、上皮内癌や初期浸潤癌とほぼ同様であるが、顆粒状構造はさらに扁平になっていく傾向がみられる (Fig. 28). 細長い細胞質突起の表面においても同様である。しかし、癌細胞のなかにはその表面構造が正常扁平上皮に類似し、microvilli~microridge 様のものも時に観察される (Fig. 31).

考 按

I. 試料作製法について: 試料作製法は、透過型電子顕微鏡よりはるかに手技は簡単かつ単純であるが、固

定、脱水、蒸着法等にいくつかの問題点^{19,20,22,24)}も残されている。各々について検討を加えてみたい。

1) 試料採取: 子宮頸部最表層のありのままの微細構造をうるためには、この表面をこすらないことが重要である。手術標本や、細胞診用の細胞採取後や、腔拡大鏡診は子宮頸部に操作を加えているので、扁平上皮表層を損傷した可能性があり、走査電顕用試料としては適さない。もちろん、固定、脱水、蒸着などの試料作製過程における操作中にも表面をこすらない注意が大切である。したがって、Jordan²⁵⁾, Williams²⁶⁾, Ferenzy²⁷⁾, Nasr²⁸⁾らによる手術標本よりえられた試料による報告は、術前処置による表層損傷の疑いから、最表層の観察およびその解釈の正確性が懸念される。

2) 粘液除去: 子宮頸部においては粘液が表面をおっているため、走査電顕による所見の解釈を誤らないためにこの粘液をとりのぞかなければならない。一方、粘液をとりのぞくにあっても、細胞表面に損傷の加わる可能性がある。諸家^{24,29)}の報告をみてもこれに対処する方法はまだ定まっておらず、大多数は生食水で粘液を除去している。著者は N-acetyl-L-cystein^{30,31)} の mucolytic 作用に注目し、これを粘液の除去に応用した。これを用いると、組織表面から容易に除去される。

3) 固定方法: 試料の固定には、glutaraldehyde や osmium の単独固定法と、glutaraldehyde と osmium の二重固定法の2種類が常用されている。徳永²⁴⁾の報告によると、アルデハイド系の単独固定だけでは線毛表面の強拡大像で縞模様が認められるが、後固定として osmium を用いると、線毛の表面は平滑でふくよかな構造として観察されるという。この縞模様はアルデハイド系固定剤の lipid に対する固定作用が不十分なために、事後のアセトン脱水過程でそれら組成が試料から溶出したために生じた artefact か、またはアルデハイドが組織に対して非凝固性であるために脱水、乾燥の過程でおこった強い収縮によると解釈されている。以上から著者は glutaraldehyde と osmium による二重固定法を採用した。

4) 乾燥: 生物試料は水分を多く含んでいるため、走査電顕で観察するためには脱水を行わなくてはならない。今回の実験ではアセトンから空気中に出して乾燥させる「自然乾燥法」を主として用いたが、この方法では乾燥時の表面張力による試料の変形をさげえない。この表面張力による試料変形は最近開発された臨界点乾燥法によってさげられるという^{24,32~37)}。そこで著者も一部の症例で臨界点乾燥法を試みたところ、線毛細胞や分泌細胞において明確な差を認めたが、扁平上皮では自然乾燥

法との間に大差は認められなかった。しかし臨界点乾燥法はこの分野で今後定着するものと考えられる。

5) 蒸着: 生物試料は非電導性であるので, 試料に導電性をもたせ, また 2 次電子の発生を良くするために 100~250 Å の厚さに金属粒子の蒸着を行う。低倍率で細胞の観察を行う場合には, 蒸着膜の影響はすくないが, 走査電顕の性能の向上につれ高倍率(1 万~3 万倍)で観察するようになると, 蒸着膜の画像に及ぼす影響は無視できないものがある。当初は低倍率で細胞形態, 細胞配列の観察に止まっていたが, 高倍率による個々の細胞表面の微細構造の解析を発達させるために蒸着法が検討されている。最近の知見によると, 従来用いられてきた金は, その大きい粒子凝集性のため良くないともいわれ, Au-Pd, Pt-Pd などが注目され^{22,24)}, また, 無蒸着で観察しようとする試み²³⁾もなされているので, 本領域への応用が期待される。

II. 正常扁平上皮細胞表面の微細構造について: 子宮頸部の正常扁平上皮における最表層の細胞表面には, 2 種類の像が観察された。その 1 は microvilli ともしうべき微小突起が多数密に配列している像であり, その 2 は microridge ともしうべき種々の方向に走る多数の小隆起が表面をおおっている像である。従来, 扁平上皮表面は microridge とする報告²⁵⁻²⁷⁾が多いが, Nasr²⁸⁾のごとく最表層の微細構造は microvilli とする報告もあり, このどちらであるかはいまだ議論のわかれるところである。一方透過電顕においても, 扁平上皮細胞の遊離面には microvilli 様の細胞質小突起が観察^{5-10,38)}されているが, 縦切断面においては microvilli も microridge も同様の所見を示すこともあって, やはり結論はまだ下されない。ところで, 細胞診用の細胞採取のために子宮腔部表面を擦過したり, または生検試料に超音波処理等を行って表層をはがした子宮腔部扁平上皮表面を走査電顕で観察すると, microridge ともしうべき像がみられる。これに対し細胞診, 腔拡大鏡診, 内診など何んら操作を加えていない患者の子宮腔部試料では, ほとんどの例に microvilli ともしうべき像が認められる。以上から子宮腔部最表層細胞表面の走査電顕的微細構造は microvilli であり, より下層の表面は microridge であると考えられる。これは最初に microridge 説をとった Jordan²⁵⁾が試料作製法の改良で microvilli 説²⁶⁾に訂正した成績に一致する。ところで, microvilli が最表層で microridge がより下層の細胞の表面像であるとするれば, 子宮腔部表面にはその移行型があつてよいはずであるが, 今のところはっきりとした移行像は観察されていない。また試料の採取部位, ホルモン環境, 細胞変性など

の影響も考慮しなければならず, 最終結論は今後の検討に待ちたい。

より下層細胞の表面構造には, 前述したごとく microridge ともしうべき細胞質小隆起が縦横に不規則に走っているのがみられる。そして, はがれかかった細胞の裏面, つまり扁平上皮裏面には microgroove ともしうべき小さな溝が縦横に不規則に走っている。したがって細胞の上下は嵌合(interdigitation)によって接合していると見做される。このことは透過型電顕所見によっても示唆されている^{6,13)}。

さて, 光顕レベルで扁平上皮有棘層には細胞間を連ねている細胞間橋が観察されるが, 走査電顕像で化生上皮最表層の拡大した細胞間隙にみられた細胞質突起は, この細胞間橋に相当するものと考えられる。従来, 扁平上皮有棘層における細胞間橋は, 細胞間が固定, 脱水などの過程において細胞表面が収縮し, desmosome で連絡された細胞質の棘突起の部分が自然のままの状態より強調されて生じた一種の artefact であろうといわれてきた¹¹⁾が, 化生上皮ではその扁平上皮としての未熟性のために, 有棘層が表層にまで達し, 表面の細胞間橋を走査電顕によって観察し得たものといえよう。

III. 各種上皮の走査電顕による所見について: 正常扁平上皮は, 腔拡大鏡診においては平滑な淡紅色面としてしか観察されないが, 腔顕微鏡診においては繊細な細胞膜で境された扁平な多角形細胞の規則正しい配列として観察される。走査電顕ではこれらの所見に加えてさらに前述したごとく, 細胞質表面の微細構造が観察可能であり, この診断的有用性は大きい。しかし, 走査電顕像においてみられる核の膨隆や, 細胞質にみられる microvilli の形態は試料作製法によって変形することがあるので, その解釈には十分な注意を必要とする。

化生上皮の細胞質表面は, 正常扁平上皮の microvilli や microridge と異なり, 丸味のある細顆粒状を呈している。初期あるいは中期の化生上皮では, 扁平上皮としては未熟な細胞が表層にまで達しているためと考えられるが, その性状はどちらかといえば上皮内癌, 浸潤癌に類似していることは極めて興味深い。

異形成上皮の腔拡大鏡診は白斑, 基底, 分野の異常所見が観察されるが, それらは細胞集団の像であり, 個々の細胞については観察できない。また腔顕微鏡診では, 正常扁平上皮よりも核は大きく, 核間の距離は不正となり, 細胞配列はやや乱れている所見が観察される。走査電顕像においても, 核一細胞質比が増大している細胞がみられるが, これは細胞診でみられる dyskaryotic cell に相当するものと思われる。これらの所見に加えて, 細

胞相互の重なり合いの出現、膨隆せる細胞境界の消失、細胞の厚さの増大などが観察される。さらに興味深いことは、走査電顕でのみ観察される細胞表面の所見である。すなわち、細胞表面構造の microvilli は正常扁平上皮に比較して、より短かく丸味をおびてくる。そして同じ異形成上皮においても、正常扁平上皮に類似する、microvilli や microridge をもつ表面構造の細胞もみられる。これらの細胞では核が膨隆していることから分るように細胞は薄く、扁平上皮としてより分化した細胞と解釈される。したがって同じ dyskaryotic cell でも細胞分化の程度により、その細胞表面の微細構造には差のあることが示唆される。

上皮内癌の腫拡大鏡診像は白斑、基底、分野、異型変換帯、容疑赤色面などが出現するが、個々の細胞の観察はできない。腔顕微鏡診においては、細胞の配列の不規則性と共に、異形成上皮と比較し、いっそう核の多染性と多型性が増す。走査電顕像においては細胞の厚さのために核の状態は分らない。しかし、細胞診でみられるいわゆる third type malignant cell に相当する、円または類円形の細胞が密集し、細胞配列の乱れおよび重なり合いが観察される。高倍率で観察すると、細胞質表面は正常扁平上皮の微細構造とは大きく異なり microvilli は異形成上皮よりさらに丸く短く顆粒状に近くなっている。これについて透過型電顕でも、上皮内癌構成細胞の細胞質突起は、数が増すと同時に突起も短くなっていることが報告^{7,15,41)}されており、走査電顕の所見によく符号している。最近では細胞診だけでも、かなりの確率で初期浸潤癌の推定診断が可能である。その細胞診上の特徴は数多いが、上皮内癌でみられる深層型悪性細胞のなかに少数の分化型悪性細胞が混じてくるということもその一つに挙げられる。今日の走査電顕による観察でも、上皮内癌に類似した細胞集団のなかに、細くのびた細胞質突起を有する有尾細胞がみられたが、これらは細胞診上の分化型悪性細胞に対応する細胞と見做される。

浸潤癌の腫拡大鏡診では、上皮内癌の所見に加えて、異常隆起、潰瘍などが出現するが、これらの所見は腫瘍表面の細胞集団の観察であり、細胞診でみられる種々の悪性細胞との関係は不明である。また腔顕微鏡においては、濃染した大小不同の強い異型性に富む核が多数みられ、細胞境界は不明瞭で、核のみが強調された像がみられる。そして、進行した癌では表面が壊死となり、巨大核の散在する所見しか観察できなくなる。走査電顕では、癌細胞のもつ細胞の厚さのために核所見は不明であるが、個々の細胞の形態および細胞質表面の超微構造の観察には最適であり、細胞診でみられる tadpole cell

や fiber cell などの分化型悪性細胞が腫瘍表面に存在しているのが認められる。また、細胞質表面の超微構造は、正常扁平上皮とはきわめて異なった像を呈し、上皮内癌においてみられたような顆粒状の形態は、さらにおしつぶされたように扁平に近くなっているのが観察される。透過型電顕像でも、上皮内癌までは多く観察された細胞質小突起も浸潤癌では減少するといわれており^{7,15)}、これは走査電顕の所見を裏づけている。浸潤癌のなかには少数の例であるが、その細胞質表面に異形成上皮でみられたような microvilli~microridge に類似した細胞質小突起をもつ細胞が観察される。これらの細胞表面の差は、細胞分化の程度によるものと考えられるが、腫瘍表面の変性による影響も考慮しなければならない。

ここで正常扁平上皮、異形成上皮、上皮内癌、浸潤癌の表面の超微構造にのみ注目すると、病変が進行するにしたがい、細胞質微小突起が長より短へ、隆起より扁平へとになっていく傾向がみられる。このような連続的な傾向を示しているという事実は、細胞診からその背景の組織病変を推定できるのと同様に、走査電顕像からも、個々の細胞を観察することにより、その細胞の由来する組織型を推定できる可能性を示唆している。しかし、細胞表面の微細構造には、細胞の分化の程度による差も存在し、結論を出すには更に症例を増してゆかなければならない。

稿を終るにあたり、御指導と御校閲をたまわった恩師栗原操寿教授、直接御指導いただいた野沢志朗博士に深謝するとともに、御協力いただいた教室員一同に深謝いたします。

なお本論文の要旨は第4回日本臨床電子顕微鏡学会、第25回日本産科婦人科学会総会、第5回国際細胞学会等において発表した。

Summary

Scanning electron microscopic observations were performed to study the ultrastructure of the surface of precancerous lesions and invasive cancers of the uterine cervix. Specimens were collected from patients who visited the Gynecologic Cancer Clinic of Keio University Hospital.

1. Normal squamous epithelium: Thin polygonal cells were arranged regularly in the shape of pavement and the nuclear excrescences were observed in the center of the cells. Numerous, short and irregular villous processes were seen on the surface, and irregular runs of small grooves on the back side of the cells. The surface of the underlying cells was covered by a network of cytoplasmic microridges.

2. Metaplastic epithelium: It was composed of round to ellipsoid shaped cells varying slightly in size. The surface was covered by short, rounded, villiform projections. The intercellular spaces were dilated, and well-developed intercellular bridges noted.

3. Dysplasia: Cells with increased nucleocytoplasmic ratio were arranged irregularly and the overlapping of cells was noted. The villiform projections of most cells were shorter, and had rounded tips, as compared with those of normal squamous epithelium.

4. Carcinoma in situ: Relatively uniform and round cells were packed together, exhibiting a somewhat monotonous picture. However, the arrangement of the cells was irregular, and the overlapping of the cells was apparent. The microvilli on the surface of the cells were much shorter in size and rounder in shape, and were almost granular.

5. Early invasive carcinoma: It was mainly composed of round cells as seen in carcinoma in situ, but mixed with those cells were differentiated malignant cells having slender cytoplasmic processes.

6. Invasive carcinoma: Cells of markedly irregular sizes and irregular shapes were seen overlapping in the way of house tiles. Various kinds of bizarre-shaped cells were observed on the surface of the tumor. The surface of most cells was rather granular.

文 献

- 1) 栗原操寿: 子宮頸部の前癌病変に関する研究, 第 24 回日本産婦総会宿題報告, 1972.
- 2) 栗原操寿: コルポスコピー図譜, 中外医学社, 1962,
- 3) 藤森速水他: コルポマイクロスコーピー図譜, 永井書店, 1963.
- 4) 藤森速水他: 藤森式コルポマイクロスコーピーの実際とそのみかたのコツ, 産婦治療, 10(2): 127~145, 1965.
- 5) 小宮秀男: 超薄切片による子宮癌組織の電子顕微鏡的観察, 産婦人科の実際, 3(5): 337~341, 1954,
- 6) 小森昭人: 人子宮腔部扁平上皮並びに扁平上皮化生の電子顕微鏡的研究, 日産婦会誌, 18(19): 1093-57~1108-72, 1966.
- 7) 吉田吉信: 腔・子宮腔部扁平上皮並びに子宮頸部扁平上皮癌の電子顕微鏡的研究, 産婦の進歩, 12: 623-11~653-40, 1960.
- 8) 堀幸一郎: 子宮頸癌の電子顕微鏡的研究 (特に腔内剝離細胞及びその放射線による変化), 日産婦会誌, 10(13): 1688-42~1694-48, 1958.
- 9) 姉齒俊他: 子宮頸癌々細胞の電子顕微鏡的観察, 臨床婦人科産科, 17(6): 467~470, 1963.
- 10) C.M. Dougherty, M.D.: The epithelium stroma junction in the uterine cervix, A.J.O.G. 81: 911, 1961.
- 11) D.W. Fawcett: Inter cellular bridges, Experimental cell research, Suppl. 8: 174~187, 1961.
- 12) 橋本正淑: 人子宮頸部扁平上皮化生の電子顕微鏡像, 臨床病理の知識, 20: 777, 1966.
- 13) 黒住一昌他: 電子顕微鏡による細胞組織図譜, III, 医学書院.
- 14) 工藤隆一: 実験的子宮頸部上皮異常の病理組織学的並びに超微形態学的研究, 日産婦会誌, 21(6): 615~624, 1969.
- 15) 須賀政友: 人子宮頸癌の超微形態学的研究, 日産婦会誌, 20(12): 47~62, 1968.
- 16) 明石勝英他: 子宮腔部扁平上皮癌の微細構造について—電子顕微鏡的研究—, 産婦の世界, 2(10): 37~41, 1959.
- 17) 坂口弘: 走査型電子顕微鏡, 医学のあゆみ, 76(5): 272~277, 1971.
- 18) 長谷川与一: 鏡体, 細胞, 3(13): 9~16, 1971.
- 19) 橋本初次郎: 走査電顕の進歩, 総合臨床, 20(1): 13~17, 1971.
- 20) 坂口弘他: 走査電子顕微鏡試料作製に関する 2, 3 の問題点, 最新医学, 24(12): 2544~2550, 1969.
- 21) 山本禎一他: 走査電子顕微鏡, 産科と婦人科, 39(12): 87~101, 1972.
- 22) 田中敏一: 走査型電子顕微鏡のための生物試料作製手技の開発と応用, 日本電顕学会誌, 5: 57~62, 1973.
- 23) 村上宅郎: 生物試料直接走査電子鏡のためのタンニン・オスミウムの改良法, 日本組織学記録, 36: 189~194, 1974.
- 24) 徳永純一: 走査電子顕微鏡の医学・生物学への応用—動物試料調整の問題点—, 電子顕微鏡講習会テキスト, 1971.
- 25) J.A. Jordan, et al., : S.E.M. in the study of cervical neoplasia, J. Obst. & Gynec. Brit. Cwlth., 78: 940~946, 1971.
- 26) A.E. Williams et al., : The surface ultrastructure of normal and metaplastic cervical epithelia and CIS, Cancer Research, 33: 504~513, 1973.
- 27) A. Ferenczy et al., : S.E.M. of the cervical transformation zone, Am. J. Obst. & Gynec., 115(2): 151~157, 1973.
- 28) M.F. Nasr et al., : S.E.M. of the human cervical description of a new method to study the surface anatomy, Acta Cytologica, 17(2): 141~147, 1973.
- 29) 徳永純一他: 走査電子顕微鏡の医学への応用—その現在と将来への展望—, 医学のあゆみ, 68(11): 485~491, 1969.
- 30) 野沢志朗他: 走査型電子顕微鏡による子宮頸部前癌病変

- 及び癌の観察，診療と保険，13：978～983，1971.
- 31) A.T. Sheffer : The reduction in vitro in viscosity of mucoprotein solutions by a new mucolytic agent, N-acetyl-L-cystein, Ann. N.Y. Acad. Sci., 106 : 298～310, 1963.
- 32) 榎木勇他：子宮内膜の電顕所見，産科と婦人科，39(12) : 122～134, 1972.
- 33) 田中正明：人卵管内膜の走査電顕的研究，産婦の進歩，26(3) : 213～256, 1973.
- 34) Anderson, T.F. : Techniques for the preservation of three dimensional structure in preparing specimens for the electron microscope, Trans. N.Y. Academy Sci., 13 : 130～133, 1951.
- 35) 榎木勇他：液体 Freon 臨界点乾燥法による人子宮内膜の走査電顕像，産婦の進歩，25(2) : 155～162, 1973.
- 36) 榎木勇他：走査電子顕微鏡用試料のための臨界点乾燥法 (Critical point drying method) の意義，産婦の進歩，25(2) : 147～153, 1973.
- 37) 田中敬一：簡単な臨界点乾燥法装置，日本電顕学会誌，21(2) : 153～154, 1972.
- 38) C.T. Ashnorth et al., : Epithelium of normal cervix uteri studied with electron microscopy and histochemistry, Am. J. Obst. & Gynec., 79(6) : 1149, 1160, 1960.
- 39) 栗原操寿他：子宮頸部における前癌病変と癌の電顕的知見，産科と婦人科，39(2) : 146～162, 1972,
- 40) 栗原操寿他：子宮頸癌，細胞，3(13) : 37～41, 1971.
- 41) H.M. Shingleton et al., : Human cervical intraepithelial neoplasia and CIS, Cancer Res., 28 : 695, 706, 1968.
-