原 著

超音波検査による甲状腺癌集団検診と穿刺吸引細胞診の成績

社会保険山梨病院病理¹⁾, 同 内科²⁾, 甲府市立病院病理³⁾,
 国立相模原病院病理⁴⁾, 千葉県がんセンター研究所⁵⁾

小俣 好作¹⁾ 望月 敬司¹⁾ 千野 正彦¹⁾ 井口 孝伯²⁾
 飯田 龍一²⁾ 渡辺 秀夫³⁾ 山本 雅博³⁾ 古家 正道⁴⁾
 浅尾 武士⁴⁾ 田中 昇⁵⁾

超音波検査による 8,976 名の甲状腺癌集団検診において, 496 名の穿刺吸引細胞診が施行され, 男性 14 名 (0.22%), 女性 19 名 (0.69%) に甲状腺癌を発見した. 癌の最大径の平均は 11.9 ± 4.2 mm であり, その半数以上が 10 mm 以下の小型癌であった.

Key words : Thyroid cancer—Mass screening—Echo graphy—Aspiration biopsy cytology

はじめに

甲状腺癌の集団検診は従来より行われているが, その多くは子宮癌あるいは乳癌検診と同時に実施され, 女性を対象としたものがほとんどであり, また, 1 次スクリーニングは触診によっている.

われわれは超音波検査を甲状腺の集団検診に用い, その異常例に対して超音波映像下穿刺吸引細胞診を行ったのでその成績を報告する.

対象と方法

社会保険山梨病院健康管理センターで, 昭和 58 年 9 月から昭和 59 年 12 月まで 16 ヶ月の成人病検診および人間ドックを受診した 8,976 名 (男 6,229, 女 2,747) に対して甲状腺の超音波検査を行った (表 1). 全員が甲状腺に関する自覚症状を有していなかった. 約 1 割に超音波映像に異常を認めたが, 腫瘍状陰影を呈していたほぼ全例の 496 名 (男 253, 女 234) に対して超音波映像下穿刺吸引細胞診を施行した.

超音波装置は横河電気 RT-2000, 接触子は 5 MHz のものを使用し, 従来の水浸法⁹⁾に替えてコンタクトスキ

Detection of thyroid cancer in mass screening using ultrasonic echography and aspiration biopsy cytology

Kosaku OMATA¹⁾, M.D., Keiji MOCHIZUKI¹⁾, M.T., Masahiko CHINO¹⁾, M.T., Kohaku IGUCHI²⁾, M.D., Ryuichi IIDA²⁾, M.D., Hideo WATANABE³⁾, C.T., J.S.C., Masahiro YAMAMOTO³⁾, M.D., Masamichi KOIE⁴⁾, C.T., J.S.C., Takeshi ASAO⁴⁾, M.D., Noboru TANAKA⁵⁾, M.D., D.D.S., F.I.A.C.

Dept. of Pathology¹⁾ and Internal Medicine²⁾, Yamanaishi Hospital of Social Insurance

³⁾ Dept. of Pathology, Kofu City Hospital

⁴⁾ Dept. of Pathology, Sagami National Hospital

⁵⁾ Chiba Cancer Center

論文別刷請求先 ☎400 甲府市朝日 3 の 8 の 31 社会保険山梨病院病理 小俣好作

昭和 59 年 7 月 8 日受付

昭和 60 年 8 月 8 日受理

表 1 被検者の年齢分布 (1983 年 9 月~1984 年 12 月)

性 年齢	男	女	合計
20~	564 (9.1)	365 (13.3)	929 (10.3)
30~	1,190 (19.1)	355 (12.9)	1,545 (17.2)
40~	2,224 (35.7)	1,034 (37.6)	3,258 (36.3)
50~	1,724 (27.7)	788 (28.7)	2,512 (28.0)
60~	527 (8.5)	205 (7.5)	732 (8.2)
合計	6,229 (100)	2,747 (100)	8,976 (100)

() : %

表 2 穿刺細胞診施行例 (1983 年 9 月～1984 年 12 月)

性 年齢	男	女	合計
20～	6 (1.1)	9 (2.5)	15 (1.6)
30～	36 (3.0)	19 (5.4)	55 (3.6)
40～	89 (4.0)	77 (7.5)	166 (5.1)
50～	80 (4.6)	91 (11.6)	171 (6.8)
60～	42 (8.0)	47 (22.9)	89 (12.2)
合計	253 (4.1)	243 (8.9)	496 (5.5)

() は被検者に占める穿刺施行例の割合 (%)

ヤン法で行った。超音波による病変の検出精度は、すでに長原ら¹³⁾が報告しているように、嚢胞性病変では 2～3 mm, 充実性病変でも 3 mm 以上あれば検出可能であった。このうち、径 3 mm 以上の充実性病変、また嚢胞性病変であっても内空に充実性の突出の認められるものに対して、穿刺吸引を行った。穿刺は 21 G の注射針をつけた 10 cc の注射筒を用い超音波映像下に注射針を刺入し、腫瘤に到達したことを確認して吸引を行い、スライドガラスのうえに圧出、2 枚を 95% アルコールに固定、1 枚を乾燥後に固定して、Papanicolaou および Giemsa 染色を行った。

細胞診断は、上皮細胞成分の全く塗抹されていないものを Class-0、細胞数が少なく、しかも正常の甲状腺濾胞細胞と同様の細胞像を示すものを Class-I、細胞数が多く、核の大小不同、粗な核クロマチンパターンなど軽度の異型性を示すものを Class-II、さらに核異型が強く、細胞の重積性あるいは核間距離の不同のみられるものを Class-III、核内空腔や核のしわ形成、細胞の乳頭状配列などを示すものを Class-V、明らかな核内空腔は認められないがときに核のしわ形成がみられ、ほかの細胞異型像を伴うものを Class-IV とした。細胞診報告書には、Class 分類だけでなく、検体の適・不適、組織型の推定などもできるだけ記載した。

成 績

1. 穿刺吸引細胞診施行例

穿刺を行った 496 例 (男 253, 女 243) の年齢別では、男女とも 40 歳代、50 歳代が多いが、全被検者に占める穿刺施行例の割合は、20 歳代の男 1.1%, 女 2.5%, 30 歳代の男 3.0%, 女 5.4%, 40 歳代の男 4.0%, 女 7.5%, 50 歳代の男 4.6%, 女 11.6%, 60 歳以上の男 8.0%, 女 22.9% と年齢が高くなるに従って穿刺対象の割合が増加して

図 1 甲状腺穿刺吸引細胞診(男), (1983 年 9 月～1984 年 12 月)

図 2 甲状腺穿刺吸引細胞診(女), (1983 年 9 月～1984 年 12 月)

いる。全体では男の 4.1%, 女の 8.9% に穿刺を行っており、これらの数字はそのまま超音波検査上での甲状腺限局性異常の出現頻度を現している (表 2)。

細胞診断の結果は、Class-0, I, II, III, IV, V の順に男ではそれぞれ 46 例 (18.2%), 114 例 (45.1%), 58 例 (22.9%), 15 例 (5.9%), 5 例 (2.0%), 15 例 (5.9%), 女では 31 例 (12.8%), 85 例 (35.0%), 74 例 (30.5%), 24 例 (9.9%), 12 例 (4.9%), 17 例 (7.0%) であった (図 1, 2)。

Class-IV, V の細胞診断陽性とした症例は、男 20 例, 女 29 例あり、男女とも 20 歳代から、悪性細胞が認められている (表 3)。また、全受検者に占める Class-IV および V の割合は、男性で 0.32%, 女性で 1.06% であり、男女とも 60 歳以上でその割合が一段と高くなって

表 3 甲状腺穿刺細胞診 Class-IV, V の年齢分布

性 年齢	男	女	合計
20～	2 (0.35)	1 (0.27)	3 (0.32)
30～	1 (0.08)	5 (1.41)	6 (0.39)
40～	7 (0.31)	10 (0.31)	17 (0.52)
50～	5 (0.29)	9 (1.14)	14 (0.56)
60～	5 (0.95)	4 (1.95)	9 (1.23)
合計	20 (0.32)	29 (1.06)	49 (0.55)

() は各年齢層被検者に対する Class-IV, V の割合 (%)

表 4 手術例の細胞診成績

細胞診 組織診 Class	乳頭癌	濾胞腺腫	腺腫様 甲状腺腫	その他
陽性 (IV, V)	31			1
疑陽性 (III)	1	3	2	
陰性 (I, II)	1	6	2	1
合計	33	9	4	2

誤陰性 (3.0%), 誤陽性 (33.3%)

いることが注目される。

Class-IV および V は積極的に手術を勧め、Class-III では超音波映像所見を参考にして適応を検討した。超音波映像上の分類、良悪性の推定などに関してはすでに長原¹³⁾によって報告されている。Class-II 超音波映像上明らかな腫瘍陰影を認めるものは、3～4 ヶ月ごとの超音波による経過観察、Class-0 は再検とした。なお Class-I, II であっても患者の希望により手術を行った症例もある。

Class-0 の症例は全体で 15% にみられたが、この原因としては、穿刺吸引手技の問題のほかに、5 mm 以下の小陰影がはたして腫瘍であったか否かなどの問題も含まれている。

2. 手術施行症例の検討

細胞診断 Class-IV, V の 49 例のうち 32 例、Class-III の 39 例中 6 例、Class-I, II の 331 例中 10 例の合計 48 例の手術が社会保険山梨病院および甲府市立病院において行われた。

術前の細胞診断が Class-IV, V 32 例のうち、術後の組織診断は乳頭癌 31 例 (97%)、上皮小体腺腫の疑い 1 例、Class-III の 6 例中、乳頭癌 1 例、濾胞腺腫 3 例、腺腫様甲状腺腫 2 例、Class-I, II の 10 例中、乳頭癌 1 例 (10%)、濾胞腺腫 6 例、腺腫様甲状腺腫 2 例、甲状腺近傍に発生した神経鞘腫 1 例であった (表 4)。濾胞癌は 1 例

写真 1 細胞診誤診例 (53 歳, 女) の超音波写真

写真 2 同症例の穿刺吸引細胞像 (Papanicolaou 染色, ×850)

もなかった。

乳頭癌 33 例のうち、術前の細胞診で陰性としたのは 1 例で誤陰性率は 3.0% であった。この症例では、塗抹細胞が少なく、写真 2 のように核の大小不同、粗な核クロマチンパターンなど細胞異型はみられるものの、核内空胞や核のしわ形成が認められず、細胞診では Class-II として濾胞腺腫を疑ったが、超音波像では癌が示唆され (写真 1)、術後組織診で最大径 10 mm の乳頭癌と診断された (写真 3, 4)。手術材料の擦過細胞では少数ながら核内空胞、核のしわ形成が認められた (写真 5)。

濾胞腺腫、腺腫様甲状腺腫では穿刺細胞診で疑陽性とした症例が 3 例および 2 例あったが、細胞の重積性、著しい核の大小不同などの所見により過診断したものがほとんどであった (写真 6)。術後の見直しではそれらのすべてが Class-II であり、経過観察すべき例であった。

甲状腺癌手術例の男女比は 14 対 19、男は 21 歳から 60 歳、女は 26 歳から 62 歳までにみられ、平均年齢は男 48 歳、女 44 歳であった (表 5)。

主腫瘍が癌であったものの最大径は、5 mm が 1 例、6 mm が 3 例、7 mm が 1 例、8 mm が 6 例、9 mm が 4 例、

写真 3 同症例の手術標本写真

写真 5 同症例の手術標本擦過細胞像 (Papanicolaou 染色, $\times 850$)

写真 4 同症例の手術標本の組織像 (H-E 染色, $\times 106$)

写真 6 細胞診で悪性を疑った濾胞腺腫 (59 歳, 男) の穿刺吸引細胞像 (Papanicolaou 染色, $\times 850$)

表 5 検診によって発見された甲状腺癌手術例の年齢分布 (1983 年 9 月～1984 年 12 月)

年齢	性	男			女			合 計	
			A	B		A	B	A	B
20～		3	0.53	50.0	1	0.27	11.1	4	0.43
30～		0	0	0	3	0.85	15.8	3	0.19
40～		3	0.13	3.4	9	0.87	11.7	12	0.37
50～		3	0.17	3.8	3	0.38	3.3	6	0.24
60～		5	0.95	11.9	3	1.46	6.4	8	1.09
合計		14	0.22	5.5	19	0.69	7.8	33	0.37

A: 被検者に占める癌の割合 (%), B: 穿刺例に占める癌の割合 (%)

表 6 甲状腺癌手術例における主腫瘍の最大径

最大径 (mm)	例 数
～ 10	19
11 ～ 15	6
16 ～ 20	8
21 ～	0
合 計	33

10 mm が 4 例と 10 mm 以下の乳頭癌が 19 例 (58%) を占め, 平均は 11.9 ± 4.2 mm であった (表 6). 最小の 5 mm の癌でも超音波映像下に穿刺吸引は可能であり, それによって得られた細胞数は診断に十分であった.

術後の組織診により確診された甲状腺癌は男性受検者 6,229 名中 14 名 (0.22%), 女性受検者 2,747 名中 19 名 (0.69%) であり, 癌の発見率は女性のほうが優位に高い ($p < 0.01$) (表 5). また細胞診でみたと同様に男女とも 60 歳以上で, それ以下の年代に比較して高い癌の割

合であった。

考 案

1. 甲状腺癌集団検診について

各地において甲状腺癌の集団検診が行われているが^{6,8,10,20}、それらは子宮癌あるいは乳癌検診と同時に実施されているものが大半で、対象も女性が大部分を占める。わずかに丸地¹²⁾の報告に多数の男性例をみるのみである。また、いずれの場合も検査方法は1次スクリーニングとしては触診法によっている。

従来の検診における甲状腺癌発見率は0.04~0.40%であるが、われわれの成績は男性6,229名中14名(0.22%)、女性2,747名中19名(0.69%)であった。細胞診断のClass-IVおよびVの占める割合は男性0.32%、女性1.06%であり、女性の100人に1人が甲状腺癌を有していたことになる。特に男女とも60歳以上で高率であったが、加齢や内分泌機能の影響が推測される。

2. 小型の甲状腺癌について

潜在性の甲状腺癌が著しく高率に存在することは以前より指摘されており、高橋¹⁶⁾は320例の剖検例で44例、13.8%の甲状腺癌を発見し、SwedenでもBondesonら⁴⁾が、7%の報告をしている。また、Fukunagaら⁵⁾は日本、ハワイ在住日本人、カナダ人などの剖検例を調べ、日本人に潜在性の甲状腺癌の多いことを指摘している。

しかしながら、これら剖検例で調べられた癌はごく小さなものがほとんどであり、高橋¹⁶⁾の報告でも直径3.5 mm以下のものが44例中36例(82%)で、10 mm以上のものはわずか2例にすぎない。

甲状腺癌のほとんどはその顕在化が著しく抑えられているといわれ¹⁵⁾、臨床的に問題になる数は少ない。3.5 mm以下の癌が生前に診断できたとしても、すぐには手術の対象になるとは思われない。河西⁷⁾は、5~10 mmの小型癌は、10 mm以上の臨床癌と比べリンパ節転移などに差がなく、5 mm以上の小型癌はすでに顕在化しはじめた癌と解釈すべきとしている。一般的には5 mm以上の癌が手術の対象になるといわれている。

われわれの方法では、長さ5 mmの癌であれば超音波検査で捕えられ、映像下に穿刺吸引して診断することが可能である。

3. 穿刺吸引細胞診について

超音波検査を用いた甲状腺癌の検診では前述のごとく多数の異常例が指摘されるが、正確な質的診断は困難である。細い針を使用した穿刺吸引細胞診は転移などの危

険性がないといわれており²⁾、また、穿刺生検組織診よりも診断率が高いといわれている³⁾。

顕在化した甲状腺腫瘍の穿刺吸引細胞診断についてはすでに多くの報告があり^{1~3,11,14,17~19)}、その術前診断率の高いことが知られている。特に、甲状腺癌のなかでも多い乳頭癌については、その核の特徴から容易に診断可能である。しかしながら、濾胞癌、濾胞腺腫、腺腫様甲状腺腫に関しては、細胞診単独ではその鑑別が困難な症例も多く、今後、超音波診断など画像診断と組み合わせで検討していくべきものと思われる。

本論文の要旨は、第23回日本臨床細胞学会秋期大会において発表した。

Summary

We have been employing echo-guided aspiration biopsy cytology for thyroid cancer in mass screening during September 1983 to December 1984.

In this survey 8,976 samples (male: 6,229, female: 2,747) were examined, and 496 persons (male: 253, female: 243) were performed by echo-guided aspiration biopsy cytology. Thirty-three cases of thyroid carcinoma were detected, and the detection rate was 0.22% in male and 0.69% in female.

The largest diameters of the operated carcinomas were as large as 11.9 ± 4.2 mm, and more than the half of the cases were small carcinomas less than 10 mm in largest diameter.

文 献

- 1) 相吉悠治・他：穿刺吸引細胞診による甲状腺腫瘍の診断、ホルモンと臨床、31：873~875, 1983.
- 2) Block, M.A.: Fine needle aspiration and lesions of the thyroid, Int. Adv. Surg. Oncol., 5: 1~27, 1982.
- 3) Boey, J., et al.: Fine needle aspiration versus drill-needle biopsy of thyroid nodules: A controlled clinical trial, Surgery, 91: 611~615, 1982.
- 4) Bondeson, L., et al.: Occult papillary thyroid carcinoma in the young and the aged, Cancer, 53: 1790~1792, 1984.
- 5) Fukunaga, F.H., et al.: Genographic pathology of occult thyroid carcinomas, Cancer, 36: 1095~1099, 1975.
- 6) 生野文彦・他：徳島県における甲状腺癌集団検診(第一報)、四国医誌、37: 715~721, 1981.
- 7) 河西信勝：小型・微小甲状腺癌診断への努力、癌の臨床、

- 29: 488~492, 1983.
 - 8) 神波澄幸・他: 鳥取県中部における甲状腺疾患の頻度, 岡山医誌, 89: 1670, 1977.
 - 9) 岸本誠司・他: 甲状腺腫瘍の超音波診断, 耳鼻臨床, 74: 724~735, 1981.
 - 10) 神頭定彦・他: 甲状腺微小癌の臨床的検討—検診甲状腺微小癌 63 例を中心に—, 山梨医学, 12: 30~33, 1984.
 - 11) Löwhagen, T., et al.: Aspiration biopsy cytology in diagnosis of thyroid cancer, World J. Surg., 5: 61~73, 1981.
 - 12) 丸地信弘: 甲状腺に関する疫学的研究, 信州医誌, 16: 255~265, 1967.
 - 13) 長原 光・他: 超音波による甲状腺集団検診の成績, 山梨医学, 12: 34~39, 1984.
 - 14) Ramacciotti, C.E., et al.: Diagnostic accuracy and use of aspiration biopsy in the management of thyroid nodules, Arch. Intern. Med., 144: 1169~1173, 1984.
 - 15) 菅野晴夫: ヒト癌の自然史, 日病会誌, 69: 27~57, 1980.
 - 16) 高橋信二: 潜在性甲状腺癌の臨床病理学的研究, 日内分泌誌, 45: 65~79, 1968.
 - 17) 鳥屋城男: 甲状腺腫の穿刺吸引細胞診, 日臨細胞誌, 11: 101~114, 1972.
 - 18) 東 権広: 穿刺吸引細胞診による甲状腺腫瘍の診断, 日外会誌, 84: 612~622, 1983.
 - 19) 筒井一哉・他: 穿刺吸引細胞診による甲状腺癌の診断, 新潟医学会雑誌, 97: 197, 1983.
 - 20) 露口 勝・他: 甲状腺癌の集団検診—5年間の成績—, 日癌治, 18: 314, 1983.
-