症 例

乳腺原発腺様嚢胞癌の1例

千葉市立海浜病院検査科病理¹⁾, 同 外科²⁾, 帝京大学市原病院病理³⁾
 西野 武夫¹⁾ 高橋 年美¹⁾ 鍋嶋 誠也²⁾ 太枝 良夫²⁾
 磯野 敏夫²⁾ 菅野 勇³⁾ 長尾 孝一³⁾

乳腺原発の腺様嚢胞癌の1例を経験し、その細胞像と組織像について検討した。症例は45歳女性、左上外側に長径14.2 mmの腫瘤を認めた。Papanicolaou染色では球状、シート状の細胞集塊の内部に特徴的な透明状の粘液様球状物を認め、Giemsa染色では赤紫色を示した。細胞は小型、裸核状で、核の大小不同は少なかった。核クロマチンは中等度増量、細顆粒状で、核小体は小さく1~2個認められた。組織学的には、小型の腫瘍細胞が胞巣状、索状に増殖し、各胞巣は粘液様物質を内容とする真の腺腔と偽嚢胞腔を伴い篩状構造を呈していた。真の腺腔を構成している上皮細胞は、CEA, EMA, keratin陽性で、電顕的には微絨毛が認められ、その腺腔内容物はPAS陽性であった。一方の偽嚢胞腔を構成している上皮細胞はVimentin陽性で、偽嚢胞内容物は全てアルシアン青陽性で、部分的にはPAS陽性も認められた。またGiemsa染色で赤紫色、トルイジン青染色では紫紅色のメタクロマジーを示した。電顕的には少数の上皮細胞に筋上皮様分化を認め、内腔には基底膜様物質、未熟膠原線維を確認できた。

Key words : Breast—Adenoid cystic carcinoma—Cytology—Immunohistochemistry
 —Case report

I. はじめに

乳腺の腺様嚢胞癌はきわめてまれな腫瘍で、その発生頻度は1%以下とされている。その予後は、好発する唾液腺や気管支腺などのものより良好であると報告されている。今回われわれは、典型的組織像を呈した

1症例を経験し、腫瘍細胞が構成する篩状構造中の2種類の腔と、内容物の関連性につき免疫組織化学、電顕的に検討したのでその細胞像と若干の文献的考察を加えて報告する。

II. 症 例

患 者：45歳、女性

主 訴：左乳房腫瘤

家族歴、既往歴：特記事項なし

現病歴：平成2年2月ごろより、しこりに気づいていたが放置し、同年7月に圧痛出現。平成3年1月に当院外科を受診。超音波検査にて左上外側に長径14.2 mmの腫瘤が認められ、穿刺吸引細胞診で腺様嚢胞癌と診断された。同年2月に、1/4切除と腋窩郭清による乳房温存法が施行され、現在経過観察中である。ちなみにリンパ節に転移は認めなかった。

Adenoid cystic carcinoma of the breast : a case report
 Takeo NISHINO¹⁾, C.T., J.S.C., Toshimi TAKAHASHI¹⁾, C.T., I.A.C., Seiya NABESHIMA²⁾, M.D., Yoshio OOEDA²⁾, M.D., Toshio ISONO²⁾, M.D., Isamu SUGANO³⁾, M.D., Koichi NAGAO³⁾, M.D.

¹⁾Department of Pathology, Clinical Laboratory, ²⁾Department of Surgery, Chiba Municipal Kaihin Hospital

³⁾Department of Surgical Pathology, Teikyo University School of Medicine, Ichihara Hospital

論文別刷請求先：〒261 千葉市美浜区磯部3の31の1 千葉市立海浜病院臨床検査科病理 西野武夫

平成5年5月11日受付

平成5年9月3日受理

III. 材料と方法

細胞診標本作製には、外科受診時の穿刺吸引検体で Pap. 染色と Giemsa 染色を行い、摘出腫瘍捺印検体で Pap. 染色と Giemsa 染色および Alcian blue (Al・b) 染色、PAS 染色を行った。組織標本は摘出腫瘍から 10% Buffer ホルマリン固定、パラフィン切片を作製し、H-E 染色と Giemsa 染色、トルイジン青染色を行った。免疫組織化学的検索のために ABC 法で、CEA, EMA, keratin, actin, S-100, Vimentin 染色を行った。さらに、EMA と Vimentin のそれぞれの染色後標本に、通常の Al・b-PAS 二重染色を行った。電顕の試料は摘出腫瘍部分から通常のグルタール固定、エポン包埋により作製した。

IV. 結 果

1. 細胞所見

穿刺吸引細胞像では、Pap. 染色において腫瘍細胞は、球状、腺管状、シート状など比較的结合性を有する細胞集塊として多数採取されていた。細胞集塊の内部には透明な粘液球様物が認められ（写真3）、その辺縁に腫瘍細胞が取り囲むようにして認められるものもあった。細胞は小型、裸核状で、核の大小不同性は少なかった。核クロマチンは中等度増量、細顆粒状で核膜は薄く、核小体は小さく1~2個認められた（写真4）。Giemsa 染色では、粘液球様物は赤紫色に染色された（写真5）。摘出腫瘍捺印細胞像は、術前の

穿刺吸引細胞像と同一の所見であった。またこの摘出腫瘍捺印標本の Al・b 染色と PAS 染色では、Al・b 染色は細胞集塊のとくに辺縁に沿って染色された。一方の PAS 染色は、細胞集塊内部の粘液球様物が赤色に染色された。

2. 肉眼および組織所見

肉眼的には $1.3 \times 1.0 \times 1.0$ cm の腫瘤で、断面は黄白色で境界はやや不明瞭であった（写真1）。

組織像は、H-E 染色において小型で比較的異型の乏しい腫瘍細胞が胞巣状、索状に増殖し、各胞巣内に大小の腺様囊胞がみられ、篩状構造を呈していた。囊胞内には淡青色ないし好酸性の粘液様物質がみとめられ、各胞巣はエオジン好性の結合織で囲まれている（写真2）。各染色結果は表1に示すように、偽囊胞腔内容物は Giemsa 染色で赤紫色に染色され、トルイジン青染色ではメタクロマジーを示した（写真6）。真の腺腔を構成している上皮細胞は CEA, EMA, keratin 陽性であった。一方の偽囊胞腔を構成している上皮細胞は Vimentin のみ陽性であった。actin はすべて陰性で S-100 は一部の腫瘍細胞に陽性であった。EMA-Al・b-PAS 三重染色は、EMA 染色陽性細胞の真の腺腔内容物は PAS 陽性であった（写真7）。Vimentin-Al・b-PAS 三重染色は、Vimentin 染色陽性細胞の偽囊胞腔内容物はすべて Al・b 陽性で、Al・b に混じって PAS 陽性の部分もあった（写真8）。

3. 電顕所見

真の腺腔を構成している腺管上皮において、微絨毛やデスモゾーム様接着装置が認められた。非腺管表層型細胞で構成されている偽囊胞上皮は少数の細胞に筋

表1 真の腺腔と偽囊胞腔の染色結果

染 色 名	真の腺腔		偽囊胞腔	
	上皮細胞	内容物	上皮細胞	内容物
Giemsa		無色		赤紫色
トルイジン青		青		メタクロマジー
CEA	+	+	—	—
EMA	+	+	—	—
Keratin	+	—	—	—
Vimentin	—	—	+	—
Actin	—	—	—	—
S-100	—	—	±	—
EMA-Al・b-PAS (三重染色)	EMA(+)	PAS(+)	EMA(—)	Al・b(+) & PAS(±)
Vimentin-Al・b-PAS (三重染色)	Vimentin(—)	PAS(+)	Vimentin(+)	Al・b(+) & PAS(±)

+: 陽性, ±: 部分的に陽性, —: 陰性

写真 9 電顕低倍像。粘液様物質を内容とする真の腺腔（矢印・大）と間質成分を内容とする偽嚢胞腔（矢印・小）が認められる

写真 10 電顕高倍像。真の腺腔には微絨毛（矢印・大），偽嚢胞腔には基底膜様物質（矢印・中）や未熟膠原線維（矢印・小）が認められる。Inset：ヘミデスマゾーム（矢頭）と筋原線維を伴う筋上皮細胞

原線維，ヘミデスマゾームがあり，筋上皮への分化がみられた。内腔は明瞭な基底膜に囲繞され，基底膜様物質，未熟膠原線維等が認められた（写真 9, 10）。

V. 考 察

腺様嚢胞癌は唾液腺，気管支，子宮，涙腺などに発

生し、予後の悪い腫瘍として知られている。一方乳癌に発生するものは非常にまれで、全乳癌に対する発生頻度は1%以下とされ¹⁾、原因不明であるが悪性度は低く予後はきわめて良好とされている。現在までに本邦での報告は10数例であるが、遠隔転移例は荒川ら²⁾の報告した1例のみで、また林ら³⁾は、8×10.5 cmの大きな腫瘍で、罹病期間が約20年も達していた症例において、リンパ節転移は認められなかったと報告している。以上のような報告を考慮して本症例には乳房温存手術が行われ、リンパ節に転移もなく現在経過観察中である。

肉眼的には、田中ら⁴⁾は、硬靱で薄い被膜によって完全に包埋され、線維腺腫を思わせるものとし、通常の乳癌とは異なると報告している。しかし本症例の腫瘍の性状は、淡い結節状で境界やや不明瞭の腫瘍であった。

穿刺吸引細胞像について Kline ら⁵⁾は、細胞は豊富で均一、多くは小さく孤立的で、いくつかの腺房に粘液球を伴い、細胞は卵形、直径は7~15 μm で少なくともリンパ球より大きく、核の不同性やクロマチン増加は中等度、核膜の不整や核小体は目立たないと述べている。また庵原ら⁶⁾はPap.染色よりもGiemsa染色のほうが粘液が赤紫色に染まり、本癌の診断に有用であると報告している。われわれの症例も通常の乳癌よりも細胞が小型で、核の異型性は軽度であり、特徴的な粘液球がGiemsa染色で円形な赤紫色に認められ、細胞診で腺様嚢胞癌の診断は可能であった。

本腫瘍は組織学的に、篩状の胞巣形成を特徴とし、導管型上皮細胞より成る真の腺腔と、筋上皮型細胞よりなる偽嚢胞腔があるといわれている⁷⁾。また一般的に組織像が類似している篩状乳頭腺管癌との鑑別が必要とされている。Anthony ら⁸⁾はbiphasic patternは本腫瘍の重要な診断基準の1つで、粘液組織化学的検索が有用であると述べている。本症例は、H-E染色だけでは真の腺腔と偽嚢胞腔の鑑別は不可能であったが、偽嚢胞腔内容物がGiemsa染色で赤紫色に、トルイジン青染色でメタクロマジーを示し、これらが真の腺腔のみで構成している篩状乳頭腺管癌との鑑別の一手段になると思われた。Lamovec ら⁹⁾は、6症例に対して免疫組織化学染色を行い、すべての症例においてCEA, EMA, keratin染色陽性の導管型細胞を証明したとしている。松山ら¹⁰⁾は、免疫組織化学的検索でCEA, EMAが真の腺管に局在し、偽嚢胞と充実性増殖を主体とする細胞はVimentin陽性を呈するとし、

またCEA-Al・b二重染色やVimentin-Al・b二重染色などを行い、偽嚢胞はAl・bのみ陽性と報告している。今回われわれは、EMA-Al・b-PASおよびVimentin-Al・b-PAS三重染色を行い、EMA陽性を示した導管型上皮細胞で構成している腺腔側は粘液で、PAS染色陽性であるということ、一方のVimentin陽性を示した筋上皮型細胞で構成している偽嚢胞腔側は偽粘膜(間質成分)で、Al・bのみ陽性と、Al・bに混じってPAS陽性の部分があるということが確認できた。また細胞診の診断に重要なギムザ染色での赤紫色の粘液球様物は、偽嚢胞腔側の間質成分であることが示唆された。

本腫瘍の発生について、Anthony ら⁸⁾は、蛍光抗体法にて腫瘍細胞内にactomyosinが証明されたとし、そのほとんどは筋上皮細胞由来であるとしている。またKoss ら¹¹⁾は、電顕的にcytoplasmic fibrillの存在、腫瘍細胞と基底膜との間にhemidesmosomeの形成、pinocytotic vesicleを認め、この腫瘍に筋上皮細胞の関与があるとしている。本症例では、S-100陽性、actin陽性の典型的筋上皮細胞の増殖はないことから、筋上皮細胞起源という証拠は認められなかった。しかし本症例は未分化な細胞が主体ではあるが、偽嚢胞上皮の一部に筋原線維を保有し、S-100陽性の細胞を認めたので、筋上皮への分化を伴うことは示唆された。

ほかの臓器の腺様嚢胞癌に比べて予後のよい理由、組織発生など、不明な点が多く、今後さらに、症例の検討を重ねる必要があると思われた。

本論文の要旨は第30回日本臨床細胞学会秋期大会(東京)において発表した。

Summary

A case of adenoidcystic carcinoma of the breast, studied cytologically and histologically, is reported. A 45-year-old housewife noted a lump measuring 14.2 mm at the upper outer region of left breast. Cytologically, the tumor cells were shown to be in sheets and/or clumps accompanied by mucoid globules, red-purple in color on Giemsa staining. The nuclei of tumor cells were relatively small and unremarkable with fine granular chromatin which was slightly increased in amount. The nucleoli were small and few in number. Histologically, there were solid and trabecular tumor cell nests with the cribriform pattern admixing two

types of lumina, true glandular and pseudocystic. The lining epithelium of the former lumen was stained with CEA, EMA and Keratin and possessed microvilli ultrastructurally. The content of the lumen stained with PAS. On the other hand, the epithelium of the pseudocystic lumen stained only with vimentin. The lumen content stained mainly with alcian blue and focally with PAS, also being red-purple, as is compatible with metachromasia, in color with Giemsa and toluidin blue. Ultrastructurally, the lining epithelium showed myoepithelial differentiation in a few cells. The lumen contained a basal lamina like substance and immature collagen fibers.

文 献

- 1) Cavanzo, F.J., Taylor, H.B.: Adenoid cystic carcinoma of the breast: an analysis of 21 cases, *Cancer*, 24: 740~745, 1969.
- 2) 荒川正博, 磯村 正, 福久由光・他: 巨大な腫瘍を形成した乳腺腺様嚢胞癌の 1 例, *癌の臨床*, 25: 40~43, 1979.
- 3) 林 逸朗, 勝田弥三郎, 野村雍夫・他: 乳腺原発の腺様嚢胞癌の 1 例, *癌の臨床*, 29: 1012~1016, 1983.
- 4) 田中 聡, 目黒文明, 田口孝爾: 乳腺の腺様嚢胞癌 (adenoid cystic carcinoma) の 1 例, *外科診療*, 18: 151~155, 1976.
- 5) Kline, T.S., Kline, I.K.: *Breast (Guides to Clinical Aspiratin Biopsy Series)*, pp 121~174, Igaku-Shoin, New York, Tokyo, 1989.
- 6) 庵原昭一・他: *穿刺吸引細胞診アトラス*. 第 1 版, p 116, 文光堂, 東京, 1984.
- 7) 森永正二郎: 唾液腺の解剖と腫瘍の組織発生, *病理と臨床*, 7: 545~559, 1989.
- 8) Anthony, P.P., James, P.D.: Adenoid cystic carcinoma of the breast: Prevalence, diagnostic criteria, and histogenesis, *J. Clin. Pathol.*, 28: 647~655, 1975.
- 9) Lamovec, J., Us-Krasovec, M., Zidar, A., et al: Adenoid cystic carcinoma of the breast: A histologic, cytologic, and immunohistochemical study, *Semin Diagn Pathol*, 6: 153~164, 1989.
- 10) 松山郁生, 丸山雄造, 土屋眞一: 乳腺原発腺様嚢胞癌 (adenoid cystic carcinoma) の 1 例 一特に粘液組織化学および免疫組織化学的検索を中心に, *乳癌の臨床*, 5: 541~548, 1990.
- 11) Koss, L.G., Brannan, C.D., Ashikari, R.: Histologic and Ultrastructural Features of Adenoid cystic carcinoma of the Breast, *Cancer*, 26: 1271~1279, 1970.

写真説明

- 写真 1 肉眼像. 腫瘍は境界やや不明瞭で, 顆粒状, 小結節癒合型を呈する
- 写真 2 組織像. 各腺巢内には, 大小の腺腔に粘液様物質が認められ, 篩状構造を示している (H-E 染色, $\times 10$)
- 写真 3 穿刺吸引細胞像. 細胞集塊の内部に, 透明な粘液様球状物質が認められる (Pap. 染色, $\times 10$)
- 写真 4 穿刺吸引細胞像. 腫瘍細胞は小型均一な類円形核で, クロマチンは細顆粒状, 核小体は 1~2 個で小さい (Pap. 染色, $\times 100$)
- 写真 5 穿刺吸引細胞像. Pap. 染色で認められた粘液様球状物は, 赤紫色に認められる (Giemsa 染色, $\times 20$)
- 写真 6 組織像. 左: 嚢胞腔内容物は赤紫色を呈する (Giemsa 染色, $\times 20$). 右: 嚢胞腔内容物は紫紅色に染色されメタクロマジーの所見である (トルイジン青染色, $\times 20$)
- 写真 7 免疫組織像. EMA 染色陽性の真腺腔内は, PAS 陽性である (EMA-Al・b-PAS 三重染色, $\times 40$)
- 写真 8 免疫組織像. Vimentin 染色陽性細胞の偽嚢胞腔内は, alcian blue 陽性で, PAS 陽性部分も認められる (Vimentin-Al・b-PAS 三重染色, $\times 40$)

写真 1

写真 2

写真 3

写真 4

写真 5

写真 6

写真 7

写真 8