原 著

甲状腺乳頭癌の分化度推定に關与する細胞学的特徴の検討

癌研究会附属病院細胞診断部¹⁾, 東京大学医学部病理学教室²⁾荒井 祐司¹⁾ 都竹 正文¹⁾ 坂本 穆彦²⁾

組織学的に確定診断の得られた甲状腺低分化型乳頭癌 13 症例と甲状腺高分化型乳頭癌 17 症例の穿刺吸引細胞診標本より両型の細胞像を比較し, 低分化型の細胞学的特徴を明らかにすることを目的として検討を行った。

低分化型の細胞学的特徴は, 1. 小集塊での出現が主で, 孤立散在傾向も認められる. 2. 集塊は, 細胞配列の乱れと重積性が強く, 一部には結合性の低下 (ほつれ) が認められる. 3. 核は高分化型より大型で楕円形が主体, 大小不同性が強い. 4. 同一標本上に, 高分化型の集塊の出現を認めることがある。

また, 正常および良性濾胞上皮細胞, 高分化型, 低分化型との核の形状の比較を行った結果, 核の大きさ, 大小不同性, 核形 (核の丸さ) において濾胞上皮と高分化型および低分化型の間に有意差が認められ (t-検定), 核の形態からも鑑別が可能であることが示唆された。

Key words: Thyroid — Aspiration cytology — Morphometry — Papillary carcinoma — Poorly differentiated carcinoma

I. はじめに

甲状腺乳頭癌における組織学的分化度分類は Sakamoto ら^{1,2)}, 河西ら³⁾によって提唱され, 今日ではその骨子は甲状腺癌取扱規約^{4,5)}に記載されるにいたっている. それに基づきこれまでに臨床的, 組織学的研究は報告されてきたが, 穿刺吸引細胞診においては, 分化度分類に関する細胞像の検討は十分には行われているとはいえない。

本研究では, 坂本らによる甲状腺低分化型乳頭癌 (以下低分化型) の細胞学的特徴とした細胞集塊の出現様式を中心に, 細胞診による分化度分類の試み⁶⁾をさらにおしすすめ, 集塊の構築や出現している細胞に注目し, それらの形態学的特徴を見出し, 細胞像による分化度分類の可能性を検討した。

II. 対象・方法

癌研究会附属病院にて 1981 年から 1995 年に生検または手術摘出材料で低分化型と組織診断された症例のうち, 術前の穿刺吸引細胞診で陽性と判定した症例の中から再検討可能であった 13 例を用いて, 細胞集塊の出現様式, 細胞の大きさ, 核所見, 特に核の形, 核内細胞質封入体および核の溝について観察を行い細胞学的特徴となる所見を検討した. 細胞集塊の出現様式は大集塊, 小集塊, 散在性にわけた. 大集塊は 100 個以上の細胞からなる集塊, 小集塊は 50 個以下の細胞より構成されている集塊とした. 散在性は孤立性細胞

A cytological study on grading of papillary carcinoma of the thyroid

Yuji ARAI¹⁾, C.T., I.A.C., Masafumi TSUZUKU¹⁾, C.T., C.F. I.A.C., Atsuhiko SAKAMOTO²⁾, M.D., F.I.A.C.

¹⁾Department of Cytology, Cancer Institute Hospital

²⁾Department of Pathology, Faculty of Medicine, University of Tokyo

論文別刷請求先 ☎ 170 東京都豊島区上池袋 1 の 37 の 1 癌研究会附属病院細胞診断部 荒井祐司

平成 8 年 10 月 11 日受付

平成 8 年 12 月 21 日受理

を示す。細胞の大きさは、大、中、小型に3分した。大型は正常濾胞上皮の2倍以上の大きさ、小型は濾胞上皮と同程度の大きさ、中型はこれらの中間の大きさの細胞とした。

対照として1992年から1995年に甲状腺高分化型乳頭癌（以下高分化型）と組織診断され、細胞診においても陽性と判定した17例を用いて、同様の観察を行い細胞像の違いを比較検討した。

また、正常および良性濾胞上皮細胞（以下濾胞上皮）3例、高分化型5例、低分化型6例をオリンパス・デジタル測微接眼装置 OSM-DC を用いて、核の大きさ（長径，短径）について1症例100個以上の核を計測し、その数値から核の大小不同性，形状（円～楕円形）についても定量的な観察を行った。これらの結果の検定には *t*-検定を用いた。

用いた細胞診標本はいずれも穿刺吸引法により得られたもので、パapanicow染色されたものである。

III. 結 果

低分化型および高分化型とされた各症例の出現細胞像を検討項目に分けて表1，2に示した。それらと観察時の核所見をもとに低分化型と高分化型の両細胞像の特徴と思われる所見を表3にまとめた。

低分化型の細胞集塊の出現様式の特徴は小集塊が主体であり，散在傾向であった。症例によっては大型集塊の出現も認められた。しかし，これら大型集塊も大きく二つに分けられ，一方は細胞配列に乱れが少なく核の重なりが弱くシート状に近い集塊であり，他方は細胞配列に乱れがあり集塊の内側に間質成分を伴わず

重積性が強く，辺縁に細胞のほつれなどが観察され結合性の弱い集塊として認められた。小集塊においてはほとんどが後者の所見であった。細胞の大きさは大型から小型まであり，N/C比は中等度が主体であるが軽度から高度と多彩であった。核形は楕円形が主体で円形や類円形のものも少数認められた。大小不同性は強く大きさにかなりのバラツキがみられた。クロマチンは粗顆粒状で核膜に付着してるものを多く認めた（写真1～4）。核内細胞質封入体は13例中7例（53.8%）に，核の溝は13例中10例（76.9%）に認められた。また，核内細胞質封入体あるいは核の溝のどちらかが認められたのは13例中11例（84.6%）であった。どちらも認められなかった2例（No. 6, 13）は，細胞集塊がほとんどなく孤立散在性に出現し，細胞は大小不同，N/C比の高いものから低いものまで多彩で異型が強く，未分化癌に近い細胞像であった⁵⁾。

高分化型の集塊所見は，大から小集塊での出現をみるがそれらの細胞配列に乱れは少なく核の重なりも弱くシート状のものが多かった。乳頭状においては集塊の内側に間質成分を伴っており辺縁に一層の細胞配列を認めた。細胞の大きさは全体に小型が主体でバラツキも少ない。N/Cは中等度が主体で，症例によっては一部に軽度から高度のものも認められた。核形は円形から類円形であった。大小不同性は弱く均一な感じであった。クロマチンは微細顆粒状で核膜への付着も少なく肥厚はみられなかった（写真5～8）。核内細胞質封入体は17例中13例（76.5%）に，核の溝は17例全例に認められた。

核の計測結果を表4に示した。核自体の大きさは濾胞上皮が最も小さく高分化型，低分化型の順で大き

表1 低分化型の細胞像

症例	細胞集塊の出現様式	細胞の大きさ	核の形	核内細胞質封入体	核の溝
1	小集塊>散在性	大	楕円形	—	+
2	大集塊+小集塊>散在性	中～小	円<楕円形	—	+
3	小集塊>散在性	中<小	楕円形	+	+
4	大集塊<小集塊+散在性	大<中>小	円<楕円形	+	+
5	小集塊>散在性	中	類円形	—	+
6	小集塊<散在性	大～中～小	類円<楕円形	—	—
7	大集塊+小集塊	中	円<類円形	+	+
8	大集塊<小集塊	大～中～小	類円<楕円形	+	+
9	散在性	中～小	楕円形	+	+
10	大集塊+小集塊+散在性	中～小	円<楕円形	+	+
11	小集塊+散在性	大<中～小	類円<楕円形	+	+
12	小集塊>散在性	大～中～小	円<楕円形	—	+
13	小集塊<散在性	大～中～小	円<楕円形	—	—

表 2 高分化型の細胞像

症例	細胞集塊の出現様式	細胞の大きさ	核の形	核内細胞質封入体	核の溝
1	小集塊+散在性	小	円形	+	+
2	大集塊<小集塊	小	円形	+	+
3	大集塊+小集塊	小	円形	+	+
4	大集塊<小集塊	小	円形	+	+
5	大集塊+小集塊+散在性	中<小	円~類円形	-	+
6	大集塊+小集塊+散在性	大<中<小	円形	+	+
7	大集塊+小集塊+散在性	中<小	円~類円形	+	+
8	小集塊	小	円形	-	+
9	小集塊+散在性	大<中<小	円<楕円形	+	+
10	小集塊	小	円<楕円形	+	+
11	小集塊+散在性	中<小	円形	+	+
12	大集塊+小集塊>散在性	中~小	円~類円形	-	+
13	小集塊	小	円~類円形	+	+
14	小集塊>散在性	中<小	円~類円形	-	+
15	小集塊	大<中<小	円~類円形	+	+
16	大集塊+小集塊>散在性	中<小	円~類円形	+	+
17	大集塊+小集塊>散在性	中~小	円~類円形	+	+

表 3 低分化型, 高分化型の細胞学的所見の比較

細胞学的所見	低分化型	高分化型
集塊	小集塊主体散在性あり	大~小集塊
配列	乱れ, 重積性強い	シート状, 乳頭状
辺縁	ぼつれあり	しっかりしている
細胞所見		
大きさ	大~小型	小型主体
N/C 比	中等度主体だが多彩	中等度主体
核所見		
形	楕円形 (~類円形)	円~類円形
大小不同性	高度	軽度
クロマチン	粗顆粒状不均等分布 核膜肥厚多	微細顆粒状 核膜肥厚少
核内細胞質封入体	7/13(53.8%)	13/17(76.5%)
核の溝	10/13(76.9%)	17/17(100%)

写真 1 低分化型の細胞集塊. 重積性の強い大型乳頭状集塊. 集塊内には間質成分はなく充実性で, 辺縁には小集塊状のぼつれを認める (Pap. 染色, 対物×20)

い, 低分化型では短径, 長径ともに SD 値が高分化型に比べ 2 倍程度となっている. 大小のバラツキが高度であった. 短径/長径比 (核の丸さ) においては濾胞上皮が一番円形に近い値を示しており次に高分化型, 低分化型の順で楕円形に近かった. これら計測値を SPSS 統計パッケージを用いて統計学的処理を行った結果, 濾胞上皮と高分化型の短径に関してのみ有意差は認められなかった ($P=0.075$) が, その他の間にはいずれも有意の差を認めた ($P<0.01$).

IV. 考 察

低分化型甲状腺癌は, 構築においては乳頭状, 濾胞

状構造の一部または多くの部分に充実性, 索状構造が認められ, かつ未分化癌ほどの強い細胞異型を示さない^{5,6)}, と組織学的に定義されている. 穿刺吸引細胞診においては, 乳頭癌特有の細胞像として乳頭状集塊, 核内細胞質封入体, 核の溝, スリガラス様核, 砂粒小体などがあげられており^{7,8)}, またその他の手法も試みられている⁹⁻¹¹⁾. しかしながら, これらの所見のみでは分化度分類を行うのは不十分かつ困難であると考えられる.

計器による計測においては, 細胞の異型性を中心に鑑別点を求めたが, 結果として核の大きさ, 大小不同性, 核形 (丸み) が低分化型, 高分化型, 濾胞上皮に

写真 2 写真 1 の強拡大。重積性が強く細胞配列の乱れた小乳頭状集塊。N/C 比は中等度だが、核形不整、クロマチン顆粒状粗で核膜に付着している、核内細胞質封入体を認める (Pap. 染色、対物×100)

写真 4 写真 3 の強拡大。著しい核の大小不同性、核形は類円形から楕円形で軽度の不整がみられる、クロマチン粗で核縁は不規則に肥厚している。結合性が弱く細胞間に間隙を認める (Pap. 染色、対物×100)

において有意差がありこれらが鑑別点となりうることを示唆された。低分化型の同一細胞診標本上にある大小の集塊であっても集塊によって構成している細胞の形態に違いがある。これは、穿刺吸引法では腫瘍内のそれぞれの部分すなわち乳頭状や濾胞構造の高分化な部分と充実性や索状構造の低分化な部分が混在して採取されるためと考えられる。このことは低分化型の細胞診標本上には高分化型の細胞集塊も出現することが十分にあることを示している。

核内細胞質封入体の出現頻度は、乳頭癌では 70% 以上とされている^{12,13)}ことから考えると、今回の低分化型における出現頻度は 53.8% と低く、この結果においてもほとんど出現しないとされている未分化癌と

写真 3 低分化型の細胞集塊。平面的だが結合性の弱い大型シート状集塊 (Pap. 染色、対物×20)

写真 5 高分化型の細胞集塊。平面的で重積性に乏しく結合性のしっかりした大型シート状集塊。写真中央部は集塊の折れ曲がりによる重なりである (Pap. 染色、対物×20)

高分化型との中間的性質を示している。本研究では、低分化型にのみ特有に出現する細胞所見を見出すには至らなかったが、高分化型や濾胞上皮との所見を対比させた結果、以下のような傾向が明らかにされた。

1. 小集塊での出現が主で、孤立散在傾向も認められる。
2. 集塊は、細胞配列の乱れと重積性が強く、一部には結合性の低下 (ほつれ) が認められる。
3. 核は高分化型より大型で楕円形が主体、大小不同性が強い。
4. 同一標本上に、高分化型の集塊の出現を認めることがある。

以上の検討結果は、細胞診で甲状腺低分化型乳頭癌を推定しうることを示唆している。

写真6 写真5の強拡大。軽度の核の大小不同性、クロマチン微細顆粒状増量、核縁の肥厚はあまりない。核形は円形主体、核間距離に乱れが少なく、重積性も弱い。核の溝を認める (Pap.染色, 対物×100)

写真8 写真7の強拡大。クロマチン微細顆粒状で偏在性の核を有する細胞が一層性で、内側に間質成分を伴った乳頭状の集塊 (Pap.染色, 対物×100)

写真7 高分化型の乳頭状集塊。集塊辺縁の細胞質のしっかりした乳頭状集塊。核密度は高いが重積性は軽度である (Pap.染色, 対物×40)

表4 デジタル測微接眼装置 OSM-DC による核計測結果 (mean±SD)

組織型	核の短径(μm)	核の長径(μm)	短径/長径比
低分化型 (n=6)	7.26±1.51	9.50±1.80	0.77±0.11
高分化型 (n=5)	6.27±0.77	7.75±0.87	0.81±0.09
濾胞上皮 (n=3)	5.74±0.66	6.43±0.68	0.89±0.06

(* : $p < 0.01$), (‡ : $p < 0.01$)

sis as to nuclear size, shape and anisokaryosis. The findings obtained in this study are possible indicators for making a diagnosis of poorly differentiated papillary carcinoma of the thyroid on routine cytological examination.

文 献

- 1) Sakamoto, A., Kasai, N., Sugano, H. Poorly differentiated carcinoma of the thyroid. A clinicopathologic entity for a high-risk group of papillary and follicular carcinomas. Cancer, 1983; 52: 1849~1855.
- 2) 坂本穆彦. 甲状腺における組織学的分化度の臨床的意義. 病理と臨床, 1988; 6: 761~764.
- 3) 河西信勝, 坂本穆彦, 小川申一郎, 内田正興. 甲状腺低分化型の臨床. 癌の臨床, 1981; 27: 20~25.
- 4) 甲状腺外科検討会. 外科・病理甲状腺癌取り扱い規約, 第4版, 東京: 金原出版, 1991.
- 5) 甲状腺外科検討会. 甲状腺癌取り扱い規約, 第5版, 東京: 金原出版, 1996.
- 6) 坂本穆彦, 池永素子, 都竹正文, 平田守男, 原島三郎, 河西信勝. 甲状腺低分化癌 poorly differentiated car-

Summary

To clarify the grading of thyroid carcinoma on cytology, 13 poorly differentiated and 17 well differentiated papillary carcinomas were investigated in the present study.

Cytological characteristics of poorly differentiated carcinoma were as follows; 1) Presence of small clusters and dispersed cancer cells. 2) Clusters showing a piled-up irregular cell arrangement, and forming loose arrangements in some areas. 3) Large elliptic nuclei as compared to well-differentiated types of cancer. Prominent anisokaryosis. 4) Occasional admixture of well differentiated carcinoma components.

These results were confirmed by morphometrical analy-

- cinoma の細胞学的特徴. 日臨細胞誌, 1986 ; 25 : 993~996.
- 7) 坂本穆彦. 甲状腺穿刺吸引細胞診の現状と問題点. 日臨細胞誌 1993 ; 32 : 1079~1085.
- 8) 坂本穆彦. 甲状腺穿刺細胞診. 笹野伸昭編, 東京: 医歯薬出版, 1994 : 165~177.
- 9) Tung, C.C., Chang, T.C., Hsieh, H.C. Value of immunoperoxidase staining of thyroglobulin in fine needle aspiration cytology of thyroid diseases. *Acta Cytol*, 1995 ; 39 : 396~401.
- 10) Francis, I.M., Das, D.K., She : kh, Z.A., Sharma, P.N., Gupta, S.K. Role of nuclear groove in the diagnosis of papillary thyroid carcinoma, A quantitative assessment on fine needle aspiration smears. *Acta Cytol* 1995 ; 39 : 409~415.
- 11) Kaneko, C., Sakamoto, M., Niimi, H., Osaka, A., Shimizu, M., Shinzato, M. Studies on intranuclear inclusions and nuclear grooves in papillary thyroid cancer by light, scanning electron and transmission electron microscopy. *Acta Cytol*, 1996 ; 40 : 417~422.
- 12) 花輪孝雄, 庵原昭一, 堀中悦夫. 甲状腺疾患における核の封入体の臨床細胞学的検討. 日臨細胞誌, 1979 ; 18 : 302~311.
- 13) 加藤良平. 取扱い規約に沿った腫瘍鑑別診断アトラス「甲状腺」. 坂本穆彦編者, 東京: 文光堂, 1991 : 21~53.
-