迷路骨化例に対する人工内耳手術の問題点

— 術後性真珠腫を生じた一症例 —

東 野 哲 也

要旨：蝸牛骨化は人工内耳手術における開窓手技や電極挿入を困難にする病態として最も頻度が高い。髄膜炎後の蝸牛骨化症例に対し人工内耳手術を行った成人症例を呈示し、術側選択、手術手技、合併症として生じた真珠種に対する対応などの問題点について論じた。人工内耳に、より適した術側を決定するためには電気聴覚検査とCT・MRIによる内耳画像評価が不可欠で、特に3次元MRIは開窓可能な外リンパ腔を描出する上で重要な役割を演じた。また、人工内耳術後に生じた真珠種に対して電極を保存して一期的摘出を行ったが、安定した中耳腔を確保する上で外耳道閉鎖と有茎側頭筋膜弁による補強が有用であった。

キーワード：蝸牛骨化、3次元MRI、人工内耳合併症、術後性真珠種、有茎側頭筋膜弁

Summary Problems in cochlear implantation in an ossified cochlea: Report of a case with postoperative cholesteatoma:

Tetsuya Tono. Department of Otolaryngology, Miyazaki Medical College

Cochlear implantation surgery in ossified cochlea is a challenge for otologist. The purpose of this paper is to present our therapeutic strategy for an adult patient with cochlear ossification who developed cholesteatoma one year after implantation. Three dimensional MRI study showing a surgically accessible perilymphatic space in the ascending segment of the cochlear basal turn played a significant role in the preoperative planning. Postoperative cholesteatoma was successfully removed with preservation of the implant. A vascularized temporalis fascia flap covering the electrode in a mastoidectomy cavity and the closed external canal skin seemed to be useful to create a stable middle ear cavity.

Key words: Ossified cochlea, three-dimensional MRI, cochlear implantation, postoperative cholesteatoma, vascularized temporalis fascia flap

はじめに

近年の人工内耳医療の進歩は目覚ましく、少なくとも言語習得後失聴例に対する聴覚リハビリテーションの手段としては確固たる治療法となった。最近では従来禁忌とされてきた中耳炎や迷路骨

包病変を伴う例に対しても適応が拡大され、術側や術式の判断に苦慮する症例も増加しつつある。

人工内耳手術における蝸牛開窓や電極挿入を困難にする病態として骨迷路や迷路骨包の病変が挙げられる。1991年～2000年に当科で経験した人工内耳成人例115症例のうち後天性骨包病変を伴った例は11耳で、病態の内訳は迷路骨化4耳、迷

路硬化症 2 耳，内耳梅毒 2 耳，迷路骨折 1 耳，聴神経腫瘍術後 2 耳であった。本稿では迷路骨化症例の一例を呈示し，術側選択や手術手技の実際，及び特異的な術後合併症への対応について問題点を論じたい。

症例呈示

症例：58 歳女性。

病歴：生後の言語発達は良かったが，5 歳時髄膜炎罹患後より両側高度難聴となった。補聴器の効果は全く得られず，会話には筆談と手話を用いている。本人と同居家族が人工内耳の強い希望を持って受診した。

耳科検査所見：両鼓膜に病的所見はなく，両耳とも純音聴力検査は scale out，温度眼振検査も無反応であった。単音節正答率は読話で 14%，補聴器装用で左右ともに 8% と補聴器装用効果は全く認められなかった。電気聴覚検査では，針電極

を用いた岬角刺激，鼓膜電極を用いた鼓膜刺激ともに右耳では音感が得られたが左耳は陰性であった。この結果は，日を変えて再検査しても同じであった。

CT 所見（図 1）：両耳とも乳突蜂巣，耳管周囲蜂巣の発育は良好で中耳に異常軟部陰影は認めなかった。右内耳は骨化により蝸牛基底回転と全ての半規管の描出が認められない。左内耳は半規管に部分的な狭窄所見を認めるが蝸牛の描出は正常である。

MRI 所見（図 2）：TOSHIBA 社製 VISART 1.5T を使用し，Fast Asymmetric Spin Echo 法（TR：5000；TE250；スライス厚：1 mm；スライス間隔：0.5mm）により得られた内耳画像データを 3 次元再構成した像を示す。左耳においては半規管の部分的信号欠損を認めるが，蝸牛の形態は保たれている。これに対し右耳では全ての半規管の描出がなく，蝸牛基底回転の inferior seg-

図 1 術前軸位 CT 像（1 mm スライス）。A，B：右耳。基底回転の骨化が顕著であるが上方回転の描出は良い。前庭内にも異常石灰化を認め，外側半規管や後半規管が描出されていない。C，D：左耳。外側半規管と後半規管に狭窄所見を認めるが前庭，蝸牛の描出は正常である。

図 2 内耳 3 次元 MRI 像。左耳においては半規管の部分的信号欠損を認めるが、蝸牛の形態は保たれている。is=inferior segment; as=ascending segment。右耳では全ての半規管の描出がない。蝸牛は基底回転 inferior segment からの信号がないが ascending segment より上方回転の描出は良好である。骨化した inferior segment を削開すれば蝸牛軸を損傷することなく ascending segment の開窓が可能なが示される (矢印)。

ment の信号欠損が認められる。

適応判定：本例は言語習得期失聴 (perilingual deafness) であるため、人工内耳の適応は症例に応じて検討する必要がある。本例では同居する家族の熱意が強く、聴覚リハビリには良好な家庭環境にあったので、人工内耳の適応と判断した。しかし、電気聴覚が右耳のみ陽性で、この右耳に蝸牛の骨化を認めたため厳しい術側判定となった。CT 所見からは右蝸牛の骨化が基底回転の inferior segment に局限していること、ascending segment には外リンパ液を示す MRI 信号が認められること、蝸牛基底部を直線状に削開すれば蝸牛軸を損傷することなく外リンパ腔に到達可能であることより右耳を選択した。

手術所見：1998 年 11 月 4 日、右耳への Nucleus22 人工内耳植込み術を施行した。耳介付着部上縁から後方に弧状切開を加え、乳突削開及びレシーバーベッドの作成を行った。posterior tympanotomy のみでは岬角前方への視野が不十分であったため、キヌタ骨を摘出し骨部外耳道後壁を板状に除去した。ダイヤモンドバーを用いて蝸牛窓窩前縁から溝状に岬角壁の削開を始め、頂側に向かってトンネル状に骨削開を進めた。inferior segment 基底部では蝸牛骨包の骨と鼓室階の化骨組織とを識別することができなかったが、ascending segment に近づくにつれ、白く脆い骨

組織が識別可能となり、外リンパ液が滲む所見が観察された。この骨組織を鋭匙で除去していくと外リンパ腔に到達した。これにより ascending segment 内への約 17 電極の挿入が可能となった (図 3)。開窓部トンネル内の電極は内側 (蝸牛軸方向) に押しつけるように筋膜片とフィブリン糊で固定した。レシーバーを通常通り固定した後、除去した外耳道後壁骨片を戻して骨パテで修復した。

術後経過：術後経過は順調で、2 週間後の音入力で 16 チャンネルを利用したプログラミングが可能であった。言語習得期失聴という条件のためオープンセットでの評価は困難であったが、数カ月の経過で読話能力の改善が確認された。

1999 年 12 月に右耳の掻痒感を訴えたため検査したところ、右鼓膜緊張部の後上象限が陥凹し肉芽を伴った真珠腫形成が認められた。鼓膜陥凹部は岬角壁と癒着し、電極の輪郭が認められた。CT 所見 (図 4) では上鼓室～乳突洞を占拠する軟部陰影を認めたが、前鼓室、耳管周囲蜂巣の含気は保たれていた。真珠腫摘出の必要性を説明し、可能な限り人工内耳電極を保存することで再手術の同意が得られた。

再手術所見：側頭筋膜を栄養する浅側頭動脈の分枝 (中側頭動脈) をドップラー血流計で確認しながら耳内切開を行い、これを耳介後上方に延長

図 3 断層 X 線像。ascending segment 内に挿入された電極を示す (矢印)。

図 4 人工内耳術後軸位 CT 像 (右耳)。A: ツチ骨 (m) 後方に鼓膜の陥凹 (矢印) を認め、削開乳突腔は真珠腫による軟部陰影 (*) で占拠されている。B: 再建した外耳道後壁直下の皮膚に電極が接している (矢印)。矢頭=電極及びレシーバー。

した。外耳道後方に固定したレシーバーを露出しないように外耳道上壁を削開して上鼓室～乳突洞を開放した。前回の手術で岬角壁削開部に電極を固定するために充填した筋膜片と鼓膜後上部が癒着し、電極を巻き込みながら上鼓室～乳突洞に進展した真珠腫が認められた。いわゆる「後上部型真珠腫」の病態であったが、耳管～鼓室前方の粘膜は良好であった。結合織で覆われた電極に極力侵襲を与えないよう真珠腫母膜と肉芽組織を摘出し、癒着鼓膜は外耳道深部の皮膚とともに剥離除去した。中側頭動脈を含む有茎側頭筋膜弁を作成し、翻転した筋膜弁で電極や削開乳突腔を覆い、下縁は縫合閉鎖した外耳道皮膚を裏打ちして縫合した。

再手術後経過：再手術前後での使用可能電極数及び T/C レベルは不変で、自覚的な人工内耳効果にも変化はなかった。1 年後には軟骨部レベルで閉鎖した外耳道の内側には広い含気腔が形成されており、真珠腫遺残を疑わせる軟部陰影は認められていない (図 5)。1 年半経過した現在も、人工内耳を終日装用して生活している。

考 察

1. 骨化例に対する人工内耳の適応と術側選択について

従来禁忌とされていた蝸牛骨化例に対しても積極的に人工内耳手術が行われるようになった背景には、1) 小児人工内耳例の増加により骨化症例

図5 再手術後軸位CT像(右耳)。A: 上鼓室～乳突腔は再含気化し、真珠腫遺残を疑わせる軟部陰影は認められない。B: 軟骨部レベルで閉鎖した外耳道の内側には広い含気腔が形成されており、電極周囲に異常軟部陰影を認めない。矢頭=電極及びレシーバー。

の頻度が増えたこと、2) 骨化例の側頭骨標本において十分な数のらせん神経節細胞生存が確認されること¹⁾、3) 部分的な電極挿入例においても人工内耳の有効性が報告されたこと²⁻⁴⁾、4) CTやMRIの進歩により閉塞病変の正確な範囲が術前に評価可能となったこと、等が挙げられる。しかし、骨化の原因として最も多い髄膜炎や内耳炎では残存らせん神経節細胞の数が他の難聴病態より有意に少ないとされており^{5,6)}、人工内耳には不利な病態であることにはかわりない。骨化の範囲が広いほど残存らせん神経節細胞が少ない傾向にある⁷⁾上に、電極の挿入深度も制限される。また蝸牛神経への刺激効率も悪い可能性が高い。したがって術後成績が芳しくない場合を想定して、インフォームドコンセントを得るべきと考える。このような条件では術側の選択が極めて重要な意味

を持つので、電気聴覚検査による蝸牛神経機能とCT、MRIによる閉塞病変程度の左右差を慎重に比較する必要がある。

呈示症例では電気聴覚が陽性の右耳に蝸牛の骨化を認め、逆に蝸牛閉塞のない左耳の電気聴覚が陰性であったことから、厳しい術側選択を迫られた。電気聴覚検査は定量性はないとしても、当科での300耳以上の電気聴覚検査で音感覚が全く得られない「陰性耳」は聴神経腫瘍やその術後例等の特殊な症例に限られ、全て人工内耳非適応と判定してきた。左耳において電気刺激の部位に関わらず「陰性」であったことから、らせん神経節細胞障害が相当に高度であることが示唆された。したがって、左耳への人工内耳手術に患者の同意を得ることは難しいと考えた。反対に、機能的に良好な右耳を選択すれば、開窓手技に困難を伴うことは明らかであり、術者にとっては厳しい選択となった。しかし、骨化が基底回転のinferior segmentに局限しており、ascending segment開窓の見込みが画像所見で示されたことは、患者や家族への説明に重要な役割を果たした。スライス厚1mm以内のCT及び水を強調した三次元MRIによる内耳の描出は人工内耳術前プランニングに不可欠な検査と言える。

2. 骨化例に対する手術法について

Balkanyら⁸⁾は人工内耳手術の立場から骨化の程度を1) 蝸牛窓閉塞、2) inferior segment閉塞、3) upper segment閉塞に分類しているが、呈示症例は2)に分類される。

inferior segment閉塞はこれらの3分類のなかで最も頻度が高いが、骨化の範囲は蝸牛窓から2~3mm程度のものからascending segment移行部に至るものまで種々の程度がある。当科で人工内耳手術を経験した骨化症例4耳中3耳は数mm以内の閉塞であり開窓も比較的容易であった。呈示症例はこの分類の中で最も閉塞範囲が広い例であるが、ascending segmentに開窓可能な外リンパ腔が存在することの意味は大きい。非閉塞蝸牛と同等の電極挿入深度が達成できる可能性が高いし、電極束がascending segmentに入ることによってNucleus人工内耳(22チャンネル)の15チャンネル以上の挿入深度が確保されるからである。

本例におけるascending segmentの開窓作業に

はかなりの骨削開が必要であった。迷路骨包と異なる白く脆い化骨組織を探索したが、本例の場合には ascending segment の直前まで識別不可能で、鼓室階の良い指標にはならなかった。posterior tympanotomy のみの視野では削開方向の確認が難しく、外耳道後壁除去により術野を確保した。もし、術前プランニングで inferior segment の骨化部位を直線的に削開することで蝸牛軸を損傷することなく ascending segment の外リンパ腔に到達できる見込みがなければ、開窓作業を途中で断念する可能性もあらうと思われた。

upper segment 閉塞例では基底回転鼓室階に開窓の目標となる外リンパ腔が存在しないので、前庭階や第二回転に開窓部位を探る⁹⁾が、電極挿入に十分な腔が確保できない例の方が多いと予想される。その場合、削開による 7~8 mm のトンネル内に電極先端のみ挿入する inferior segment tunnel insertion に留めるか、蝸牛軸周囲に溝を作成して全活性電極を留置する radical cochleosotomy insertion を試みるかの選択が必要となる⁸⁾。前者ではせいぜい 10 チャンネルの挿入が目標となるが、後者の手術法で懸念されるらせん神経節細胞への侵襲は避けられるであろう。この程度の電極深度でも 20 チャンネル以上挿入した例と大差ない人工内耳成績が得られたとする報告もみられる¹⁰⁾。しかし、基底回転基底部のみの神経刺激で言語認知に必要な情報を処理することは厳しいと考えるのが常識的と思われる。現在、残存するらせん神経節細胞をより有効に刺激するための方策が、術式の側面¹¹⁾からも、電極形状の側面¹²⁻¹⁴⁾からも改良が進められており、症例に応じた使い分けが今後の課題となるであろう。

3. 術後合併症としての真珠腫とその対応について

中耳炎は特に小児人工内耳症例において時に問題となる合併症であるが、真珠腫形成例の報告は稀である¹⁵⁾。本例における真珠腫形成の機序には、1) 前方に拡大した岬角削開部を覆うために用いた結合組織片と鼓膜が癒着したこと、2) 術野確保のために一旦除去した外耳道後壁骨の再建が不適切であったため電極が外耳道後壁皮膚に直接接したこと、等が挙げられる。したがって、1) 岬角壁を広範に削開して結合組織を充填する場合には

鼓膜の浅在化等の癒着防止策を講じること、2) 外耳道後壁は努めて温存し、やむを得ず削除した場合には間隙が生じないように後壁再建をすること、の重要性が再認識された。本例のように岬角前方の視野が必要な例には、鼓膜挙上により経外耳道の術野を併用して対応することも可能と思われる。

人工内耳術後の真珠腫に対しては、1) implant を保存したまま真珠腫を摘出する、2) 電極を一時的に抜去して真珠腫摘出後一期的に再挿入する、3) implant を抜去して真珠腫摘出後数カ月して二期的に同側への再埋込みを行う、4) implant 抜去して対側に埋め込む、等の対応が想定できる。本例のように対側の電気聴覚が陰性で人工内耳の効果が期待できない場合には 4) の選択は適切ではない。また、安定した人工内耳効果が得られている電極を一時的にでも抜去することにも抵抗がある。結局、本例では真珠腫の遺残と再発の可能性について説明した上で、できる限り 1) で対応することで再手術の同意が得られた。

再手術の工夫点としては、1) レシーバーや電極起始部を露出しないですむように耳内切開を延長した皮切を施したこと、2) 真珠腫遺残を防ぐため外耳道削除して術操作を行ったこと、3) 電極の露出や真珠腫再発を防ぐため外耳道閉鎖と有茎側頭筋膜弁による補強を加えたこと、等が挙げられる。有茎側頭筋膜弁は中耳根治術後例への人工内耳埋込み¹⁵⁾や術後皮弁壊死による implant 露出部の修復¹⁶⁾に利用された報告があるが、真珠腫などの中耳炎病巣を制御する上でも有用な方法であることが確認された。

本報告は第 11 回日本頭頸部外科学会学術講演会（横浜）、シンポジウム 1「人工内耳手術の問題点」（担当：迷路骨包病変）で発表した内容の一部である。貴重なコメントを頂いた司会の伊藤寿一教授に謝意を表します。

文 献

- 1) Hinojosa R, Green JD, Marion MS: Ganglion cell populations in labyrinthitis ossificans. *Am J Otol* 12: 3-7, 1991. 1989.
- 2) Kemink JL, Zimmerman-Phillips S, Kileny PR et al: Auditory performance of children with cochlear ossification and partial implant insertion. *Laryngoscope* 102: 1001-

- 1005, 1992.
- 3) Cohen NC, Waltzman SB: Partial insertion of the Nucleus multichannel cochlear implant: technique and results. *Am J Otol* 14 : 357-361, 1993.
- 4) Hartrampf R, Dahm MC, Battmer RD et al: Insertion depth of the Nucleus electrode array and relative performance. *Ann Otol Rhinol Laryngol* (Suppl) 166 : 277-280, 1995.
- 5) Otte J, Schuknecht HF, Kerr AG: Ganglion cell populations in normal and pathological human cochleae. implications for cochlear implication. *Laryngoscope* 88 : 1231-1246, 1978.
- 6) Nadol JB, Young Y, Glynn RJ: Survival of spiral ganglion cells in profound sensorineural hearing loss: Implication for cochlear implantation. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 98 : 411-416,
- 7) Lu CB, Schuknecht HF: Pathology of prelingual profound deafness: Magnitude of labyrinthitis fibro-ossificans. *Am J Otol* 15 : 74-85, 1994.
- 8) Balkany T, Ganz BJ, Steenerson RL et al: Systematic approach to electrode insertion in the ossified cochlea. *Otolaryngol Head Neck Surg* 114 : 4-11, 1996.
- 9) 久保 武, 井脇貴子: 化骨例への人工内耳埋め込み術, 耳鼻咽喉科診療プラクティス 2 : 聴覚の獲得 (久保 武編), 134-137, 2000.
- 10) Kileny PR, Zimmerman-Phillips S, Zwolan TA et al: Effects of channel number and place of stimulation on performance with the Cochlear Corporation multichannel implant. *Am J Otol* 13 : 117-123, 1992.
- 11) Colletti V, Fiorino FG, Carner M et al: Basal turn cochleostomy via the middle fossa route for cochlear implant insertion. *Am J Otol* 19 : 778-784, 1998.
- 12) Lenarz T, Battmer RD, Lesinski A et al: Nucleus double electrode array: a new approach for ossified cochleae. 18 : S39-S41, 1997.
- 13) Bredberg G et al: Electrodes for ossified cochleas. *Am J Otol* 18 : S42-S43, 1997.
- Richardson HC, Beliaeff M, Clarke G et al: A three-array cochlear implant: a new approach for the ossified cochlea. *J Laryngol Otol* 113 : 811-814, 1999.
- 14) Kempf HG, Johann K, Lenarz T: Complications in pediatric cochlear implant surgery. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 256 : 128-132, 1999.
- 15) Tong MCF, van Hasselt CA: Cochlear implant surgery in a modified radical mastoidectomy cavity reconstructed utilizing the Hong Kong vascularized temporalis fascia flap technique. *Cochlear implant and related sciences update* (ed by Honjo I, Takahashi H), 151-154, Karger, Basel, 1997.
- 16) Beckenstein MS, Steenerson RL, Elliott LF et al: Use of superficial temporal fascia flap for coverage of an exposed cochlear implant. *Otolaryngol Head Neck Surg* 120 : 940-942, 1999.