当科における頸部食道癌の治療検討

道 津 充¹⁾ 桂 資 泰¹⁾ 岩 永 哲¹⁾
田 中 藤 信¹⁾ 小 室 哲²⁾ 崎 浜 教 之¹⁾
高 橋 晴 雄¹⁾

要旨：頸部食道癌は、消化器外科で取り扱われる場合が多く、耳鼻咽喉科で取り扱う施設は多くはないのが現状である。また、発見時に進行したケースが多く、治療の選択にも困惑する場合が多々ある。今回我々は、頸部食道癌で治療を行った5例を、その治療、経過、治療法の選択などについて、当科での取り扱い、当科でのアプローチ法など検討を加えた。疾患の内訳は、すべて頸部食道癌でその全例に対して外科的治療を行った。

キーワード：頸部食道癌、経頸部アプローチ、喉頭温存頸部食道摘出術

Summary Discussion on cervical esophageal cancer treated at our department:

Mitsuru Dotsu¹⁾, Motoyasu Katsura¹⁾, Tetsu Iwanaga¹⁾, Fujinobu Tanaka¹⁾, Satoru Komuro²⁾, Noriyuki Sakihama¹⁾ and Haruo Takahashi¹⁾. ¹⁾Department of Otolaryngology-Head & Neck Surgery, Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences, ²⁾Department of Otolaryngology and Head & Neck Surgery, National Hospital Organization Nagasaki Medical Center

At present, there are not many medical institutions with otorhinolaryngology departments in which cervical esophageal cancer can be treated. In addition, there have been many cases in which such disease had already progressed when confirmed at a medical institution. Therefore, it is often very difficult to select appropriate treatments for such cases. Herein, we report five cases in which we provided treatment for cervical esophageal cancer. We also discuss the treatment, progression of the disease, selection of treatment methods, and approaches taken by our department. The diseases of the five cases were cervical esophageal cancer, and surgical treatment was performed in all cases.

Key words: cervical esophageal carcinoma, approaches through the cervical region, larynx-conserving surgical resection of the cervical esophagus

[Received Jun. 17, 2007, Accepted May 15, 2007]

はじめに

頸部食道癌は一般的に全食道癌の約5%の頻度

といわれ^{1,2)}(図1)、消化器外科で扱われることが多く、我々耳鼻咽喉科医が遭遇する機会も多々はない。また、発見時点での進行例が多く、手術症例では喉頭合併切除が必要になる場合が多いのが現状である。今回我々は、当施設で経験した頸部食道癌において、その治療、経過、手術のアプローチ法を述べ、当科における治療方針、手術方

¹⁾ 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科展開医療科学講座
耳鼻咽喉・頭頸部外科学領域

²⁾ 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター耳鼻咽喉科
[平成19年1月17日受付、平成19年5月15日受理]

針について検討をくわえる。

症 例

症例内訳は表1に示す如く、平成16年1月から平成18年12月の3年間で経験した頸部食道癌5症例である。この全例に対し外科治療を行った。全て扁平上皮癌で、TNM分類は食道癌取り扱い規約に基づいて分類した。症例1～4は咽頭喉頭頸部食道摘出術、遊離空腸による食道再建術を、症例5は喉頭温存頸部食道摘出術、遊離空腸による食道再建術を行った。このうち症例2と症例5の詳細を提示する。

症例2：61歳、女性。

主 訴：嚥下障害。

既往歴：慢性関節リウマチ。

現病歴：嚥下障害で当院消化器外科を受診し、頸部食道癌の疑いで治療目的に当科紹介となった。

局所所見：喉頭ファイバースコープではバルサルバ法でも病変を観察できない。また、両側ともに反回神経麻痺は認めない。胃内視鏡検査では、腫瘍により内視鏡が頸部食道を通過せず、同部よりの組織検査で高分化型扁平上皮癌の診断を得た。

画像所見：MRIでは、T1、T1造影、T2で頸部食道を中心として上下に進展する腫瘍性病変を認める。また、下端は少なくとも第二胸椎までは腫瘍進展が疑われ、気管膜様部への腫瘍の浸潤も認めた。明らかな転移リンパ節は認めない（図2）。

下咽頭食道造影では、下咽頭梨状陥凹部に粘膜不整像は認めない。頸部食道の造影剤の通過は不良で、気管への瘻孔形成を認める（図3）。

以上より頸部食道癌 cT4N0M0 StageⅢの診断で、咽頭喉頭頸部食道摘出術、両側頸部郭清術（Ⅱ～Ⅳ）、甲状腺全摘術、遊離空腸による食道再建術を施行した。頸部食道で気管食道瘻を形成していたため、喉頭温存をあきらめ合併切除することとし、また第2胸椎以下の食道と気管膜様部の境界は明瞭であったため、経頸部アプローチで十分手術可能と判断し、胸部外科の待機のもと、経頸部アプローチで行った。すべて経頸部操作で摘出し、遊離空腸食道吻合はかなり下方になったものの、食道を牽引することにより端々吻合は十分に可能であった（図4）。

経過：摘出断端陰性で、頸部リンパ節転移もなく、追加治療を行わず術後1ヶ月で退院となった。現在術後1年半経過するが、局所再発、遠隔転移ともに認めていない。

(CLIENT 21 気管・食道・頸部より一部改編)

図1 食道癌の亜部位別頻度

表1 症例内訳

	症例1	症例2	症例3	症例4	症例5
主 訴	嚥下障害	嚥下障害	嚥下障害	嚥下痛	嚥下障害
性 / 年齢	女性 / 61	女性 / 71	男性 / 74	女性 / 67	男性 / 74
TNM	T4N1M0	T4N0M0	T4N1M0	T4N0M0	T3N0M0
病 期	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ
喉頭気管	+	+	+	+	±
浸潤		(気管食道瘻)			(気管膜様部)
反回神経	-	-	+	+	-
麻痺			(一側)	(一側)	
治 療		咽頭喉頭頸部食道摘出術			頸部食道摘出術 (喉頭温存)

(TNM分類は食道癌取り扱い規約参考)

図2 頸部食道を中心として上下に進展する腫瘍性病変を認める(※)。また、下端は少なくとも第二胸椎までは腫瘍進展が疑われ、気管膜様部への腫瘍の浸潤も認めた(↑)。明らかな転移リンパ節は認めない。

図3 下咽頭梨状陥凹部に粘膜不整像は無いが、頸部食道の造影剤の通過は不良で、気管へ瘻孔形成も認め、同部より気管への造影剤の誤嚥を認める(→)。

症例4: 74歳, 男性。

主 訴: 嚥下障害。

既往歴: 高血圧・・・降圧剤内服

糖尿病・・・インスリン加療

現病歴: 当院消化器外科で頸部食道癌(cT3N0M0 stage II)で化学療法(NDP 130mg/m²+5FU 750mg/m²×3クール)及び放射線療法(Linac

63.0Gy)を行い、寛解となったが、半年後に局所再発を認め、当科紹介となった。

局所所見: 胃内視鏡検査で門歯より18cmの頸部食道に隆起性病変を認めた。反回神経麻痺は認めなかった(図5)。同部よりの組織検査で高分化型扁平上皮癌の診断であった。

画像所見: MRIでは、頸部食道に腫瘍性病変

図 4 経頸部アプローチで十分かつ安全な視野で摘出可能であった。
頸部食道を中心に上下に広がる潰瘍性の腫瘍を認める。

図 5 門歯より 18cm の頸部食道に隆起性病変を認める。反回神経麻痺は認めない。

を認め、気管膜様部への浸潤も強く疑う。下咽頭食道造影では、頸胸部移行部に隆起性病変を認め、腫瘍による狭窄を認める（図 6）。

以上より頸部食道癌 rT3N0M0 Stage II の診断で外科治療を行った。本症例に対しては、膜様部への浸潤も疑われ、年齢、化学療法・放射線療法後の再発などをふまえ、咽頭喉頭頸部食道摘出術が望ましいと考えたが、本人の音声温存に対する強い希望もあり喉頭温存術式を試みた。最終的に術中所見で喉頭温存可能かどうかを決定すること

に同意を得た上で、経頸部アプローチによる喉頭温存頸部食道摘出術（気管膜様部合併切除）、気管傍・上縦隔郭清術、甲状腺左葉峡切除術、遊離空腸による食道再建術、気管切開術を行った。前頸筋群を全てその起始部で切断し、食道を十分に牽引することにより経頸部操作でも安全かつ十分な視野を得ることができた。気管膜様部は合併切除で対処し、術中迅速診断で断端を確認し一時縫縮を行った。また上縦隔の気管周囲の死腔に移植空腸の血流豊富な腸間膜を充填し、気管血流障害

図 6 MRI では、頸部食道に腫瘍性病変を認め、気管膜様部への浸潤も強く疑う。
下咽頭食道造影では、頸胸部移行部に隆起性病変を認め、腫瘍による狭窄像を認める。

図 7 前頸筋群を全てその起始部で切断し、食道を十分に牽引することにより経頸部操作でも安全かつ十分な視野を得ることができた (図 a)。
上下断端ともに十分な安全域をとって切除した (図 b)。

a
b
声帯の可動性は良好（術後5ヶ月）。

c
d
通過良好で、誤嚥も認めない（術後8ヶ月）。

図8 術後経過

による気管壊死への対策とした。最後に喉頭浮腫や両側反回神経麻痺に備え、気管切開術を追加した（図7）。

経過：術後は一過性の両側反回神経麻痺を認め、約1.5ヶ月後より経口摂取を開始したが、術前より危惧された誤嚥性肺炎をしばしば繰り返した。

術後5ヶ月目には声帯の可動に改善が見られ、誤嚥も認めず退院となった。さらには術後8ヶ月目には声帯の可動も正常化し、気管孔閉鎖に至った（図8）。手術後1年経過する現在まで局所再発、遠隔転移ともに認めていない。

考 察

当科における治療方針は他施設と大きな相違は無いが、手術を第一選択としている。当然ながら癌の進行度、機能障害の程度、重複癌の有無、年齢、Performance Status などにより他の治療も検討する。手術症例においては①膜様部への浸潤、②反回神経麻痺の有無、③年齢などにより喉頭温存可能か、経頸部アプローチで可能か、開胸操作が必要かを検討する⁴⁻⁷⁾。当科における手術方針としては、頸部アプローチを基本手技としている。場合により胸骨を一部剖開することで、腕頭動静脈のレベル (Th1 ~ 2) までは安全かつ十分な視野で操作は可能であると考えている。しかしながら、十分な上縦隔郭清を必要とする場合や、一部胸部食道切除の場合にそなえて、常に胸骨縦切開の準備をして手術に望んでいる。頸部食道癌で最も問題になることは、病変が下方にあり、かつ気管浸潤が高度である場合、縦隔気管孔形成の必要性が生じることであろう。このような場合、すなわちこれが経頸部アプローチの限界でもあるのだろうが、手術侵襲も大きい上に、術後合併症の問題が大きくなるため、化学療法、放射線療法の併用療法も選択肢の一つと考えている (図 9)。また、喉頭温存可能な場合は喉頭温存に努めるが、我々は、その条件としては以下としている。①癌が喉頭、気管に浸潤していないこと。②癌が後壁に限局すなわち膜様部への大きな浸潤が無いこと。③両側反回神経麻痺がないこと。④非高齢者 (70 歳以下が望ましい) であること³⁾。軽度の膜様部浸潤例に対しては、膜様部の合併切除で対処し、一時縫縮もしくは局所皮弁で対応可能である。それ以上の気管膜様部再建が必要な例では、残念ながら喉頭温存を断念せざるをえまい。また、70 歳以上であっても Performance Status がよければ、喉頭温存も考慮すべきであろう。(図 10) 全症例、術後それぞれ 1 年から 3 年経過するが、再発症例は 1 例もない。今後も局所再発、縦隔リンパ節転移、遠隔転移などふまえた十分なフォローアップが必要である。

図 9 当科における頸部食道癌の取り扱い

喉頭温存の条件

- ①癌が喉頭、気管に浸潤していない
- ②癌が後壁に限局 (膜様部への大きな浸潤がない)
- ③両側反回神経麻痺がない
- ④非高齢者 (70 歳以下が望ましい)

図 10

ま と め

頸部食道癌に対して、当科における治療方針、手術方針を検討した。手術において手術視野の確保の工夫により、経頸部アプローチでも安全かつ十分な視野確保が可能である。また、症例は限られるが喉頭温存可能症例に対しては積極的に喉頭温存を試みるべきであるが、その条件について検討を加えた。

文 献

- 1) 林 隆一, 海老原敏, 吉積 隆: 頸部食道癌に対する合理的手術. 手術 52 : 1809-1814, 1998.
- 2) 鶴丸昌彦: 食道腫瘍. 21CLIENT 16 気管・食道・頸部: 207-215, 2001.
- 3) 小澤壮治, 安藤暢敏, 北川雄光, 他: 頸部食道癌に対する喉頭温存術式. 手術 52 : 1803-1808, 1998.
- 4) 吉田知之, 大橋伸也, 平出文久, 他: 頭頸科の立場からみた頸胸境界部食道癌手術. 手術 48 : 1317-1323, 1994.
- 5) 安田卓司, 塩崎 均, 矢野雅彦, 他: 頸部食道癌に対する積極的喉頭温存術式. 手術 56 : 335-342, 2002.
- 6) 塩崎 均, 田中 晃, 重岡宏典, 他: 下咽頭・頸部食道癌. 消化器外科, 24 : 1845-1851, 2001.
- 7) 小澤壮治, 安藤暢敏, 北川雄光, 他: 頸部食道癌. 消化器外科, 24 : 149-157, 2001.