3次元CTによる頭頸部手術の術前診断

新川 敦¹⁾ 宮本ゆう子¹⁾ 三宅浩郷¹⁾ 斉藤彰治²⁾

要旨: 通常の1 mm スライス2次元高分解能CTから、その画面4~15枚の情報を同一の大型コンピュータ上でretrospectiveに3次元再構築を行い、3次元CT画像を得た。これらの画像が耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域の術前診断への応用を試みた。その結果、手術方向からのイメージにより解剖学的把握が容易になること。2次元CTフィルム枚数を減少させ、患者被爆を減少させることが可能となること。患者、研修医教育に少ない枚数のフィルムから説明ができることの利点が考えられた。

Key words: 高分解能CT, 3次元CT, 術前画像診断

はじめに

CTが近代医学の発展、特に我々耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域に寄与していることは間違いないことである。立体的な構造を把握するためには、通常のHigh resolution CT Scanning(以下HRCTと略する)では一方向で10枚以上のフィルムを2方向以上撮影し、これを頭のなかで立体空間構造を再構築する必要があるが、この方法は比較的イメージを掴みにくいものとする。特に耳鼻咽喉科頭頸部領域では複雑な3次元構造を持っているため、なおさらである。

1977年Herman等¹⁾がCTデータを情報処理技術により3次元構築する3 Dimention CT(以下3次元CT)の報告を発表して以来、整形外科領域、形成外科領域、口腔外科領域における外傷、奇形の報告が散見される。それらの報告には耳鼻咽喉科頭頸部外科領域の、顔面外傷、咽頭外傷などでの症例報告が散見されているが²⁾³⁾⁴⁾、副鼻腔領域また側頭骨病変の報告は少ない⁵⁾⁶⁾。

今回、我々は頭頸部外科領域の薄いスライス幅を利用した3次元CT画像を検討し、その画像を提示するとともに、その利用方法について検討を加えたので報告する。

装置、方法

3次元CTを撮影するハードウェアは横河製high-resolutional CT scanner 装置Vertex 3000である。スキャン時間は4.5sec, 130mA:120kvp, 撮影領域を25cmの条件とし、側頭骨ではスライス幅:1 mm, スライス間隔:1 mm, 副鼻腔においてはスライス間隔を2 mmとした。さらにこので上がった画像に耳部では左右に2.8~3倍のretrospective target(拡大再構成)を行い、高分解能画像の2次元CTを得ておく。

この2次元CT画像をソフトウェアとして横河製3 Dイメージングソフトを用いて、CT値400以上のピクセルを選択し、連続する4~15枚の連続する2次元のcoronal HRCT画像をコンピュータ上で画像の3次元再構築を行った。得られた3次元画像はディスプレイ上で実際には任意の方向に回転させることができるので、立体の上、下、前後左右のいずれの画像をも持つことができるが、今回はこれを一方向からだけの画像としてフィルムに焼き付けた。再構築までの時間は約10分程度である。

1) 東海大学医学部耳鼻咽喉科 (1992. 5. 18 受付)

2) 斎藤耳鼻咽喉科医院

症例

3次元CT画像を検討した症例は、1991年4月から同12月までに耳鼻咽喉科頭頸部手術を予定し、術前検査としてHRCTを撮影した40症例である。

以下に代表的な症例を提示する。

1) 上顎の違和感を主訴にした症例の1mmスライスのHRCT画像を提示した。図1-1はcoronal画像、図1-2はaxial画像である。副鼻腔で1mmスライスが必要かどうかは別の問題として、それぞれの方向のこれらの画像情報データを4～15枚併せ、図1-3～図1-6に示したような3次元CT画像を再構築した。図1-3はcoronal画像の再構築で、上顎洞のほぼ中心から後方を見た画像であり、図1-4は同じ面から後方より前方をみた画像である。図1-3では上顎洞内の凹凸、眼窩後方の上眼窩裂、篩骨天盖などが立体的に観察できる。図1-4は通常の手術では見ることのできない、後方から見た上顎洞前壁内部、前篩骨蜂巣等が観察できる。図1-5はaxial画像でやはり上顎洞中央から上を眺めた画像である。上顎洞眼窩壁、上顎篩骨境界領域等の立体的な状態が観察できる。図1-6は上顎洞中央から下を眺めた画像である。上顎洞歯槽窩の立体的な形態が観察できる。

図1-1

図1-2

図1-1 通常の2次元HRCT coronal画像(1mmスライス)。右上顎の小さな粘膜肥厚が観察できる。

図1-2 図1-1と同じ症例のHRCT axial画像 同様の右上顎の小さな粘膜肥厚所見が観察できる。

図1-3

図1-4

図1-3 副鼻腔3次元CT coronal 2次元画像(図1-1を含む連続する10枚のスライス)の再構築により作成した画像。正面視で上顎洞中央から後ろ方向を見るようにしてある。上顎洞後壁、上顎篩骨境界領域、上眼窩裂、篩骨蜂巣などの状態が立体的に観察できる。

図1-4 副鼻腔3次元CT coronal 2次元画像 正面視で上顎洞中央の面後方中から前方を見るようにして図1-1のスライスを含む5枚から立体構築してある。上顎洞の前壁裏面の状態および鼻腔入口部付近の観察ができる。

2) 正常例 (患側の反対側) の2例の側頭骨 CT 画像を図2に示した。図2-1は通常の1 mm スライスの coronal 蝸牛面画像であり、この後方の5枚のスライス情報を再構築した画像が図2-2である。鼓室内、上鼓室と天蓋との関係、また頸動脈管、茎状突起などの立体感が観察できる。図2-3は別な症例の左 coronal HRCT 画像の3次元再構築画像であるが、20° の俯瞰図として描出している。このように自由に角度をつけてディスプレイ上で観察できるのも特徴である。図2-4はさらにこれに拡大をかけ、耳小骨のみを明瞭に描出したものである。coronal 画像の通常の2次元 CT で内側に位置するのがツチ骨で外側に位置するのがキヌタ骨であることを立体的に描出している。

3) 症例3は上顎嚢胞症例である。通常の術前には患者またはその家族に手術の説明を行う際には、図3-1に示したように、一方向数枚から10数枚の画像をもって患者説明を行っている。これが2方向だと30スライス以上となり、この多数の HRCT フィルムは患者およびその家族を混乱させてしまう。患者に対するインフォームドコンセントという意味でも、これを図3-2に示したように1~2枚の立体画像フィルムにすれば、患者およびその家族が上顎嚢胞という病気を理解することが容易となる。実際の患者説明としては、上顎洞外側壁が消失するほぼ円形の嚢胞が存在することを立体画像で説明することが可能であった。

4) 眼球突出を伴う上顎嚢胞の症例を提示する。図4-1の Coronal HRCT をみれば、この症例は exophthalmos を主とした単房性嚢腫のように見えるが、これは一枚の1 mm の範囲のスライス幅で

図1-5

図1-6

図1-5 副鼻腔3次元CT axial 画像 図1-2を含むスライス面を含んで上顎洞中心面下方から上方を見るように構築した。上顎洞眼窩壁、上顎篩骨境界領域等の観察ができる。

図1-6 副鼻腔3次元CT axial 画像 上顎洞中心面から下方を見るように再構築した。上顎洞歯槽窩、鼻腔底部の観察ができる。

図2-1

図2-2

図2-1 右側頭骨 coronal CT 画像 蝸牛面 (1 mm スライス画像) この HRCT を axial 画像とともに2方向撮影し、術前検査とするのが通常である。

図2-2 右側頭骨3次元 coronal 画像、図2-1の連続する coronal HRCT の7~8枚の画像から3次元構築した。中耳腔、顎間接、内頸動脈、茎状突起等を立体的に観察できる。

図2-3

図2-4

図2-3 左側頭骨3次元coronal画像、20度程度の角度を付けて、左側頭骨HRCT画像を俯瞰した像を示した。ディスプレイ上ではこのように自由に角度をつけて観察できる。

図2-4 図2-3に更に拡大をかけ、耳小骨連鎖のみを描出した画像も取り出すことができる。ツチ骨、キヌタ骨の相互の関係を立体視することができる。

図3-1

図3-2

図3-1 2次元副鼻腔HRCT画像 この図のように、一般的には数枚のスライスをもって立体イメージを作り上げている。患者説明、研修医には理解が難しい。

図3-2 上顎中央より上方をみる方向で図3-1を含むスライス数枚を立体再構築した3次元立体画像

左上顎洞と嚢腫の関係、またその立体的構造をこの1枚のフィルムから観察でき、患者説明も容易である。

あるため、実際は図4-2の別なHRCTに示すように、もう一つの嚢胞が存在する。図4-3の3次元CTではこの2つの嚢胞を立体的に、1枚のフィルム上に描出することができる。多房性の嚢胞の取り残しには術者としては常に注意を払うところであるが、この3次元画像は術者の把握が容易であり、また研修医教育としても有用であることが予想される。

考案

3次元CTは通常の2次元CT画像データを3次元イメージに変換することで、この複雑で重要な解剖学的部位の理解を容易にする方法である。耳鼻咽喉科頭頸科領域での利用法は表1に示したようなことが考えられる。

現時点において3次元構築を行う方法は2種類ある。一つには画像フィルムを利用し、これをビデオ入力からデジタル化する、またはディジタイザに直接フィルムを利用し、他のコンピュータに入力しそこで3次元構築する方法と、我々の行ったように画像データを同一コンピュータのソフトウェア上でその膨大な情報そのものを再計算し、3次元構築する方法がある。

ディジタイザ、ビデオ画像による3次元構築の試みは、耳鼻咽喉科領域では主に側頭骨病理標本

図 4-1

図 4-2

図 4-1 多房性上顎嚢胞症例の coronal CT 所見 眼窩壁を破壊する嚢胞が観察できる。

図 4-2 図 4-1 と同じ症例のやや後方の coronal CT 所見もう一つの頬骨窩に存在する嚢胞が観察できる。

図 4-3

図 4-3 図 4-1 から連続するスライス面を再構築した 3 次元 CT 画像 一枚の画像から上記 2 つの嚢胞が 1 枚の画像上に立体的に描出してある。

表 1 3 次元 CT による頭頸部領域での利用法

1. 術前診断
2. 術中の解剖学的指標
3. 術後経過観察

先天奇形、外傷、腫瘍、また良性疾患でも患者個人個人の解剖学的形態の多様性から、その手術の解剖学的指標として利用されるなど利用価値は大きい。

の 3 次元構築で行われており⁷⁾、CT 画像をディジタイズする方法は Davis⁵⁾らにより行われているに過ぎない。この 3 次元構築の方法の利点はパーソナルコンピュータを利用することができ、そのデータを手術室にまで持ち込むことができ、そこで解剖学的位置を選択し、自由な方向に回転し、自由な面で術者が観察できる可能性があるという利点がある。しかし一方、この得られた画像フィルムからビデオ画像、またディジタイザを利用して再取り込みする方法は、取り込む画像フィルムそのものが HRCT 情報量のすべてを表現するわけではないために、どうしても途中の段階で画質が劣化することは避けられない。

我々の装置は CT に付属する大型コンピュータ上で、HRCT 情報そのものをソフトウェアにより 3 次元変換する方法であり、この方法はコンピュータ上の情報量をそのまま利用することが出来る。そのため、画像の劣化はほとんどなく 2 次元 CT と同等の解像力を得ることができる。さらには我々は 1 mm スライス幅の解像力の良い 2 次元 CT 画像情報を用いることで、さらに良好な 3 次元画像を得ている。しかし、画像情報を簡単に取り出すこと、また持ち運んで手術室等で有効に使うことが出来ないという欠点もある。

将来的には、CT 付属の大型コンピュータからデータを光磁気ディスク、リムーバブルディスク等によりデータそのものをコンパートし、パーソナルコンピュータなどで簡便に手術室等で使用することができる時代がくる可能性は高い。また LAN 等のケーブル化により、データそのものをターミナルコンピュータで使用するような方向性がある可能性もある。

こうすることで、実際は今回示したような、1~2 枚の画像で患者の CT 情報を持つのではなく、

自由な方向、面、厚さ、回転をもった多くの情報量が患者とともに随伴すれば利用価値はさらに一層増大することは間違いない。これは症例5で示したような、重要な判断を下す際には大切なことと考えられる。

フィルム上の画像診断と、ディスプレイ上の診断との情報量の差は、超音波エコーの場合と類似している。すなわち超音波を操作している場面においての多大な情報量と、これを画像としてフィルム上に提示されたときの限られた情報量の差を考えれば明白である。

こういったデメリットが現時点ではあるものの、フィルム上に表現された3次元CT画像を術前検査として利用することを考えると、表2に示すことが利点として挙げられる。

術者の解剖学的理解が容易になることは前に述べた。さらには立体画像を頭でイメージするにはCT画像はcoronal, axialなど2方向の撮影が必要となる。我々の施設においても、骨病変を伴う慢性中耳炎、奇形などの側頭骨外科の術前には、必ずHRCTを2方向撮影するようにし、合併症・偶発症の発生を予防するようにしている。しかし、この3次元構築を行えば、立体像はイメージではなく画像として得られるため、今後は2方向で撮影する必要性が減少すると考えられる。従って患者被爆量も約半分に減少する。

また症例3に示したように、従来、患者への手術説明は多くのHRCTフィルムを前にして行っている。患者の知識からこれらの画像を理解することは大変なことであり、これを立体画像の1～2枚のフィルムで具体的に説明することができれば、患者の理解度は良くなることが予想される。図3、図4などがそれに該当し、手術には2個の嚢胞があること、またその手術範囲は上顎のほとんどに及ぶことなどが、容易に具体的に説明できる。同様にまだCT等の読影に習熟していない若い研修医教育にも適切な方法であると考えられる。

またこの3次元構築の方法そのものは患者に対する、肉体的・経済的負担がないことがあげられ、余分な被爆は全く必要としないことも大きな利点であろう。

逆にいいことばかりではなく、注意すべきこともある。表3に示したように、CTを撮影している途中でこの3次元CT再構築はできない。およそ20分間CT装置を3次元イメージ解析時間に割くことは、日常臨床の妨げとなろう。ディスクに格納し、後の暇な時間にこれを行っているのが現状

表2 3次元CTの利点

1. 従来のaxial, coronalの2方向の2次元CTからのイメージと比較し、手術方向からの方向でイメージをとることが出来、術者の解剖学的理解が容易となる。
2. 3次元的把握において2次元CTを相対する2方向で撮影する必要性が減少する。従って、患者被爆も減少する。
3. 患者への説明が容易である。30枚以上の画面をもって説明するより、3次元フィルム1～2枚で説明できる容易さがある。また同時に研修医教育にも良い。

表3 現状の3次元CTの留意点

1. リアルタイムに画面が作成できない。
(ソフトウェア上の問題)
2. 2次元CT以上の解像力は得られない。
(耳小骨病変、僅かな骨欠損、骨折等)
3. スライス間距離が拡大すれば、artifactが増大する。
4. スライス間距離を小さくすれば撮影回数が増加し、被爆が増大する。

表4 3次元イメージングの将来

1. CTにおいてはスライス幅を狭くし、さらに解像力を微細にする。
(耳小骨、内耳病変などの再構築)
2. CT, MRIの併用による病変単独の再構築
3. カラー化による視覚的改善

である。

また得られた3次元画像は決して2次元HRCTの解像力を越えることはない。これは3次元CT画像そのもののデータが2次元画像データを利用していることに起因する。従って、耳小骨、僅かな骨折等、2次元CTで観察できない部分は3次元にしても観察できないことに留意すべきである。

我々は3次元再構築画像の解像力を高めるために、2次元HRCTを1mmスライス、1mm間隔で撮影している。これはスライス幅を広げれば、得られた2次元フィルムの解像力が劣化することは周知の事実であるため、装置ができる限界の最小スライスの1mmを採用している。またスライスとスライスの間のスライス間隔を広げれば、その撮影しなかった部分の情報は欠落し、そのため欠落した部分の情報はソフトウェア上でスムージングが行われるため、artifactが増大する。例えば3mm間隔で撮影したとすれば、スライスとスライスの間は2mmの情報が欠落する。耳小骨でいえば、通常耳小骨は3~4枚のスライスに入るが、そのうち2枚が欠落することになり、本来の形態を描出しなくなる。

逆にスライス間隔を狭くすれば、それだけ撮影枚数が増加し、患者被曝は増大する。しかし、解像力は増加する。前にも述べたが3次元構築がルーチン化すれば、2方向での撮影が不要となる可能性もあり、このスライス間隔、撮影方法、撮影枚数などは、今後の研究課題としたい。

将来的には、表4に示したように、CTはさらに進歩し、2次元の0.5mm程度のスライス幅が撮影できる機種がでるのは時間の問題であろう。またコンピュータの進歩により、3次元解析時間が減少するのも必然であろう。そうなれば、さらに解像力の高い3次元CT画像がリアルタイムに再構築できるようになると考えられる。現在では図2に示したように耳小骨の形態がやっと判別できる程度から、その微細な骨欠損の状態、さらにはアブミ骨の状態まで検討できるようになる可能性は高い。また、その利用方法も手術場で、外来で、病棟で、研究室でと多くの利用範囲が広がる可能性は高い。

また現在はCTが主体ではあるが、同様な3次元構築の試みはMRIでも行われはじめている⁸⁾。しかし、MRIの解像力はまだCTには数段劣るのが現状である。しかし、MRIの特殊性とCTの解像力とを併せ、腫瘍等の病変の形、サイズ等を単独で再構築することができる可能性も高い。

欧米ではCT、MRIのカラー化が進められている。視る方にとっては白黒よりもカラーの方が視覚に訴えるものが多いのはカラーテレビの例をとるまでもない。

一般のコンピュータの普及とそれに伴う低価格化が、情報量の保存という意味で医学界、耳鼻咽喉科領域にさらに貢献する時代はそう遠くないと考える。

文献

- 1) Herman G. T. and Liu H. K. : Three-dimensional display of Human organs from computer tomograms. Comput Graphics Image Process. 9 : 1-21, 1979.
- 2) DeMarino D. P., Steiner E., Poster R. B. : Three-Dimensional Computed Tomography in Maxillo-facial Trauma. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 112 : 146-150, 1988.
- 3) Zinreich J. S., Mattox D. E., Johns M. E. : 3-D CT for Cranial Facial and Laryngeal Surgery. Laryngoscope 98 : 1212-1219, 1988.
- 4) Schellhas K. P., EL Deeb M., Wilkes C. H. : Three-Dimensional, Computed Tomography in Maxillo-facial Surgical Planning. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 114 : 438-442, 1988.
- 5) Davis R. E., Levoy M., Rosenman J. G., Fuchs H., Pizer S. M. Skinner A. and Pillsbury H. G. : Three-dimensional highresolutional volume rendering (HRVR) of computed tomography data : Applications to otolaryngology-head and neck surgery. Laryngoscope 101 : 573-582, 1991.
- 6) Seldon H. L. : Three-dimensional reconstruction of temporal bone from computed tomographic scans in a personal computer. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 117 : 1158-1161, 1991.
- 7) Green J. D., Marion M. S., Erickson B. J., Robb R. A. and Hinojosa R. : Three-dimensional reconstruction of the temporal bone. Laryngoscope 100 : 1-4, 1990.
- 8) Herman G. T. : Three-dimensional imaging on a CT or MR scanner. J Comput Assist Tomogr. 12 : 450-458, 1988.

Abstract Three-dimensional High-Resolution CT in Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery.

Atsushi Shinkawa, Yuuko Miyamoto, Hirosato Miyake* and Shouji Saito**

Conventional high resolution CT scanings are not optimal for demonstrating three-dimensional anatomic relationships. In otorhinolaryngology-head and neck surgery these critical relationships are often highly complex, and their complete understanding is essential to a successful surgical outcome. A new computer generated image display format, 3-Dimensional High Resolution CT Scanning (3-D HRCT), facilitates the understanding of these critical anatomic relationships the underforming conventional imaging data into clinically relevant 3-D images.

Conventional two-dimensional CT scans are obtained for routine clinical indications of operation. Unlike many other 3-D reconstruction algorithms, 3-D HRCT suffers minimal data loss in the conversion process, which in turn provides for superior image solution. This better allows the application of 3-D technology for small or complicated anatomic structures such as middle ear components, maxillary sinus, orbital structures those are frequently encountered in otolaryngology-head and neck surgery. Advances in computer-controlled manipulation that further enhances the evaluations of desired pathologic features have been achieved. This study contains representative clinical cases chosen to illustrate the potential utility of 3-D HRCT in otolaryngology-head and neck surgery. The authors believe 3-D HRCT images will enhance the surgeon's understanding of the 3-D anatomic relationships that exist between critical pathologic features and surrounding vital structures and be useful for the explanation to the patients and young doctors.

Key words : 3-Dimension CT Scanning