咬筋内血管腫の一例

石尾健一郎¹⁾ 鈴木光也¹⁾ 広田佳治¹⁾ 市村恵一²⁾ 飯沼壽孝²⁾

要旨： 症例は、44歳の女性。主訴は、右頬部腫瘍。昭和61年4月より摂食時右頬部腫瘍に気付く。平成2年10月より腫瘍増大傾向を認め、11月当科受診。咬筋弛緩時、右頬部に直径約40mm大の弾性軟、表面平滑、境界不明瞭な瀰慢性腫脹が存在し、咬合時、同部に境界明瞭な半球状膨隆を認めた。疼痛、圧痛、開口障害はなし。臨床症状、CT(特にダイナミック造影CT)、超音波検査より咬筋内血管腫を疑い、平成3年1月31日、口外法により腫瘍摘出術施行。腫瘍は暗赤色、表面不整な30×17×15mm大の腫瘍で、内部に直径約5mmの静脈石を認めた。本邦報告例にみる咬筋内血管腫手術アプローチ法について若干の文献的考察を加えた。

Key words： 咬筋内血管腫、静脈石、ダイナミック造影CT、口内法、口外法

緒言

身体各部の横紋筋肉内に発生して筋線維内に浸潤するようにみえる血管腫を特に筋肉内血管腫 intramuscular hemangioma と呼び、また臨床上、力みや下垂により膨隆し勃起性を有することから勃起性血管腫 erectile hemangioma の名称もある。特に咬筋内に発生したものは咬筋内血管腫あるいは咬筋部勃起性血管腫と呼ばれる。

咬筋内血管腫症例を1例経験したので、その概要を報告し、本邦の報告例にみる手術アプローチ法について文献的考察を加えた。

症例

患者：44歳 女性

初診：平成2年11月17日

主訴：右頬部腫瘍

既往歴：交通外傷（昭和55年）

家族歴：特記すべき事項なし

現病歴：生下時に異常なし。昭和61年4月ごろ、摂食時の右頬部膨隆を家人に指摘され、安静時の右頬部腫瘍にも気付いた。6月に某院口腔外科を受診し血管腫の診断を受けたが、良性であり放置してよいと指示された。平成2年10月より腫瘍は増大傾向を示したため、当科を受診した。

現症：体格、栄養状態は中等度で全身所見に特記すべき事項はなかった。安静時局所所見では、右頬部に、直径約40mm、表面平滑、境界不明瞭、可動性で柔らかい瀰慢性腫脹を認めた。疼痛や圧痛はなく、腫脹部皮膚に異常を認めなかった(図1)。咬合時には、同部に比較的境界明瞭な弾性軟の半球状腫瘍を認めた(図2)。咬合時では安静時に比べ腫瘍の硬度が増加した。さらに咬合時に下を向いて力むと、腫瘍は増大した。また、筋緊張を緩め安静に戻すと、膨隆はただちに消退した。腫瘍上での拍動や血管雑音は認めなかった。咬合時にも疼痛や圧痛はなかった。開口障害、顔面神経麻痺は認めず、また頬粘膜、ステノン管開口部、唾液の流出にも異常はなかった。

¹⁾公立昭和病院耳鼻咽喉科 (1992. 4. 24 受付)

²⁾東京大学医学部附属病院分院耳鼻咽喉科

超音波所見：右咬筋内表層に約20×30mm大の腫瘤を認めた。力んだ特に腫大はより著明となった。

CT 所見：下顎骨を含む中咽頭レベルの軸位断単純 CT 画像では、右咬筋の腫脹と咬筋内に静脈石を思わせる high density area を認めた。咬筋とやや low density を呈する腫瘤との境界は不明瞭であった。下顎骨の破壊像および菲薄化は認めなかった（図3-1、4-1）。

ダイナミック造影 CT を施行した。単純 CT 画像と同レベルの軸位断造影 CT 画像では、右咬筋内の low density area は、周囲組織の造影により強調された。造影剤注入開始38秒後で周囲とのコントラストが最も良好となり、腫瘤の境界が鮮明になった（図3-2、4-2）。健側の左側咬筋には、この効果は現れなかった。

図1 安静時局所所見

図2 咬合時局所所見

図3 軸位断 CT 画像

3-1 (上)：単純 CT 画像

矢印が high density area を呈する静脈石

3-2 (下)：ダイナミック造影 CT 画像

(造影剤注入開始38秒後)

1：下顎骨 2：右咬筋 3：左咬筋

図4 軸位断 CT 画像 (咬筋部拡大像)

4-1 (上)：単純 CT 画像

4-2 (下)：ダイナミック造影 CT 画像
(造影剤注入開始38秒後)

周囲組織の造影により腫瘤辺縁が最も明瞭になった (矢印)

1：下顎骨 2：右咬筋

単純 X-P, オルソパントモ所見: 異常所見なし。

臨床診断: 右咬筋内血管腫

手術所見: 平成 3 年 1 月 31 日に血管腫摘出術を施行した。耳前部から下顎下縁下方 2 cm に切開を入れ, 広頸筋直下で皮膚弁を挙上, 顔面動脈, 顔面神経下顎縁枝・頬筋枝を確認, 保存し, 腫瘍を咬筋より剝離し摘出した。流入あるいは流出血管を認めた。周囲との癒着はなかった。摘出標本は暗赤色, 表面不整な 30×17×15mm 大の腫瘤であり, 内部に直径約 5 mm の静脈石を認めた。創部にドレーンを留置した。出血量は 32ml であった。

病理組織学的所見: 横紋筋組織中に著明に拡張した血管の増生を認め(図 5), 管腔内には血栓や多数の赤血球を認めた(図 6)。

病理診断: 筋肉内海綿状血管腫

経過: 術後, 右頬部の瀰慢性腫脹および咬合時の腫瘍は消失した。およそ 1 年 3 か月経過したが, 合併症や再発は認めていない。

図 5 病理組織像
(H-E 染色・弱拡大)

図 6 病理組織像
(H-E 染色・弱拡大)

考察

管腫 angioma は, 新生脈管からなる良性腫瘍で, 真の腫瘍ではなく過誤腫 hamartoma の一種とみなされている。血管に起因するものは血管腫, リンパ管に起因するものはリンパ管腫として知られている。これらの管腫は管芽細胞および結合組織基質の増殖によって発現し, 先天的あるいは後天的に生じる。後天的に生じたものの中には外傷が関与した場合もあり, Jenkins は, 外傷の関与はおよそ 17% であると報告している¹⁾。本症例にも約 10 年前に外傷の既往があるが主に反対側への傷害であり, 本疾患発症の主因子とは考えにくい。

1980 年以降における咬筋内血管腫の本邦報告令は, 我々が渉猟しえた範囲で 20 件であった(表 1)。年齢は 2 歳から 49 歳, 平均年齢 24.0 歳であった。過去の報告²⁾のとおりに 30 歳以前の発症が多く, 20 例中 14 例と 70% を占めた。性別では, 女性に発生することが多い³⁾とされるが, 男女比は 9:11 と著明な性差は認めなかった。

1980 年代は CT が検査の主流であり, また, 安静時と咬合時での血管腫の変化をリアルタイムにとらえられることから超音波検査を組み合わせることも多い³⁻⁸⁾。MRI も CT と併用すると有用である⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾。

手術のアプローチ法は, 口内法と口外法に大きく 2 分される。口内法は 8 例に, 口外法は 12 例に施行された。口内法は主に口腔外科で用いられているアプローチ法であり, 咬筋肥大症手術の Obwegeser-Beckers 法¹²⁾を応用したものである(図 7¹³⁾)。

口外法施行例の切開部位は, 下顎下縁切開 4 例, 耳介下部～下顎下縁切開 3 例, 頬部(腫瘍部)切開 3 例が多く(表 2), 切開の大きさは, 腫瘍の部位・範囲に依存している。口内法・口外法の選択には, 腫瘍の大きさ・部位が問題となるが, 過去の報告では, 口内法が最大 50×40×40mm の例¹⁴⁾

表1 本邦における咬筋内血管腫の報告例（1980年以降）

報告年／者	歳・性	主要検査	臨床診断	アプローチ法	大きさ(mm)
1983/稲 木	29・男	X-P, sialo-CT 耳下腺造影	軟部組織腫瘍	頬部腫瘤下縁	55×42×30
1984/中 野	38・女	angiography	咬筋部勃起性血管腫	耳介前有髪部	15×7
1984/河 田	11・男	X-p	頬部血管腫	顎下部	35×25
1985/水 田	20・女	耳下腺造影	頬部咬筋内静脈石	口内法（局麻下）	不明
1985/大 塩	2・男	耳下腺造影 穿刺造影	海綿状血管腫	下顎下縁	50×50
1986/熊 沢	14・男	CT, echo	頬部血管腫	耳介下部下顎下縁	不明
1986/ 陳	7・男	X-P, zero	深在性血管腫	口内法	30×20
1986/尾 崎	32・女	X-P	勃起性咬筋血管腫	口内法	50×40×40
	49・女	X-P	勃起性咬筋血管腫	口内法	30×20×20
1987/筑 丸	15・男	CT, echo	勃起性咬筋血管腫	下顎下縁	40×20×15
1987/井 上	24・女	CT, DSA	咬筋内血管腫	耳前部下顎下縁	55×30
1988/佐々木	48・女	穿刺造影	勃起性咬筋血管腫	口内法	17×17
	18・男	echo	勃起性咬筋血管腫	口内法	27×22
	17・男	CT, echo	勃起性咬筋血管腫	咬筋部皮膚	17×16
	21・女	CT, echo	勃起性咬筋血管腫	口内法	22×19
1989/若 森	26・女	CT, echo	咬筋部勃起性血管腫	腫瘤直上（局麻下）	不明
	35・女	echo, zero	咬筋部勃起性血管腫	口内法（局麻下）	不明
1989/中 島	15・男	CT, echo, angiography	咬筋部勃起性血管腫	耳介下部下顎下縁	43×30×26
1989/田 中	20・女	CT, MRI	咬筋内血管腫	乳様突起下端下顎下縁	90×40×20
1990/三 宅	38・女	X-P, CT, echo 耳下腺造影	咬筋部勃起性血管腫	顎下部	12×10×7

図7 Obwegeser-Beckers法

口腔内より下顎枝前縁上方部から下顎第一大臼歯付近の歯肉頬移行部までの粘膜切開をし、下顎枝および下顎体外側の骨膜上剝離と咬筋付着部の切離を行う。咬筋の深層と中間層を水平に切斷する。

に、口外法が12×10×7 mm の例⁹⁾に施行されており、必ずしも大きさによる選択のみではなく、術者の技量や慣れに負うところが大きいと考える。

口内法と口外法を比較すると、口内法は、顔面皮膚に瘢痕が残らないという術後の審美的側面から見て優れた手術法であり、顔面神経下顎縁枝を損傷する危険性が少ない特徴がある¹³⁾。しかし厳密な意味で術中の腫瘍存在部位の確認が困難であり⁷⁾、その他の顔面神経枝が損傷される危険性はある²⁾。口外法は、術野が広く安全性の高い手術であるが、審美的障害は避け難い(表3)。

筋肉内血管腫では外科的切除が最も確実な治療法であるが、不十分な切除による術後再発率が約20%に認める¹⁵⁾との報告もあり、いずれの方法を採ろうとも健常筋組織を含めた十分な切除が必要である。また、術前に血管造影を行い栄養血管が同定できた場合、選択的栄養血管塞栓術を施行しておく術中の出血量を減らすことが可能である⁹⁾¹¹⁾。

表2 本邦(1980年以降)における切開法

口外法	12
下顎下縁切開	4
耳介下部～下顎下縁切開	3
腫瘍部(頬部)切開	3
S字状切開(耳下腺手術に準ずる)	1
耳介前有髪部切開	1
口内法	8

表3 アプローチ法(口内法と口外法)の比較

	口内法	口外法
術後の審美障害の可能性	－	＋
術野	狭い	広い
術野の無菌操作	不可	可
顔面神経枝同定の難易	難	易
ステノン管損傷の可能性	＋	－
術中の腫瘍存在部位の確認	難	易

(田中⁹⁾らの表を一部改変)

結語

44歳、女性の右咬筋内血管腫を1例経験した。診断を確認するという意味において、CTは有用であった。1980年以降の本邦報告例において、特に手術のアプローチ法についてまとめ、若干の文献的考察を加えた。

文献

- 1) Jenkins HP, Delaney PA : Benign angiomatous tumors of skeletal muscles. Surg Gynecol Obstet 55 : 464-480, 1932.
- 2) Welsh D, Hengerer AS : The diagnosis and treatment of intramuscular hemangiomas of the masseter muscle. Am J Otolaryngol 1 : 186-190, 1980.
- 3) 佐々木研一, 野間弘康, 柿沢卓 他 : 勃起性咬筋血管腫の4症例. 日口外誌 34 : 1619-1626, 1988.
- 4) 熊澤博文, 田辺正博, 田中信三 : 頬部血管腫—興味ある所見を呈した1例—. 耳喉 58 : 15-19, 1986.
- 5) 筑丸寛, 青木伸二郎, 石川好美 他 : 勃起性咬筋血管腫の1症例. 日口外誌 33 : 2459-2465, 1987.
- 6) 若森実, 川野芳春, 石井友行 他 : 咬筋部に発生した勃起性血管腫の2例. 日口外誌 35 : 217-220, 1989.
- 7) 中島嘉助, 大沢幸世, 篠崎文彦 : 咬筋部勃起性血管腫の1例に対する治療. 日口外誌 35 : 1929-1934, 1989.
- 8) 三宅実, 長島駿一郎, 鶴田敬司 他 : 勃起性咬筋血管腫の1症例. 日口外誌 36 : 558-565, 1990.
- 9) 田中利善, 市村恵一 : 咬筋内血管腫の1症例. JOHNS 5 : 1299-1305, 1989.
- 10) 市村恵一, 田中利善, 北原伸郎 : 咬筋に対する外科的アプローチ—文献的考察—. 耳鼻臨床 82 : 1209-1219, 1989.
- 11) 岩渕史郎, 松井和夫, 鈴木郁子 他 : 咬筋内血管腫の1例. 第2回日本頭頸部外科学会講演, 1992.
- 12) Beckers HL : Masseteric muscle hypertrophy and its intraoral surgical correction. J. max. mf. Surg. 5 : 28-35, 1977.
- 13) 高橋庄二郎 : 咬筋肥大症の手術. 図説口腔外科手術学(大谷隆俊, 園山昇, 高橋庄二郎 編) : 729-731, 医歯薬出版株式会社, 東京, 1989.
- 14) 尾崎佳孝, 林尚徳, 難波まゆみ 他 : 口内法による勃起性咬筋血管腫の摘出手術. 日口外誌 35 : 563-569, 1986.
- 15) 井上耕, 宮田守, 森田守 : 術前診断が可能であった咬筋内血管腫の1例. 耳喉 59 : 399-403, 1987.

Abstract

A case report of intramasseteric hemangioma

Ken-ichiro Ishio, Mitsuya Suzuki, Yoshiharu Hirota, Keiichi Ichimura, Toshitaka Inuma

A 44 years-old Japanese female was seen with the chief complaints of right cheek swelling.

At the initial visit, a subcutaneous diffuse swelling, measuring 40mm in diameter, was seen in the right masseter muscle region. The swelling revealed itself as an elastic soft mass immediately following the contraction of masseter muscle by chewing or biting hard, without spontaneous pain or tenderness. The mass disappeared soon after the muscle relaxation. No bruit or palpable pulsation was present over the mass.

Such imaging modalities were done preoperatively as ultrasonography and dynamic enhanced CT.

The physical examination was otherwise normal.

Preoperative diagnosis of hemangioma of the right cheek was obtained by clinical findings and imaging modalities.

Surgery was performed under general anesthesia, the mass lesion removed by extraoral approach and the tumor, measuring $30 \times 17 \times 15$ mm, was located on the right masseter muscle. Phlebolith, measuring 5mm in diameter, was found within the tumor.

Histopathological diagnosis was intramuscular hemangioma.

As of 15 months after surgery, the patient follows an uneventful course with neither complications nor signs of swelling at contraction of the masseter region and of recurrence.

Key words : intramasseteric hemangioma, phlebolith, dynamic enhanced CT, intraoral approach, extraoral approach