経耳下腺法による副咽頭間隙腫瘍の摘出

海野徳二 野中 聡 中島 築 坂東伸幸 荒川卓哉

要旨: 42歳女性の症例を引用して、副咽頭間隙腫瘍の術前検査と経耳下腺腫瘍摘出術について述べた。画像診断としてはCT, MRI がよく用いられる。血管造影は、血管と腫瘍との関係を把握し、腫瘍内血流状態を知るのに重要である。また、内頸動脈閉塞試験 (Matas' test) も必要な検査法である。経耳下腺法は、皮膚切開が比較的小さく、術後の機能障害が少ない手術法である。神経鞘腫では、発生母地の神経保存の可否について議論があり、理論的には保存し得る。しかし、個々の症例によって異なり、術中の適切な判断を要する。

Keywords: 副咽頭間隙腫瘍, 経耳下腺法, 神経鞘腫

はじめに

副咽頭間隙腫瘍は、発生部位、大きさ、性状が多様で、或る定まった手術様式をどの症例にも当てはめることはできない。頭蓋底に達している、かなりの大きさの、血管に富んだ浸潤性の腫瘍に対しては、下顎離断によって十分な視野を得ても極めて困難な手術となる。逆に、顎下腺直上にある、あまり大きくない、剝離しやすい腫瘍の場合は、容易な手術手技となる。したがって、どのような腫瘍であるかの術前診断が非常に重要になるが、画像診断の進歩により詳細な情報が得られるようになった^{1~4)}。

第4回日本頭頸部外科学会サテライトシンポジウムで供覧したVTRは一人の症例についての記録で、その個人の手術を示したものに過ぎない。しかし、この手術を計画するに当たっては術前に十分な検査を行い、その情報を活用して決めたものであるから、この種の腫瘍を取り扱う概略を掴み、類似の症例へ応用することは可能であると考え発表する。

症例と検査所見

女性、42歳。当科初診は1993年11月11日。10月中旬に左耳下部の膨隆に偶然気づき、翌日近くの病院耳鼻科を受診。CT検査を受け、副咽頭間隙腫瘍を疑われて紹介された。その他の自覚症状は全くない。

左顎角部の高さに表面平滑な円形の腫瘤を触れる。深在性で辺縁は不明瞭。可動性もはっきりしない。左軟口蓋、咽頭側壁に軽度の膨隆がある。脳神経には異常を認めない。CT像では茎状突起を前外方に押し出すように、内部陰影不均等な腫瘍が存在し、耳下腺とは境界がある。artifactのために全体像や血管との関係が明らかではない。MRIでは境界明瞭な腫瘍があり、T₁WIでは筋よりやや強く、Proton DIとT₂WIとでは高信号、Gd-DTPAによってcontrast enhancement陽性を示した(図1)。腫瘍内にT₂WIで高信号領域が存在している。内頸動脈は内側に圧排されていて、内頸静脈は認められない。冠状断像では、腫瘍は頭蓋底までは達せず、咽頭壁との境界も明瞭である(図2)。総頸動脈造影では、頸部内頸動脈は内側に弧状に偏位して、分岐直上部から後頭動脈が後上方へ走る(図3)。腫瘍辺縁よりfeedingがあり、早期動脈相から造影されるが、毛

* 旭川医科大学耳鼻咽喉科学教室 (1994. 3. 30 受付)

図1：Gd-DTPA 造影のMRI 矢印は内頸動脈

図2：冠状断MRIによる腫瘍の位置の確認

図3：左総頸動脈血管造影 矢印は内頸動脈

細血管相での濃染はなく、静脈相で貯留はあるが早期静脈内造影は見られない。腫瘍への血液供給は内頸動脈性と判断された。内頸静脈は造影されないで閉塞しているとみなされた。他日施行の ^{99m}Tc -HMPAO 脳血流スキャンで、バルーンによる左内頸動脈閉塞テストでは、両側脳血流分布には明らかな左右差は見られず、限局性異常もなく、側副血行路による良好な血液供給があると判定された。

手術と術後経過

手術はtransparotid approach によって行った⁵⁾⁶⁾。耳前部から顎下部までS字状に皮膚を切開したが、下方端を延長すれば頤から下口唇正中切開が可能な方向とした。これは下顎を離断しなくてはならない場合を考慮したものである。顔面神経幹を同定し、神経を遊離して浅葉を翻展し、深葉は必要に応じて切除する。この症例では、胸鎖乳突筋前縁から腺被膜を剥離する段階で、腫瘍が顎二腹筋との間に存在することが確認された。顎二腹筋と腫瘍とを剥離すると、腫瘍の表面に沿って動脈が後上方に向かって走っていることが認められ、外頸動脈からの分枝であることを確かめた上切断した(図4)。顔面神経幹を露出し、下枝に沿って剥離すると後顔面静脈に達した。本症例では腫瘍は上方には進展していないので、上枝、中枝付近の剥離は行わなかった。頸動脈分岐部直上では、動脈の上を横切る舌下神経が存在した。外頸動脈は浅層を、内頸動脈は深層を上方に向かって走行し、その途中で腫瘍被膜に栄養血管と思われる多くの細い枝を出し、これらを結紮・切断していくと周囲からの可動性が増大したが、下側方では、かなり太い索状物が腫瘍内を貫通するごとく存在した(図5)。

この索状物は迷走神経で、これを腫瘍から剥離することは不可能であったので、テープをかけて

図4：露出された腫瘍表面（略号は全図に共通）

TRG 耳珠, PAR 耳下腺, MSC 胸鎖乳突筋,
MDG 顎二腹筋, AOC 後頭動脈

図5：腫瘍と周囲の血管・神経

NVII 顔面神経, VFP 後顔面静脈, T 腫瘍,
NXII 舌下神経, NX 迷走神経, ACE 外頸動脈,
ACI 内頸動脈, RDS 舌下神経下行枝

挙上し切断した。この操作によって腫瘍は深部からも外方からも容易に剝離されることになった。舌下神経は被膜から剝離した（図6）。周囲から剝離した腫瘍は上方に持ち上げられたが、上深部の一部で盲目的な用手剝離が強いられ、翼突静脈叢からの出血があったが、容易に止血することができた（図7）。腫瘍摘出後の創面を8図に示す。腫瘍は胸鎖乳突筋と顎二腹筋とに囲まれて、その深部にあり、内頸動脈に接してそれを内側に圧排していた。舌下神経は下行枝も確認され腫瘍被膜から完全に剝離された。内頸静脈は消失していた。止血を確認し、ドレーンを1本挿入し、耳下腺浅葉を元に戻して、腺被膜と胸鎖乳突筋前縁とを縫合固定し、皮膚は二層に縫合した。術後に嘔声と誤嚥を来したが、短期間に代償され、その他の点では問題なく順調な経過で回復し退院した。

図6：迷走神経の切断

図7：腫瘍挙上後の内頸動脈走行

図8：腫瘍摘出後の創面

考 察

副咽頭腫瘍の術前検査の主目的は、腫瘍の存在部位と性状とを正確に把握し、適切な手術手技の選択に役立たせることである。そのために、CT、MRI、Scintigraphy、超音波検査などの画像診断が広く利用されている。この間隙は茎状突起を境として前区と後区とに区分される。血管、神経などの重要臓器が位置するのは後区であるから、後区発生の腫瘍には一般に複雑で困難な手術手技が要求される。CT 水平断像が一般的であるが、金属歯冠装着などによる artifact があり、必ずしも全例で確診が得られるわけではない。MRI はこの点を補い、冠状断像も容易に得られるので高さの判定にも有用である。どちらか一方で情報量が十分であれば両方法を併用する必要はないが、二つを対照しながら判断すれば診断価値は一層大きくなる。本症例には超音波検査、Scintigraphy は用いていないが、症例によっては有用な検査となる。血管造影は、血管と腫瘍との位置関係や腫瘍内の血流状態を知る上で重要である。副咽頭間隙腫瘍ではやむを得ず内頸動脈を結紮しなければならないこともあるから、術前の側副血行路の確認は是非ともやっておきたい検査の一つである。また、状況によっては術前の embolization は術中の出血を減少させる。本症例では feeding artery が内頸動脈性 vasa vasorum と判断されたためこの操作は行っていない。

術前に組織型が判明していれば手術操作に有利であることは言うまでもなく、生検、殊に針生検が行われることもあるが、神経性腫瘍に対する針生検の確診率は高くはなく、画像診断による発生部位の推定や、血管造影による vascularity の状態を参考にすれば、腫瘍性状の把握はある程度可能なので、生検絶対必要症例は限られてくる。

手術操作ではアプローチ法が最初に決定されねばならない。顎下部の皮切だけで到達可能な腫瘍もあるが、下顎離断や口腔粘膜切開を要するものもあって、mandibular swing と呼ばれている⁷⁻⁹⁾。経耳下腺法は顎下部切開に比べれば切開線がやや長くはなるが、耳下腺深葉に達するのが容易であり、深葉組織を除去すれば直接副咽頭間隙に到達できるという利点がある。この場合に障害物になるのは顔面神経であり、回避できなければ術中には鋭利に切断し、腫瘍摘出後に縫合する。これによって視野は確実に拡大する。

神経鞘腫では、発生母体の神経を残せるか否かの議論がある¹⁰⁾。本症例では迷走神経を切断したために術後脱落症状が出現した。組織的には、腫瘍被膜に神経が付着した付近に節細胞が分布していて、このために剝離が不可能であったと思われる。神経鞘腫の発生母地から考えると、理論的に

は神経線維からの分離が可能であるが、無理な操作は腫瘍残存の危険も伴い、切断は避けられても必ずしも機能回復が期待できるとは限らない。端々吻合、神経移植も含めて術中の適切な判断を要する。

副咽頭間隙腫瘍で手術上の困難が予想されるものは、1) 頭蓋底に接して高位置にある腫瘍、2) 血流豊富な腫瘍、3) 再発腫瘍、4) 悪性腫瘍、5) 巨大腫瘍、などとなる。これらは病歴や術前検査によつて的確に判断される事柄であつて、必要な検査を省いて情報が得られないままに手術することは最も慎むべきことである。疾患名は同一であつても幾通りもの手術手技を使い分けなければならない疾患である。

ま と め

42歳女性の症例を引用して、経耳下腺法による副咽頭間隙腫瘍摘出術について述べた。この方法は耳下腺深葉腫瘍摘出術と殆ど同じ手技であるので、皮膚切開創も目立たず、咬合不全などの術後機能障害をきたすこともない。しかし、頭蓋底に及ぶ場合などには術野が狭く到達困難なことがある。この腫瘍は、部位、性状などによつて手術の難易度が著しく異なるので、術前検査によつて十分な情報を得て必要な準備をして、最も適切な方法を選択しなければいけない。

文 献

- 1) 海野徳二他：シンポジウムII．副咽頭間隙の臨床．口咽科6：21-26, 1993.
- 2) Tom BM, Rao VM, Guglielmo F: Imaging of the parapharyngeal space: Anatomy and pathology. Crit Rev Diagn Imaging 31: 315-356, 1991.
- 3) Babbel RW, Harnsberger HR: The parapharyngeal space: The key to unlocking the suprahyoid neck. Sem Ultrasound CT MR 11: 444-459, 1990.
- 4) 加瀬康弘, 山根雅昭, 市村恵一他：副咽頭間隙の画像診断—CT と MRI の比較—日耳鼻 95: 655-664, 1992.
- 5) Stell RM, Mansfield AO, Stoney PJ: Surgical approaches to tumors of the parapharyngeal space. Am J Otolaryngol 6: 92-97, 1985.
- 6) 海野徳二：副咽頭間隙の腫瘍切除法．JOHNS 3: 1197-1203, 1987.
- 7) Baker DC, Conley J: Surgical approach to retromandibular parotid tumors. Ann Plast Surg 3: 304-314, 1979.
- 8) Flood TR, Hislop WS: A modified surgical approach for parapharyngeal space tumours: Use of the inverted "L" osteotomy Brit J Oral Maxillofac Surg 29: 82-86, 1991.
- 9) Clayman GK, Adams G.L: Modification of the mandibular swing for preservation of occlusion and function. Head & Neck 13: 102-106, 1991.
- 10) Park CS, Suh KW, Kim CK: Neurilemmomas of the cervical vagus nerve. Head & Neck 13: 439-441, 1991.

Abstract : Transparotid extirpation of parapharyngeal space tumor

Tokuji Unno, MD, et al.

Department of Otolaryngology, Asahikawa Medical School

Quoting a 42 year old female patient, transparotid extirpation of a parapharyngeal tumor was described. She was introduced to our department because of left infraauricular swelling noticed two weeks previously. From the findings of preoperative examinations including CT, MRI, carotid angiography and Matas' test, the tumor was diagnosed as being situated both in the pre- and poststyloid portions of the parapharyngeal space, pushing the internal carotid artery medially, being fed by vasa vasorum of the internal carotid artery. The collateral pathway to the brain was kept in good condition.

The surgical procedures were as follows. A skin incision was made from the preauricular to the submandibular regions. After detaching the parotid capsule from the anterior border of the sternocleidomastoid muscle, the surface of the tumor was identified under the digastric muscle. The trunk of the facial nerve was identified and the inferior ramus was torn to the posterior

facial vein. The hypoglossus nerve was preserved but the vagus nerve was cut because of tight adhesion to the tumor. With many ligations of the feeding vessels, the tumor was successfully extirpated. It was histologically a neurinoma. A postoperative course was uneventful except for slight hoarseness and aspiration, which were compensated within a few weeks.

A most adequate surgical technique should be chosen from the findings of preoperative examinations as to localization, size, vascularity and pathology.

Key words : Parapharyngeal tumor, Transparotid, Matas' test, Neurinoma