側頭骨原発悪性腫瘍

— 治療方針決定までの効果的な方策 —

岸 本 誠 司

要旨 側頭骨悪性腫瘍に対する適切な治療方針を決定するためには腫瘍進展度の正確な把握とそれに基づいて手術適応を正しく決定することが重要である。

そこで、MRI および CT を中心とした画像から得られる腫瘍進展に関する詳細な情報を進展方向別に整理し、新しい T 分類案を呈示した。さらに、本腫瘍に対する様々な術式を、外耳道全摘術、側頭骨部分切除術、側頭骨亜全摘術および側頭全骨摘術にまとめなおし、それぞれの術式に対する適応を腫瘍進展度別に検討した。

キーワード：側頭骨悪性腫瘍，進展度分類，術式，手術適応

Summary Malignant tumors of the temporal bone ; Staging proposal and appropriate selection of surgical treatment :

Seiji Kishimoto ¹⁾, Department of Otolaryngology, Kochi Medical School

A new staging system is proposed for malignant tumors of the temporal bone, based on findings obtained from CT scans and MR imaging. All of important anatomical sites are included in this T classification system and divided into 6 groups depending on the direction of the tumor extension. A tumor in T1 category is defined that tumor locates in the external auditory meatus (EAM) and does not infiltrate into the bony structure. A T2 tumor infiltrates into the bony part of EAM but does not extend into the middle ear. A T3 tumor locates within the temporal bone including the middle ear. A T4 tumor extends beyond the temporal bone.

Using this staging system, appropriate selection of the surgical treatment for the malignant tumors of the temporal bone was investigated.

Key Words : Temporal bone cancer, Staging, Surgical treatment

---

はじめに

外耳も含めた側頭骨原発悪性腫瘍については病期分類が確立されておらず、そのため治療方針の選択についても適切な基準は定まっていない。

そこで本稿では、進展度分類，手術術式の選択

基準に関する新しい提案を行い，治療方針決定に至るまでの適切な方策について検討する。

進展度分類

CT, MRI などの画像診断法の確立されていなかった時期には、側頭骨悪性腫瘍に関する進展度の評価は大まかにしか行うことができず、3段階の分類が一般的であった¹⁾。すなわち、外耳道に

---

*高知医科大学耳鼻咽喉科（現 国立がんセンター東病院頭頸科）

限局した第1期，骨の軽度の破壊や中耳への浸潤の見られる第2期，さらに側頭骨深部や側頭骨外にまで進展した第3期である。しかし最近では，画像検査法の進歩によって腫瘍進展度のより詳細な把握が可能になるとともに，頭蓋底外科をはじめとした手術手技の向上により手術適応が拡大されてきたため，正確な腫瘍の進展度分類が必要となってきた。しかし，これまでにこの様な要求に応えられるような病期分類はほとんどなく，わずかに Arriaga らが CT 所見をもとにした T 分類案を提唱しているのみであった²⁾。

そこで，筆者は CT および MRI 所見を参考にした側頭骨悪性腫瘍の病期分類試案を作成した(図1)³⁾。この病期分類の特徴として，以下の様な点が挙げられる。

1) 側頭骨悪性腫瘍の進展範囲を把握するために重要な解剖学的チェックポイントが全て含まれている。

2) 側頭骨悪性腫瘍は様々な経路をたどって側頭骨外へ進展して行くが，それらの進展経路を考慮しながら進展方向別にチェックポイントが分類されている。

3) CT および MRI から得られる多くの画像情報をもれなくチェックし，かつ1枚の図で示すことができ，容易に腫瘍の進展状況を把握できる。

4) 予後の悪い中耳癌は，はじめから T₃とされている。

5) 試案では側頭骨外進展を一括して T₄としているが，今後さらに細分化していくことができる。

本分類は以上のような特徴を有していることから，側頭骨悪性腫瘍の適切な治療法の選択，予後の判断，治療成績の比較検討などに有効に利用できると考える。

リンパ節転移

側頭骨悪性腫瘍はリンパ節転移の頻度が少ないといわれているが側頭骨外進展例や皮膚浸潤例ではしばしばリンパ節転移を伴う。その転移経路は他の頭頸部腫瘍とはやや異なる(図2)。特に，後頭部，耳下腺部，副咽頭間隙などの領域のリンパ節は触知しえないことが多く，MRI，CT などによる画像情報が重要となる。原発部位の手術を予定する場合，併せて検索しておくことが必要である。

図2 側頭骨悪性腫瘍の頸部リンパ節転移経路

手術術式と適応

本疾患の治療については，治癒的切除が可能であれば手術が第1選択となり，術式の選択が重要

T分類 進展方向	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
	側頭骨内			側頭骨外
	外耳道限局 骨浸潤なし	骨部分浸潤	外耳道骨壁 を越える	側頭骨周囲 頭蓋内
後方		後壁	乳突蜂巣 → S状静脈洞	→ 後頭蓋窩 → 硬膜 → 小脳
上方		上壁	→ (鼓室天盖)	
前方		前壁 → (Santorini切痕)	→ 顎関節窩 卵円孔・棘孔 側頭下窩	→ 中頭蓋窩 → 硬膜 → 側頭葉
下方		下壁	下鼓室 顔面神経管	
内方		→ (鼓膜)	→ 鼓室 耳小骨	
外方		→	耳介	側頭部皮膚、耳下腺、側頭筋、胸鎖乳突筋

図1 側頭骨悪性腫瘍の病期分類案 (岸本³⁾を改変)

となる。しかし、術式についての統一した名称、分類や適応基準などについてはまだ確立されていない。

主要な術式を整理すると、以下の様に分けられる (図3)。さらに、扁平上皮癌を対象とした場合の手術適応について検討を加える。なお、T分類については筆者試案 (図1) を用いた。

1) 外耳道全摘術⁵⁾

骨部および軟骨部外耳道を鼓膜、槌骨および砧骨と共に一塊として摘出する術式である (図4 A-D)。

図3 側頭骨悪性腫瘍の手術とその手術範囲
(岸本⁴⁾を改変)

A: 外耳道全摘術, B: 側頭骨部分切除術,
C: 側頭骨亜全摘術, D: 側頭骨全摘術
FN: 顔面神経, JV: 内頸静脈, CA: 内頸動脈

筆者の進展度分類試案の T₁症例および腫瘍浸潤が外耳道骨壁全層におよんでいない T₂症例が適応となる。ただし、基底細胞癌の場合は軟部組織の切除と骨部外耳道の部分的な削開で十分と考えられる。

2) 側頭骨部分切除術 (Partial Temporal Bone Resection)⁶⁾

外耳道全摘を行うと共に、側頭骨を削開して病変部を切除していく術式である (図5 A-D)。この場合、内耳および顔面神経は温存される。

Medina らは本術式を外側側頭骨切除術 (Lateral Temporal Bone Resection) と命名し腫瘍の進展度に応じて側頭骨の切除範囲を4型に細分類した⁷⁾。さらに、錐体尖端部も含めて広範囲に削除していく術式も提唱されている⁸⁾。

本術式では T₂症例に対しては治癒的切除となりうるが、T₃症例に対しては、腫瘍の分割切除となるため非治癒的切除となる。術後照射の有効性については賛否両論がある^{9,10)}。

3) 側頭骨亜全摘術 (Subtotal Temporal Bone Resection)¹¹⁾

内頸動脈の走行する錐体尖端を除き側頭骨を一塊切除する術式である。

T₃症例に対しては治癒的切除が可能でありよい適応となる。さらに、T₄症例においても良好な成績が報告されるようになってきている^{10,12)}。今後の問題は、T₄症例の内どのような症例に対し本手術の適応とすべきかである。

4) 側頭骨全摘術 (Total Temporal Bone Resection)¹³⁾

錐体尖端部まで進展した症例に対し、内頸動脈も含み側頭骨を全摘する術式であるが、根治性、術後合併症などの面から手術適応となる症例は少ないものと思われる¹⁰⁾。

以上、扁平上皮癌を中心とした側頭骨悪性腫瘍の手術適応についてまとめると図6のようになる。すなわち、実線で結んだように T₁は外耳道全摘術、T₂は外耳道全摘術あるいは側頭骨部分切除術、T₃は側頭骨部分切除術あるいは側頭骨亜全摘術、T₄は側頭骨亜全摘術あるいは手術適応外と考えられる。点線で結んだ術式は特殊な場合にのみ適応となると考えられる。

おわりに

側頭骨悪性腫瘍に対する適切な治療方針を決定するためには、多くの画像情報から腫瘍進展度を正確に漏れなく把握し、さらにそれに基づいて術式の適応を正しく決定することが重要である。そのため、本稿で呈示した腫瘍進展度分類案は有用と考えられる。

図6 側頭骨悪性腫瘍の手術術式と適応

図4 外耳道全摘術

- A: 皮切線
- B: 外耳道全摘術後
- C: 摘出標本
- D: 術後創部

図5 側頭骨部分切除術

- A : 皮切線
- B : 側頭骨部分切除術後
- C : 摘出標本
- D : 術後再建

引用文献

- 1) Goodwin WJ, Jesse RH : Malignant neoplasms of the external auditory canal and temporal bone. Arch Otolaryngol 106 : 675-679, 1980.
- 2) Arriaga M, Curtin H, Takahashi H, et al : Staging proposal for external auditory meatus carcinoma based on preoperative clinical examination and computed tomography findings. Ann Otol Rhinol Laryngol 99 : 714-721, 1990.
- 3) 岸本誠司：中耳の早期癌の診断と治療. JOHNS 13 : 585-588, 1997.
- 4) 岸本誠司：外耳道の悪性腫瘍. JOHNS 8 : 887-890, 1992.
- 5) Crabtree JA, Britton BH, Pierce MK : Carcinoma of the external auditory canal. Laryngoscope 86 : 405-415, 1976.
- 6) Gacek RR, Goodman M : Management of malignancy of the temporal bone. Laryngoscope 87 : 1622-1634, 1977.
- 7) Medina JE, Park AO, Neely JG, et al : Lateral temporal bone resection. Am J Surg 160 : 427-433, 1990.
- 8) Pensak ML, Gleich LL, Gluckman JL, et al : Temporal bone carcinoma : Contemporary perspectives in the skull base surgical era. Laryngoscope 106 : 1234-1237, 1996.
- 9) Kinney SE, Wood BG : Malignancies of the external ear canal and temporal bone : Surgical techniques and results. Laryngoscope 97 : 158-164, 1987.
- 10) Prasad S, Janecka IP : Efficacy of surgical treatments for squamous cell carcinoma of the temporal bone : A literature review. Otolaryngol Head Neck Surg 110 : 270-280, 1994.
- 11) Parsons H, Lewis JA : Subtotal resection of the temporal bone for cancer of the ear. Cancer 7 : 995-1001, 1954.
- 12) 毛利光宏, 長嶋達也, 田原真也 他：中耳癌に対する側頭骨摘出術. 頭頸部外科 4 : 209-216, 1994.
- 13) Graham MD, Sataloff RT, Kemink JL et al : Total *en bloc* resection of the temporal bone and carotid artery for malignant tumors of the ear and temporal bone. Laryngoscope 94 : 528-533, 1984.