二十世紀ナシの特殊整枝法における 異常葉の発生に関する研究 (第1報)

熊代 克巳
(信州大学農学部)

K. KUMASHIRO: Studies on "Ijoyo" (abnormal leaves) developed
in a certain training system of Nijisseiki pears. I.

Summary

1. It is well known in Nagano district that Nijisseiki pear trees will usually develop so-called "Ijoyo" (abnormal leaves) when the shoots continue to grow vigorously without being cut back for one or two years in Momozawa's training system. That is, leaves which spread nearly on and after the ninth node of new shoots, become narrow, thick and brittle, having faint mosaic symptoms. The shoots, with these abnormal leaves are somewhat stunted. The fruits born are inferior in their transverse growth. Their skin is partially lacked in lenticels and often have some russet stripes on the surface, though the taste is generally normal.

2. In the result of this experiment, the longer the length of vigorous shoots, and the later the ceasing of their elongation in the fall, the higher

the developing percentage of abnormal leaves on them in the following year. The location of buds which would develop to the disordered shoots with abnormal leaves after sprouting, was restricted to the tip of the vigorous shoots. So, by cutting back the vigorous shoots at their tip during the rest period, the development of the disorder was completely retarded. However, once the abnormal leaves developed on shoots, the cutting back of the shoot had no effect as a preventive measure of the disorder.

3. In any other varieties than Nijisseiki none of abnormal leaves developed, even though the shoots grew vigorously and were not cut back in the trees trained in the same system.

I. 緒 言

長野県伊那地方においては、戦後、二十世紀ナシの増植がさかんに行なわれた。そして、それらの新植樹はほとんどすべて、地元のナシ栽培の先覚者である桃沢匡勝氏の考案した新しい整枝法を採用してきた。その新しい整枝法は、苗植え付け後約3年間、主枝候補枝を直立誘引して切返し剪定を行わずに伸長させ、まっすぐに強固な主枝を早期に完成させるのが特色の1つである。しかるに、その整枝法を二十世紀ナシに適用した場合、植え付け後3年目ごろから、主枝の延長枝に原因不明の異常葉の発生することがあり、異常葉の発生した枝は生長が不良であるばかりでなく、その枝からは以後継続して異常葉が発生するので、樹形の完成に大きな支障をきたすようになった。桃沢式の新しい整枝法はその後全国的に普及したために、この障害もまた全国各地で発生がみられるようになり、重大な問題となつている。

著者はさきに、従来の整枝法ならびに桃沢式整枝法を用い、他の条件をまったく同一にして二十世紀ナシを栽培した結果、後者の場合に限つて異常葉の発生すること

を認めた。当報告では、異常葉の外部症状とともに、枝の伸長量の長短や切返し剪定の有無と障害発生との関係などについて報告することにした。

この障害については、まず桃沢氏⁽⁸⁾ (1954) が「異常生長」という名称で紹介し、ついで三浦氏⁽⁷⁾ (1958) および北島氏⁽⁴⁾ (1963) は「変葉病」という名称を用いたが、伊那地方のナシ生産者の間では両方の名称が通用している。

II. 外 部 症 状

1. 葉 の 症 状

この障害 (異常生長, 変葉病) のもつとも顕著な症状は、第1図にみられるように、新梢の中央部の葉が奇形化することである。第2図は種々の形の異常葉を示したものであるが、そのうちもつとも代表的なのは (2) の形のもので、葉身が萎縮してきわめて細く、肉厚で、表面に凹凸があり、葉質がかたくて折れやすい。そして、不鮮明なモザイク症状が認められる。第3図の写真は、透視撮影したためにモザイク症状がかなりめいりように現われている。第2図 (2) の下段は葉身全体が萎縮している場合であるが、上段のように葉身の基部から中央

1964年7月20日受理

Fig. 1. Typical appearance of abnormal shoot.

るもの（第2図（3））がまれに認められ、また、主脈付近のみがわずかに萎縮しているために葉縁にひだを生じているようなもの（第2図（4））や、主脈が彎曲しているもの（第2図（5））がかなり多く認められる。

Fig. 3. Mosaic symptoms in abnormal leaf.

部が萎縮し先端部は正常葉とほとんど変わらないような場合もある。

そのほか、主脈を中心に片側だけが萎縮している

Fig. 4. Abnormal symptoms in young leaf. Left—normal, right—abnormal.

異常葉の発生当初 2~4 週間のものは、第2図（2）

に示すような顕著な特徴をもつたものが発生するが、その後に展開するものはしだいに異常の程度が軽微になり、7月上旬以後のものは正常葉とほとんど区別のつかないのが普通である。

なお、異常葉は正常葉に比べて落葉が早い。

3. 枝の症状

枝では葉におけるような顕著な異常症状が認められないが、異常葉の発生枝は正常枝に比べて生長が劣り、はなはだしい場合には異常葉の発生と同時に伸長が停止してしまう。

異常枝の腋芽は一般に貧弱であり、その腋芽から翌年伸長する枝はほとんどすべて前年と同様に異常を呈する。第5図は、同一樹内における正常な亜主枝と異常葉が発生した亜主枝とを比較したもので、後者では发育枝の発生がきわめて少ない。

なお、異常枝を注意深く観察すると、発生の初期には毛茸を欠いた条斑の現われていることがあり（第6図）、老熟すると褐色の条斑の存することがある。しかし、これらのみによつて正常枝と

異常枝を判別することはかなり困難であり、両者の判別は、むしろ葉の着生している時期に行なうのがもつともよい。

4. 果実の症状

異常枝に着生した果実の中には、第7図に示すように部分的に果点を欠いていたり、またかつ色さび状の条斑

Fig. 2. Various types of abnormal leaves. 1—normal, 2~5—abnormal.

これらの異常葉は、第4図に示すように、展開を終わらない若葉の時期から、葉身の全体あるいは部分的に毛茸が欠けていて光沢があり、濃緑化するのが早いなどの点から、正常葉と容易に区別することができる。

2. 異常葉の発生し始める節位および時期

本障害においては、新梢上の葉がすべて異常を呈する

Fig. 5. Comparison of sub-main shoots grown normally (upper) and those developed abnormal shoots (lower) in the same tree.

Fig. 6. Striped symptoms in abnormal shoot.

を有するものがある。なお注意深く観察すると、花および幼果の時期に、花托および花(果)梗に縦に毛茸を欠いた条斑の認められることがある。異常果は一般に、正常果に比べて小さく、果形がやや腰高である。果実の味、肉質などには顕著な相違は認められない。

III. 枝の伸長量ならびに伸長停止期の早晩と異常枝の発生との関係

1. 幼木の場合(その1)

(1) 材料および方法

昭和31年12月に、信州大学農学部の実験圃場に、二十世紀の1年生苗30本を、3.6mの間隔で正方形植えに定植し、前報の方法⁽⁶⁾に従って、1樹あたり3本の主枝を直立誘引して4年間育成した。

栽植地の土壌は前報と同様の火山灰土壌であり、施肥量も前報とまったく同一である⁽⁶⁾。

全主枝数90本のうち30本は、植え付け後2年目の冬に切返し剪定を行なったために、この調査からは除外

Fig. 7. Striped symptoms in abnormal fruit.

した。

異常の程度の判定にあたっては次の3階級に分けた。すなわち、軽度の異常葉を着けた枝が1~2本発生している場合を軽微とし、顕著な異常葉を着生した枝が比較的少数発生している場合を中位とし、同様な枝が多数発生している場合を激甚とした。

(2) 結果

植え付け後1年目における主枝候補枝の伸長量は、35~93cmであり過半数が70~89cmであつた。そして、翌2年目に異常を呈した枝はなくすべて正常であつた。

植え付け後3年目には、主枝延長枝の過半数に異常枝が発生したが、前年の主枝伸長量と異常枝発生との関係は第1表に示すとおりである。すなわち、植え付け後2

Fig. 8. Growth of young Nijisseiki pear trees. Left: 3-year-old, photographed in Oct., 1958. Right: the same tree in June of 1959. Abnormal shoots developed from the tips of the center and right main shoots (arrows).

Table 1. Relation between the shoot growth in the second year after planting and the development of abnormal shoots in the following year. (I)

Shoot length (cm)	No. of shoots	No. of normals (%)	1959			
			No. of abnormalities			
			Light	Moderate	Severe	Total (%)
~ 109	8	8 (100)	0	0	0	0 (0)
110 ~ 119	9	6 (67)	3	0	0	3 (33)
120 ~ 129	16	5 (31)	6	5	0	11 (69)
130 ~ 139	15	4 (27)	3	4	4	11 (73)
140 ~ 149	11	0 (0)	1	5	5	11 (100)
150 ~	1	0 (0)	0	0	1	1 (100)
Total	60	23 (38)	13	14	10	37 (62)

Table 2. Relation between the date of cessation of shoot growth in the second year after planting and the development of abnormal shoots in the following year. (I)

Date of cessation of shoot growth	No. of shoots	No. of normals (%)	1959			
			No. of abnormalities			
			Light	Moderate	Severe	Total (%)
~ July 20	2	2 (100)	0	0	0	0 (0)
July 21 ~ " 25	7	6 (86)	1	0	0	1 (14)
July 26 ~ " 30	32	9 (32)	7	10	6	23 (68)
July 31 ~ Aug. 4	10	2 (20)	2	3	3	8 (80)
Aug. 5 ~ " 9	2	1 (50)	0	0	1	1 (50)
Aug. 15 ~ " 19	2*	1 (50)	1	0	0	1 (50)
Aug. 20 ~ " 24	2*	1 (50)	1	0	0	1 (50)
Aug. 25 ~	3*	1 (33)	1	1	0	2 (67)
Total	60	23 (38)	13	14	10	37 (62)

* Developed a secondary shoot.

年目における主枝候補枝の伸長量が 109cm 以下の場合には、翌3年目にそれから生長する枝はすべて正常であるが、110cm 以上の場合には、その翌年に異常枝が発生している。すなわち、植え付け後2年目の主枝候補枝の伸長量が大であるほど翌3年目においてその延長枝に異常枝の発生率が高く、また異常の程度も著しい傾向がある。

第8図は、植え付け後2年目の10月における樹の生育状態および同一樹の翌年6月における異常枝の発生状態を示したもので、2年目の生長がやや劣っていた左側の主枝は正常であるが、生長が比較的旺盛であつた中央および右側の主枝からは異常枝が発生している（矢印）。

植え付け後3年目に正常であつた主枝にも、翌4年目にはほとんどすべてに異常枝が発生した。それらの3年目における伸長量は、115~128cm であつた。

一般に、長く伸長した枝ほど伸長停止期がおそい。念のために、植え付け後2年目における主枝候補枝の伸長停止期の早晩と、翌3年目の異常枝の発生との関係を調べた結果は、第2表に示すとおりである。すなわち、2次生長した枝を除いて、植え付け後2年目における伸長停止期のおそい枝ほど翌3年目における異常枝の発生率が高い傾向が認められる。枝が2次生長した場合には、伸長停止が極端におそいにもかかわらず、翌年の異常枝の発生率がそれほど高くない。

2. 幼木の場合（その2）

（1）材料および方法

昭和32年12月に、前記と同じ実験圃場に、二十世紀の1年生苗64本を、2mの間隔で正方形植えにした。そして、窒素1、リン酸1、加里1、石灰4、苦土0.5の

施肥比率を標準区としてそのほかに窒素4倍量区、窒素倍量区、無窒素区、リン酸倍量区、無リン酸区、加里倍量区、無加里区、石灰倍量区、無石灰区、苦土倍量区、無苦土区、および無肥料区を設け、さらに、標準区に敷わらをした区、草生した区、深耕して有機質を加用した区の以上合計16試験区を設けた。整枝法は前述と同様で、主枝を1樹あたり3~4本ずつ直立誘引して伸長させた。異常の程度の判定も前述の方法に従つて行なつた。なお、植え付け後2年目の冬に、各区から1樹ずつを選んで、主枝の切返し剪定を行なつたために、それらは3年目の調査からは除外した。

（2）結果

各肥料処理区における異常枝の発生率には一定の傾向が認められず、全体を通じて伸長量の大小と異常枝の発生率との間に密接な関係が認められた。

Table 3. Relation between the shoot growth in the first year after planting and the development of abnormal shoots in the following year.

1958(the first year after planting)		1959	
Shoot length (cm)	No. of shoots	No. of normals(%)	No. of abnormal(%)
~ 89	156	156 (100)	0 (0)
90 ~ 99	37	29 (78)	8 (22)
100 ~ 109	13	7 (54)	6 (46)
110 ~	5	1 (20)	4 (80)
Total	211	193 (91)	18 (9)

i) 植え付け後2年目における異常枝の発生

前回の調査においては植え付け後2年目にはまったく異常枝を発生しなかつたが、この調査では2年目にすでに一部の枝に異常枝が発生した。植え付け後1年目における主枝候補枝の伸長量と翌2年目の異常枝の発生との関係は第3表に示すとおりである。すなわち、植え付け後1年目における伸長量が89cm以下の場合には翌2年目に異常枝はまったく発生していないが、90cm以上の場合には翌年異常を呈しているものがあり、伸長量が大きいほど異常枝の発生率が高い傾向がある。なお、この場合の異常の程度は、軽微か中程度で、著しい異常は発生しなかつた。

ii) 植え付け後3年目における異常枝の発生

植え付け後3年目には、前年の異常枝はすべて異常枝の発生を繰り返す、さらに、前年正常であつた枝の大部分から異常枝が発生した。前年すでに異常を起こしていた枝および切返し剪定をした枝を除いて、前年の伸長量と3年目の異常枝の発生率との関係は、第4表に示すとおりである。すなわち、植え付け後1年目における伸長量が119cm以下の主枝には翌3年目に異常はまったく

発生していないが、120cm以上の場合には異常が発生しており、そして、2年目の伸長量が大きいほど翌年の異常枝の発生率が高く、また異常の程度も著しい傾向が認められる。

つぎに、植え付け後2年目までは正常であつた主枝について、2年目における伸長停止期の早晩と翌3年目の異常枝の発生との関係を調べた結果は、第5表に示すとおりである。すなわち、前回の結果と同様に、植え付け後2年目における伸長停止がおそい枝ほど翌3年目の異常枝の発生率が高い傾向にあるが、伸長停止が8月21日以後の場合には、2次生長した枝を含んでいるために、翌年の異常枝の発生率がやや低くなっている。ちなみに、伸長停止期が8月21日以後であるにもかかわらず翌年正常であつた5本の主枝は、いずれも頂芽が2次生長を行なつたものである。

Table 5. Relation between the date of cessation of shoot growth in the second year after planting and development of abnormal shoots in the following year. (II)

1959(the second year after planting)		1960	
Date of cessation of shoot growth	No. of shoots	No. of normals (%)	No. of abnormal (%)
~ July 31	6	4 (67)	2 (33)
Aug. 1 ~	5	2 (40)	3 (60)
Aug. 6 ~	10	4 (33)	8 (67)
Aug. 11 ~	15	1 (4)	27 (96)
Aug. 16 ~	20	2 (5)	40 (95)
Aug. 21 ~	25	3 (7)	36 (93)
Aug. 26 ~	12*	2 (17)	10 (83)
Total	144	18 (13)	126 (88)

* Included the shoots occurred a secondary growth.

3. 成木の場合

Table 4. Relation between the shoot growth in the second year after planting and the development of abnormal shoots in the following year. (II)

1959(the second year after planting)		1960				
Shoot length (cm)	No. of shoots	No. of normals(%)	No. of abnormal			
			Light	Moderate	Severe	Total(%)
~ 119	8	8 (100)	0	0	0	0 (0)
120 ~ 129	5	3 (60)	1	1	0	2 (40)
130 ~ 139	14	3 (21)	4	5	2	11 (79)
140 ~ 149	20	2 (10)	8	5	5	18 (90)
150 ~ 159	48	1 (2)	13	15	19	47 (98)
160 ~ 169	42	1 (2)	12	9	20	41 (98)
170 ~	7	0 (0)	1	3	3	7 (100)
Total	144	18 (13)	39	38	49	126 (88)

(1) 材料および方法

信州大学農学部付属農場に栽植されている二十世紀樹のうち異常葉がまったく発生していない樹3本を選び、それらの主枝を育成する目的で、昭和35年から、20本の発育枝を幼木における主枝育成の場合と同様の方法で、直立誘引して切返し剪定を行わずに2年間伸長させた。そして、

3年目における異常枝の発生率を調査した。

2. 結果

亜主枝育成開始後1年目の伸長量は93~121cmであつたが、翌2年目にはまったく異常枝を発生しなかつた。

3年目には、多数の枝から異常枝が発生したが、この場合の前年の伸長量との関係は、第6表に示すとおりである。

Table 6. Relation between the length of shoots in the second year after giving up their cutting back and the development of abnormal shoots in the following year.

Shoot length (cm)	No. of shoots	In the following year	
		No. of normals(%)	No. of abnormals(%)
100 ~ 109	3	3 (100)	0 (0)
110 ~ 119	4	3 (75)	1 (25)
120 ~ 129	4	2 (50)	2 (50)
130 ~ 139	5	1 (20)	4 (80)
140 ~	4	0 (0)	4 (100)
Total	20	9 (45)	11 (55)

すなわち、幼木における主枝育成の場合とほぼ同様に、亜主枝育成開始後2年目に110cm以上伸長した枝には異常枝を発生するものがあり、伸長量が大であるほど異常枝の発生率が高い傾向が認められる。

IV. 異常枝の発生に対する切返し剪定の効果

1. 異常枝の発生前における切返し剪定の効果

(1) 材料および方法

前述の昭和31年12月に植え付けた樹について、植え付け後2年目に130~149cm伸長した主枝30本を選んで、その年の冬に、5、15および30cm程度の3段階の切返し剪定を行ない、3年目における異常枝の発生状態を調査した。

また、昭和32年12月に植え付けた樹においては、Table 7. Effect of the cutting back of shoots in the second year after planting on the development of abnormal shoots in the following year. (I)

Length of cutting back (cm)	No. of shoots	In the following year	
		No. of normals(%)	No. of abnormals(%)
0*	26	4 (15)	22 (85)
5	10	7 (70)	3 (30)
15	10	9 (90)	1 (10)
30	10	10 (100)	0 (0)

* Cited from table 1.

植え付け後2年目の冬に合計49本の主枝について、頂芽から9芽目まで、長さにして約20cmだけ切返し剪定し、3年目における異常枝の発生状態を調査した。

(2) 結果

植え付け後2年目のほぼ同程度に伸長した主枝を種々の程度に切返し剪定した場合の、翌年の異常枝の発生率は第7表に示すとおりである。なお参考までに、無剪定の場合の異常枝の発生率を第1表から引用した。それによると植え付け後2年目の冬に切返し剪定した枝は明らかに異常枝の発生率が低い。そして、切返しの程度が強いほど翌年の異常枝の発生率が低い傾向にあり、約30cmも切返した枝は、まったく異常が認められない。

Table 8. Effect of the cutting back* of shoots in the second year after planting on the development of abnormal shoots in the following year. (II)

Shoot length before cutting (cm)	No. of shoots	In the following year	
		No. of normals(%)	No. of abnormals(%)
130 ~ 139	6	6 (100)	0 (0)
140 ~ 149	7	5 (71)	2 (29)
150 ~ 159	17	10 (59)	7 (41)
160 ~ 169	19	8 (42)	11 (58)
Total	49	29 (59)	20 (41)

* Approximately 20 cm.

つぎに、植え付け後2年目における伸長量が130~169cmであつた主枝について、一様に頂芽から9芽目まで、長さにして約20cm切返し剪定を行なつて、3年目における異常枝の発生率を調べた結果は第8表に示すとおりである。すなわち、第4表の結果と対比すると明らかなように、植え付け後2年目の冬に切返し剪定を行なつた主枝は無剪定のものに比べて、翌3年目の異常枝の発生率ははるかに低い。また、植え付け後2年目における伸長量が139cm以下の主枝では、約20cm切返すことによつて翌年の異常枝の発生を完全に防止しているが、伸長量が140cm以上の場合には、その程度の切返しでは異常枝の発生を防止できないことがわかる。

2. 植え付け後3年目における異常枝の発生分布

前述のように、枝の先端部を前もつて剪除すると異常枝の発生率が顕著に減少するが、これは、異常枝を発生する原因が枝の先端部に局在しているからだと思われる。切返しを行なわない場合でも、翌年、先端部の芽から生長する枝のみが異常となり、比較的下方の芽から生長する枝はすべて正常であるように思われたので、その点を明確にするために次の調査を行なつた。

(1) 材料および方法

前述の昭和 32 年 12 月に植え付けた樹のうち、植え付け後 2 年目までは正常で 3 年目に初めて異常枝が発生した 126 本の主枝について、3 年目には頂枝のみを強く伸長させることなくできるだけ多数の枝を発生させ、どの位置の芽から異常枝が発生するかを調査した。

(2) 結果

植え付け後 2 年目に伸長した主枝候補枝の平均節数は約 42 節であつたが、翌 3 年目に各節の芽から発生した枝の異常枝発生率を示したのが第 9 図である。すなわち植え付け後 2 年目に伸長した枝の頂芽から発生した枝はほとんどすべて異常となつているが、下方の節位ほど異常枝の発生する率が低くなつており、先端から数えて 21 節目以下の芽から発生した枝はすべて正常であつた。そして、前年の伸長量が大きくあるほど異常枝の発生本数が多く、より下部の節位まで異常枝が分布している傾向にあつた。

Fig. 9. Distribution of abnormal shoots in the third year after planting.

なお参考までに、頂芽からの節数と頂芽からの距離との関係を示すと、頂芽から 5, 10, 15 および 20 節目の頂芽からの距離は、それぞれ約 4, 22, 42 および 62 cm であつた。

第 10 図の写真は、植え付け後 3 年目の 6 月に撮影したもので、先端部から発生した 2 本の新梢だけが異常伸長し、それ以下の新梢は正常であることを示している。

3. 異常葉の発生後における切返し剪定の効果

信州大学農学部付属農場に栽植されている 26 本の二十

Fig. 10. Development of abnormal shoots from the tip of main shoot in the third year after planting. Two shoots of the tip are abnormal and the downward shoots are normal.

世紀樹の主枝および垂主枝の頂枝のうち、異常を呈しているもの約 250 本について、昭和 33 および 34 年に、無剪定の場合、中央部のもつとも顕著な異常葉が着生している部位まで切返した場合、および基部の正常葉が着生している部位まで切返した場合について、その翌年における異常枝発生の状態を調査した。その結果、ほとんどすべて

の枝が前年とほぼ同様に異常枝を発生し、切返し剪定の影響を認めることができなかった。

V. 桃沢式整枝法を他品種へ適用した場合

伊那地方において戦後新植されたナシ樹はほとんど、二十世紀であるが、そのほかに受粉樹として、日本ナシの八雲、早生赤、中国ナシの鴨梨、慈梨、西洋ナシのパートレット、好本号、セニョール・デスベランなどが栽植されている。そして、それらの受粉用品種についても桃沢式の新しい整枝法に従つて育成した樹が存在しているが、二十世紀におけるような異常葉はまったく発生していない。

また、信州大学農学部付属農場においても、昭和 25 年に、二十世紀と同時に、石井早生、八雲、菊水、新興、今村秋などの品種を栽植し、同様の新しい整枝法で育成してきたが、二十世紀はほとんどすべての樹に異常が認められるにもかかわらず、その他の品種にはまったく異常が認められない。

他品種における異常葉の発生の有無をさらに明確にするために、昭和 32 年 12 月、本学実験圃場に、石井早生、八雲、翠星、新世紀、長十郎、菊水および新興の 7 品種を 3 本ずつ栽植し、前述の二十世紀の標準施肥区のものと同様の取り扱いをして、異常葉が発生するかどうか

かを観察した。

その結果、植え付け後2年目における主枝候補枝の平均伸長量が、石井早生 163cm、八雲 118cm、翠星 149cm、新世紀 153cm、長十郎 157cm、菊水 155cm および新興 143cm であり、八雲を除いていずれも二十世紀に劣らない伸長程度であつたが、翌3年目に異常枝はまったく発生しなかつた。さらにその翌年も観察を続けたが、やはり異常枝の発生は認められなかつた。

VI. 考 察

幼木時代に主枝候補枝を極端に伸長させると、翌年または翌々年に異常葉を着生した枝が発生することが、本報告の結果から明らかになつた。すなわち苗植え付け後1年目の伸長量が90cm以上であると翌2年目に異常枝を発生する場合があります、さらに100cm以上であるとなんまりの高率で異常枝を発生している。また、植え付け後2年目の伸長量が110cm以上の場合には翌3年目に異常枝を発生する危険があり、140cm以上の場合には翌年ほとんどすべてが異常枝を発生している。

なお、異常葉は、苗木植え付け後2~3年目の主枝延長枝に発生するばかりでなく、それまでは全然異常が認められない二十世紀の成木において亜主枝を育成するような場合に、2~3年間切返し剪定を行なわずに極端に枝を伸長させると、やはり発生することが明らかになつた。

植え付け後1年目すなわち2年生樹の場合には、100cm以上伸長した枝を切返さないでおくとも翌年かなりの高率で異常枝を発生するが、翌2年目あるいは成木の場合には、100cm程度の枝なら切返さなくても発生しない。その理由については今のところ不明であり、今後の研究課題である。

一般に長く伸長した枝ほど伸長停止期がおそいから、枝のおそ伸びが異常の誘因になつていのではないかと考えられる。そこで、伸長停止期の早晚と翌年の異常枝の発生との関係を調べたところ、伸長量の大小の場合ほど密接な関係は認められなかつた。というのは、2次生長を行なつたために伸長停止がおくれた枝の異常枝の発生率がかならずしも高くなかつたからである。

つぎに、切返しを行なわない場合には異常枝の発生率が高く、切返しを行なえば発生率の著しく低くなることが明らかになつた。植え付け後3年目における異常枝の発生分布を調べた結果、前年伸長した枝の先端部から発生した枝のみが異常を呈したのであるから、その先端部を前もつて剪除することがその発生防止に効果のあるのは、当然である。

そこで、どの程度切返したならば発生を防止できるか

が問題になるが、本報告の結果から、強く切返しするほどその効果が高く、また、長く伸びた枝ほど強く切返しの必要のあることがうかがえる。一般に1年目の伸長量が100cm以上の場合には約5cm以上切返すのがよく、2年目には、伸長量が120cm程度の場合には約10cm、130cm程度の場合には約20cm、つまりおよそ110cmを越える分だけ切返す必要があるように思われる。なお第9図から推察すると、伸長量がきわめて大であつた場合には、翌年の異常枝の発生を完全に防止するには、頂芽から20芽目ぐらいまで、約60cm切返す必要があることがわかる。

一度異常葉が発生すると、その枝からは以後継続して異常枝が発生するようになり、現在のところその治療方法が発見されていないから、何よりもまず発生させないようにすることが重要である。そのためには、極端に枝を伸長させることを避け、さらに毎年ある程度の切返し剪定を行なう必要がある。桃沢式整枝法は二十世紀ナシの栽培上種々の点ですぐれた特色を有しているから今後も広く採用されていくと思われるが、以上の点に注意して育成すれば、異常葉を発生させることなく、樹形を完成させることができる。

異常葉の原因については今のところ不明であるが、数種のウイルス性病害類似の症状を呈していることが多い^(3,9)、また、亜鉛あるいはホウ素欠乏の場合に現われる症状にも似ていることが多いので⁽¹⁾今後はこれらの点から検討する必要がある。

なお、極端な異常葉が発生し始める時期は、いわゆる養分転換期にあたつており、体内の貯蔵養分がもつとも減少する時期であるように思われる⁽²⁾。萌芽後貯蔵養分によつて正常葉が展開し、貯蔵養分が消耗するところに異常葉が発生し始め、その後貯蔵養分がふたたび蓄積され始めるころになると葉の異常の程度が軽微になるという経過を考えると、異常葉の発生は樹体内の栄養生理と密接な関係があるようにも思われる。

VII. 摘 要

二十世紀ナシの枝を直立に誘引して旺盛に伸長させ、切返し剪定をしないと、1~2年後に原因不明の異常葉が発生する。

1. 異常葉の代表的な症状は葉身が細く肉厚で、葉質がかたく、不鮮明なモザイクが認められる。異常葉が発生し始める時期は、毎年5月下旬ごろ（長野）で、新梢基部から数えて8~10節目からである。異常の発生した部分に成つた果実は、果形が小さく腰高で、部分的に果点を欠いていたり、さび状の条斑を有するものがあるが、食味は正常果と比べてほとんど差がない。

2. 枝の伸長量が大であるほど翌年の異常枝の発生率が高い傾向にある。枝の伸長停止期の早晚と翌年の異常枝の発生率との関係は、伸長量の場合ほど密接でない。異常葉の発生した枝は生長が不良で、以後それから生長する枝には継続して異常葉が発生するようになる。

3. 初めて異常が認められた年における異常枝の発生部位は、前年生枝の先端部に限られている。したがって、枝の先端部を前もって切返し剪定しておく、異常枝の発生率が著しく低い。しかし、すでに異常を呈している枝について切返し剪定をしても、翌年の異常葉の発生を防止する効果はない。

4. 二十世紀以外の品種には、同様な取り扱いを行なっても、今までのところ異常葉はまったく発生していない。

文 献

1. CHILDERS, N. F. 1954. Fruit nutrition.
2. 林 真二・脇坂幸雄. 1956. 農及園. 31: 333—335.
3. 日高・平井・村山・与良. 1960. 植物ウィルス病
4. 北島 博・梶原敏宏. 1963. 作物病害図説.
5. 高馬 進・中山昌明. 1961. 島根農大研究報告. 9 (A-1): 33—39.
6. 熊代克巳・建石繁明. 1963. 信大農学術報告. 8: 33—41.
7. 三浦小四郎. 1958. 果実日本. 13 (4): 42—43.
8. 桃沢匡勝. 1954. 農及園. 29: 23—27.
9. POSNETTE, A. F. 1963. Virus diseases of apples and pears.
10. U. S. Dept. Agr. 1951. Virus diseases and other disorders with viruslike symptoms of stone fruits in North America.

抄 録

ジベレリンの処理時期がモモの単為結実果の肥大に及ぼす影響

ジベレリン (GA) により誘起されるモモの単為結実果の肥大、核の大きさおよび硬化の程度は処理濃度と正の相関関係にあり、250 ppm 以上では自然果と変わらないことが知られている。しかし、果実や核の大きさに変化がみられることがあり、これは GA 処理時期によつて子房の発育程度に相違があるためと考えられている。そこで、著者は8年生のモモ Rio Oso Gem 種を除雄し、50% 開花期 (3/23)、満開期 (3/29) および花卉落下期 (4/6) に GA (K塩) の 1,000 ppm を散布し子房の発育程度の相違が果実および核の肥大に及ぼす影響について調査した。

その結果、着果率は GA 処理により 16~21% 増加したが散布時期による相違はみられなかった。果実およびその核の長さは無処理果のそれと差異は認められなかったが、cheek および suture の直径は小さかった。また、処理時期が遅れるほどこれらの値は増加する傾向があり、花卉落下期処理区では無処理区との間にほとんど差がなかった。果肉の厚さには各部分とも無処理区との

間に差がなかった。核中のリグニン含量は核上半部、下半部および処理区間による差はなかったが、核の下半部の細胞の体積は GA 処理により小さくなった。これらのことは内果皮の細胞分裂期間中は果皮のそれよりも長く、また、頂部よりも基部のほうが長く続くことを示している。果実の大きさは内果皮の肥大および細胞分裂に影響されるが、内果皮の硬化は GA 処理により影響されないことを示している。果実および核の大きさの変化は GA 散布濃度、子房からの吸収および葉からの転流濃度によるものであろう。熟期は果色および可溶性固形物含量から考えると無処理区に比較して数日早かった。

以上のことから考えて、GA 処理時期は遅いほうがよく、本実験からでは花卉落下期に散布した果実が自然果に最も近かった。(稲葉昭次)

CRANE, J. C. 1963. Parthenocarpic peach development as influenced by time of gibberellin application. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci. 83: 240~247.