血小板膜糖蛋白 GP IIb/IIIa の機能と構造

田上 憲次郎*

Platelet glycoprotein IIb/IIIa complex: Functions and structure

Kenjiro TANOUE*

Key words: GP IIb/IIIa complex, platelet aggregation,
fibrinogen-binding site, thrombasthenia

はじめに

血小板の機能の大きなものの1つは、互いに接触して粘着する、即ち凝集することであるが、先天性の血小板機能異常症である血小板無力症ではこの凝集能が欠損した病態であることが知られていた。1974年 Nurden と Caen は3例の本症患者の血小板膜の SDS-polyacrylamide gel 電気泳動 (SDS-PAGE) を施行し、periodic acid Schiff (PAS) 染色にて糖蛋白を染色すると、3例に共通して正常に比して大きな欠失を発見した¹⁾。引続き Phillips ら (1975, 1977) もこれらの異常を確認し膜の糖蛋白 (glycoprotein, GP) の IIb と IIIa とが特異的に著減もしくは欠損していることを明らかにした²⁾³⁾。ここに GP IIb と IIIa は凝集機能における不可欠のファクターとして認識されるに至った。

以下、本稿では GP IIb と IIIa の機能についての最近の進歩を略述する。この進歩において見逃せない点は、実験法として交叉免疫電気泳動 (crossed immunoelectrophoresis, CIE) とモ

ノクロナル抗体を用いた研究によって多大の進歩が得られた点である。したがって本稿でもその面への比重が過重になった。

I. GP IIb と IIIa の物理化学的性質

GP IIb の SDS-PAGE (非還元下) での分子量 (Mr) は 142,000 で還元下では α 鎖 (Mr=132,000) と β 鎖 (Mr=23,000) に分れるので S-S 結合で α と β 鎖とが結合されているとされる。GP IIIa は 1 本鎖でありながら、非還元下では Mr=99,000 で、これが還元下では Mr=114,000 となり、見かけ上分子量が増大するという奇妙な現象がある⁴⁾。この還元によって S-S 結合を切断した後にむしろ見かけ上の分子量が増大するように見えるのは、その1本の polypeptide の鎖の内にも S-S 結合が含まれるためとされ、IIIa の他にも Ia, IIa および IIb α においてもみられるといわれる⁴⁾。

最近 GP IIb と GP IIIa とを精製して rotary-shadowing 法で電顕下に観察した成績では⁵⁾、GP IIb は直径 10~12 nm の globular (球状)

* 東京都臨床医学総合研究所・循環器病研究室 [〒113 東京都文京区本駒辺 3-18], The Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, Japan.

であり、GP IIIa は長さ約 30 nm の紐状のものがほぼ中央で折れ曲った部分で、 Ca^{2+} 存在下では、GP IIb の球状のものに付着した形をとっているという。

このように GP IIb と GP IIIa は 1:1 の比で存在し、後述するように heterodimer を形成していると考えられている⁶⁾。

血小板に特異的な alloantigen である Lek^a は GP IIb の上に⁷⁾、PIA¹ (Zw^a) は GP IIIa の上にあるといわれている⁸⁾。

II. 凝集における GP IIb/IIIa の役割 (血小板と fibrinogen の相互作用)

血小板を洗浄もしくはゲル濾過によって血漿蛋白成分と分離して、イオン成分の上では血漿とはほぼ同じ溶液に浮遊させても、ADP による凝集は生じないことが旧くから知られていた。当時血小板はきわめて不安定な細胞であると考えられていたので、かかる現象は洗浄またはゲル濾過の際の人工的損傷によるものと考える人々もいた。

しかし1978年 Mustard らのグループにより⁹⁾、彼等の考案した洗浄法によって洗浄したヒト血小板は、完全に人工的なメジウム (Tyrode 液) に浮遊された場合でも、 Ca^{2+} イオンと fibrinogen の両者の存在があれば、ADP 刺激により fibrinogen が血小板に結合して凝集が惹起されることが初めて実証された。これを契機に血小板と fibrinogen との相互作用の研究が急速に進歩した。以下に述べるのは全て洗浄血小板またはゲル濾過血小板を用いた実験成績である。

Bennett らは¹⁰⁾、正常の静止状態 (非活性化) の血小板にはメジウム中の放射性標識の fibrinogen はほとんど結合しないが、ADP 添加によって刺激された血小板にはこの fibrinogen の結合が急速に生じることを観察し、これは血小板表面に fibrinogen の receptor (結合部位) が、ADP 刺激によって express されるためであろうとした。そしてこの結合した fibrinogen が血小板相互の間にブリッジ (橋渡し) を形成し、相互の粘着つまり凝集を形成していくと考えた。さらに Bennett らは¹⁰⁾、またほぼ同時に

Mustard らも¹¹⁾、血小板無力症患者の血小板では ADP 刺激によっても fibrinogen の結合が微弱であることを発見した。つまり ADP 刺激によって fibrinogen の結合部位をオープンするのは GP IIb/IIIa であろうと推定されるに至った訳である。Marguerie ら¹²⁾、Coller¹³⁾ および Peerschke ら¹⁴⁾ の成績もこれらを確認するものであった。

GP IIb/IIIa 上の fibrinogen の結合部位の同定に関して、Bennett ら¹⁵⁾は極めて巧妙な実験を行なった。結合しうる手を2本持ち、うち一方のみが光化学反応性をもっている (heterobifunctional) cross-linker である methyl-r-azidobenzimidate (MABI) を遮光条件下で fibrinogen に自然に結合させ、次いでこの MABI-fibrinogen を ADP で刺激した血小板浮遊液に遮光下で添加すると、血小板表面に結合する。さらにこの反応系を紫外線で照射すると、MABI のもう一方の結合の手が活性化され、その近傍にある構成部位に link する。この血小板を分離し、可溶化後、SDS-PAGE 施行、nitrocellulose 膜に転写し、抗 PIA¹ 抗体 (前述のように PIA¹ 抗原は GP IIIa 上にある⁸⁾) と孵置し、¹²⁵I 標識 protein A で処理し、オートラジオグラフィーを行なった。MABI-fibrinogen と反応した血小板では、GP IIIa と MABI-fibrinogen との間に高分子複合体が形成されたために SDS-PAGE のゲルの中には行けなくなるために、対照血小板に比し、正常の移動度をもつ GP IIIa は減少していることを観察し、fibrinogen の結合部位は GP IIb/IIIa の複合体の GP IIIa の側であろうと結論した。

一方 fibrinogen 分子のいずれの部分か血小板を結合するかについても解明されてきた。まず Hawiger らは¹⁶⁾、fibrinogen $[(A\alpha)_2(B\beta)_2\gamma_2]$ から解離された γ 鎖が intact の fibrinogen とほぼ同程度に ADP 凝集惹起能があり、 α 鎖は γ 鎖の 1/4~1/5 の活性をもつが、 β 鎖はゼロであったことから、血小板 GP IIb/IIIa によって認識される部位は主として γ 鎖であろうとした。彼等のグループはこの面でも極めて精力的に究明し、1982年には γ 鎖の C 末端側のペプチドを検討して27個のアミノ酸からなるペプタ

イドが¹⁷⁾, 次いで1983年には15個のアミノ酸のペプチドが必須の部位であるとしていたが¹⁸⁾, 1984年には γ 鎖のC末端側のアミノ酸配列と同じオリゴペプチドを合成して検討して, C末端側の12個のアミノ酸のオリゴペプチド(dodecapeptide)が血小板上のfibrinogenレセプターを認識する部位とした¹⁹⁾.

しかしながら Marguerie らは²⁰⁾ 前述のMA-BI に似た SANAH という cross-linker を ¹²⁵I-fibrinogen につけて血小板と反応させると, そのA α 鎖が特異的にGP IIb/IIIa と結合するとの成績を得ていて, Hawiger らとは必ずしも一致していない.

血小板の凝集(aggregation)に関係する高分子蛋白は実はfibrinogenのみではなく, 次章の von Willebrand factor (vWF) やfibrinogen および thrombospondin の4者が一応明らかにされている. 最近これら4者は総括的に adhesive proteins と contact-promoting proteins と呼ばれるようになった. これらの4者の全てがGP IIb/IIIa の分子上にその結合部位を有していると考えられるようになった²¹⁾. そこでこれら4者の異なる蛋白の結合部位が互いに異なるのか, 同一部位であるかが興味を持たれて来た. この点に関して最近の Haverstick らの成績は注目される²²⁾. 彼等は Hawiger ら¹⁶⁾ のグループの用いたアミノ酸配列とは全くことなる合成の gly-arg-gly-asg-ser の pentapeptide, または末端の gly を除いた tetrapeptide が, fibrinogen のみならず vWF や fibronectin の血小板への結合を阻害することを示唆する成績を得て, GP IIb/IIIa 複合体の分子上にあるこれら adhesive proteins の結合部位は共通していることを示唆している.

III. GP IIb/IIIa と von Willebrand factor (vWF) との相互作用

Bernard-Soulier 症候群の血小板では GPIb が欠損し, そのためにリストセチンによる凝集(agglutination)も vWF の血小板への結合も生じないとされた. つまり vWF の結合部位は GP Ib とされてきた. ところが, GP IIb/IIIa が選択的に欠損している血小板無力症では, リ

ストセチン刺激時の vWF の結合は正常と同様であるが, トロンビン刺激時の vWF の結合は正常の約20%にしかすぎないことが, 1982年 Ruggeri らによって明らかにされた²³⁾. つまり血小板と vWF との相互作用はリストセチン刺激とトロンビン刺激のそれぞれで互いに異なる機序が示唆された.

これより少し前に Fujimoto & Hawiger はヒト血小板においては, ADP 刺激時には vWF の結合部位がオープンされることを報告していた²⁴⁾. リストセチン刺激のときの vWF の血小板への結合は, ホルマリン固定の血小板でも生じるが, この ADP 刺激のときの vWF 結合は血小板が代謝的には正常であることが必要であった. さらに彼等はトロンビン刺激時においても vWF の結合が生じ, これが prostacyclin や EDTA または EGTA によっても抑制されること, またこの vWF 結合には放出された ADP が重要な役割を果していることを示した²⁵⁾. Ruggeri らの成績²³⁾とも合せて, ADP やトロンビン刺激時の vWF 結合部位は GP Ib ではなく, GP IIb/IIIa ではないかとの推定がなされた訳であるが, これは Ruggeri らが GP Ib と GP IIb/IIIa のそれぞれに対するモノクローナル抗体(後述)を用いて速やかに実証した²⁶⁾. Fujimoto らは²⁴⁾, トロンビン刺激時の vWF の血小板への結合は, fibrinogen と競合しないこと, また放出された ADP が大きな役割を演ずることを示していたが, Gralnick ら²⁷⁾や, Plow ら²¹⁾は fibrinogen との競合がみられることを示し, また Di Minno ら²⁸⁾は放出された ADP の意義は高くないと報告し, 必ずしも意見の一致をみていなかった. さらに重要なことは, 血漿メジウムの中で ADP またはエピネフリンで刺激された血小板には vWF が結合しないという報告があることで²⁹⁾, この *in vitro* での ADP による vWF 結合の生理的意義についてなお説明を要するところであった.

一部は前述したように Plow ら²¹⁾³⁰⁾は, fibrinogen, vWF および fibrinogen などの adhesive proteins は, 活性化された血小板の表面では, 3者に共通の結合部位に結合すると結論した. さらにふみこんで GP IIb/IIIa 上における vWF

と fibrinogen の結合部位の相互関係を詳細に検討したものをみると, Hawiger らのグループ³¹⁾は, ADP, トロンビンもしくは A23187 刺激時の vWF の血小板 (の GP IIb/IIIa) への結合には, (後 2 者では放出された) ADP がその血小板膜上における結合部位に正しく結合することが必須であることを示した上で, ADP 刺激における fibrinogen と vWF の結合が互に競合することを示した。さらに彼等は前述した実験で用いた dodecapeptide¹⁹⁾を再び用いて, これが ADP 刺激時における fibrinogen 結合も vWF 結合もほぼ平行して抑制する成績を得て, vWF と fibrinogen は GP IIb/IIIa 分子上に共通の結合部位をもっていると結論した。

他方, Ruggeri らのグループ³²⁾は GP IIb/IIIa 上の異なるエпитオープに対する 2 種のモノクローナル抗体を用いて検討し, これらはトロンビン刺激時の fibrinogen と vWF の結合に対してそれぞれ異なる抑制効果を示したので, GP IIb/IIIa 上のそれぞれの結合部位は相異なるものであると結論した。

IV. Ca イオンと GP IIb/IIIa と血小板凝集

1. キレート剤の影響 (その 1)

前述したように, 血小板の ADP 凝集における不可欠のメジウムの要素は, Ca^{2+} イオンと fibrinogen である⁹⁾。したがって十分量の例えば ethylene diamine tetraacetate (EDTA) の如き Ca キレート剤を ADP 添加の前に加えると凝集は阻止され, また ADP 添加のあとに EDTA を添加してもいったん生じていた凝集は速やかに解離していく。

1978年 Zucker ら³³⁾は極めて注目すべき実験成績を報告した。血小板を EDTA の存在下で 37°C で 10~15 分間孵置すると, 後に十分量の Ca を追加しても ADP による凝集も fibrinogen の結合も生じなくなる, つまり非可逆的な変化を起すが, 室温 (22°C) で同様に孵置してもかかる非可逆的ではなく, Ca の再添加により凝

図 1 血小板の交叉免疫電気泳動 (CIE)

左下方の origin の well に洗浄血小板を 1% Triton X-100 で可溶化したものを入れ, まず左から右へ電気泳動する (1 次元). 次に, 家兎抗ヒト血小板抗体を含むゲル (抗体相) を上方に作り, 1 次元との間には単なるゲルを洗降線の分離をよくするために作る (中間相). 2 次元は下方から上方に泳動すると, それぞれの洗降線が形成される. この CIE は EDTA の非存在下で施行したので, GP IIb/IIIa は複合体を形成し, 1 本の釣鐘状のバンドを形成している (IIb-IIIa). 他は Alb (albumin), VIII-vWF (第 VIII 因子-von Willebrand 因子), Fbg (fibrinogen), XIII A (第 XIII 因子 A 鎖) の各洗降線が固定されている。

集能も fibrinogen 結合能も十分に回復するといふ成績であった。しかしこの 37°C 下で EDTA 処理した血小板 (37°C-EDTA 処理血小板) は ADP 刺激による変形能や放出能は Ca 添加によって可逆的に回復しうることも同時に実証した。あたかも実験的に血小板無力症に酷似した血小板を作成したようなものであった。

これは当時の研究者の間ではおぼろげながら認識されつつあったことのようにであるが, 彼女等の観察力のするどさを示した論文であった。その 37°C-EDTA 処理血小板の不可逆的な凝集能の喪失の原因をめぐって, それ以後の GPIIb/IIIa の研究が行われて来たといっても過言ではない。

Zucker らのグループ³⁴⁾は次いでかかる 37°C EDTA 処理血小板の表面への ^{45}Ca のとり込みが対照血小板に比して減少していること, また血小板無力症の血小板の Ca とり込みも正常血小板の約 50% しかないことを証明した。後者の

図 2 血小板無力症患者の血小板の CIE

最上段の抗体は抗ヒト血小板抗体、中段は抗 GP IIb/IIIa 抗体、下段は抗ヒト-fibrinogen 抗体（ヘキスト社）を用いた CIE。左側の患者血小板では、右側の正常対照に比して、GP IIb/IIIa 複合体と fibrinogen の沈降線が欠損している。

成績から血小板無力症に欠損している GP IIb/IIIa に Ca の結合部位が存在すると推測される訳であるが、正常血小板でも 37°C EDTA 処理によって GP IIb/IIIa 複合体は膜の上で不可逆的にはなれて、Ca をとり込んでの再結合が不可能になったのであろうと推測した。もっともこの「膜の上ではなれる」という推測は、後述するように必ずしも正確な推測ではないが、いずれにしても 37°C EDTA 処理が GP IIb/IIIa の Ca 結合性を不可逆的に傷害してしまい、この意味でも血小板無力症に酷似することになる。

2. 交叉免疫電気泳動法による検討

GP IIb/IIIa と Ca との関係についての研究手段として利用されたものに交叉免疫電気泳動法

(crossed immunoelectrophoresis, CIE) がある。これを血小板研究に初めてとり入れたのは Hagen ら³⁵⁾³⁶⁾である。これは洗浄した血小板を 1% Triton X-100 にて可溶化し、これをまず寒天ゲルの中で第 1 次元として電気泳動する。次いでその直角方向にヒト血小板で免疫して得た家兎の multispecific な抗ヒト血小板抗体を含む寒天ゲルの中を第 2 次元として泳動すると、対応する抗原と抗体の反応によってそれぞれ独立した沈降線がえられる(図 1, 2)。CIE により従来は SDS-PAGE で分離されていた血小板膜糖蛋白が抗原の上からもそれぞれ独立した蛋白であることが証明され、従来の GP Ib, IIb, IIIa など沈降線として把握しうるようになっ

図3 EDTA の非存在, 存在下における血小板の CIE

抗体は左右とも monospecific の抗 GP IIb/IIIa 抗体 (家兎) を用いた。左側では EDTA 非存在下で施行, GP IIb/IIIa が複合体を形成しているので 1 本の洗降線を形成。右側では血小板可溶化液に EDTA を 1 mM になるように加え, 左と同時に CIE を施行した。やや薄い 2 本の洗降線 (左側が IIIa, 右側が IIb) に分離する。矢印の洗降線はわずかに残っている複合体である, EDTA の添加が室温下であれば, 後に Ca を 5 mM 加えれば左側のようになる。

た。しかも SDS に比して Triton X-100 ははるかに mild な可溶化剤であるために SDS-PAGE では行ないえなかった実験が可能になった。

Shulman ら³⁷⁾は速やかに CIE を利用して血小板の GP IIb-IIIa は Ca^{2+} 存在下では複合体を形成して CIA の上では 1 本の沈降線をつくるが, 血小板可溶化液に EDTA を加えると, CIE 上で GP IIb/IIIa 複合体の沈降線が 2~3 本に分離することを観察した。これは GP IIb/IIIa 複合体がそれぞれ IIb と IIIa に解離したものと解釈した。

その直後に Kunicki ら³⁸⁾も, 血小板無力症患者が大量の血小板輸血を受けた後に発生した抗 GP IIb/IIIa 抗体 (IgG-L) を用いて CIE を行ない, GP IIb/IIIa の沈降線を切りとり SDS-PAGE にかけると実際に GP IIb と GP IIIa が含まれることを確認し, さらに血小板可溶化液に EDTA を加えると CIE 上で GP IIb と GP IIIa のそれぞれの沈降線に分離するが, Ca を再添加すると再び 1 本の沈降線を形成することを観察した。つまり可溶化された状態で GP IIb と GP IIIa という 2 つの GP が Ca イオン

依存性に複合体を形成するというわけである。これらの成績は同様に CIE を用いた Hagen ら³⁹⁾や Howard ら⁴⁰⁾によっても確認された。

Gogstad ら⁴⁰⁾は血小板の CIE を利用して血小板膜糖蛋白の Ca 結合性を検討したところ, GP IIb/IIIa 複合体, GP Ia および未同定のある抗原が ^{45}Ca と強く結合したことを観察した。GP IIb/IIIa の複合体の沈降線が EDTA 添加によって GP IIb と GP IIIa に分離した場合も, それぞれの GP は ^{45}Ca を結合したと述べているので, この系での Ca 結合性の意義については解釈が困難であろう。

3. Sucrose density gradient 超遠心法による検討

Triton X-100 にて可溶化した血小板蛋白を 10~40% の sucrose density gradient にのせ超遠心を行なうと, 蛋白は分子量の大きさに従って沈降の度合が決定される。したがって遠心管内の gradient を分取してどの高さに GP IIb/IIIa が存在するかを標準物質と比較して決めればその分子量を決定しうる訳である。Pidard ら⁴²⁾の成績では Ca^{2+} 存在下では GP IIb と GP IIIa の双方ともに IgG ($\text{Mr}=140,000$) と fibr-

表 1 GP IIb と GP IIIa に関するモノクロナル抗体 (主要分のみ)

	略 称	抗 原	文 献		凝 集 阻 害 効 果*				血小板 1 個当 りの結合量	活性化血小 板への結合 量増大	血小板への Fbg の結合 への影響**
			初報告	その後の報告	ADP	Epi	Coll	Thr			
1	Tab	IIb	44	49, 30	→			→	39,000± 4,600 47,800±11,200	(-)	→
2	A ₂ A ₉	IIb/IIIa	48	54, 57, 58	↓	↓		↓	47,000		↓
3	T10	IIb/IIIa	49	30	↓				50,600± 5,600	(-)	↓
4	10E5	IIb/IIIa	50	53	↓	↓	↓	↓	40,000± 8,000		↓
5	AP-2	IIb/IIIa	51	26, 32	↓	↓	↓	↓	57,400± 9,700		↓
6	B59.2	IIb/IIIa	52	26	↓		↓		22,000		→
7	7E3	IIb/IIIa	53		↓				約 50,000	(+)	↓
8	LJP5	IIb/IIIa	32		→		→	→	50,600	(+)	→
9	LJP9	IIb/IIIa	32		↓		↓	↓	54,800		↓
10	PAC-1	IIb/IIIa	54		↓	↓			1,000	(+)	↓
11	AP3	IIIa	55		→		→	→	40,200		↓
12	TM83	IIb/IIIa	56		↓		↓	↓			↓

* ADP, Epi (Epinephrin), Coll (Collagen), Thr (Thrombin) による凝集への効果, →影響なし, ↓抑制する

** ADP または Thrombin 刺激による Fibrinogen の血小板への結合に対する影響, →影響なし, ↓抑制する

inogen (Mr=340,000) の間の分画にあらわれ, EDTA 存在下では双方とも Mr=100,000 前後の分子量に相当する分画に回収された. Jennings & Phillips らも⁶⁾ほぼ同様の手法を用い, Ca²⁺ 存在下では 265,000 の分子量のところに GP IIb と IIIa は co-sediment するが, EDTA 存在下では同様に10万前後の分子量のところに沈降することを確認した. 従来から行われたように SDS の如き強力なイオン性可溶化剤で可溶されて SDS-PAGE にかかけられると, GP IIb と IIIa はそれぞれ 142,000 と 99,000 の分子量に相当する位置に泳動されるが, これらの成績のように Ca 存在下で Triton X-100 の如き穏和な非イオン性可溶化剤で可溶化された場合は, 両者は非共有結合性に 1対1の比で複合体 (heterodimer) を形成して, あたかも分子量26.5万をもつ蛋白の如くに行動することが解明されたことになる. 結局 CIE による成績と同様の成績を示したことになる.

4. キレート剤の影響 (その2)

前述したようにZucker ら³³⁾は EDTA 存在下 37°Cで10~15分静置された血小板は非可逆的に ADP 凝集能と fibrinogen 結合能を失うことを観察していたが, 上述の CIE や sucrose density gradient 超遠心法を用いての GP IIb と

IIIa の可逆的な複合体形成—解離の成績をみて, この37°C EDTA 処理血小板では膜表面における GP IIb と IIIa がこの処理によって非可逆的に解離してしまったのではないかと, との仮説を立て, 37°C EDTA 処理血小板と対照血小板から GP IIb と IIIa を抽出して CIE と sucrose density gradient 超遠心法の双方を用いて検討した⁴³⁾. ところが予想に反してこの仮説は否定された. すなわち37°C EDTA 処理血小板から抽出した GP IIb と GP IIIa は, 対照 (22°C EDTA 処理) 血小板からのそれらと同様に, CIE と sucrose gradient 超遠心法を施行する系にCa²⁺存在下では両者は複合体を形成し, EDTA存在下では別々に分離することを確認した. つまり細胞レベルでの非可逆的な変化を可溶性蛋白のレベルで再現することはできなかったことになる.

実はこの点はモノクロナル抗体の認識するエピトープとも関係することで, GP IIb/IIIa 複合体をエピトープとする筈のモノクロナル抗体の中に, EDTA 存在の有無にかかわらず血小板への結合がほぼ一定のものがある. このことは血小板上における GP IIb/IIIa の複合体の形成のメカニズムが単純でないことをうかがわせるものである.

図4 モノクロナル抗 Ib 抗体 (TM 60) の分子サイズによる抑制効果の変化

IgG のままの TM60 と F(ab')₂ ではリストセチン凝集を抑制しうるが, Fab' ではもはや抑制できない. 他方, トロンビン凝集では Fab' でもなお抑制しうる.

ところが Shattil ら^{43a)}は 0.2% Triton X-100 と 10 mM CHAPS で可溶化し同条件下でポリアクリルアミド電気泳動を行う方法を応用すると, 正常対照血小板では GP IIb と IIIa とがひとつの独立した連続のバンドを形成するが, 37°C EDTA 処理の血小板では GP IIb と IIIa とが次第に不可逆的に分離して低分子量の方に泳動されるようになること, 同時に GP IIb/IIIa の複合体形成の時のみに結合能をもつモノクロナル抗体 (A₂A₉, 表 1, 後述) のかかる血小板への結合が次第に低下することを観察した. これにより細胞膜表面上の GP IIb/IIIa の不可逆的分離が, 可溶化蛋白のレベルでも再現されたことになる. もっとも Zucker ら⁴³⁾が示したような 37°C EDTA 処理血小板を Ca 存在下で CIE を行くと, 複合体バンドをつくるという可逆性についてはなお疑問が残っている.

V. モノクロナル抗体による GP IIb/IIIa の研究

1. 応用の開始

最近モノクロナル抗体は広い研究領域で応用されているが, 血小板研究の領域で最初に本抗体を応用した論文は, 1980年の McEver⁴⁴⁾ らのようである. Köhler & Milstein のハイブリドーマ法によるモノクロナル抗体作成法について

の歴史的論文⁴⁵⁾が1975年に発表されてから5年後である. 腫瘍細胞やリンパ球の表面構造の解析に本抗体が速やかに応用されたことに比較すれば決して早い方ではない. しかし1980年以降は血小板膜の構造と機能の解析に本抗体を用いる研究が相次ぐようになった.

1983年夏 Stockholm での第29回国際血栓止血委員会では「血小板のモノクロナル抗体」の分科会 (Coller 小委員長) も開催されるほどになり, このとき登録制を開始することが決定され, その結果が1984年に発表された⁴⁶⁾. しかしながらその後はこの登録制は事実上有名無実になったことが, 1985年夏の San Diego における第31回国際血栓止血委員会で当の Coller から報告された. はじめは統一的な命名法も提唱されたが, 現実的には全く無視され, 研究者の命名 (略号) がそのまま使用されているようである.

さて血小板研究にモノクロナル抗体を用いる目的は, 構造と機能との関連性の追究であることが多い. 血小板をよく洗浄して主に BALB/c マウスを免疫し, 型の如く細胞融合法によりモノクロナル抗体を確立する訳であるが, この際純粋に免疫学的手法で抗体をスクリーニングしていくというよりも, ある段階までは血小板の粗製膜画分を抗原とする ELISA 法を用いて抗

体活性を確かめるが、その段階からは次は血小板の機能に対する抑制効果を検討していく方が効率的であり、現実的である。例えば GP IIb に対する抗体を目的とする場合は、リストセチン凝集の抑制効果を検討するという方法である。GP IIb/IIIa に対する抗体の検索の際は、ADP 凝集などが用いられる。しかしこれらの場合、仮に GP IIb/IIIa 複合体に対する抗体であっても、機能基もしくはその近傍からはなれたところのエピトープの場合は機能障害を生じないので見落される可能性がある。研究上の目的からみてかかる機能障害をもたないモノクロナル抗体は不要ということもありえようが、このような抗体を必要とする場合もあると思われる。

次にモノクロナル抗体による血小板の機能障害の陽性の成績を得たときの解釈の問題である。モノクロナル抗体のエピトープは一般にアミノ酸残基で10~15個以下の部分であろうといわれている。したがってある抗体を Ig G の儘で血小板に作用させて例えばリストセチン凝集が抑制されても、その抗体が vWF の結合部位もしくはその近傍を認識しているという結論にはならない。なぜなら GP IIb の分子量は約 15~16万で、マウスの IgG も大体この程度であるから、GP IIb 上の vWF 結合部位からはなれたエピトープに対する抗体であっても、その結合の様相によっては IgG のサイズに関係した立体障害 (steric hindrance) のために vWF 結合部位が抗体によって覆いかくされて、vWF の結合が不能になる場合もありえよう。図 4 に示すのはわれわれの研究室で作成した GP IIb に対するモノクロナル抗体 TM60 の例である⁴⁷⁾。1.1 mg/ml リストセチンによる凝集を 5.0 μ g/ml の TM60 ではほぼ完全に抑制したが、0.05 U/ml トロンビンによる凝集の完全抑制には 64 μ g/ml の TM60 を要した。これだけでは vWF の結合部位により近いエピトープに対する抗体のように思われたが、この F(ab') を用いるとリストセチン凝集に対する抑制効果は消失したが、トロンビン凝集に対してはなおも抑制効果を保持していた。したがって TM60 のエピトープは vWF の結合部位よりもトロンビンの結

合部位により近づいたところであろうと結論した。もっともこの場合は抗体の大きさだけでなく、vWF とトロンビンの分子量の大きさのちがいが影響する可能性も否定できない。

2. GP IIb と GP IIIa に関連するモノクロナル抗体

表 1 に GP IIb と GP IIIa に関係するモノクロナル抗体のうち比較的詳細にその性状が明らかにされたもの 12 種を列挙した。ほかにもこの種のモノクロナル抗体は 1985 年末までの文献で 15~16 種はあるが割愛した。

血小板への結合量をみると、GP IIb/IIIa 複合体もしくは IIb または IIIa のそれぞれに対する抗体であっても、血小板 1 個当たり約 40,000~50,000 個が結合しうる (PAC-1 については後述)。この点からも GP IIb と IIIa が 1:1 の比で結合して heterodimer を形成していることが理解される。特に McEver ら⁴⁹⁾は GP IIb に対する抗体 Tab と、IIb/IIIa 複合体に対する抗体 T10 を平行して検討して、血小板 1 個当たりの結合量は前者が 47,800 個で、後者が 50,600 個であり、両者が非常に近い値であると述べているのは興味深い。

これらの抗体の血小板無力症血小板への結合を検討したものでは全てが、平常よりもはるかに少い量しか結合しなかったことを報告している⁴⁴⁾⁴⁸⁾⁵⁰⁾。

またこれらの抗体のいずれも ADP、トロンビン、コラーゲン添加による血小板の shapechange (変形) を抑制したものはない。

血小板の凝集の抑制能をもつ抗体はいずれも fibrinogen 結合の抑制能をもっており、凝集と fibrinogen 結合との密接な相関関係がこの点からも追認されたことになる。

前に ADP やトロンビンの刺激によっても血小板に vWF が結合することを述べたが²⁴⁾²⁵⁾、この際の結合部位が GP IIb/IIIa 複合体にあることを証明するために用いられたモノクロナル抗体は AP2 であった²⁶⁾。最近同様の性質をもつ抗体が 2 株、LJP5 と LJP9 が作成された³²⁾。これら 3 種のうち AP2 と LJP9 は ADP 刺激における fibrinogen の GP IIb/IIIa への結合を阻害するが、LJP5 にはその阻害作用はない。

表 2 血小板の活性化を検分しうるモノクロナル抗体

	略 称	抗 原	文献	血 小 板 へ の 結 合		
				非刺激時	刺 激 血 小 板	
1	7E3	GP IIb/IIIa 複合体	53	徐々に結合	(ADP) 急速に結合	
2	LJP5	GP IIb/IIIa 複合体	32	100%	(Thrombin)	150%
3	PAC-1	GP IIb/IIIa 複合体	54	1,000	(ADP 又は Epi)	10,000~15,000 20,000~25,000
4	S 12	GP IIa $\left(\begin{array}{l} \text{Mr} \\ 148,000 \text{ (還元)} \\ 138,000 \text{ (非還元)} \end{array} \right)$	61	800 $\pm$ 470	(Thrombin)	9,600~ 2,600
5	KC4	Mr=140,000 (GP IIb と IIa の中間に泳動)	62	minimal	(Thrombin)	13,400~ 3,000

一方, LJP9 と AP2 との間にはそれぞれ F(ab) の血小板への結合に関して競合しないが, LJP5 と AP2 との間, および LJP5 と LJP9 との間には競合関係がある. したがってこれらの3種の抗体は GP IIb/IIIa 複合体の上でそれぞれ異なるエピトープをもつと考えられるが, AP2 と LJP9 のエピトープは全くはなれていますが, LJP5 のそれは部分的に AP2 と LJP9 のそれぞれに重なっていると考えられる. しかもこれら3種のエピトープ全体にわたって vWF の結合部位でもある. それにもかかわらず, ADP 刺激における fibrinogen の GP IIb/IIIa への結合を阻害するのは LJP9 と AP2 であり, LJP5 にはその阻害作用はない. これら奇妙な成績は少なくとも部分的には結合した F(ab) の大きさによって steric hindrance が生じているためのもののようである. また fibrinogen の大きさも問題になると思われ, Hawiger らのグループが用いた dodecapeptide¹⁹⁾ や, Haverstick らの tetrapeptide²²⁾ などを用いることにより, より詳細な位置関係が明らかにされるように期待される. いずれにしても抗体 LJP5 の vWF と fibrinogen の結合に及ぼす影響から判断して, vWF と fibrinogen の GP IIb/IIIa への結合部位は少なくとも部分的に相異なると結論できそうである³²⁾.

3. GP IIb/IIIa 複合体に対するモノクロナル抗体のエピトープについての問題

一般にモノクロナル抗体はただ1個のエピトープをもつものである. ところが GP IIb と GP IIIa の2つの蛋白質に対してのモノクロナ

ル抗体というのは一見矛盾しているように思われる. この点を追求したのはやはりこの分野のパイオニアの McEver ら⁵⁹⁾ であった. 彼等は GP IIb と GP IIIa を単離して, そのアミノ酸組成とペプチド・マップを検討して, 両者は完全に相異なることから, GP IIb と IIIa には共通のエピトープはないだろうと結論した. したがって GP IIb と GP IIIa とが複合体を形成してはじめて表現されるエピトープということになる. Coller ら⁵⁰⁾ は複合体を形成した GP IIb と GP IIIa の両者にまたがったようなエピトープではなく, 複合体を形成したときに GP IIb か GP IIIa の conformational change を来たす部分がエピトープであろうと推測している.

エピトープの具体的な決定法としては, はじめは常法に従ってモノクロナル抗体を結合させた Affigel を用いる affinity chromatography か, immunoprecipitation によっていたが⁴⁴⁾⁴⁸⁾⁵⁰⁾⁵²⁾⁵³⁾, CIE の普及に伴ない放射性標識のモノクロナル抗体を CIE の中間相に入れ, EDTA の存在, 非存在下にて CIE を施行し, GP IIb/IIIa の複合体の1本の沈降線か, あるいは分離した IIb または IIIa の沈降線のいずれに, 放射活性が認められるかによってエピトープを決定するようになった³²⁾⁴⁹⁾⁵¹⁾⁵⁴⁾⁵⁵⁻⁵⁷⁾.

4. 血小板の活性化を検出するモノクロナル抗体

表 2 に血小板が活性化されたときに結合が増大するモノクロナル抗体を列挙した. この5種のうち3種は GP IIb/IIIa 複合体をエピトープ

としている。GP IIb/IIIa は前述のように血小板が ADP, thrombin などの生理的な活性化物質にて刺激されたとき, vWF や fibrinogen の結合部位をオープンするが, そのメカニズムは全く不明であった。これらの結合部位そのものは静止状態では表面にオープンされていないで, 刺激後にはじめて表面に出てくる筈である。これら3種は表1にも示したように fibrinogen の結合の阻害効果をもっているのので, GP IIb/IIIa 複合体の fibrinogen の複合部位の近傍を認識しているようである。しかしながら 7E3⁵³⁾ と LJP5³²⁾ の場合は静止時にもゼロという訳ではないので, 活性化に伴う conformation の変化か, あるいは GP IIb/IIIa 複合体の周辺の microenvironment の活性化に伴う変化のためにモノクロナル抗体の GP IIb/IIIa 複合体への到達が容易になった可能性はある⁵³⁾。さらに大きな可能性は, 活性化に伴って細胞内の α 顆粒膜にも存在しているといわれている⁶⁰⁾ GP IIb/IIIa が形質膜表面に出現して来て, 膜表面の GP IIb/IIIa 複合体の抗原量が増加したことを反映しているだけのこともかもしれない³²⁾。しかし PAC-1 の場合は, 静止血小板へは約1000個の結合しかないが, 活性化血小板には15倍から20倍にも増大すること, 放出反応とは直接関係しないこと, Ca の濃度依存性であること, などから fibrinogen の結合部位 (レセプター) そのものをエピトープとしている可能性があり, 注目される⁵⁴⁾。

表2の S12⁶¹⁾ と KC4⁶²⁾ に関しては, その抗原は GP IIb/IIIa とは関係ないが, 活性化血小板に特異性をもつように思われるのであえて引用した。これらの両者とも血小板表面へのエピトープの出現は放出反応の進行と極めて密接な相関関係があること, Ca 依存性の結合でないこと, などから血小板の細胞内の顆粒の膜が放出反応に伴って原形質膜と融合して, 血小板膜表面にあらわれたと解釈される。

おわりに

血小板膜 GP IIb と IIIa の機能と構造についての話題を概観した。GP IIb/IIIa 複合体と fibronectin, thrombospondin との相互作用, また

本複合体と cytoskeleton との関係, 血小板無力症の最近の進歩, 等々については紙数の関係でふれることはできなかった。

文 献

- 1) Nurden, A.T. and Caen, J.P.: An abnormal platelet glycoprotein pattern in three cases of Glanzmann's thrombasthenia. *Br. J. Haematol.*, **28**; 253~260, 1974.
- 2) Phillips, D.R., Jenkins, C.S.P., Lüscher, E.F. and Larrieu, M.-J.: Molecular differences of exposed surface proteins on thrombasthenic platelet plasma membrane. *Nature*, **257**; 599~600, 1975.
- 3) Phillips, D.R. and Poh Agin, P.: Platelet membrane defects in Glanzmann's thrombasthenia. Evidence for decreased amounts of two major glycoproteins. *J. Clin. Invest.*, **60**; 535~545, 1977.
- 4) Phillips, D.R. and Poh Agin, P.: Platelet plasma membrane glycoproteins. Evidence for the presence of non-equivalent disulfide bonds using non-reduced-reduced two-dimensional gel electro-phoresis. *J. Biol. Chem.*, **252**; 2121~2126, 1977.
- 5) Carrel, N.A., Fitzgerald, L.A., Steiner, B., Erickson, H.P. and Phillips, D.R.: Structure of human platelet membrane glycoproteins IIb and IIIa as determined by electron microscopy. *J. Biol. Chem.*, **260**; 1743~1749, 1985.
- 6) Jennings, L.K. and Phillips, D.R.: Purification of glycoproteins IIb and III from human platelet plasma membrane and characterization of a calcium-dependent glycoprotein IIb-III complex. *J. Biol. Chem.*, **257**; 10458~10466, 1982.
- 7) Kieffer, N., Boizard, B., Didry, D., Wautier, J.L. and Nurden, A.T.: Immunohistochemical characterization of the platelet-specific alloantigen, Lek^a. A comparative study with the PI^{AI} anti-

- gen. *Blood*, **64**; 1212~1219, 1984.
- 8) Kunicki, T.J. and Aster, R.H.: Isolation and immunologic characterization of the human platelet alloantigen Pl^{A1} . *Mol. Immunol.*, **16**; 353~360, 1979.
 - 9) Mustard, J.F., Packham, M.A., Kinlough-Rathbone, R.L., Perry, D.W. and Regoeczi, E.: Fibrinogen and ADP-induced platelet aggregation. *Blood*, **52**; 453~466, 1978.
 - 10) Bennett, J.S. and Vilaire, G.: Exposure of platelet fibrinogen receptors by ADP and epinephrine. *J. Clin. Invest.*, **64**; 1393~1401, 1979.
 - 11) Mustard, J.F., Kinlough-Rathbone, R.L., Packham, M.A., Perry, D.W., Harfenist, E.J. and Pai, K.R.M.: Comparison of fibrinogen association with normal and thrombasthenic platelets on exposure to ADP or chymotrypsin. *Blood*, **54**; 987~993, 1979.
 - 12) Marguerie, G.A., Plow, E.F. and Edgington, T.S.: Human platelets possess on inducible and saturable receptors specific for fibrinogen. *J. Biol. Chem.*, **254**; 5357~5363, 1979.
 - 13) Collier, B.S.: Interaction of normal, thrombasthenic and Bernard-Soulier platelets with immobilized fibrinogen. Defective platelet-fibrinogen interaction. *Blood*, **55**; 169~178, 1980.
 - 14) Peerschke, E.I., Zucker, M.B., Grant, R.A., Egan, J.J. and Johnson, M.M.: Correlation between fibrinogen binding to human platelets and platelet aggregation. *Blood*, **55**; 841~847, 1980.
 - 15) Bennett, J.S., Vilaire, G. and Cines, D.B.: Identification of the fibrinogen receptor on human platelets by photoaffinity labeling. *J. Biol. Chem.*, **257**; 8049~8054, 1982.
 - 16) Hawiger, J., Timmons, S., Kloczewiak, M., Strong, D.D. and Doolittle, P.F.: γ and α chains of human fibrinogen possess sites reactive with human platelet receptors. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, **79**; 2068~2071, 1982.
 - 17) Kloczewiak, M., Timmons, S. and Hawiger, J.: Localization of a site interacting with human platelet receptor on carboxyl-terminal segment of human fibrinogen γ -chain. *Biochem. Biophys. Res. Commun.*, **107**; 181~187, 1982.
 - 18) Kloczewiak, M., Timmons, S. and Hawiger, J.: Recognition site for the platelet receptor is present on the 15-residue carboxyl-terminal fragment of the γ -chain of human fibrinogen and is not involved in the fibrin polymerization reaction. *Thromb. Res.*, **29**; 249~255, 1983.
 - 19) Kloczewiak, M., Timmons, S., Lukas, T.J. and Hawiger, J.: Platelet receptor recognition site on human fibrinogen. Synthesis and structure-function relationship of peptides corresponding to the carboxyl-terminal segment of the γ -chain. *Biochemistry*, **23**; 1767~1774, 1984.
 - 20) Marguerie, G.A., Thomas-Maison, N., Ginsberg, M.H. and Plow, E.F.: The platelet-fibrinogen interaction. Evidence for proximity of the $A\alpha$ chain of fibrinogen to platelet membrane glycoproteins IIb/IIIa. *Eur. J. Biochem.*, **139**; 5~11, 1984.
 - 21) Plow, E.F., Srouji, A.H., Meyer, D., Marguerie, G. and Ginsberg, M.H.: Evidence that three adhesive proteins interacts with a common recognition on activated platelets. *J. Biol. Chem.*, **259**; 5388~5391, 1984.
 - 22) Haverstick, D.M., Cowan, J.F., Yamada, K.M. and Santoro, S.A.: Inhibition of platelet adhesion to fibronectin, fibrinogen, and von Willebrand factor substrates by a synthetic tetrapeptide derived from the cell-binding domain of fibronectin. *Blood*, **66**; 946~952,

- 1985.
- 23) Ruggeri, Z.M., Bader, R. and DeMarco, L.: Glanzmann thrombasthenia: Deficient binding of von Willbrand factor to thrombin-stimulated platelets. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, **79**; 6038~6041, 1982.
- 24) Fujimoto, T. and Hawiger, J.: Adenosine diphosphate induces binding of vWF to human platelets. *Nature*, **297**; 154~156, 1982.
- 25) Fujimoto, T., Ohara, S. and Hawiger, J.: Thrombin-induced exposure and prostacyclin inhibition of the receptor for factor VIII/vWF on human platelets. *J. Clin. Invest.*, **69**; 1212~1222, 1982.
- 26) Ruggeri, Z.M., DeMarco, L., Gatti, L., Bader, R. and Montgomery, R.R.: Platelets have more than one binding site for von Willebrand factor. *J. Clin. Invest.*, **72**; 1~12, 1983.
- 27) Gralnick, H.R., Williams, S.B. and Collier, B.S.: Fibrinogen competes with vWF for binding to the GP IIb/IIIa complex when platelets are stimulated with thrombin. *Blood*, **64**; 797~800, 1984.
- 28) Di Minno, G., Shapiro, S.S., Catalano, P., De Marco, L. and Murphy, S.: The role of ADP secretion and thromboxane synthesis in factor VIII binding to platelets. *Blood*, **62**; 186~190, 1983.
- 29) Schulleck, J., Jordan, J. and Montgomery, R.R.: Interaction of von Willebrand factor with platelets in a plasma milieu. *J. Clin. Invest.*, **73**; 421~428, 1984.
- 30) Plow, E.F., McEver, R.P., Goller, B.S., Woods, V.L. Jr., Marguerie, G.A. and Ginsberg, M.H.: Related binding mechanisms for Fbg, vWF and TSP on thrombin-stimulated human platelets. *Blood*, **66**; 724~727, 1985.
- 31) Timmons, S., Kloczewiak, M. and Hawiger, J.: ADP-dependent common receptor mechanism for binding of vWF and fibrinogen to human platelets. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, **81**; 4935~4939, 1984.
- 32) Lombardo, V.T., Hodson, E., Roberts, J.R., Kunicki, T.J., Zimmerman, T.S. and Ruggeri, Z.M.: Independent modulation of vWF and fibrinogen binding to the platelet membrane GP IIb/IIIa complex as demonstrated by monoclonal antibody. *J. Clin. Invest.*, **76**; 1950~1958, 1985.
- 33) Zucker, M.B. and Grant, R.A.: Non-reversible loss of platelet aggregability induced by calcium deprivation. *Blood*, **52**; 505~514, 1978.
- 34) Peerschke, E.I., Grant, R.A. and Zucker, M.B.: Decreased association of ⁴⁵calcium with platelets unable to aggregate due to thrombasthenia or prolonged calcium deprivation. *Br. J. Haematol.*, **46**; 247~256, 1980.
- 35) Hagen, I., Bjerrum, O.J. and Solum, N.O.: Characterization of human platelet protein solubilized with Triton X-100 and examined by CIE. *Eur. J. Biochem.*, **99**; 9~22, 1979.
- 36) Hagen, I., Nurden, A., Bjerrum, O.J., Solum, N.O. and Caen, J.P.: Immunohistochemical evidence for protein abnormalities in platelets from patients with Glanzmann's thrombasthenia and the Bernard-Soulier syndrome. *J. Clin. Invest.*, **65**; 722~731, 1980.
- 37) Shulman, S. and Karparkin, S.: CIE of human platelet membranes. Diminished major antigen in Glanzmann's thrombasthenia and Bernard-Soulier syndrome. *J. Biol. Chem.*, **255**; 4320~4327, 1980.
- 38) Kunicki, T., Pidard, D., Rosa, J.-P. and Nurden, A.T.: The formation of Ca-dependent complexes of platelet mem-

- brane glycoprotein IIb and IIIa in solution as determined by CIE. *Blood*, **58**; 268~278, 1981.
- 39) Hagen, I., Bjerrum, O.J., Gogstad, G., Korsmo, R. and Solum, N.O.: Involvement of divalent cations in the complex between the platelet glycoproteins IIb and IIIa. *Biochem. Biophys. Acta*, **701**; 1~9, 1982.
- 40) Howard, L., Shulman, S., Sadanandan, S. and Karpatkin, S.: CIE of human platelet membranes. The major antigen consists of a complex of glycoproteins GP IIb and GP IIIa, held together by Ca and missing in Glanzmann's thrombasthenia. *J. Biol. Chem.*, **257**; 8331~8336, 1982.
- 41) Gogstad, G.O., Krutnes, M.B. and Solum, N.O.: Calcium-binding proteins from human platelets. A study using CIE and ^{45}Ca . *Eur. J. Biochem.*, **133**; 193~199, 1983.
- 42) Pidard, D., Rosa, J.-P., Kunicki, T.J. and Hagen, A.T.: Further studies on the interaction between human platelet membranes GP IIb and IIIa in Triton X-100. *Blood*, **60**; 894~904, 1982.
- 43) Zucker, M.B., Varon, D., Masiello, N.C. and Karpatkin, S.: The combining ability of glycoproteins IIb, IIIa and Ca in EDTA-treated nonaggregable platelets. *Thromb. Haemost.*, **50**; 848~851, 1983.
- 43a) Shattil, S.J., Brass, L.F., Bennett, J.S. and Pandhi, P.: Biochemical and functional consequences of dissociation of the platelet membrane glycoprotein IIb/IIIa complex. *Blood*, **66**; 92~98, 1985.
- 44) McEver, R.P., Baenziger, N.L. and Majerus, P.W.: Isolation and quantitation of the platelet membrane glycoprotein deficient in thrombasthenia using a monoclonal antibody. *J. Clin. Invest.*, **66**; 1311~1318, 1980.
- 45) Koehler, G. and Milstein, C.: Continuous cultures of fused cells secreting antibody of predefined specificity. *Nature*, **256**; 495~497, 1975.
- 46) Coller, B.S.: Report of the working party on hybridoma-derived monoclonal antibodies to platelets. *Thromb. Haemost.*, **51**; 169~173, 1984.
- 47) Yamamoto, N., Kitagawa, H., Tanoue, K. and Yamazaki, H.: Monoclonal antibody to glycoprotein Ib inhibits both thrombin- and ristocetin-induced platelet aggregation. *Thromb. Res.*, **39**; 751~759, 1985.
- 48) Bennett, J.S., Moxie, J.A., Leitman, S.F., Vilaire, G. and Cines, D.B.: Inhibition of fibrinogen binding to stimulated human platelet by a monoclonal antibody. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, **80**; 2417~2421, 1983.
- 49) McEver, R.P., Bennett, E.M. and Martin, M.N.: Identification of two structurally and functionally distinct sites on human platelet membrane glycoprotein IIb/IIIa using monoclonal antibodies. *J. Biol. Chem.*, **258**; 5269~5275, 1983.
- 50) Coller, B.S., Peerschke, E.I., Scudder, L.E. and Sullivan, C.A.: A murine monoclonal antibody that completely blocks the binding of fibrinogen to platelets produces a thrombasthenic-like state in normal platelets and binds to glycoproteins IIb and/or IIIa. *J. Clin. Invest.*, **72**; 325~338, 1983.
- 51) Montgomery, R.R., Kunicki, T.J., Taves, C., Pidard, D. and Corcoran, M.: The diagnosis of Bernard-Soulier syndrome and Glanzmann's thrombasthenia with a monoclonal assay on whole blood. *J. Clin. Invest.*, **71**; 385~389, 1983.
- 52) Di Minno, G., Thiagarajan, P., Perussia, B., Martinez, J., Shapiro, S.,

- Trinchieri, G. and Murphy, S.: Exposure of platelets fibrinogen-binding sites by collagen, arachidonic acid, and ADP: Inhibition by a monoclonal antibody to the glycoprotein IIb/IIIa complex. *Blood*, **61**; 140~148, 1983.
- 53) Collier, B.S.: A new monoclonal antibody reports an activation-dependent change in the conformation and/or microenvironment of platelet GP IIb/IIIa complex. *J. Clin. Invest.*, **76**; 101~108, 1985.
- 54) Shattil, S.J., Hoxie, J.A., Cunningham, M. and Brass, L.F.: Changes in the platelet membrane glycoprotein IIb/IIIa complex during platelet activation. *J. Biol. Chem.*, **260**; 11107~11114, 1985.
- 55) Newman, P.J., Allen, R.A. and Kunicki, T.J.: Quantitation of membrane glycoprotein IIIa on intact human platelets using the monoclonal antibody, AP-3. *Blood*, **65**; 227~232, 1985.
- 56) 山本正雅, 田上憲次郎, 北川恒代, 山本一夫, 山崎博男: トロンビン凝集における GPV 水解に及ぼす抗 GP Ib, 抗 GP IIb/IIIa モノクローナル抗体の影響. 第8回日本血栓止血学会, 岐阜市, 1985年11月
- 57) Brass, L.F., Shattil, S.L., Kunicki, T.J. and Bennett, J.S.: Effect of Ca on the stability of the platelet membrane GP IIb/IIIa complex. *J. Biol. Chem.*, **260**; 7875~7881, 1985.
- 58) Shattil, S.L., Brass, L.F., Bennett, J.S. and Pandhi, P.: Biochemical and functional consequences of dissociation of the platelet membrane glycoprotein IIb/IIIa. *Blood*, **66**; 92~98, 1985.
- 59) McEver, R.P., Baenziger, J.U. and Majerus, P.W.: Isolation and structural characterization of the polypeptide subunits of membrane glycoprotein IIb/IIIa from human platelets. *Blood*, **59**; 80~85, 1982.
- 60) Gogstad, G.O., Hagen, I., Korsmo, R. and Solum, N.O.: Characterization of the proteins of isolated human platelet α -granules. Evidence for a separate α -granule pool of the glycoprotein IIb and IIIa. *Biochem. Biophys. Acta*, **670**; 150~162, 1981.
- 61) McEver, R.P. and Martin, M.N.: A monoclonal antibody to a membrane glycoprotein binds only to activated platelets. *J. Biol. Chem.*, **259**; 9799~9804, 1984.
- 62) Hsu-Lin, S.-C., Berman, C.L., Furie, B.C., August, D. and Furie, B.: A platelet membrane protein expressed during platelet activation and secretion. Studies using a monoclonal antibody specific for thrombin-activated platelets. *J. Biol. Chem.*, **259**; 9121~9126, 1984.