特集・RPGN

半月体形成の機序*

森田 俊**

Key words: crescent, RPGN, Masugi nephritis.

はじめに

腎糸球体の半月体は各種の腎疾患にみられるものであって、rapidly progressive glomerulonephritis に特有なものでなく、例えば Heptinstall の “Pathology of the kidney”¹⁾ の索引で crescent の項を引くとその他に、急性糸球体腎炎、慢性糸球体腎炎、Goodpasture 症候群、SLE、多発性動脈炎、Schönlein-Henoch 紫斑病、悪性高血圧症、腎硬塞、限局性栓塞性腎炎、移植腎の病名が出てくる。更に、Alport 症候群²⁾、腎静脈血栓症³⁾、デキストラン過敏症⁴⁾、血清病⁵⁾、などに半月体のみられる報告がある。実験腎炎でも馬杉腎炎⁷⁾や自己免疫性糸球体腎炎⁸⁾の他に N,N'-diacetylbenzidine⁹⁾やガソリン¹⁰⁾による腎炎にも強い半月体形成がみられている。

一般に半月体は予後不良の証拠と考えられ重要視されている一方、半月体を有する例でも必ずしも予後が悪くないことを強調する人もいる。この際、単に半月体の有無が問題なのでなく、頻度や大きさも重要である。即ち予後不良の rapidly progressive glomerulonephritis では、半月体を有する糸球体の全糸球体に対する割合がきわめて高く、その半月体が非常に大きいことが特徴である。

かように各種疾患にみとめられ、且つ予後にも関係している重要な所見であるにもかかわらず、半月体の微細構造に関する詳細な研究も数

年前まではきわめて少く、その形成機序に関しては未だ不明の点が多い。

著者は以前にヒト各種糸球体腎炎における半月体の微細構造を報告した¹¹⁾が、そのデータをもとに半月体の構造、形成機序に関して私見をのべるが、家兎馬杉腎炎の半月体を電顕的に検索をすすめているので、その所見も併記する。

I. 半月体の構造

1. 光顕的所見

新しい半月体は主として細胞性で、時にフィブリン、白血球、赤血球などを混じており、細胞間には PAS でうすく染る物質がみられ、時に細胞分裂像がみられる(図1)。時が経つにつれ、半月体は細胞・線維性、線維性に移行し、次第に細胞間物質は PAS 染色に染まらなくなる。

線維性半月体となってしまうと、乏血性変化による intracapsular hyalinization との区別がむずかしい場合もある。乏血性変化のみを主体とする例は比較的鑑別が容易であるが、糸球体腎炎の上に乏血性変化が加わった際の線維性半月体様構造の成り立ちを推測することはむずかしいことが多い。

ヒトの半月体でも稀に多核の巨細胞をみるが、家兎馬杉腎炎ではしばしば巨細胞がみとめられる(図2, 3)。ボーマン囊の基底膜はヒトの場合大きい半月体のみられる際にもかなりよく保たれていることが多いが、家兎馬杉腎炎で

* Mechanism of crescent formation.

** 新潟大学医学部腎研究施設, 病理形態部門, Takashi MORITA: Institute of Nephrology, Niigata University School of Medicine, Niigata, Japan.

は大きな半月体をみることは稀であるにもかかわらず、ポーマン囊の基底膜は消失し、間質の細胞滲潤との境界が不明になることが多い(図3)。

2. 電顕的所見

ヒトの半月体ではその構成細胞(以下半月体細胞と仮称する)は細胞小器官の少ない明細胞と、暗調の胞体を有し、粗面小胞体のよく発達した暗細胞からなり、時々細胞同志は複合接着帯をもって接している。一般に半月体細胞は上皮細胞しかもポーマン囊上皮の増殖したものと考えられているが、なかには係蹄上皮の増殖したものも含まれている¹¹⁾。さらに線維芽細胞や組織球様細胞もみられ、ある程度上皮細胞との移行像もみられ、上皮細胞由来も否定し得ない¹¹⁾。近藤らは家兎馬杉腎炎における半月体に単球由来の細胞が関与していると報告しているが¹²⁾、著者の成績もこれをある程度支持し、細い細胞突起をもち、リゾゾームを多く持った大食細胞が多くみられ、これらはお互に inter-digitation で接しており、時には巨細胞を形成している(図5, 7)。係蹄基底膜に接している細胞と大食細胞様細胞との境界のはっきりしないこともあるが(図6)、係蹄基底膜の傷害の激しいところでは上皮細胞が剝離していることもある(図8)ので、剝離した上皮のあとに大食細胞が入ってきたのか、上皮が大食細胞様に変化したのか不明である。また分裂像を示す細胞もフィブリンにとりこまれ、リゾゾームに富み上皮細胞よりは単球大食細胞系の細胞により類似をもとめられるものもある(図9)。

細胞間には初期に蛋白様物質がみられ、フィブリンも混じていることが多い。細胞間物質は次第に基底膜様に均質にみえ膠原線維も増してきて、細胞もだんだん扁平となり、ついでには膠原線維にまじって細胞胞体の小片が混じている程度になる。半月体細胞間の基底膜様物質の存在より、半月体細胞はポーマン囊上皮由来であると結論している人もあるが¹³⁾、萎縮した係蹄の皺のよった基底膜と上皮の間に薄い基底膜様物質がみられ、これが上皮と上皮の間の物質に続いているのがみられることもある(図10)。

ので、かかる結論は納得しがたい。細胞間の膠原線維も半月体細胞自身がつくるのか、ポーマン囊外より侵入してきた線維芽細胞がつくるのかの論争もあるが、ヒトの半月体でポーマン囊が一見健全である糸球体でしかもポーマン囊からかなり離れた部にもみられることより、前述の基底膜様物質同様半月体細胞がつくり得るものと考えられる。抗膠原蛋白による蛍光抗体法で半月体細胞をとりかこんで網目状に陽性物質がみられるという報告もあり¹⁴⁾、細胞性半月体でも細胞間に膠原蛋白はみられることを示している。

II. 半月体の形成機序

上述の如く、半月体細胞の由来に関しても意見の一致をみているわけでないが、上皮細胞の増殖としても、どういう機序で上皮の増殖が起るのであろうか。常識的にはポーマン腔に上皮細胞を刺激して増殖をおこさせる物質が糸球体係蹄から滲出してくることが考えられる。

半月体中にフィブリンの存在することは古くから知られており¹⁵⁾、Vassalli ら¹⁶⁾が抗凝固剤で家兎馬杉腎炎の半月体形成が抑えられるという報告を行ってからはフィブリンが半月体形成に大きな役割を演じていると考える人が多く、臨床的にも抗凝固剤の使用が試みられている¹⁷⁾¹⁸⁾。しかし、thromboplastin による Vassalli らの実験¹⁹⁾で若干の半月体形成はみられても馬杉腎炎の比でなく、またステロイド投与によりポーマン腔内にフィブリンの出現をみても半月体形成はみられぬこと²⁰⁾より、フィブリン自体には上皮細胞増殖惹起能はあったとしても、低いものと考えられ、フィブリン以外の物質の滲出も考慮に入れなければならない。この際、フィブリンは単に高分子物質のポーマン腔内への滲出を意味するだけでなく、その凝固により、同時に存在する刺激物質をながくポーマン腔内にとどめておく補助的役割をなしていることは考えられる。しかし蛍光抗体法による検索では半月体にフィブリンはみられるけれども、免疫蛋白や補体は見出されないのが通常である²¹⁾。最近凝固因子として重要な antihemophilic

☒ 1	☒ 2
☒ 3	☒ 4
☒ 5

図 6 | 図 7
図 8

图 9 | 图 10
图 11

図 12 | 図 13

図 14

付 図 説 明

写真はすべて家兎馬杉腎炎で、日数はネフロトキシン注射後を示す。

- 図 1 12 日。ボーマン腔内に蛋白様物質が充満し、上皮細胞と思われる細胞が増加している。分裂像も 1 個認められる。ボーマン囊の基底膜は途切れている(矢印)。右下は分裂像の強拡大 (PAS 染色)。
- 図 2 21 日。下半分の係蹄の変化が強くその近くのボーマン腔に蛋白様物質、多核巨細胞がみられる。(PAS 染色)。
- 図 3 35 日。萎縮した係蹄の一部の基底膜が消失し(矢印)、その部に巨細胞がみられる。ボーマン囊は消失し、間質の細胞滲潤と半月体の区別が不明となっている。(PAS 染色)。
- 図 4 12 日。フィブリンを充満した係蹄の基底膜が断裂し、その部からフィブリンを含む蛋白物質の漏出像がみられ、ボーマン腔内に赤血球もみられる (Epon 包埋切片の PAM 染色)。
- 図 5 9 日。毛細管腔(C)は細胞成分で充満され、一部変性におちいった胞体と思われるものも含む。係蹄基底膜は薄く、一部上皮細胞が剥離し、裸の部分がみられる(N)。ボーマン腔には巨細胞(R)がみられる。(×3,100)。
- 図 6 図 5 の一部。係蹄基底膜は薄く、ボーマン腔側の細胞(上皮?)の一部は細胞小器官を欠いており、他方では細い細胞突起が著明な interdigitation (I) をおこしている。(×6,300)。
- 図 7 図 5 の R の部分。いくつかの核と核の間の胞体には細胞膜と思われるものがなく、多核の巨細胞と考えられる。図 6 の部分との間にもあきらかな細胞膜はみられない。(×7,500)。
- 図 8 9 日。ボーマン腔内にはフィブリン、大食細胞と思われる細胞 (M_{1-3}) がみられ、右上の係蹄基底膜は上皮が剥離し、裸になっている(N)。(×4,200)。
- 図 9 図 8 の M_3 。核は分裂像を示し、胞体はリゾゾームを多く含む。まわりはフィブリンにとりかこまれ、他細胞と密に接するという上皮性の性格は少ない。(×4,800)。
- 図 10 35 日。萎縮性の係蹄(C)と上皮細胞の間の薄い基底膜様物質がみられ(矢印)、これが下方の上皮細胞間物質(I)につながっている。(×4,200)。
- 図 11 12 日。薄い係蹄基底膜の一部に小裂孔がみられ、そこから細胞がボーマン腔に向かって遊出(?)している像がみられる。(×7,800)。
- 図 12 別の切片にみられた図 11 と同一個所。上皮細胞も小孔に向かって細胞突起を出している(矢印)。(×10,500)。
- 図 13 6 日。係蹄基底膜の一部に蛇行、膨化がみられ(矢印)、その部の上皮にはポケット状の腔があいている。(×4,200)。
- 図 14 9 日。係蹄内には interdigitation (I) でお互に接する細胞や、多核巨細胞(R)が充満しており、これら細胞はリゾゾームを多く含み、大食細胞に類似を求め得る。(×3,800)。

factor (AHF) に対する抗体を用いた検索で、糸球体係蹄内のフィブリンは AHF と共存するのに、半月体内にはフィブリンのみで AHF が存しないと報告されているが²²⁾、血液凝固機点の関与も含めてまだまだ不明の点が多いといわざるを得ない。

半月体を有する糸球体に係蹄基底膜の断裂が高頻度に見られることが、各所から報告されており¹¹⁾²³⁾、特に Spear の報告にある 2 歳の Alport 症候群の患者で、正常の糸球体や軽い富核を示す糸球体にまじって半月体を有する糸球体が見られ、その係蹄基底膜に断裂がみられていること³⁾は興味深い。

家兎馬杉腎炎においても基底膜断裂は高頻度に見られる所見で、かかる部分からフィブリンを含む蛋白様物質の漏出(図 4)、細胞の遊走

(図 11) がみられ、また上皮細胞も胞体の一部を断裂部に侵入させている像がみられる(図 12)。図 5, 8 にみる如く、かなり広い範囲にわたって基底膜変化がみられることがあるが、断裂は小裂孔といった方がよいようなごく小部分に限られることが多く(図 11, 12)、図 13 にみる如き限局性の基底膜傷害がすすんで小裂孔をつくる可能性が考えられる。抗基底膜抗体は蛍光抗体法でみる限り、びまん性に基底膜に付着しているのに、なぜかような限局性の傷害が起るのか不明であるが、Germuth は補体はびまん性でなく、不規則、顆粒状に証明されることより補体系の関与を重視している²⁴⁾。

基底膜の断裂と半月体形成が密接に関係しているとすると、基底膜の透過性亢進により透過できる蛋白分子よりもっと高分子の物質な

り、断裂部より遊出してくる細胞が半月体形成に重要な役割を演じている可能性が考えられる。家兎馬杉腎炎において、早期より係蹄内に多数の単球大食細胞系の細胞が多数出現しており(図14)、基底膜の断裂、ボーマン腔内に多数の大食細胞のみられることから、半月体形成におけるこれら細胞の役割に関しても再検討の要があると考えられる。

おわりに

ヒト糸球体腎炎および家兎馬杉腎炎における半月体の形態学的所見より、半月体形成機序を論じたが、純形態学的検索のみでは十分な結論は得がたく、またヒトおよび家兎の半月体を比較してみても、両者が全く同じ形態学的所見を示しているともいえず、一方のみの検索ではむしろ間違った結論を導く恐れのあることを痛感した。今後各種動物で、種々な型の腎傷害にみられる半月体を検索することにより、より確実な半月体形成機序が判明するものと思われる。

稿を終るにあたり、木原達教授のご校閲を感謝いたします。

文 献

- 1) Heptinstall, R. H. : Pathology of the kidney. 2nd ed., Boston, Little, Brown & Co., 1974.
- 2) 佐野元昭, 他 : Alport 症候群の2剖検例—その糸球体病変を中心として. 日腎会誌, **15**; 905~913, 1973.
- 3) Spear, G. S. : Pathology of the kidney in Alport's syndrome. Pathol. Ann., **9**; 93~138, 1974.
- 4) Case records of the Massachusetts General Hospital (Case 7-1966). New Eng. J. Med., **274**; 336~349, 1966.
- 5) Muehrcke, R. D. : Acute renal failure : Diagnosis & management. St. Louis, The C. V. Mosby Co., 1969, p. 247.
- 6) De la Pava, S., et al. : Fatal glomerulonephritis after receiving horse anti-human-cancer serum : Report of three cases. Arch. Intern. Med., **109**; 391~399, 1962.
- 7) Movat, H. Z., et al. : Studies of nephrotoxic nephritis. I. The fine structure of the glomerulus in acute nephrotoxic nephritis of dogs. Am. J. Clin. Path., **36**; 306~321, 1961.
- 8) Stebley, R. W. : Glomerulonephritis induced in sheep by injections of heterologous glomerular basement membrane and Freund's complete adjuvant. J. Exp. Med., **116**; 253~272, 1962.
- 9) Harman, J. W. : Chronic glomerulonephritis and the nephrotic syndrome induced in rats with N,N'-diacetylbenzidine. J. Pathol., **104**; 119~128, 1971.
- 10) Beirne, G. J. : Glomerulonephritis induced by chronic exposure of rats to gasoline vapors: A model of Goodpasture's syndrome. Abstracts of the fifth annual meeting of the American Society of Nephrology, Washington D. C., Nov. 1971.
- 11) Morita, T., et al. : Structure and development of the glomerular crescent. Am. J. Pathol., **72**; 349~368, 1973.
- 12) Kondo, Y., et al. : Cellular aspects of rabbit Masugi nephritis. II. Progressive glomerular injuries with crescent formation. Lab. Invest., **27**; 620~631, 1972.
- 13) Galle, P. : Les proliferations cellulaires endotheliales et epitheliales du flocculus glomerulaire sont-elles de simples vue de l'esprit? Actualites nephrologiques de l'Hopital Necker, Paris, Flammarion, 1970, pp. 263~269.
- 14) Scheinman, J. I., et al. : The immunohistopathology of glomerular antigens. The glomerular basement membrane, collagen, and actomyosin antigens in normal and diseased kidney. J. Clin. Invest., **54**; 1144~1154, 1974.
- 15) Engel, H. : Glomerulitis adhaesiva. Virchows Arch., **163**; 209~226, 1901.
- 16) Vassalli, P. and McCluskey, R. T. : The pathogenetic role of the coagulation process in rabbit Masugi nephritis. Am. J. Pathol., **45**; 653~677, 1964.

- 17) Kincaid-Smith, P., et al. : Anticoagulants in "irreversible" acute renal failure. *Lancet*, **II**; 1360~1363, 1968.
- 18) Arieff, A. I. and Pinggera, W. F. : Rapidly progressive glomerulonephritis treated with anticoagulants. *Arch. Intern. Med.*, **129**; 77~84, 1972.
- 19) Vassalli, P., et al. : Electron microscopic study of glomerular lesions resulting from intravascular fibrin formation. *Am. J. Pathol.*, **43**; 579~617, 1963.
- 20) Moran, T. T. et al. : Diabetic and cortisone-induced renal lesions : A morphologic and immunohistochemical study. *Lab. Invest.*, **11**; 240~254, 1962.
- 21) Lewis, R. J., et al. : An immunopathologic study of rapidly progressive glomerulonephritis in the adult. *Human Pathol.*, **2**; 185~208, 1971.
- 22) Hoyer, J. R., et al. : Immunofluorescent localization of antihaemophilic factor antigen and fibrinogen in human renal diseases. *J. Clin. Invest.*, **53**; 1375~1384, 1974.
- 23) Min, K. W., et al. : The morphogenesis of glomerular crescents in rapidly progressive glomerulonephritis. *Kidney International*, **5**; 47~56, 1974.
- 24) Germuth, F. G., Jr. and Rodriguez, E. : Immunopathology of the renal glomerulus. Immune complex deposit and antibasement membrane disease. Boston, Little, Brown, Co., 1973, p. 217.

投稿後印刷までの間に次の二、三の興味深い論文が発表された。Carroll 等は家兎の抗基底膜抗体による腎炎の半月体に単球が主として関与していることを走査型電顕で証明している (Carroll, N. et al. : The inflammatory character of glomerular crescents. VIth International Congress of Nephrology, Firenze, June 1975.)。また最近 Germuth 一派及び Dixon 一派から半月体形成に対する heparin 効果に否定的な論文が発表された (Bone, J. M. et al. : Heparin therapy in antibasement membrane nephritis. *Kidney International* 8 : 72~79, 1975. Border, W. A. et al. : Failure of heparin to affect two types of experimental glomerulonephritis in rabbits. *Kidney International* 8 : 140~148, 1975.)。