血液脳関門*

堀 正 治** 最 上 平太郎**

Key words : osmotic opening of BBB, tight junction, pinocytotic vesicle.

I. 血液脳関門研究の歴史

血液脳関門 (BBB) という問題は中枢神経系に関する研究を進めて行く上で、避けられない関門ではあるが、過去半世紀以上にわたる幾多の研究にもかかわらず、いまだに概念的にはある程度の理解は出来るものの、具体的には全く神秘のベールにつつまれたままである。さて BBB という概念の発端は 1887 年 Ehrlich¹⁾ が酸性アニリン色素 (セルレイン S) を動物の皮下に注射したところ、他の組織は染まるのに、脳だけは染まらないこと、反対に塩基性色素であるメチレンブルーでは脳も染まりうるという生体染色の結果を発表したことに始まるといわれている。

1913 年 Ehrlich の弟子である Goldmann²⁾ がトリパンブルーを静脈内および髄液腔内にそれぞれ注入して、前者では中枢神経は染まらないのに、後者では染まるということから、脳の血管には物質透過性に関する何らかの特殊な機構が存在することを初めて示唆し、BBB という概念が確立した。その後この酸性色素を使って、Behnson³⁾ は胎生期や幼若期のネズミでは脳血管の透過性が成熟期のそれより大きいことを報告し、また Wislocki⁴⁾ も脳下垂体、視床下部、松果体、最後野、柱間結節、視索上裂では、脳の他の部分よりも高い血管透過性を示すこと

を見いだした。これらの幼若ネズミの脳とか室傍構造 (Paraventricular structure) とよばれる部分は血液脳関門を欠くためであると現在は考えられているが、当時はこれらの部位が色素を捕獲してしまうので、他の脳部へ色素が行きわたらないというように理解された。生理学の方面では 1953 年 Pappenheimer⁵⁾ が毛細血管壁の分子透過に関する研究を発表した。

それによると酸素、炭酸ガスそして他の脂溶性の物質は血管の透過性は高く、毛細血管のほとんど全表面で拡散するのに対し、イオンとか非脂溶性の物質では透過性は比較的低く、毛細血管を貫通する pore とか channel を通り抜けるという仮説を提唱した。この pore は今日形態学的に毛細血管内皮細胞に認められている小孔 (pore, fenestra) とは異なるもので、Pappenheimer の計算では毛細血管の組織学的表面積の 0.2% 以下の断面に相当し、内皮細胞間隙に相当するものと考えられる。形態学的方面でも 1950 年代に入って、電子顕微鏡がこの分野にも導入されるようになり、飛躍的な発展を上げたのである。

1953 年 Palade⁶⁾ の micropinocytotic vesicle の観察や、1956 年 Bennet⁷⁾ の membrane flow の概念がそれである。Palade は血管内皮細胞に存在する多数の直径 700 Å 前後の小胞に注目し、これらを pinocytotic vesicle と呼び、この

* Blood brain barrier.

** 大阪大学 医学部 脳神経外科 [〒553 大阪市 福島区 福島 1-1-50], Masaharu HORI and Heitaro MOGAMI : Department of Neurosurgery, Osaka University School of Medicine, Osaka, Japan.

Fig. 1 Types of capillaries.

小胞が液体や大きな分子を取り込んで、内皮細胞の管腔側から組織実質の方へ自ら移動することによって、それらの能動輸送に働くという説である。また一方 Bennet は物質が特殊な結合群をもつ膜の表面に結合して、その膜自体が移動することによって物質を輸送するという考え方をした。そしてその膜の部位による特殊性により、膜の各物質に対する選択性が現われると考えた。一方 BBB の本質が物質の透過性であることから、透過の状態を何んらかの形で顕微鏡下で観察できる方法を開発しようとする試みがなされた。経口的に硝酸銀を与えて、銀粒子の電子線散乱を利用して、脳毛細血管壁の透過性を電顕で見たり、鉄粒子を利用したものでは ferritin-albumin 膠質液の静注法やその他硫化水銀静注法、thorotrast、金粒子、saccharated iron oxide 等の静注法が考案された。

また放射性同位元素を用いての BBB の研究は P^{32} や I^{131} を使って autoradiogram により電顕でも見られるようになった。1960年代には Klatzo⁸⁾等により、fluorescein isothiocyanate で label した albumin または globulin を静注して、蛍光顕微鏡を用いて、血管透過性を観察した。これは現在でも光顕用として、手軽で便利な方法として広く用いられている。1965年

Fig. 2 Tight junction between endothelial cells of cerebral vessel.

Karnovsky⁹⁾ が組織化学的反応を利用して、或種の蛋白質の透過性を電顕的に観察することに成功した。これは horse radish peroxidase を用いているが、これは通常分子量 43,000 程度の蛋白質であり、精製することにより分子量を 5,000前後まで自由に小さくすることが出来て、ベンチデン反応をほどこすことにより、その反応産物は電顕的に非常に美しい osmiophilic な粒子として観察出来る。現在のところ電顕的な tracer としては最もすぐれたものとされている。1967年 Reese と Karnovsky¹⁰⁾ はこの horse radish peroxidase を BBB-indicator として始めて用い、電顕的な脳毛細血管の観察により、蛋白質のような高分子の物質に対する BBB は少なくとも脳血管内皮細胞の間隙にある tight junction に存在するという事実を発表した。

もちろん pinocytotic vesicleなどを介しての transcellular route も無視することはできないが、その後の Reese, Brightman, Hori¹¹⁻¹³⁾, 等の一連の実験結果からも、この tight junction が BBB のメカニズムの一つであることは明らかとなった。

II. 脳毛細血管の微細構造

さて脳の毛細血管に関門現象を生みだす何んらかの特殊な構造が存在するかどうかの問題であるが、本質的には一般の毛細血管と同様に一層の内皮細胞と、その外周に密着する基底膜の

二要素からなり、特殊な構造的差異は認められないのであるが、最近の研究から脳血管に少し他の臓器の血管と異なった点が見いだされてきている。それは隣接した内皮細胞の細胞膜が完全に融合した、いわゆる tight junction によって帯状に継ぎ目を閉ざされていて、その上に内皮細胞自身も fenestration や pore のような構造を全く持たない。さらにその外側には緻密な基底膜をはさんで、星状膠細胞の突起でぎっしりと裏打ちされている。また内皮細胞における pinocytotic vesicle は他の組織のそれに比べて著明に少ないのも一つの特徴であるといわれている。(図1, 2)

III. 病的条件下における血液脳関門

1. 脳浮腫

脳組織に何んらかの損傷が加わると、必ずといっていいほど脳浮腫という現象が起こってくる。この脳浮腫において、血管の透過性の問題は非常に重要である。Klatzo¹⁴⁾によれば脳浮腫には二つの型があり、一つは vasogenic type で他の一つは cytotoxic type である。前者は脳血管の損傷にもとずいて、血管の透過性が亢進して、脳実質へ血清の中に含まれる蛋白質やその他の組成が流出する現象である。このカテゴリーに属する脳浮腫では臨床の見地から非常に一般的で頭部外傷、血管障害、炎症、脳腫瘍等が属している。実験的に再現するにはいろいろな方法が考案されているが、最も簡単なものは、脳表に凍結破壊巣を作ることによって、BBBの破綻を生じせしめる方法である¹⁵⁾。この場合 BBB の破綻の場所は主に白質であり、血管の透過性は亢進し、BBB-indicator の露出が認められる。一方 cytotoxic type の脳浮腫では主なる病変は脳の血管ではなく、実質の細胞成分への影響である。従って灰白質の腫脹が著明で、BBB-indicator の血管外流出も見られない。このカテゴリーに属する脳浮腫としてはトリエチルチン中毒、水中毒、ある種の anoxia 等があげられる。これらの二つの脳浮腫のメカニズムを知ることによって、それらの治療という面にも理論的な根拠を与えることが出来る。

たとえば各種の高張液が vasogenic type の脳浮腫の治療に用いられているが、実際にはいろいろの問題がある。なぜならそれを用いることにより全脳容積は減少するかもしれないが、脳血管の透過性の高まっている場所では、ますます高張液が浮腫部へ流入して、かえって浮腫を助長する結果になる。しかし、一時的にでも脳容積を減少させることにより、血流を改善し、脳組織でのガス交換その他を円滑にすることができて、全体として脳浮腫を軽減させるという利点もあり、実際には複雑な要素がからみあっているのである。

一方 cytotoxic type の脳浮腫では血管の変化はないので、理論上高張液による治療は全く理にかなっているのであるが、一般には細胞成分の腫脹をきたすメカニズムやそのほんとうの要因については明確ではなく、現在実地臨床からこの治療効果を評価するのはむづかしい。脳浮腫に対するステロイドの作用ははっきりとした作用機序はいまだ証明されていないが、実験的臨床的に BBB の透過性を改善することは明らかであるから、まもなくそのメカニズムも解明されることであろう。

2. 脳腫瘍の化学療法

脳腫瘍の化学療法を行なう上で、腫瘍組織、ことに腫瘍細胞内に制癌剤が十分な濃度で到達する必要がある、やはりこの関門を無視することは出来ない。臨床面では脳浮腫の際の関門の破綻によって惹き起される病態に対しての予防法の開発ということが重要であるが、化学療法の場合にはむしろこの関門の破綻といえ言いついすぎかもしれぬが、その通過を期待することになる。

これらの関門によって制癌剤などの化学物質は通常脳や髄液中に進入することを阻止されている。中枢神経系のリポイド性細胞膜を通して、細胞内に拡散、浸透するためには次のような化学物質が適当である。

- (1) 体内におけるイオン化が少ない。
- (2) リポイド可溶性の高いこと。
- (3) 蛋白質と結合しにくいこと。

BCNU, CCNU, methyl-CCNU 等の脂溶性

Fig. 3 Passage of peroxidase between cerebral endothelial cells stops abruptly at the tight junction of normal capillary when injected intravenously.

Fig. 4 Peroxidase stops also at the tight junction when injected intrathecally.

の制癌剤は容易に髄液脳内に取り込まれ、ほとんど BBB による抵抗を考慮しないともいいので、脳腫瘍に対しては非常にすぐれた物質と考えられる。しかしその他の制癌剤は BBB の存在によって脳にはまず取り込まれないものと考えてよいのであるが、Kotsilimbas¹⁶⁾ の 5-FU をつけた実験では、中毒量に達するほど大量 (60 mg/kg) に投与すれば、脳内にとり込まれ、メラノームの発育も抑制されるものがある。また早川²¹⁾ 等の報告に見られるように、methotrexate のごとく BBB を通過しないものは髄液内に投与すれば、容易に腫瘍内へ入ることが知られている。しかし今日脳神経外科において日常利用されている脳腫瘍の scintiscanning では、腫瘍組織と周辺の脳組織との間の同位元素に対する透過性の差を応用して、腫瘍の局在を診断しているのであるが、いいかえれば BBB の破綻によって説明されるものである。Glioma では一般にそれが組織学的に悪性なほど scan 陽性率は高いといわれている。従って BBB を通過しない制癌剤でも glioma が悪性なほど選択的に腫瘍内に取り込まれるという、まことに都合な論理が成り立つのであるが、Bleomycin, mitomycin, methotrexate 等の実験ではある程度の脳腫瘍組織内濃度を検出可能であるが、scintiscanning の成績との間に必ずしも一定の

相関関係を見出し得ない。

しかし BBB の状態が薬剤の浸透にきわめて重要な意味をもつことは事実であり、ただ腫瘍の組織学的な状態、制癌剤の感受性の差異、病変の経過、投与方法などによるデータのばらつきなども多く、未解決な点が少なくない。さらに BBB との関連で抗癌剤の投与方法を改良していく努力が必要かと考えている。

IV. 血液脳関門に関するわれわれの実験

1967 年 Reese と Karnovsky¹⁰⁾ は蛋白質の一種である horse radish peroxidase を BBB-indicator として用い、電顕的な脳毛細血管の観察により、蛋白質のような高分子の物質に対する BBB は少なくとも脳毛細血管内皮細胞の間隙にある tight junction に存在するという事実を発表したのは前に述べた通りであるが、その後の Reese と Brightman¹¹⁾ の一連の報告からも明らかである。(図 3, 4)

そこで私達はこの tight junction が何んらかの病的条件下において、開閉するものかどうかという点に興味を持ったのである。BBB を実験的に破綻させる方法にはいろいろあるが、どれも一長一短があり、脳実質に損傷をおよぼすことなく、BBB すなわち脳血管のみに変化を与えることは非常に困難であったからである。しかし、私達はいろいろな高張液の osmotic action を利用して、可逆的な BBB 破綻のモデ

TCble 1 Threshold and reversibility of blood-brain-barrier opening as related to lipid solubility

substance	olive oil/water partition coefficient	ether/water partition coefficient	threshold osmolal	reversibility of BBB damage
LiCl	*	*	1.5	Yes
Na ₂ SO ₄	*	*	1.5	Yes
NaCl	*	*	1.6	Yes
Urea	0.00016	0.00047	3.0	Yes
Glycerol	0.00007	0.00066	5.7	Yes
Lactamide	0.0003	—	4.6	Yes
Methyl urea	0.00044	0.0012	4.3	Yes
Formamide	0.00083	0.0014	4.6	Yes
Acetamide	0.0009	0.0025	6.4	Yes
Ethylen glycol	0.0005	0.0053	19.6	No
Propionamide	0.0037	0.013	6.4	Yes
			8.2	No
Cyanamide	0.0045	0.11	2.5	No
Propylene glycol	0.0056	0.018	27.5	No
Methanol	0.008	0.14	32.7	No
Ethanol	0.032	0.26	12.3	No
Methylcarbamate	0.025	—	2.9	No
Ethylcarbamate	0.074	0.64	1.6	No

The substances tested are ranked with respect to their olive oil/water and ether/water partition co-efficient, which represent lipid solubilities, and the thresholds and reversibility observations also are listed.

According to this table, the relative lipid-insoluble agents above acetamide work reversibly, but the more lipid-soluble agents give irreversible barrier change, and the former agents have almost the same threshold-osmolalities, if they are divided between electrolytes and non-electrolytes. * Assumed approximately zero.

ルを作り、それが脳血管内皮細胞間隙の tight junction の開閉によって惹起される現象であることを証明したのである。

1. 実験動物と方法

シリーズ : 1

126 匹のウサギを手術用顕微鏡下に、脳表面の血管をまったく損傷することなく、両側の頭頂部を開頭の上、蜘蛛膜におおわれた脳表を露出した。ただちに股静脈より、2% の Evans blue (4 ml/kg) を注射したのちに、直径 6 mm の円形露紙に試験液である高張液を滲ませて、脳表上に 10 分間留置したのち、露紙を取り除いて、脳表を生理食塩水にて十分に洗い流したのち、手術用顕微鏡下に脳表血管を観察して、写真撮影を行なった。おのおの高張液に対して、段階的に種々の濃度を変えて、脳表面に作用させ、Evans blue が血管から露出し始める

最低濃度を決定して、これをその高張液による BBB 破綻を惹起する域値濃度とした。さらに、それらの高張液による BBB の破綻が可逆性であるかどうかを見るために、まずある高張液の域値濃度で一側の脳表面に 10 分間作用させた後に、生理食塩水で洗いながら 30 分間放置してから、初めて Evans blue を静注した。それから反対側の脳表面を露出して、まったく同じ試験液で同じ時間作用させた。この操作により、もし最初の脳表面の血管から色素の露出がなく、反対にもう一方の脳表面が青染する場合にはこの試験液による BBB の破綻は 30 分以内に可逆的に正常に回復したと判定された。しかし同様な操作により両側の脳表面が青染される場合には、それは 30 分以内の可逆性は期待できないということを意味する。

シリーズ : 2

Fig. 5 Reversible breakdown of the BBB is produced by a class of lipid-insoluble solutes which differ in chemical and ionic properties. These agents may osmotically shrink barrier cells, possibly the vascular endothelium and reversibly may open the spaces between them. The lipid-soluble solutes may destroy the barrier cells irreversibly.

76匹のウサギは右側の外頸動脈を結紮して、同側の総頸動脈にポリエチレンチューブを挿入したのち、股静脈から Evans blue と horse radish peroxidase (50 mg/100 g, type II, Sigma Co.) を注射した。さらに、そのチューブより、試験液をそれぞれのウサギの血圧と等しいか、少し高い圧力で注入して、右側脳半球の循環血液を30秒間試験液によって置換させた。そして色素および peroxidase の脳血管からの露出を蛍光顕微鏡と電顕によって観察した。また BBB の破綻の可逆性を見るためには、まず高張液を注入したのち、5~30分後に色素を静注して、その露出を観察した。さらに可逆性に対する電顕的観察のためには、高張液注入前に色素を静注し、高張液注入後それぞれの時間に peroxidase のみ静注して、色素が露出している脳の部分から電顕試料を採集した。試料は Graham と Karnovsky¹⁷⁾ の方法により処置さ

れた。

2. 結果

シリーズ1においては、表1のごとく19種類の化学物質について検討されたが、それらは脂溶性の弱いものから強いものへ順に並べられている。それぞれの物質の脂溶性をあらわす指標は olive oil/water partition coefficients¹⁸⁾ と ether/water partition coefficients¹⁹⁾ によって推測された。それぞれの化学物質による BBB 破綻の程度は、それらの濃度が高くなればなるほど、すなわち浸透圧が高まるのに比例して増強することは、域値濃度を決定する際の一連の実験によって明らかであった。また BBB の破綻の可逆性はエチレングリコールを除いて、プロピオアミドより脂溶性の強い物質では期待できない。さらに、脂溶性の比較的低い可逆的な BBB 破綻を起こす化学物質では、おおむねそれぞれの化学物質の特殊性にかかわらず、類似

Fig. 6 Reversible barrier damage with 2 M urea by the intracarotid perfusion. The right brain : much leakage of Evans blue immediately after perfusion. The middle : less leakage 10 min. later. The left : No leakage 30 min. later.

した域値濃度すなわち浸透圧について、BBB破綻を惹起している。これらの結果から、比較的脂溶性の弱い物質の高張液ではBBBに対してosmotic effectを期待できるが、脂溶性の強い物質にBBB破綻の可逆性は見られない。これは細胞膜を直接透過するのみならず、細胞膜そのものを破壊してしまうのであろうと想像される。(図5)

さて私達の興味は、このような可逆的なBBB破綻が、はたして脳血管内皮細胞がosmotic actionによって萎縮して、それらの間隙にあるtight junctionが開いて起こっているかどうかにあるわけであるが、これはどうしても電子顕微鏡により直接内皮細胞の状態を確認する必要がある。その場合、高張液の脳表面局所への適用は、多かれ少なかれ血管以外の脳組織への影響をさげがたい。また高張液は、血管の外膜、中膜を経て、はじめて内皮細胞に達するので、osmotic actionのみならず、それぞれの化学物質の分子の大きさやdiffusion, reflection、それに関する時間などの複雑な要因が加わってくる²⁰⁾。したがってシリーズ2の頸動脈からの高張液注入法によると、血管以外の周囲の組織に影響を与える以前に血管内皮細胞に直接作用するはずである。

事実頸動脈注入法により、それぞれの化学物質による域値濃度は、一般的にシリーズ1の局所作用におけるものよりすべてやや低い目の値を示した。しかし化学物質の内には、脳組織に

対してtoxicに働くものもあり、すべて頸動脈注入できるとは限らない。とくに脂溶性の強い物質の内には麻酔作用をもっているものもあり、これは容易に想像される。しかし代表的な非脂溶性物質や脂溶性物質、例えば尿素やプロピレングリコールなどにおいて、局所作用によってえた結果とまったく同様の所見をえた。すなわち比較的脂溶性の弱い物質ではosmotic effectにより可逆的なBBB破綻が起こるが、脂溶性の強い物質では可逆性を期待できない。(図6)

代表的な非脂溶性物質の一つである尿素の域値濃度である2モル高張液を頸動脈から注入して、脳血管からのperoxidaseの露出を電顕的に観察すると、想像されたとおり、明らかに血管内皮細胞の間隙から開放されたtight junctionを通過して、besement menbraneを経て、脳実質の細胞間隙にまで露出していくのが証明された。(図7)尿素注入30分後、peroxidaseを静注して見ると、正常脳と同様にtight junctionで完全にブロックされ、脳実質にまったく入らない。これは尿素高張液のosmotic effectにより内皮細胞が一時的に収縮して、tight junctionを可逆的に開放したと理解される。一方脂溶性の比較的強いプロピレングリコールを頸動脈に注入すると、内皮細胞は変性破壊の像を呈し、peroxidaseはdiffuseに脳実質へ拡がり、内皮細胞はまったくbarrier functionを失なう。

Fig. 7 Peroxidase passing through the tight junction between capillary endothelial cells, which is opened by osmotic effect of urea solution.

V. 考察とむすび

Reese と Karnovsky¹⁰⁾ が正常の脳における BBB の存在を, peroxidase という蛋白質を B BB-indicator として用い, それが脳血管の内皮細胞間隙の tight junction にあることを証明したが, peroxidase のような高分子の蛋白質以外の物質に関しても, その場所が BBB として働いているという保証は何にもない. ましてや病的状態における BBB の問題となると, 現在もまったく不明な点があまにも多い. 病的条件下において現在推定されうる物質の血液から脳へのルートは, 第1にいわゆる tight junction であり, 第2は内皮細胞内を pinocytotic vesicle によって運搬されるものである. いままでいろいろな方法で BBB を破綻させ, 物質の透過性の変化をみた研究があるが, 脳血管内皮細胞中の pinocytotic vesicle の増加と, その中への B BB-indicator の取り込みが見られた所見は多い. しかし内皮細胞間隙の tight junction が開放した所見は得られていない. それは tight junction が開く以前に細胞膜自身が破壊され, BBB の機能を観察するのに適さなかったとの理由にもよる. このような悲観的結果から, tight junction というのは隣り合った内皮細胞が, そこで完全に密着合体していて, そこで分離されえないものであるとさえ, 考えられたこ

ともある.

しかし最近の高度な電顕的技術の発展によって, tight junction は非常に狭いし, うねうねと屈曲して, たとえ解離したとしても, 瞬間的であり, その変化は一次元的形態学的な観察ではなかなか取らえにくいのではなかろうかと想像された. さて高張液による非常に繊細な osmotic effect を用いることにより, 脳組織を破壊せず, BBB のみに変化を与え, さらにその変化は可逆的であり, 自由にコントロールできるという私達の方法は, BBB 研究のための最良のモデルと考えている.

この実験から理解されるように, tight junction は明らかに病的条件において離開するものであり, 一時的で, 可逆的に閉鎖し, 回復する. この実験結果の意義は非常に大きく, ただ単に BBB のメカニズムの一つが tight junction にあるという事実の再確認のみでなく, それが人工的にある程度コントロールできるということにある. 例えば脳浮腫のような BBB 破綻を改善するような薬剤の効果判定とか, BBB の存在のため, 中枢神経系への取り込みが少ないために効果が期待できなかった薬剤でも, 一時的に tight junction を開放して, 投与可能となるなどが考えられる. しかし BBB を介しての物質の透過は, peroxidase のような高分子蛋白ばかりでない. もっと小さな分子の物質をはじめ各種多様で, それぞれ異なった透過方式をもっている可能性は十分想像され, 今後ますます研究を進めて行かねばならない. 同様に pinocytotic transport も無視することはできないし, glia や neuron 自身の役割も無関係でありえない. まだまだ多くの解決されねばならない困難な問題が山積しているのである.

最後にアメリカ合衆国 NIH において共同研究者として, 幾多の助言をお与え下さいました Dr. S. I. Rapoport, Dr. M. W. Brightman, Dr. T. S. Reese, Dr. I. Klatzo に感謝をささげます.

文 献

- 1) Ehrlich, P. : Zur therapeutischen Bedeutung der substituierenden Schwefelsäuregruppe. Therap. Monatsch., 1; 88~90, 1887.

- 2) Goldmann, E. E. : Experimentelle untersuchungen über die Function der Plex. chorioid. und der Hirnhäute. Arch. f. Klin. Chir., **101**; 735~741, 1913.
- 3) Behnsen, G. : Über die Farbstoffspeicherung in Zentralnervensystem der weissen Maus in verschiedenen Alterszuständen. Z. Zellforsch. U. Mikr. Anat., **4**; 515~572, 1927.
- 4) Wislocki, G. B. : The permeability of the hypophysis and hypothalamus to vital dyes, with a study of the hypophyseal vascular supply. Am. J. Anat., **58**; 421~472, 1936.
- 5) Pappenheimer, J. R. : Passage of molecules through capillary walls. Physiol. Rev., **33**; 387~423, 1953.
- 6) Palade, G. E. : Fine structure of blood capillaries. J. Appl. Phys., **24**; 1424~1434, 1953.
- 7) Bennet, H. S. : The concepts of membrane flow and membrane vesiculation as mechanisms for active transport and iron pumping. J. Biophys. Biochem. Cytol., **2**; 99~103, 1956.
- 8) Klatzo, I. : The application of fluorescein labeled serum proteins (FLSP) to the study of vascular permeability in the brain. Acta Neuropath., **2**; 144~160, 1962.
- 9) Karnovsky, M. J. : Vesicular transport of exogenous peroxidase across capillary endothelium into the T system of muscle. J. Cell Biol., **27**; 49 A. (Abstr.) 1965.
- 10) Reese, T. S. and Karnovsky, M. J. : Fine structural localization of a blood-brain barrier to exogenous peroxidase. J. Cell Biol., **34**; 207~217, 1967.
- 11) Brightman, M. W. and Reese, T. S. : Junctions between intimately apposed cell membranes in the vertebrate brain. J. Cell Biol., **40**; 648~677, 1969.
- 12) Brightman, M. W., et al. : The blood-brain barrier to proteins under normal and pathological conditions. J. neurol. Sci., **10**; 215~239, 1970.
- 13) Brightman, M. W., Hori, M., et al. : Osmotic opening of tight junctions in cerebral endothelium. J. Comp. Neurol., **152**; 317~326, 1973.
- 14) Klatzo, I. : Neuropathological aspects of brain edema. J. Neuropath. Exp. Neurol., **26**; 1~14, 1967.
- 15) Klatzo, I., et al. : Dynamics of cold injury edema. In; Klatze, I. and Seitelberger, F. (Eds.), Brain Edema, Springer, New York, pp. 554~563, 1967.
- 16) Kotsilimbis, D. G., et al. : Evaluation of parenteral 5-FU on experimental brain tumors., Neurology, **16**; 916~918, 1966.
- 17) Graham, R. C. and Karnovsky, M. J. : The early stages of absorption of injected horse radish peroxidase in the proximal tubules of mouse kidney; ultrastructural cytochemistry by a new technique. J. Histochem. Cytochem., **14**; 291~299, 1966.
- 18) Collander, E. M. and Barlund, H. : Acta Botan. Fenn., **II**; 3~12, 1933.
- 19) Wright, E. M. and Diamond, J. M. : Proc. Roy. Soc. of London, Ser. **B 172**; 227~271, 1969.
- 20) Rapoport, S. I., Hori, M. and Klatzo, I. : Testing of a hypothesis for osmotic opening of the blood-brain barrier. Am. J. Physiol., **223**; 323~331, 1972.
- 21) Hayakawa, T., et al. : Intrathecal chemotherapy selection of cytostatic agents. British J. Cancer, **24**; 489~496, 1970.