脈管造影

脾腫*

新 正浩** 高 島 力**

Key words : splenic tumor, selective celiac angiography, selective splenic angiography

図 1

〔症例 1〕 Y. T., 49 歳, 女性

主訴：貧血と脾腫

上記主訴にて内科入院精査中，腹腔動脈造影を当科に依頼される．腹腔動脈造影動脈相（図 1）で右肝動脈が腹腔動脈根部から分岐する走行異常はみられるが，肝内分枝は比較的スムーズな走行をとり，cork-screw appearance はみられない．一方，脾動脈は著明に拡張，蛇行

し，脾内分枝は大きさも数も増加している．同毛細血管相後期（図 2）では瀰漫性に濃染した腫大脾がみられ，著明に拡張，蛇行した脾静脈（矢印）が造影されているが，側副静脈はみられない．

臨床診断：脾腫

脾臓摘出および肝生検にて，慢性うっ血脾（Fibroadenie）で肝硬変症の所見はなく，idiopathic portal hypertension と診断された．

* Splenomegaly.

** 金沢大学医学部放射線科〔〒920 金沢市宝町13-1〕, Masahiro SHIN and Tsutomu TAKASHIMA : Department of Radiology, School of Medicine, Kanazawa University, Kanazawa, Japan.

図 2

図 3

〔症例 2〕 M. T., 24 歳, 女性

主訴: 左上腹部腫瘍

約 1 年前より主訴を認めたが, 特別の症状もなく放置していたが腹部膨満感強まり, 精査のため内科入院し, 脾腫瘍の疑いで当科に血管造

影を依頼される。腹腔動脈造影動脈相(図 3)で腹腔動脈根部の右方偏位, 左肝動脈の右方及び上方への圧排と脾動脈の上方偏位, 脾内分枝は著明に伸展し, 分枝も乏しい。特に下部にその変化が強い。毛細血管相後期(図 4)では軽度腫大した脾濃染の下部に様な薄い壁の濃染

図 4

図 5

(矢印)を有する巨大な avascular area (14 × 14 cm) を認める.

臨床診断：脾のう腫

手術にて脾内偽のう腫 (etiology unknown) が

図 6

図 7

図 8

確かめられた。

〔症例 3〕 S. S., 21 歳, 女性

主訴：心窩部膨満感

約 1 年半前右下腹部に腫瘤に気づき，当院産婦人科にて手術切除（右卵巢未分化胚細胞腫で

図 9

図 10

子宮へ隣接浸潤)。半年前から左上腹部痛および脾腫を認めるようになり当内科入院。肝、脾スキャンで肝に多発欠損、脾に巨大欠損を認

め、肝、脾の転移を疑って血管造影を依頼される。腹腔動脈造影動脈相(図5)で、腹腔動脈と上腸間膜動脈は共通幹をなしている。胃が右

下方に偏位し、胃体上部大彎部に巨大な avascular tumor が疑える。肝、脾内分枝の伸展像がみられるが、新生血管増生はみられない。選択的脾動脈造影動脈相（図 6）で、脾上および下極に著明に伸展し、分岐の乏しい脾内分枝が造影されている。また、著明伸展した大網動脈枝がみられる。同毛細血管相（図 7）で動脈相で比較的脾内分枝が保たれた部位に正常よりもやや淡い脾濃染がみられるが辺縁が不鮮明で、濃染も一様でない。その上部に巨大な avascular area がみられる。

臨床診断：肝および脾の乏血性転移性腫瘍

剖検では、卵巣未分化胚細胞腫再発で、左後腹膜腔上方で小児頭大の腫瘤をなし、一部後腹膜を破って脾門へ浸潤し、脾内への直接浸潤を伴い、肝は超鶏卵大の腫瘤が多発していた。

〔症例 4〕 H. N., 54 歳，女性

主訴：上腹部腫瘤

上記主訴にて内科入院精査中、当科へ血管造影を依頼される。腹腔動脈造影動脈相（図 8）で、著明に拡張した背側脾動脈と動脈相早期から脾体部、尾部および脾門部に無数の異常新生血管の増生をみる。脾動脈はそれ程拡張なく、浸潤像もみられない。同毛細血管相（図 9）では脾体尾部および脾門部の濃厚な一様でない異常濃染がみられる。

臨床診断：cystic adenocarcinoma の脾浸

潤

試験開腹にて脾原発の腫瘍で脾門部に浸潤し脾を押しつけたように広がっていて、切除不能で、生検で脾管上皮由来の adenocarcinoma であった。

〔症例 5〕 N. K., 48 歳，男性

主訴：脾腫。

慢性肝炎にて内科入院中、血管造影を当科に依頼される。ルーチンの腹腔動脈造影では肝内動脈末梢枝の軽度の cork-screw appearance と脾動脈造影（図 10）で脾内分枝は大きさも数も増加し、同毛細血管相（図 11）で脾は一様に濃染し、内側下方に正円形の濃染（矢印）がみられる。

臨床診断：副脾を伴う脾腫

正常の脾の大きさは、長径 8~14 cm, 短径は 3~7 cm とされている。

脾腫は、脾の原発性あるいは二次的疾患にみられるが、血管造影は脾腫そのものの診断や、他の左上腹部腫瘤の鑑別診断のみならず、ある種の症例においては、脾腫の原因を確かめるのに役立つ。脾、脾周囲膿瘍、脾外傷、脾のう胞、脾の良性腫瘍（血管腫、過誤腫、線維腫、筋腫、リンパ腫）、悪性腫瘍の脾原発（肉腫）はまれだが悪性リンパ腫、肉腫、肺癌等の続発性のものはみられる。また、胃、脾、後腹膜、大腸等の悪性腫瘍の隣接浸潤はよくみられる。