脈管障害と心*

伊藤良雄**

Key words : coronary artery disease, aortic disease, peripheral vascular disease, atherosclerosis, ischemic heart disease.

はじめに

心臓は脈管系の中心に位置し、血液を体組織に送り出す任務を有する器官であり、脈管疾患あるいは脈管障害は当然なんらかの形で心臓に多少なりとも影響を与える。ことに心筋は冠状循環によりその機能が保持されているゆえ冠状循環障害は直接的に心機能を左右する。

脈管疾患あるいは脈管障害が心臓に機能的、器質的变化を起こすには次の3つの場合が考えられよう。すなわち、冠状循環ことに冠動脈系に本来病変がある場合、脈管疾患あるいは脈管障害が、ある因子を介して心臓に負荷を与える場合、および脈管疾患ないし脈管障害を起こす原因ないし成因が同時に心臓をも侵す場合であろう。以下、これらについて概説するとともに、2, 3の自験例を示すことにする。

I. 冠状循環に障害がある場合

冠状循環に障害がある場合は冠不全、心不全、不整脈（刺激伝導障害を含む）が起こる。疾患としては表1に示すものが主なものであろう。先天性奇型としてはBland-White-Garland症候群（左冠動脈の肺動脈起始）、冠動静脈瘻などがある。前者は生後間もなく症状を発し、心不全、冠不全（前側壁心筋硬塞心電図）を起こして死亡することが多いが、副血行路の発達良好なれば成人に達することもある。冠動静脈瘻では流入動脈が左ないし右冠動脈であり、流

表1 冠動脈疾患（障害）

1. 先天性奇型
2. 動脈硬化症
3. 冠動脈塞栓症
4. 梅毒
5. 結節性動脈周囲炎

出口が左ないし右の心房、心室であるなど種々の組み合わせがある。冠不全、心不全を起こす。私どもは右冠動脈→左室流入の希有な冠動静脈瘻症例を経験し報告している¹⁾。また最近左右の冠動脈は存在するも両者間に著明な副血行路があり、左冠動脈の起始部近くより動脈瘻があり、肺動脈に流入している44歳女子の症例を経験している。この症例は頻発する狭心症を有していた。心雑音は動脈管開存症に類似し、右心カテーテル所見も動脈管開存症を考えさせたが、冠動脈造影（虎ノ門病院山口博士）で確診が得られ、外科的に肺動脈への流入口を閉塞することにより狭心症発作の消失をみた²⁾。

冠動脈塞栓症は周知のごとく急性心筋硬塞症と寸分たがわぬ臨床症状を呈する。基礎疾患としては僧帽弁膜症（ことに心房細動を伴う僧帽弁狭窄症、僧帽弁狭窄閉鎖不全症）が多いが、まれに亜急性細菌性心内膜炎の細菌性塞栓や、悪性腫瘍による腫瘍細胞塞栓がある。私どもも悪性絨毛上皮腫の腫瘍細胞塞栓によると考えられる30歳女子の心筋硬塞症例を経験している³⁾。また、粥状腫（atherom）片による塞栓の

* Vascular damage and heart.

** 東京大学医学部第四内科，〒113 東京都文京区本郷7-3-1，Yoshio ITO: The Fourth Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, University of Tokyo, Japan.

図 1

存在も考えられているが、その診断や証明はなかなかむずかしい。

梅毒性大動脈炎は最近ほとんどみなくなったが、昔はしばしばみられ、ことに大動脈弁閉鎖不全症を伴うものによく狭心症が合併した。その一因として梅毒性病変が冠動脈起始部を侵すことがあげられた。また、梅毒性大動脈炎をペニシリンなどで梅毒治療を開始すると狭心症が発現してくることがあり、Herxheimer 現象によるとされた。また、梅毒治療をひととおり終了してから狭心症が発現することがあり、これは冠動脈起始部の瘢痕化によると考えられた。

冠動脈の炎症の代表としては結節性動脈周囲炎の一分症としての冠動脈炎があげられよう。病気の性質上当然狭心症、心筋硬塞症、心不全などの臨床症状が期待されるが、狭心症を発することは少なく、心電図変化も通常非特異的であるとされる。ただ、高血圧の併存する場合は左室肥大心電図をみる。Mayo Clinic の Holsinger ら⁴⁾によれば、結節性動脈周囲炎剖検例 66 例中、冠動脈に本症病変を認め、心筋硬塞果が証明されたものは 41 例にのぼるが、臨床的に心筋硬塞と診断されたものは 3 例にすぎない。心電図も 35 例に異常を認めたが、左室肥大心電図と診断できるもの 6 例、心筋硬塞と診断されたものは 3 例にすぎなかったという。

図 2

私どもも結節性動脈周囲炎と思われる症例で、心不全、著明な ST・T 異常を示し、通常的心不全治療に反応せずプレドニソロン投与により軽快をみた症例を経験した。

〔症 例〕 K. Y., 48 歳, 男子。

昭和 44 年 2 月 心不全にて 2 か月入院の既往がある。昭和 46 年 12 月腹痛と心不全症状増悪を主訴に入院、夜間うわ言をいう状態となる。このころ四肢に硬結を伴う有痛性紅斑が出現す。血圧 116/90, 脈拍 90 整, 黄疸(+), チアノーゼ(+), 起坐呼吸, 浮腫(++)。心は左右に拡大著明(図 1), 心尖部に Levine II 度の収縮期雑音と III 音を認める。肺野にラ音(+), 肝 4 横指触知, 脾ふれず, 静脈圧 200 mm 水柱, RA(+), CRP(++)。ASLO 160 単位, LE 試験(+), TA 試験(-), Wa-R(-), 血沈 1 時間 20, 2 時間 40, 貧血(-), WBC 6900 (桿状核 11%), T. P. 7.5 g/dl (γ-globulin 26.8%) IgG 著明増加, 黄疸指数 28, Na 127 mEq/L, K 4.3 mEq/L, Cl 101 mEq/L, 心電図は図 2 に示すごとく, P cardiale, V₁~V₄へかけての初期 R の減高, V₅, V₆ の high voltage, 著明な ST・T 異常を示す。紅斑部皮膚生検により PN 型 angitis の所見を得た。ジギタリスとループ性利尿薬の静注にても症状好転せず、プレドニソ

ロン1日 30 mg 投与により心不全が軽快した(図3)。

冠動脈硬化症はいうまでもなく心臓障害をもたらす最も普通にみられる疾患である。心臓障害は虚血性心疾患として総括されるものであり、周知のごとく労作狭心症、心筋硬塞症、中間型、無症候性(心電図に虚血性変化を認めるも症状のないもの)および心筋虚血が原因と考えられる心拡大、心不全、各種不整脈などを示す型にわけられている。以前は高齢者の心房細動は冠動脈硬化症によると一般に考えられていたが、心房細動例の剖検所見などより、必ずしも有意な冠動脈狭窄が証明されるとは限らないことがわかってきているし、脚ブロックなども循環障害によらない、いわゆる変性性のものかなり存在することも証明されている。一方、特発性心筋症ないしは二次性心筋症でも虚血性心疾患にまぎらわしい心電図所見、自他覚所見を呈するものが多いことも認められている。これらは冠動脈造影、左室造影などの診断技術の進歩に負うところ大である。中年以降の症例で、心電図 ST・T に変化をみたり、不整脈や刺激伝導障害を有するものを冠動脈硬化症によるものと、かつて安易に診断していたことは深く反省されねばならない。冠動脈硬化は、冠動脈を左前下行枝、左回旋枝、右冠動脈の三大枝にわけ、single vessel disease, two vessels disease, three vessels disease と呼ぶ時代になってきている。

前述のことはさておき、虚血性心疾患は中年以降に最もしばしばみられる疾患の一つであり、その頻度は欧米の水準には未だ到底及ばないにしても、少なくとも本邦の都市部では比較的急峻なカーブで増加しつつある疾患である。

冠動脈硬化症といえば狭心症、心筋硬塞症をすぐ連想する。これらは、いずれも冠不全の範疇に入るもので冠予備力(coronary reserve)の低下により引き起こされる。冠不全は、心予備力の低下により引き起こされる心不全とは本来大分異なった概念である。私どもの冠静脈カテーテル法によるヒト心筋代謝の研究でも、心不全では冠静脈血酸素分圧の低下が安静時すでに

図 3

ほとんど毎常証明されるが、冠不全では必ずしも証明されない。むしろ正常範囲内にあることが多い。われわれの得ている冠静脈血は左室心筋全体を灌流してきた血液の総和である。冠静脈血酸素分圧は心筋内の平均的酸素分圧をほぼ正確に反映していると考えられるゆえ、心不全心筋には全般的に酸素分圧の低下、すなわちヒポキシアの存在が推定される。冠不全の左室心筋には局所的なヒポキシアないしアノキシアが存在するが、左室心筋全体を灌流してきた血液(冠静脈血)でみる限りでは、他の健常部のそれに相殺され、その効果が薄められてとらえることができない場合があると考えられる。Gorlinらは冠静脈の種々の深さで採血し、虚血の指標である過剰乳酸(excess lactate)の存在を示す場所と、そうでない場所とがあり、これが心電図変化を示す部位や冠動脈造影所見の狭窄部位とよく対応することを示している⁵⁾。

一方、臨床的にみた場合、心不全では特殊な例を除いて一般に心拡大を伴うものであるが、典型的な労作狭心症の多くは心拡大を示さず、左第4弓は丸味をおび、やや腰高の感をもつ。したがって昔は心拡大を伴う、あるいは心不全を伴う狭心症はむしろ特殊な例とも考えられていた。戦後右心カテーテル法の開発普及に伴い、狭心症例の病態生理がこの方法により検索される過程において、たまたま検査中に狭心症

発作が誘発され、その際いわゆる肺毛細管中間圧 (pulmonary wedge pressure) の上昇が各所で経験されるようになった。ここにおいて狭心症発作と左心機能ないしは左心不全との関連が大いに注目されるにいたった。

心筋硬塞症の既往があり、かつ心拡大を示す虚血性心疾患が左心不全症状を呈し、肺動脈圧上昇や心送血量の減少を示すことがあり得ることは古くから認められていたことであるが、心拡大のない、しかも狭心痛を有する虚血性心疾患 (心筋硬塞症の既往の有無は問わない) の狭心症発作 (自然発作、負荷誘発発作) 時の血行動態を多数例で調べたのは Müller & Rørvik⁶⁾ である。彼らは発作に1~2分先行して肺毛細管中間圧ないし肺動脈中間圧の上昇を認め、ニトログリセリン投与により狭心症を予防すると肺循環系の圧上昇もまた抑えられることをみている。Ross ら⁷⁾ も2例ではあるが狭心症発作時、胸痛に先行して左室拡張終期圧と、Dimond & Benchimol⁸⁾ のいうごとく心尖拍動図の“a”波の増高をみている。Parker ら⁹⁾ は狭心症を有しない虚血性心疾患では、運動負荷による血行動態の変化は対照群とまったく同じで、左室拡張終期圧の上昇を認めないが、狭心症を有する群で、運動負荷により狭心症が誘発されたものは全例で左室拡張終期圧や肺動脈圧上昇を認め、同時に心送血量や拍出量の増加率も健常者より少ないことをみている。もちろんこれらに対して批判的論文がないわけでもない。たとえば、Cohen ら¹⁰⁾ は左室拡張終期圧の上昇するのは例外的で、左室収縮期圧が急上昇した少数例にみられるのみであるとし、McCallister ら¹¹⁾ は、狭心症患者は運動負荷により狭心症発作を起こした例も起こさない例もともに左室拡張終期圧が上昇したとし、左室拡張終期圧と狭心痛との直接関係を否定している。しかし本邦における追試の成績では木村 (栄) ら、谷口らを初めとし、各所から狭心症発作時に左室拡張終期圧の上昇を認めるという報告が多い。

冠動脈硬化症の狭心症発作時に左室拡張終期圧が上昇するという事実をどう考えたらいいであろうか。第1の可能性は、まず左心不全 (一

過性、可逆性) が起こり、これが引き金となり狭心症が起こる。第2の可能性は、心筋の虚血がまず起こり、これが一方では心筋の収縮力を弱め左室拡張終期圧上昇をきたし、他方では嫌気性代謝を招来し、狭心症を発する (疼痛誘起因子として乳酸、PH 低下、ブラジキニンや未知物質が擬せられている) の2つが考えられる。

Malmberg¹²⁾ は臨床的に心不全のない狭心症36例と対照群11例で軽度~中等度の運動負荷を行っている。狭心症群の安静時の心内外の圧は対照群と有意の差がない。運動負荷により36例中26例 (72%) に狭心症が誘発されたが、そのうち14例 (39%) に肺毛細管中間圧上昇 (>20 mmHg)、10例に右室拡張終期圧上昇 (>9 mmHg) を認めたが、12例 (33%) では右室および左室の拡張終期圧は正常範囲にとどまった。運動負荷で狭心症を起こさなかった10例中1例のみ左室拡張期圧の上昇、3例で拍出量の異常を認めた。まったく正常の反応を認めたものは4例である。すなわち、狭心症患者36例中運動負荷により狭心症のみを起こしたものは33%、狭心症と左心不全を起こしたものは39%、左心不全のみを起こしたもの3%、心機能異常のみを示したもの14%、自他覚的に正常であったもの11%である。また見方をかえると左室充満圧上昇をみた15例中14例 (93%) に狭心症発作をみ、狭心症発作をみた26例中14例 (54%) に左室充満圧の上昇をみたことになる。彼はこれらの結果から前記のうちの第2の可能性を支持している。

Parker ら¹³⁾ は労作狭心症例にウェアイン0.5 mg 静注30分後に運動負荷を行い、投与前に比べ左室拡張終期圧、肺動脈中間圧、右室拡張終期圧などの上昇度は有意に低く抑えられたが、狭心症発作は阻止することができなかったとし、また Smith ら¹⁴⁾ もセジラニッド1.2mg 静注によって狭心症患者の exercise tolerance を増加させえなかったとしている。これらの成績はいずれも第1の可能性、すなわち左心不全が引き金となり狭心症が起こるのでなく、第2の可能性、すなわち心筋への血流の需給バランス

スのくずれが基本的にあり、これが一方では左心不全を、他方では狭心症を起こす。したがって左心不全と狭心症発生に1対1の対応がないという考え方を支持するものであろう。

虚血心筋部の収縮様相の変化については、古く Tennant & Wiggers (1935) がイヌで冠動脈を結紮すると虚血部が膨隆してくることを認めているし、臨床的にも心筋硬塞部に心臓瘤を発生すること、心室中隔穿孔を起こしたり、乳頭筋断裂を起こして致死的心不全を発現することは知られている。

虚血性心疾患の左室心筋の収縮様相の変化については、近時観血的、非観血的に検索がすすめられている。Cineventriculography で心筋硬塞部位ないし虚血心筋部に systolic bulge, akinesia, dyskinesia を観血的に証明しているし、非観血的には心尖拍動図の異常が、狭心症患者では安静時約半数に、狭心症発作時にはより高率に出現すること⁸⁾¹⁵⁾、Harrison ら¹⁶⁾¹⁸⁾は KCG (kinetocadiogram) で狭心症発作時ほとんどすべての例で systolic bulge の出現ないし増強を認め、また、亜硝酸製剤の投与により systolic bulge の消失することや、その前投与は狭心症発作の予防のみならず systolic bulge の出現をも予防することをみている。

このように冠動脈硬化症から招来される虚血性心疾患においては、硬塞部位、虚血部位に収縮異常が認められ、狭心症発作時にはさらにその異常が増強する。したがって左室心筋の収縮効率の低下がみられ、血液の前方駆出に悪影響を及ぼす。左心機能異常ひいては左室不全へと進展する要素は十分あり、実際左心不全が発現する。ことに大きい心臓瘤が存在する場合は、左室腔内の血液はその部で振子運動を起こし、前方駆出にきわめて不利である。また、心筋の一部にこのような収縮異常がある場合、強心剤を使用し、健常心筋の収縮力を強めることが果たしてよいかどうかとも議論のあるところであろう。このため心筋硬塞時にはジギタリス剤を使用しないという考えも一部にはあるが、現実には急性心筋硬塞症時の左心不全にはやはりジギタリス剤が使用されており、それなりの効果が

表 2

1. 梅毒性大動脈炎
2. 剥離性大動脈瘤
3. Marfan 症候群
4. 大動脈炎症候群

得られていると思う。しかし大きな心臓瘤のある場合、心不全の治療は難行し、なかなか代償状態が得られない。外科的に瘤切除の必要性が生じてくる。

II. 大動脈障害と心

大動脈に病変の主座があり、その病機の進展により心臓も侵されるものはいくつかある(表 2)。

梅毒性大動脈炎が心臓方向に進展し、大動脈弁口部に及べば、弁輪の開大により梅毒性大動脈弁閉鎖不全の発現することは昔よりよく知られていることである。

剥離性大動脈瘤(dissecting aneurysm)の基礎疾患は大動脈粥状硬化が最も多く、そのほか妊娠、Marfan 症候群、Erdheim 型中膜壊死、外傷などであるが、剥離が心臓方向に進行し冠動脈起始部にいたれば、冠動脈の狭窄を起こし、ひいては心筋硬塞症を発する。また弁口輪の拡大や心臓への再穿孔により大動脈弁閉鎖不全症をきたし、心包への破裂は心包血腫による心タンポナーデをきたす。

Marfan 症候群では剥離性大動脈瘤を起こさずとも、弁輪支持組織の脆弱化により大動脈弁閉鎖不全症を起こすし、またワルザルバ洞の右心への破裂は、連続性雑音を呈し、急激に発現する右心不全を発することも良く知られていることである。

大動脈炎症候群は若年女性に好発し、本邦では決してめずらしくない疾患であるが、本症は大動脈弁閉鎖不全をしばしば伴うことが知られており、心基部に大動脈弁閉鎖不全の雑音をきいた場合、考えるべき疾患の一つとされている。その発現機序は罹患上行大動脈の拡張に伴う大動脈弁輪の開大による機能的な場合と、大動脈における炎症が直接大動脈弁に及び、変形を

図 4

図 5

図 6

生じた器質的な場合とがあるとされる¹⁹⁾。

また、本症は異型大動脈縮窄症を起こしたり、あるいは病変が腎動脈を侵すことにより高血圧を呈することが多く、また動脈における炎症機転と相まって高度の動脈硬化が発現する。心臓に対しては高血圧の影響、冠動脈硬化を介しての影響があらわれる。高血圧性心不全や虚血性心疾患の病像を呈するにいたる。次に症例を示す。

〔症 例〕 59 歳、女子。

主訴：呼吸困難、浮腫、全身倦怠感、現病歴：32 歳時にツ反応強陽性、結核病巣見つからぬま

ま抗結核療法をうけた。恐らくこの時期にすでに本症が発症していたと思われる。41 歳左手のしびれ、冷感、めまい、血圧 200/? (右腕)、左手の脈がふれにくいのに気づく。50 歳労作狭心症や夜間の呼吸困難出現、54 歳左肢ついで右肢の脈のふれにくいのに気づく。56 歳眼底出血 (両側)、58 歳呼吸困難発作で某病院に緊急入院、心不全は一応軽快せるも両側白内障急速に進行す。当院眼科にて昭和 50 年 5 月白内障の手術をうけ、心不全治療のため当科に転科す。

現症：左腕動脈、左股動脈の脈拍ふれず、右股動脈脈拍は辛うじてふれる。左右内頸動脈、右腋窩動脈、腹部大動脈に血管雑音 (+)、血圧 180/72 (右腕)、心は左右に拡大、上行大動脈に著明な石灰沈着 (+) (図 4, 5)。Erb 領域に 2/6 の収縮期雑音、肝 2 横指触知、浮腫軽度 (+)、血沈 1 時間 17、ツ反応強陽性、CRP (-)、Wa-R (-) 血算異常なし、血液化学では γ -グロブリン 31.7% が目だつほか著変なし、心電図は図 6 のごとく左脚ブロックと心室性期外収縮

を認める。この症例は多くの動脈をおかした大動脈炎症候群であることはほぼ間違いないと考えるが、長年月の経過のうちに高血圧、それに続発する動脈硬化、ことに冠動脈硬化により、心臓に上記の変化を起こしたと考えられる。

なお、本症による著明な心拡大²⁰⁾、肺水腫²¹⁾、頻発する狭心症²²⁾などの報告がほかにも散見される。

III. その他の脈管障害をきたす疾患と心

この項(表 3)では、まず動静脈瘻があげられよう。先天性、外傷性動静脈瘻ないしは Paget

病などでは高拍出量性の心不全を起こすことは古くから知られている。

肺動脈に血栓や栓塞が起こり、血管床の縮小が起これば肺高血症から右心不全を起こす。急性ないし慢性肺性心といわれるものである。肺栓塞症は RI を用いる診断技術の進歩により、昔ほど希な疾患ではなくなった。また、本邦人の食生活が欧米化してきたことも本疾患増加の一因とも考えられる。リウマチ熱、大動脈炎症候群、全身性エリテマトーデスの一分症としての肺動脈炎、これにつづく肺動脈内腔の狭窄、血栓などで肺高血圧をきたし、右室肥大、右心不全をきたすこともある。全身性エリテマトーデスについては肺動脈血栓・塞栓症²³⁾、肺高血圧症²⁴⁾などの報告があり、また私どもも LE 細胞、抗核抗体陽性、purpura hyperglobulinemia を伴った肺高血圧症の症例で右室肥大心電図を認めた症例を報告している²⁵⁾。

全身性エリテマトーデスは膠原病の代表的なものであるが、腎のみならず諸所に血管病変をみる。本症の心症状としては Libman-Sachs 心内膜炎が有名であるが剖検での所見は多くは軽微であり、弁の機能障害を起こすことは少ないとされる。そのほか心筋炎、心包炎、冠動脈小枝の血管炎による不整脈、刺激伝導障害などがみられ、心筋硬塞症も発生する。日本病理剖検輯録で全身性エリテマトーデス 250 例(昭和 45~47 年)についてみると、心肥大 58 例 (23.2%)、線維性心包炎 36 例 (14.4%) Libman-Sachs 心内膜炎 18 例 (7.2%)、他の心内膜炎 9 例 (3.6%)、心筋硬塞 6 例 (2.4%)、心筋炎 5 例 (2.0%)、心萎縮 3 例 (1.2%)、出血性心包炎 2 例 (0.8%)、弁の線維性肥厚 1 例 (0.4%) であった²⁶⁾。

Pehçet 病でも動脈および静脈病変が出現し Vasculo-Pehçet (清水²⁷⁾) と呼ばれているが、心電図異常、心拡大や心炎 (carditis) を起こすものを Cardio-Pehçet と呼ぶものがある (浦山²⁸⁾)。私どもも Neuro-Pehçet に大動脈閉鎖不全を合併した症例を経験している。本例はいずれも詳細に報告する予定であるが、概要を述べると、40 歳男子、25 歳ごろより口腔粘膜アフ

表 3

1. 動静脈瘻
2. 肺動脈血栓・塞栓症
3. 全身性エリテマトーデス
4. Behçet 病
5. 川崎病
6. Bürger 病

タ、陰部に痛性潰瘍が出現し、27 歳には結節性紅斑様皮疹、発熱をみている。38 歳ごろよりまず右下肢、ついで左下肢、左上肢にしびれ感出現し、両側上下肢に痺性不全麻痺を認めるようになる。緩徐な言語、直腸・膀胱障害も出現す。入院後の検査により心拡大(一)、心電図も特記すべき所見を認めず、血圧 104/78 であったが、Erb 領域に最強点を有する収縮期 (3/6)、拡張期 (2/6) 雑音を認めた。拡張期雑音の性状は漸減性灌水様であり、大動脈弁閉鎖不全と診断された。リウマチ熱の既往もなく、War-R(一)で、しかもこの拡張期雑音はプレドニソロンの治療により Behçet 病の諸症状が軽快方向に向かうとともに消失したことから考えると、本例は Neuro-Pehçet に Cardio-Pehçet として大動脈弁閉鎖不全症を伴ったまれな例であり、弁障害はまだ軽微で、血行力学的には大きな異常は認められない時期と考え、今後の経過を追求中である。なお本邦でも、Cardio-Pehçet の例として完全房室ブロックにより Adams-Stokes 発作をきたした 1 例が最近報告されている²⁹⁾。

以上のほか、近時注目をあびている幼児を侵す川崎病では、しばしば著明な冠動脈硬化症、ひいては心筋硬塞症を起こすことが知られている。また、主として下肢を侵す Bürger 病にて冠血行障害をきたした例の報告もある³⁰⁾。

おわりに

以上、脈管障害(疾患)と心との関係を、最も多い冠動脈硬化症と心機能に重点をおいて述べたが、その他の脈管障害(疾患)の場合に心機能を左右するものは、多くは大小循環系の高血圧であり、それにより促進された冠動脈硬化症であり、あるいは血管炎(arteritis)の冠動脈

系への波及であると理解することができよう。一部、たとえば全身性エリトママトーデスや Behçet 病などにおける心障害の発現機序についてはなお不明であるが、今後とも自己免疫的な考え方から検索がつけられるであろう。

なお2, 3の自験例について簡単に紹介した。

文 献

- 1) Okuda, Y., Tsuneda, T., Morishima, A., Matsumoto, S., Ito, Y., and Tsuzuki, M. : Right coronary artery to left ventricle fistule. The sixth cases in the literature and discussion. *Jap. Heart J.*, **14**; 184, 1973.
- 2) 古瀬 彰, 他 : 狭心症および著明な副血行路を伴う左冠状動脈—肺動脈瘻の1治験例. 第76回日本循環器学会関東甲信越地方会, 1975.
- 3) 赤池 陽, 他 : 悪性絨毛上皮腫による冠動脈栓塞症と思われる1例. 第70回日本循環器学会関東甲信越地方会, 1973.
- 4) Holsinger, et al. : cited in *Peripheral Vascular Disease*. Fairbairn II J. F., Juergens, J. L., Spittell, J. A. Jr. (ed. W. B. Saunders Co. 4th) 1972, p. 357.
- 5) Herman, M. V., Elliott, W. C. and Gorlin, R. : An electrocardiographic, anatomic and metabolic study of zonal myocardial ischemia in coronary heart disease. *Circulation*, **35**; 834, 1967.
- 6) Müller, O. and Rørvik, K. : Hemodynamic consequence of coronary heart disease with observation during anginal pain and on the effect of nitroglycerine. *Brit. Heart J.*, **20**; 302, 1958.
- 7) Ross, R. S., Schwartz, N., Gaertner, R. A. and Friesinger G. C. : Electrocardiographic and hemodynamic observation during sclerotic coronary cineangiography. *J. Clin. Invest.*, **41**; 1395, 1962.
- 8) Dimond, E. G. and Benchimol, A. : Correlation of intracardiac pressure and precordial movement of ischemic heart disease. *Brit. Heart J.*, **25**; 389, 1963.
- 9) Parker, J. O., DiGiorgi, S., and West, R. O. : A hemodynamic study of acute coronary insufficiency precipitated by exercise with observation on the effect of nitroglycerine. *Am. J. Cardiol.*, **17**; 470, 1966.
- 10) Cohen, L. S., Elliott, W. C., Rolett, E. L. and Gorlin, R. : Hemodynamic studies during angina pectoris. *Circulation*, **31**; 409, 1966.
- 11) McCallister, B. D., Yipington, T., Hellerman F. J., Wallace, R. B. and Frye, R. L. : Left ventricular performance during mild supine leg exercise in coronary artery disease. *Circulation*, **37**; 922, 1968.
- 12) Malmberg, R. O. : A clinical and hemodynamic analysis of factors limiting the cardiac performance in patients with coronary heart disease. *Acta Med. Scand.*, **177** (Suppl. 426); 5, 1965.
- 13) Parker, J. O., West, R. O., Ledwick, J. R. and DiGiorgi, S. The effects of acute digitalization on the hemodynamic response to exercise in coronary artery disease. *Circulation*, **40**; 453, 1969.
- 14) Smith, H. J., Bousvaros, G. A. and McGregor, M. : Failure of acute digitalization to influence exercise tolerance in angina pectoris. *Brit. Med. J.*, **1**; 1337, 1966.
- 15) Elliott, W. C. and Gorlin, R. : The coronary circulation, myocardial ischemia and angina pectoris. *Mod. Concepts Cardiovas. Dis.*, **35**; 111, 1964.
- 16) Harrison, T. R. : Some clinical and physiologic aspects of angina pectoris. *Bull. Johns Hopkins Hosp.*, **104**; 275, 1959.
- 17) Harrison, T. R. and Hughes, M. L. : Precordial systolic bulge during anginal attacks. *Am. Physicians.*, **71**; 174, 1958.
- 18) Skinner, N. S. Jr., Leibeskind, R. S., Philip, H. L. and Harrison, T. R. : Angina pectoris. Effect of exertion and of nitrites on precordial movement. *Am. Heart J.*, **61**; 250, 1961.
- 19) 上田英雄 : 大動脈炎症候群にみられる弁膜障害—とくに大動脈弁閉鎖不全. *内科* **31**; 1099, 1973.
- 20) 金子二郎, 他 : 著明な心拡大を呈した高安静

脈炎の1例. 第60回日本循環器学会関東甲信越地方会, 1971.

- 21) 池田左千雄, 他: 初発症状発現後11年を経過し, 急性肺水腫で死亡した大動脈炎症候群の一部検例. 第72回日本循環器学会関東甲信越地方会, 1974.
- 22) 関口 寿, 他: 狭心症を頻発した大動脈炎症候群の一部検例. 第59回日本循環器学会関東甲信越地方会, 1971.
- 23) 飯泉智弘, 他: 肺動脈血栓・塞栓症を合併したSLEの1例. 第73回日本循環器学会関東甲信越地方会, 1974.
- 24) 笠井源吾, 他: 肺高血圧症を主徴とするSLEの1例. 第72回日本循環器学会関東甲信越地方会, 1974.
- 25) 片山茂裕, 他: LE細胞, 抗核抗体陽性及びPurpura hyperglobulinemiaを伴った原発性肺高血圧症の1例. 第248回内科学会関東地方会, 1974.
- 26) 伊藤 敬, 伊藤良雄 Libman-Sacks 症候群の治療. 薬物療法, **8**; 1911, 1975.
- 27) 清水 保, 山本恵一郎, 松村則幸: Behçet 症候群における血管病変について, 脈管学, **6**; 90, 1966.
- 28) 浦山 晃, 武田浩芳, 土屋忠久: Behçet 病における血管病変の二, 三. 脈管学, **5**; 212, 1965.
- 29) 堀江俊伸, 他: 完全房室ブロックにより Adams-Stokes 発作をきたし Behçet 病の1例. 第70回日本循環器学会関東甲信越地方会, 1973.
- 30) 大橋重信, 他: Bürger 病に合併した冠血行障害の2例. 第64回日本循環器学会関東甲信越地方会, 1972.

血小板凝集計 (測定セル・1本架用・2本架用の二機種)

※記録計は手持のでも接続出来ます。

血栓形成疾患や出血性疾患の素因に、多血小板血漿や血小板浮遊液等の凝集作用が大きな役割を果たします。その凝集作用に試薬を投入により、その凝集反応パターンを本計と記録計との連動により、記録紙上に再現し、より正確・迅速に判別します。

■本計の内容

1. 恒温槽(比例制御調節計・測定セル室内蔵)
2. 光度計(検出波長 700m μ ・出力T%)
別にlog Tも製作をしております。
3. 攪拌装置(マグネットスターラー方式 700~1500 R・P・M. 回転計メーター付)
4. 次回測定セル予備室(恒温・5本架)

(株) 坂 上 医療・理化学部 〒271 松戸市栄町8丁目636番地 ☎0473-64-2531