③ CL-HPLC 法によるリン脂質ヒドロペルオキシドの測定

——正常値と摂取油脂の影響

東北大学農学部

宮 澤 陽 夫

1. はじめに

15年ほど前に、老化ラットの脳が若いラットの脳よりよく”光り”，これが脂質過酸化で生じるラジカルや活性酸素による微弱な光子放出現象であることを研究した¹⁾。この発光反応（ヒドロペルオキシドとシトクロム *c* の反応）を検出部に用いたのが，CL（化学発光）-HPLC（高速液体クロマトグラフ）法である²⁻⁴⁾。長所は高感度（少なくとも 1 pmol 以上）で，OOH 基に選択的なことである。短所は内部標準法を使いにくいことである。

2. CL-HPLC 法

CL-HPLC 法で求めたヒト血漿の主な過酸化脂質は PCOOH（ホスファチジルコリン ヒドロペルオキシド）で，濃度は健常者で平均 100 nmol/L（30～200 nmol/L）であるが，個人差があり加齢と共に増える。高脂血症では 300 nmol/L より高い場合が多く，500 nmol/L 以上では心筋梗塞の発症率が高くなる。300 nmol/L 以上が治療対象域と考えている。これは，高脂血症型にとられなく共通である。血漿 PCOOH 値は，動脈硬化の危険因子である酸化リポ蛋白（酸化 LDL，酸化 HDL）の生成を示すといえる。

ヒト赤血球からは，CL-HPLC 法で PCOOH と PEOOH（ホスファチジルエタノール アミン ヒドロペルオキシド）がほぼ等量検出される。両方の合計値（PLOOH）は健常成人（平均 24 才）で約 200 nmol/L RBC で，個人差は小さいが加齢と共に有意に高くなる。平均 75 才の健常老人の赤血球 PLOOH 値は 350 nmol/l RBC だが，老人性痴呆症（アルツハイマー症，平均 75 才）では著しく高値（500～3500 nmol/L RBC）である。このような赤血球膜への過酸化リン脂質の蓄積は，ヘモグロビンからの酸素解離を低下させ脳神経細胞への酸素供給を障害すると考えられる。体内でこれらは老化赤血球と認識され，代謝される。

3. 摂取油脂とヒドロペルオキシド

摂取油脂は，体内の過酸化リン脂質と抗酸化分子の量に大きく影響する。不飽和度の高い n-3 系油脂を動物に与えると，n-6 系油脂に比べ，血漿，赤血球，肝臓で過酸化リン脂

質を増やし、逆にビタミンEが低減する。赤血球に過酸化リン脂質が増え過ぎると、その処理器官である脾臓を肥大させ、脾細胞自体は増えるが個々の細胞の免疫応答能力は半減する。これは感染や疾病に対する抵抗力の低下を意味し、ビタミンE補給程度では抑制できない。魚油など不飽和度の極度に高い油脂の摂取は、生体膜の“過酸化”と“抗酸化”のバランスを過酸化側に大きくシフトするといえる。CL-HPLC法の成績はそれらを裏付けている。

〈参考文献〉

1. Miyazawa T, Fujimoto K, Kaneda T. In : Sevanian A (ed), Lipid peroxidation in biological systems, pp 1-17. Am Oil Chem Soc, Champaign, 1988.
2. Miyazawa T, Yasuda K, Fujimoto K. Anal Lett, 20 : 915-925, 1987.
3. Miyazawa T, Suzuki T, Fujimoto K, Yasuda K. J Lipid Res, 33 : 1051-1058, 1992.
4. Miyazawa T, Fujimoto K, Suzuki T, Yasuda K. Methods Enzymol, 233 : 324-332, 1994.