仙台市内における先デボン紀層と温泉の新発見 および地すべりとの関連について

Discovery of a Pre-Devonian Formation and Hot Spring in Sendai City, and Its Relation to Land-slide in the Area

盛合禧夫* 上野春雄**
Tomio MORIAI Haruo UENO

Abstract

The broad Myiagi plain, which consists of the Quaternary system, extends to the east of Sendai City, and there are many hills (120-150m above sea level) which are formed out of the Neogene system around the urban district of Sendai, such as Dainenji-yama, Yagi-yama, Aoba-yama, Kita-yama etc. On the other side the western area of the city, the Miocene series can be seen in Natori-group and Akiu-group. These groups connect to the Ōu mountains.

In October 1996, in an attempt to find a hot spring writers bored into the ground at a point about 2km distant to the south of Sendai Station. Eventually we could find a hot spring at a depth of 1200m. It was a saline spring and the temperature of its water was 58°C. While writers were digging, also found the formation of old metamorphic rocks at depths of 800-1200m. The writers have ascertained that these metamorphic rocks belong to the Pre-Devonian period.

Until now it had been said that there was no hot spring in Sendai City, and no other formations prior to that of the Tertiary system had been found in the area. They think that these two discoveries will bring a new phase in the geological study of Sendai not only because they will be very useful for the future elucidation of the geological structure of the Sendai area, but also because they will give us an important clue in investigating the mechanisms of the outbreaks of earthquakes, landslides and slope failures in the area.

キーワード: 活断層, 温泉, 地すべり, ボーリング, 地震

1. まえがき

仙台市の東方一帯には広大な第四紀の宮城野平野が広がっている。また、仙台市街地の周辺には大年寺山・八木山・青葉山・北山など120～150 m程度の丘陵地が発達しており、新第三紀層より構成されている。一方、西方には中新世の名取層群・秋保層群の堆積が見られ、さらに奥羽山脈とつながっている(図-1)。今回、1996年10月に仙台駅南方約2 km地点で温泉ボーリングを実施したところ、地下800～1,200 mで古い変成岩の地層にあたり、さらに1,200 mの地点で58℃の温泉(食塩泉)がわき出た(図-2)。これまで、旧仙台市内での温泉は全くなく今回の湧泉は極めて画期的なものであり、併せてこの古い地層は先デボン系のものであることがわかり、これまた貴重な発見となった。それは、上述のとおり仙台市周辺には第三系しか分布しておらず、また、地下は

全く謎であった。それで今後仙台地域の地質構造の解明に大いに貢献するばかりでなく、地域一帯の地震・地すべり・斜面崩壊の発生の究明の大きな手がかりになるも

図-1 宮城県 の地質案内

* 東北工業大学

上組

図-2 中新世初期の基盤

のと思われる。

2. 仙台付近の地すべり

仙台市を含む宮城県には1937年来、多数の地すべり・山崩れの災害が発生している⁸⁾(図-2)。現在地すべり危険箇所は、建設省所管のものが109箇所、農林水産省所

管のものが51箇所、合計160箇所となっており、その内地すべり防止区域として指定されているのは44箇所である。1997年3月宮城県砂防課はこれらの危険箇所を空中写真によって調査し、その危険度を次のように分類し、報告している。

A…危険度が明瞭なもの(82箇所)

B… // やや明瞭なもの (113 箇所)

C… // 明瞭でないもの (503 箇所)

この危険箇所の中には、長町―利府構造線^{1),4)}・双葉断層等^{1),4)}の活断層付近のもの、火山(温泉)地帯、県北の地震多発帯、グリーンタフ分布地域を中心としているものなどがある。これらの中で仙台市内を中心とする地すべりは、青葉山・金剛沢・緑ヶ丘・大年寺・三居沢・放山に分布している。仙台付近には大別してNE方向とNS方向に分布する地すべり帯の傾向が見られる。これらの地すべりは降雨・地下水および風化作用などによって発生したものとされてきた。しかし、前者は長町―利府構造線と後者は双葉断層線と極めて相関性を有している(後出)。また、仙台付近には5段丘が存在しており、段丘中或いは段丘沿いに地すべりが発生している。これらのことから地すべりの発生は地質時代の地殻変動が基本要因であることが考えられ、筆者は1975年に地層の堆積量や削剥量である不整合量を応力履歴と圧縮特性から算定することによって、変動量を推定してみた²⁾(応用地質 Vol. 16, No. 4)。

一般に不整合は重なり合っている二つの地層の時代に時間的間隙のある関係をさし、堆積の中絶や削剥現象が行われたことを示している。これらの地質系統の不整合は地殻変動の結果できるものであって不整合の大小を推定する手がかりとなるものである。しかしながら現在の地質学では地質層序上でその厚さを基準として、不整合現象地点での不整合量を推定しているのに過ぎない。また、同時に不整合現象自体が一見整合的に見えても実際に時間的間隙が存在することもあり、またかなり時間的間隙があるように見える不整合でも実際にはさほど大きくないこともある。これらの場合は、地殻変動を論ずる

場合は極めて重要なことである。すなわち、不整合量を実験と計算によって求め、不整合の確認とその削剥量を推定してみて、地すべりとの関連性を究明した(図-3)。それで、既述の仙台付近の地すべりの不整合付近から試料を採取して、圧密降伏応力、先行荷重、土粒子の重量や水とうの影響を考えて、堆積時層厚を算出し、現存する地層の残存量を差し引いて侵食量をだした。例えば第四系の青葉山層の現存量が21mとする。そこで試料の先行荷重が52 t/m²であれば、土の単位体積重量と地下水を考慮して計算すれば堆積時層厚は約43mとなり、43m-21m=22mが侵食量となる。このようにして、不整合付近で多数の試料を採取して実験を行うと各地の不整合量が定量的に把握された。

それにより、不整合量の大きなところが地すべり発生の中心的役割を占めていることが判断された。さらに、今回の試錐によって第三系の下部に先デボン系が存在しさらに著しい断層構造も明確になったことで地すべりのみならず地質・地形条件にも大きな影響を与えていることが確実となった。

3. 試錐結果による地質状況

1996年11月に試錐によって発見された岩相と温泉は、従来仙台市においては全く知られていなかった。もちろん仙台市郊外には作並(仙台駅西方約28km)・秋保温泉郷(同約15km)等があるが、旧仙台市内には温泉は一つもなかった。また岩相に関しても新事実であるが後述する。今回の試錐によってNo.1孔(愛宕の湯)の地質状況は次のとおりである。

愛宕の湯(No.1)(仙台市愛宕神社)H. 8.11月 27m(標高)
掘進量 1,200 m
湧泉量 200 l/min 58°C
泉 種 カルシウム・ナトリウム―塩化物泉、高張性弱アルカリ性高温泉
0~10m 崖錐堆積物
10~15 砂岩・凝灰岩・亜炭(向山層)

図-3 応力履歴と圧縮性との関係

15~	砂岩 (竜の口層) 岩芯なし
175	凝灰岩・砂質泥岩
300	凝灰質砂岩
500	凝灰質砂岩・貝化石混入
505	火山礫凝灰岩
566	安山岩・同質凝灰岩
697	同上破碎・断層構造
800	破碎粘板岩
900~1,000	変成岩破碎
1,000~1,200	同上破碎

この試錐状況から見ると、0~200 m は、鮮新世の仙台層群であり、200~800 m は中新世の名取層群であると思われる。800 m 以深は割山変成岩と推定される⁷⁾ (写真-1)。元来、割山層 (写真-2) は生田・藤田 (1975 年) が命名したもので、泥岩や珪質な砂岩で構成され、泥岩には石墨または石灰質なレンズをはさむ低変成岩であるとしている。そしてこの層は松ヶ平層*と同層準にあつて、この松ヶ平層は上部デボン層の合の沢層** (非変成) によって不整合におおわれている。それ故、松ヶ平層と割山層は先デボン紀とされている (図-4)。今回、試錐によって発見された変成岩はこの割山層と全く酷似しており割山層の連続延長であると考えられる。この変成岩は先デボン紀であるのでシルル紀・或いは先シルル紀の可能性をもっている⁴⁾。

今回、試錐によって採取された変成岩は顕微鏡下で次のことが認められた (蟹沢聡史・東北大学教授による鑑定) (写真-3)。

1. 石灰質砂岩・頁岩互層で千枚岩質から成る
2. 砂質部はレンズ状にちぎれている
3. 碎屑性石英・斜長石・スフェーン・緑簾石などからなる。その他、微細な石英粒・絹雲母・方解石などを生じる
4. 頁岩質の部分もほぼ同じと考えられるが、微細なため碎屑鉱物ははっきりしない。砂質部に比べて、炭質物と思われる不透明物質が多い。また、層理面に斜交するへき開が発達する

また、この南方 18 km で H. 4 年に掘進した試錐も、温泉の湧出を見ることが出来、また地質もこの地域の構造解析の重要な手がかりになった。その地質状況を下記に示す。

* 松ヶ平層…佐藤 (1956 年) が命名。緑~黒色の泥質~珪質片岩より成り (加納 1958 年, 黒田・小倉 1960 年) 多くの石英質レンズを含む。強く微褶曲, 泥質部は絹雲母・石墨から成る。

** 合の沢層 (上部デボン系) …佐藤 (1956 年) が命名。層厚 75 m の頁岩・凝灰岩より成り, これから *Sinospirifer sinensis australis*, *Cyrtospirifer* sp. を産し, 1954 年に早坂・湊が上部デボン系としており, 松ヶ平変成岩上に不整合に重なっている。

写真-1 愛宕試錐 (No. 1)
1,000 m 変成岩の岩芯

写真-2 宮城県亘理町割山
割山層

写真-3 顕微鏡写真 (横幅 6.5 mm) (クロスポーラー)
(愛宕試錐 1,000 m)

春の湯 (No. 2) (岩沼市) H. 4.12.11 3.8 m (標高)

掘進量 900 m

湧泉量 200~300 l/min 42.5°C

泉種 食塩泉

0~ 6m 粘性土 (表土)

6~ 31 砂質土

31~ 89 細粒~粗粒砂質土

- 89~246 砂質泥岩173m Cl⁻: 1,600mg/l
 246~279 安山岩質凝灰岩
 279~363 砂岩 貝破片混入多
 330m PH7.9 Cl⁻: 1600mg/l
 363~387 泥岩 炭質物混入 C¹⁴ 36,200年以上
 387~396 安山岩質凝灰岩
 396~480 砂岩
 480~590 安山岩質凝灰岩
 590~900 花崗岩 600m PH8 Cl⁻: 480mg/l

この試錐をまとめてみると

0~250m 仙台層群(鮮新世)上部の砂岩・泥岩

は、仙台層群の竜の口層に相当する坂元砂岩と思われる。

250~590m 名取層群(中新世)

590~900m 花崗岩 花崗岩はミロナイト化しているように見えるがはっきりしない。割山地区では、割山層が花崗岩によって貫かれており、本地域も同様な関係にあると思われる。

4. 試錐結果による地質構造と地すべりについて

東北地方の基盤構造は地壘状構造を呈していることが

図-4 東北地方の基盤地質(北村 信 1973)加筆
 ×1. 愛宕試錐 ×2. 岩沼試錐

多く(図-5), とくに花崗岩はその傾向が強い³⁾(東北工大紀要 1981 年)。また, 地すべりもこの花崗岩の緑辺部に多く発生しており, これを花崗岩帯地すべりと呼んだ(地すべり学会, 第 26 回(1987 年⁵⁾), 第 27 回(1988 年⁶⁾), 第 31 回(1992 年))。東北地方には, 図-6 のように三条の南北方向に基盤の花崗岩が配列しており, 年代的に東側程古い。そして, これらの花崗岩の周縁部はほとんどが地すべり地帯となっている。また, 構造としては, 地塁状構造, 断層, 褶曲, 傾動を伴う地殻変動がみられる。更に Miyabe N. (1952) の研究によれば年間 1 mm~1.8 mm の隆起量を測定しており, 小貫義男(1969)も同様に花崗岩の垂直隆起変動量を解析している。すなわち, 花崗岩は経年変動としてみても, 現世の地すべりの大きな素因となっていることが理解できる。

今回, 岩沼地区の試錐下での花崗岩は明らかに北阿武隈の東側に発達する花崗岩の一部と考えられ, 破碎されミロナイト化しており, これらも地塁構造によるものと考えられる(図-5)。また, 愛宕の試錐の 900 m 地下の

変成岩も割山層の延長であり, 極めて破碎されていることから, 同様に上述の造構運動に伴うものであろう。また, 南部の北阿武隈地区の隆起帯として出現している花崗岩や割山層は岩沼や仙台に入ると急速に地下にもぐってその構造は消失してしまうが, 試錐による破碎状態を見れば, 南部と同様の構造を呈しているものと考えられ基本構造は変わらない。しかし, 急速に沈下する地域には長町-利府構造線, 坂元砂岩層および高館層で代表される火成活動があることは極めて興味深く今後その関係を究明しなければならない。しかし, No. 1 と No. 2 の試錐を比較してみると, 従来まで知られていない地質構造が想定される。すなわち No. 1 には地下深所に割山変成岩が存在していたことである。次に, No. 1 と No. 2 を単純に結んで推定断面図を作ってみると先中新世の基盤(図-2)は約数度の傾斜でゆるく北方へ向かっていくことになる。しかし, No. 2 の試錐や同周辺の地質から総合判断すると, この付近で先中新世の基盤はゆるやかではなく急崖(傾斜 40~50 度)をなして北方に向かっているものと考えられる(図-7)。換言すれば, No. 2 付近で断崖をなして切立っており, その先でゆるく傾斜をしながら No. 1 へ連続していたものと思われる。また, この急崖

図-5 東西断面図

図-6 東北地方の花崗岩と地すべり

付近には中新世初期に活動した高館安山岩が広く分布している。すなわち、この場所には大量の溶岩や火山灰が発達している。これはこの急傾斜面に沿って激しい火山活動と海底地すべりを起こした結果であろうと思われる。また、この場所は激しい火山活動と前述の基盤面が断崖であることから考えて、大きな割れ目が存在していた可能性が高い。さらにこの場所にはNE性の長町ー利府ー円田活断層帯があることは偶然とは考えにくい。これは今後の地震予知も含めて、極めて重要な地質構造である。また、この長町ー利府ー円田活断層帯には既述の現世の

図-7 No. 1, No. 2 地域推定模式地質構造図
(実線・破線: 断層)

地すべり帯が分布している。これまた、地すべりが単にこの活断層帯に並んでいるということだけではなく、基盤構造に支配されているものと考えられる。すなわち、

図-8 仙台付近の活断層(日本の活断層 1980 に加筆)

図-9 (9-1(×1), 9-2(×2) は拡大図)

9-1(×1)

9-2(×2)

図-2の地すべり地形でもわかるように、仙台周辺には多数の地すべりが発達している。この地すべりは大局的には、仙台市西方の新第三系の分布地帯と活断層地帯沿いのものに区分できる。とくに、後者は、双葉活断層と長町-利府-円田活断層に関係した地すべりである。それ故、この活断層を解明することにあたって今回の先デボン系と花崗岩の発見は、これらの謎を解決したものともいえる(図-8)。

今回判明したこの新しい地質構造は1997年5月11日に発生した秋田鹿角・八幡平地すべりにも極めて共通性がある(図-9)。すなわち、この地域から南北にのびる構造線(双葉断層の延長)鳴子・栗駒・田沢湖方面へと北方へのびているが、田沢湖周辺で急激に不鮮明になる。これはこの不鮮明な地域で、北上山地から延長の日詰-気仙沼構造線・早池峰構造線のNW性の構造線によってこの南北性の構造線が胴切されている為であろう。このことはNo. 1~No. 2地域が長町-利府構造線で切断されていることと同様な関係である。さらに、これらの地塁状構造以外にも第三系と先第三系とが断層で接しているようであり、かなりはげしい造構運動が発生したものと推定される。一方、温泉は上述の一連の強烈な破砕帯の摩擦熱や花崗岩から由来する蓄熱された熱源から供給されたものが成因として考えられる。

5. まとめ

今回の試錐によって得られた古期岩相と湯脈の発見は単に仙台付近の地下構造を解明出来た事だけではなく、それと共に今後の地震予知にも大いに役立つ大成果であった。すなわち、仙台市は宮城県沖地震で大災害を受

けているが、1995年に発生した阪神大地震後、上述の長町-利府活断層の動きが注目され、話題になっている。例えば、仙台付近にマグニチュード6~7程度の直下型地震が発生したら、強震・烈震となり、大変な被害が起こるかもしれないと云われている。今回の新事実によって、この長町-利府構造線はかなり古い時代から活動の場となっていることが暗示され、ますますより精密な調査の必要性を示唆しているものと云える。すなわち、中新世初期よりこの地域は大きな割れ目・火成活動・海底地すべりの場であり、さらに現世の地すべりにも連動していることが想定された。

最後に、本論文をシルル紀の発見者・小貫義男先生およびグリーンタフと温泉の先覚者・北村信先生の御霊前に謹んで捧げたい。

参考文献

- 1) 宮城県高等学校理科研究会地学部会: 宮城県の地質案内, pp. 1~159, 1975
- 2) 盛合禧夫: 仙台付近の地すべりと不整合について, 応用地質, Vol.16, No.4, pp. 27~35, 1977
- 3) 盛合禧夫: 奥羽背稜山脈に発達する基盤花崗岩の地質学的研究, 東北工大紀要理工学編, pp. 53~60, 1981
- 4) 北村信: 東北地方の基盤地質, 地すべり学会東北支部, pp. 1~37, 1985
- 5) 盛合禧夫・阿部真郎・森屋洋: 東北日本のグリーンタフ地域に見られる地すべり地質, 第26回地すべり学会研究会講演集, pp. 42~45, 1987
- 6) 盛合禧夫・千葉則夫: 東北地方の地すべり地質, 第27回地すべり学会研究会講演集, pp. 6~7, 1988
- 7) 生田・中川・蟹沢編: 東北地方地質誌, pp. 1~336, 共立出版, 1989
- 8) 地すべり学会東北支部: 東北地方の地すべり・地すべり地形, pp. 1~142, 1992

(原稿受理日 平成9年6月26日)

飽和度の上昇に伴う不飽和砂質土のせん断変形機構に関する研究

「地すべり」Vol. 34, No. 3 (通巻第 131 号) pp. 1~8, 1997 年 (平成 9 年) 12 月

笹原克夫

不飽和砂質土のサクシオン除荷に伴うせん断変形機構について検討するため、不飽和三軸圧縮試験装置を用いたサクシオン除荷試験を行った。その結果サクシオン除荷に伴うせん断進行が確認できると共に、主応力比及び平均主応力の変化がせん断進行に与える影響についても定量的に評価できた。次にサクシオン除荷に伴うせん断変形の進行を予測するための、不飽和砂質土の構成式を提案した。これはサクシオンに起因する等方的なボンド応力で応力を補正し、その後松岡の提案した CMP 上で応力・ひずみ関係を定義するものである。このモデルはサクシオン除荷試験でのひずみの進行をよく再現できた。

仙台市内における先デボン紀層と温泉の新発見および地すべりとの関連について

「地すべり」Vol. 34, No. 3 (通巻第 131 号) pp. 9~16, 1997 年 (平成 9 年) 12 月

盛合禎夫, 上野春雄

仙台付近には第三系しか分布しておらず、地下は全く不明であった。1996 年 10 月 1 日仙台市内で 1200 m の試験錐を行って先デボン紀層と 58°C の温泉を発見した。何れも従来まで知られていない新事実であった。この事実から、仙台付近の地質構造が明確になり、地すべりとの関連も解明でき、同時に地震発生についても大きな手がかりとなった。

1995 年兵庫県南部地震時に発生した六甲花崗岩地域の斜面崩壊の運動様式と機構

「地すべり」Vol. 34, No. 3 (通巻第 131 号) pp. 17~24, 1997 年 (平成 9 年) 12 月

横山俊治, 菊山浩喜

兵庫県南部地震で発生した六甲花崗岩の斜面崩壊は地震動加速度の慣性力による転倒が発生時の運動様式である。崩壊発生頻度は新鮮で割れ目の少ない花崗岩や尾根上の花崗岩巨礫で高い。

地震による崩壊の特徴とそのモデル斜面における理論的解析

—中国永登地震を例として—

「地すべり」Vol. 34, No. 3 (通巻第 131 号) pp. 25~33, 1997 年 (平成 9 年) 12 月

郎 煜華, 中村浩之

地震による崩壊はいろいろな特徴がある。例えば急斜面や凸型斜面に多発し、また表層崩壊が多く、地震断層付近に集中的に分布するなどの特徴があげられる。本研究では中国永登地震により発生した崩壊の特徴について詳細に分析し、その特徴をまとめた。次に、動的計画法による臨界すべり面解析により、モデル斜面における地震時の安全率とすべり面の変化を分析し、地震による崩壊の特徴を理論的に考察した。

進行性破壊を考慮した斜面安定解析

「地すべり」Vol. 34, No. 3 (通巻第 131 号) pp. 34~40, 1997 年 (平成 9 年) 12 月

滝 昌和, 山上拓男

極限釣り合い法に基づき進行性破壊を考慮した斜面安定解析法を開発した。進行性破壊は、スライス底面ごとに局所安全率を定義することで表現した。これにより未知量が大幅に増加するが、簡単な仮定を導入して問題を静定化し、力とモーメントの釣り合い条件を完全に満足した。さらに、この局所安全率を用いて土の軟化現象を考慮することができた。最後に、実際の崩壊事例に適用して本解析法が進行性破壊を表現し得ることを明らかにした。

三郡変成帯で発生した地すべりについて

—山口県宇部市の例—

「地すべり」Vol. 34, No. 3 (通巻第 131 号) pp. 41~50, 1997 年 (平成 9 年) 12 月

山本哲朗, 瀬原洋一, 中森克己, 森岡研三

山口県宇部市における三郡変成岩からなる丘陵地の斜面で発生した地すべりの特徴を明らかにするために、地質学・岩石学・土質工学の立場から斜面の調査を行った。その結果、斜面地盤は蛇紋岩のホルンフェルス、透角閃石岩の破砕片と風化土が互層をなす透水性が比較的高いことが素因となり、また斜面末端部の切取りと豪雨が誘因となって、地すべりが発生したと判断された。地すべり面の緑泥石からなる粘土の不攪乱試料の残留強度は、通常の逆算法で求めた値と一致した。最後にスケンプトンの残留係数を用いてすべりの発生機構を考察した。