表面に水の層がある事になる。即ち縦軸に $Wv^{1/2}$ をとり横軸に $T_0 - T_a$ (又は気温) をとれば、(4) 式の條件は、着氷面に水の層があるか、否かの條件となる。即ち第 6 圖に於て線の左上は水の層のある領域である。この線から離れる程水の層は厚くなり遂に水がたれる事が考へられ、又この線の右下では線から離れる程粗氷となり樹氷に近づく事が考へられる。

實測の値を圖中に入れると、上記の考へと實測がよく一致する事が解る。

6. 結 論 着氷による細い針金の温度上昇を熱電計で測定した結果、温度上昇は $0 \sim 2^\circ\text{C}$ に及ぶ。温度記録より見れば、温度はかなり振動し、この振動を調べて見ると雲の構造の不均一に基くものと考へられる。一分毎の着氷速度及温度上昇の同時觀測の結果は、着氷速度が増すと温度が昇る。簡単な式に依つてこの温度上昇を當つてみると

$$\Delta T = CR^{1/2}Wv^{1/2} \quad \text{及} \quad \Delta T = T_0 - T_a (CR^{1/2}Wv^{1/2} \geq T_0 - T_a)$$

となり、針金の半径が 0.033 cm の場合は、

$$CR^{1/2} = 0.092 (v = \text{m/s})$$

となる。

これより計算した値は實測とよく一致する。

$$CR^{1/2}Wv^{1/2} \geq T_0 - T_a$$

は氷の性質を示す條件となり、左邊が大なる時は氷の表面から水がたれる場合、左邊が小なる場合は粗氷樹氷となる事が考へられ、實測の結果も同様になつてゐる。

第 6 圖 着氷性質と氣象要素との關係

要 報

高 氣 壓 の 長 週 期 振 動, 靴 型 高 氣 壓 と 天 候*

荒 川 秀 俊**

1. 高氣壓の長週期振動, 2. 靴型高氣壓と天候

低氣壓の短週期振動については、既に高谷氏等の研究がある。今は三寒四溫の様な、高氣壓の長週期振動について述べよう。定常状態にある圓形等壓線をもつ高、低氣壓風系の

* H. Arakawa: Schwingungen mit der Periode einigen Tagen bei antizyklonaler Strömung.

** 中央氣象臺調査課長, 氣象技師, 理學博士。

安定度についての研究は、既にその数も尠くない。便宜上、著者の前論文“高、低気圧風系の安定度とその擾乱”(氣象集誌第2輯第19巻第5號)の成果及び符號をそのまま踏襲することにする。

今高、低気圧が略定常性の状態にあり、圓形の等壓線をもつて、氣流は摩擦なく流動して居るとする。圓座標を用ひ、高、低気圧の中心からの距離を r とし、方位角を θ とする。 ρ を密度、 p を氣壓、 ϕ を緯度、 ω を地球回轉の角速度、 V_θ を等壓線に沿ふ一

とかは、略定常性になることが多いから、これから主として高気圧について述べよう。

簡單のために $V_\theta = -n \cdot r \omega \sin \phi$ とおく。高気圧の場合には $V_\theta + r \omega \sin \phi > 0$ なる關係を充さねばならぬから、 n は 1 よりも小さい正數とする。さうすると週期 T は

$$\frac{2\pi}{T} = 2(1-n)\omega \sin \phi, \text{ 即ち } T = \frac{1}{(1-n)} \frac{\pi}{\omega \sin \phi}$$

依て

$n =$	0	1/2	2/3	3/4	4/5	5/6	6/7	7/8	1 の時
$T =$	振子時 12	振子時 24	振子時 36	振子時 48	振子時 60	振子時 72	振子時 84	振子時 96	∞

般氣流とする。この高、低気圧風系が小擾乱を受ける

$$\left. \begin{aligned} \frac{dV_\theta}{dr} + \frac{V_\theta}{r} + 2\omega \sin \phi > 0 \text{ のとき安定} \\ \frac{dV_\theta}{dr} + \frac{V_\theta}{r} + 2\omega \sin \phi < 0 \text{ のとき不安定} \end{aligned} \right\}$$

であることがわかつて居る。今角運動量 $r(V_\theta + \omega \sin \phi \cdot r)$ を Ω と書けば、

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\Omega}{dr} > 0 \text{ のとき安定} \\ \frac{d\Omega}{dr} < 0 \text{ のとき不安定} \end{aligned} \right\}$$

とも言ひ直せる。

高、低気圧風系が安定なときには、小擾乱は週期的運動をする。その週期 T は次式で與へられる。

$$\frac{2\pi}{T} = \sqrt{2 \left(\frac{V_\theta}{r} + \omega \sin \phi \right) \left(\frac{dV_\theta}{dr} + \frac{V_\theta}{r} + 2\omega \sin \phi \right)}.$$

この週期 T は

V_θ が殆ど零のときは

$$T = \pi / \omega \sin \phi \text{ (即ち 12 振子時).}$$

Ω が一定 (r に關せず) に近づくときは

$$T \rightarrow \infty.$$

一般に V_θ が低気圧性のときは T は $\pi / \omega \sin \phi$ (即ち 12 振子時) より短い短週期運動をなし、 V_θ が高気圧性のときは T は $\pi / \omega \sin \phi$ より長い長週期運動をする (dV_θ/dr が異常な値を持たない限りは)。

定常性の風系になることは、低気圧の場合は殆どない。しかし冬のシベリヤ高気圧とか、太平洋高気圧

となる。従つて三寒四溫位の週期をもつ定常性高気圧の振動も存在し得ることが推論できる。さうして定常性高気圧の振動週期は低緯度地方程大きい。さうしてこゝに述べる靴型高気圧は中緯度高気圧の息吹きの一様相と見て宜いのではないかと思ふ。

靴型高気圧と天候 夏季、内地が高溫多照になる充分條件は、氣壓配置が南高北低⁽¹⁾になることである。

この南高北低の氣壓配置が安定して居れば、内地の天氣は良くて持續し、氣溫高く日照が多くなる。

然るにこの南高北低の氣壓配置が持續する一つの場合として、内地附近に特異な高気圧の出現することが

第1圖 昭和11年7月27日午前6時の天氣圖、典型的な靴型高気圧

(1) 岡田：氣象學 下巻、第10章 第4節 (昭和10年)。

ある。即ち昭和 11 年 7 月 27 日午前 6 時の天氣圖(第 1 圖参照)が示す如く、北太平洋高氣壓(俗に言ふ小笠原高氣壓)が内地の遙か東南東の海上に蟠居し、その西端が内地の南方海上に延び、高氣壓の尖端が内地の方に凸出して居る場合である。このやうな氣壓配置は從來、“高氣壓のジッポ”とか、“鯨の尾のやうな高氣壓”とか言ひ慣はされて居た。今私はその特異な形狀から見て、北太平洋高氣壓の末端が西に延びてはね上つて居る狀況が、地圖で見るイタリヤの地形に似て居るので、これを靴型高氣壓と名付けようと思ふ。

盛夏、この種の靴型高氣壓が出現すると、内地の天氣が永續する傾向がある。この靴型高氣壓の出現と内地の天氣との相關を論じて見たいと思ふ。

私は先づ昭和 4 年から昭和 13 年迄の 10 箇年間を擇んで、中央氣象臺發行の朝夕の天氣圖を検討して、この 10 年間に靴型高氣壓の出現した日時を抜き出して見た。所がこの種の氣壓配置の擇び方には、多分に個人的な意見が入つて来る。即ち私が靴型高氣壓だと判定したものも、一般の人々には必ずしも靴型だと受取られないかも知れぬし、私が靴型でないとしたものも、多くの人々は靴型高氣壓中に算入するかも知れない。それについて、私は次のやうな心構へで靴型高氣壓を擇んだ。

1) 春秋、移動性高氣壓が西の方から東進して内地

附近にさしかゝる際には、よく靴型高氣壓に似た恰好をする。こうした場合は内地の天氣は良いのであるが、この天氣は永續しないで、すぐに背後から來襲する低氣壓等のために天氣が悪化する。(例、昭和 5 年 10 月 27 日午後 6 時の天氣圖を見よ)。このような場合は探らぬことにした。

2) 東西に長く延びた高氣壓が變形して、一時靴型高氣壓となることがある。(例、昭和 10 年 4 月 22 日午前 6 時)。この種の靴型高氣壓の後には好天氣が永續する。

3) 盛夏、靴型高氣壓の出現するのは、高氣壓が東の方から内地へ延びて來る場合か、又は三陸沖の高氣壓が南下する場合が多い。この二つの場合が典型的な靴型高氣壓出現の主要な契機である。

4) 南高北低で、典型的な靴型高氣壓の場合だけを擇んで論ずる。靴型高氣壓が現はれて居ても、前線とか低氣壓とかが内地附近にかゝつて居るやうな場合は探らなかつた。例へば昭和 6 年 8 月 10 日から 12 日までの天氣圖に見られるやうに靴型高氣壓になつて居ても、北海道方面に小低氣壓があり、足の甲にあたつて居る關東地方では、所謂乙字型低氣壓⁽¹⁾が形成されて居る。このやうな場合は典型的な靴型として採用しなかつた。

5) 私⁽²⁾が先きに論じたことがあるやうに、等壓線

第 1 表 昭和 4 年初頭より昭和 13 年末までに出現した靴型高氣壓の日時一覽表

昭和 4 年	7 月 11 日 18 時—12 日 6 時, 7 月 20 日 6 時, 7 月 27 日 6 時—28 日 6 時, 8 月 7 日 6 時—7 日 18 時, 8 月 18 日 18 時—19 日 6 時
昭和 5 年	4 月 17 日 18 時—19 日 6 時, 7 月 3 日 6 時—4 日 6 時, 7 月 15 日 6 時
昭和 6 年	なし
昭和 7 年	7 月 23 日 6 時—30 日 6 時
昭和 8 年	7 月 29 日 6 時—30 日 6 時, 8 月 27 日 6 時—29 日 6 時
昭和 9 年	なし
昭和 10 年	4 月 22 日 6 時, 6 月 5 日 6 時—6 日 6 時, 6 月 15 日 6 時—16 日 6 時, 7 月 28 日 6 時—8 月 2 日 6 時
昭和 11 年	7 月 17 日 6 時—20 日 6 時, 7 月 25 日 6 時—29 日 18 時
昭和 12 年	5 月 11 日 6 時, 8 月 1 日 6 時, 8 月 12 日 18 時—14 日 6 時, 8 月 17 日 6 時—18 日 6 時, 8 月 25 日 18 時—26 日 18 時
昭和 13 年	7 月 17 日 6 時—20 日 6 時

(1) 朝倉慶吉：乙字形低氣壓，氣象集誌 第 41 年，402 (大正 11 年) 又は 荒川秀俊：日本氣象學史 §48 (昭和 16 年 河出書房刊)。

(2) 荒川秀俊：乙字型等壓線の生長機構，寒氣氾濫に際し低緯度に生ずる高氣壓性氣流系，氣象集誌 第 2 輯 第 21 卷 第 10 號 (昭和 18 年)。

が内地や朝鮮半島にさしかると、等圧線は風上の側では高気圧性の、風下の側では低気圧性の屈曲をする。その結果内地附近ではよく靴型高気圧のやうな恰好をした等圧線が現はれやすい。だから靴型高気圧に似た高気圧は、特に夏季、頻発する。私は典型的な場合のみを採用したが、それでも靴型高気圧かどうかは、人によつて意見を異にする可能性が充分に多い。

上のやうな心構へをして、昭和4年初めから昭和13年末までの10箇年間に互り、靴型高気圧が出現した場合を擇び出した。その擇び出された日付は、次の表に列挙してある。この日付に對應した天氣圖を見れば、讀者は私がどんなものを靴型と呼稱したか、了解することが出來よう。

この第1表に示された靴型高気圧の出現頻度を年別並びに月別に表示して見ると第2表の如くなる。

第2表 昭和4年—昭和13年靴型高気圧出現頻度表

	6月	7月	8月	其 他	合 計
昭和4年	—	3	2	—	5
昭和5年	—	2	—	1(4月)	3
昭和6年	—	—	—	—	—
昭和7年	—	1	—	—	1
昭和8年	—	1	1	—	2
昭和9年	—	—	—	—	—
昭和10年	2	1	—	1(4月)	4
昭和11年	—	2	—	—	2
昭和12年	—	—	4	1(5月)	5
昭和13年	—	1	—	—	1
合 計	2	10.5	7.5	3	23

第2表によると(1)靴型高気圧は盛夏、特に7月と8月とに多く出現する、(2)靴型高気圧は梅雨季には出現し難い、(3)典型的な靴型高気圧は昭和6年とか、昭和9年のやうな東北の凶冷年には出現しなかつたことを知る。

靴型高気圧の重要な特性の一つは、靴型高気圧が一度出現すると、内地の天氣が引續いて良く、高温多照の日が繼起することである。それを示すために、第2表に示した靴型高気圧が出現し始めてから、内地のよい天氣が持續した日數別の頻度を示して見ると

靴型高気圧が出現し始めてから内地全體の天氣が大體持續した日數	頻 度
1日半乃至3日	7回(30%)
3日半乃至5日	7回(30%)
5日以上	9回(39%)

即ち一度靴型高気圧が出現すると、それから内地(本州、四國、九州)全體の天氣が數日も續くといふのであるから、靴型高気圧の效驗は著しいと言はねばならない。靴型高気圧が盛夏、特に7月と8月に頻發するために、7月、8月は例年高温多照になると言つてもよく、靴型高気圧が梅雨季に殆ど現はれないのも宜なる哉と思はれる。又靴型高気圧が7月、8月に一度も現はれぬやうな年には、東北地方に凶作がおこる傾向のあるのも無理からぬことと思ふ。

靴型高気圧が出現すると數日間も内地全體の天氣がよいと言つたが、しかし内地に熱雷が頻發することを注意しておかねばならない。又先きにも述べた通り、靴型高気圧が出現すると、時によると足の甲の部分に乙字型低気圧が現はれて、こゝから副低気圧が發達して出て行くことがある。又靴型高気圧の足の甲の部分の切れ込みが發達すると、例へば颱風がこの切れ込みに入り込み、靴型高気圧を横斷して東北東に進行する場合もある。

第2圖 昭和9年7月8日
午後6時の天氣圖

第2圖には昭和9年7月8日午後6時の天氣圖を示す。この天氣圖は岡田先生⁽¹⁾が、昭和9年夏に九州に旱魃が起り、同時に北日本に凶冷が起つたことの説明に使はれた歴史的な天氣圖である。この圖によると一方では内地南方に靴型高気圧らしいのが(私はこのやうなものは靴型高気圧中に數へなかつた)現はれ

(1) 岡田武松：東北地方凶冷の原因，天氣と氣候 第1巻 第8號(昭和9年)。

て、九州地方に晴天をもたらし、他方オホーツク海方面に高氣壓が頭張つて居て北日本に凶冷をもたらして

居るのが了解される。昭和9年には6月中旬頃から夏の終りまでこれに似た氣壓配置が頻發して居る。

大氣中に於ける濕度の變化に就いて (2)*

坂 上 辰 夫**

1. はし が き

前報に於ては、小氣塊が乾燥斷熱的に上昇或は下降の運動をなす場合に、その濕度が如何なる變化をなすかを論じ、濕度の遞増率 γ_H に關してその數値圖表を與へる等した。その際乾燥斷熱減率 Γ を

$$\Gamma = \text{const.} = 0.000096 \text{ c.g.s.}$$

と置き、 Γ に及ぼす濕度の影響は無視して計算を進めたが、高温多濕の場合にはこれが無視し得ぬ程のオーダーとなることを附記した。本文ではこの關係を稍々詳細にあたつて見る。

2. 基 本 式

先づ鉛直運動を行ふ氣塊が乾燥斷熱變化をなす際

$$\gamma_H = \frac{dH}{dz} = H \left(\frac{5422.99\Gamma}{T^2} - \frac{0.0003412}{T} \right) \quad (1)$$

の關係がある事は前報で述べた。一方混合比を x とすると

$$\frac{1}{p} \frac{\partial p}{\partial z} - \frac{C_p}{AR} \frac{1+2x}{1+1.6077x} \frac{1}{T} \frac{\partial T}{\partial z} = 0 \quad (2)$$

なる乾燥級の關係から

$$\Gamma = \frac{Ag}{C_p} (1 - 0.3923x + 0.785x^2 + 6.43x^3) \quad (3)$$

が導かれる。之に

$$C_p = 0.2405(1+x-x^2) \quad (4)$$

を代入すると

$$\Gamma = 0.000096(1 - 1.3923x + 2.177x^2 + \dots) \quad (5)$$

故に (1) から

$$\gamma_H = \frac{H}{T} \left(0.520607 \frac{1 - 1.3923x + 2.177x^2 + 5.25x^3}{T} - 0.0003412 \right) \quad (6)$$

3. 補 正 値

元來 x は小さくて、高温多濕の場合でも精々 1/20 のオーダーがその最大である。従つて (6) から、前報の γ_H の數値 (本文では之を γ_{H0} とする) に加ふべき補正值としては

$$\Delta = - \frac{0.520607 \times 1.3923Hx}{T^2} \quad (7)$$

を取れば十分である。

又この Δ の γ_{H0} に對する割合は

$$\frac{\Delta}{\gamma_{H0}} = - \frac{\frac{0.520607 \times 1.3923x}{T}}{\frac{0.520607}{T} - 0.0003412}$$

百分率で表はせば

$$\sigma = -72.48x / (0.520607 - 0.0003412T) \quad (8)$$

と成るが近似的には (T の代表値として 290°A をとり)

$$\sigma \doteq -172x (\%) \quad (9)$$

として略差支へが無い。實際の取扱にも (9) に依り σ と x との直線關係を示すグラフを作つて置き

$$\gamma_H = \gamma_{H0} \left(1 + \frac{\sigma}{100} \right) \quad (10)$$

から γ_H を決定すれば普通の用には十分であらう。 T を無視したために生ずる σ の誤差は、 σ に對して 2~3% 以下に過ぎない。

* T. Sakaue: On the Variation of Humidity of Vertically Moving Air (2).

** 中央氣象臺研究部, 氣象技手.