原 著

精神病者の体型学的研究

日本医科大学解剖学教室 (主任 横尾安夫教授)

本 多 浄

Kiyoshi Honda

緒 言

人類の肉体的素質と精神的素質との関係については古代印度及びエジプト時代から論ぜられて来ているということであるが 1921 年 Ernst Kretschmer は人間の体質及び気質に就て何等かの相関聯するところなきかを見んと試み、主として躁鬱病及び精神分裂病の体質論に応用せんとし、先づ体型に於て ①Asthenische Körperbautypen ②Athletische Körperbautypen ③Pyknische Körperbautypen の三主型に分類し此三主型何れにも属せぬ異常体質者を一括して ④Dysplastische Spezialtypen とし、此等の純粋な各種型の外に種々の混合型及び移行型ありとし、躁鬱性の精神基質と Pyknisch の体型、分裂性の精神基質と所謂 Asthenisch 又は Athletisch 及び Dysplastisch の各体型との間には生物学的に明瞭な相互の親和的な関係があるとした。その方法としては身体各部の測定をなし、其外貌を検し、毛髪の発生状態及び皮膚色沢の如何、生殖腺の発育状態等を探り、彼此相比較して査定したわけである。このような Kretschmer の三体型を客観的に区別するには最もよく習練された眼を要するわけであるが、身体各部の綿密な計測をなし種々の示数を案出し之によつて不鮮明な客観的体型を区別しようとする試みは尙 Westphal, Haltner 及び Straus 等によつても行はれ、Kretschmer 自身も又 Pignet 氏示数が精神分裂病と躁鬱病との体型をよく区別し得ると認めた。

本邦では石川貞吉が大正 13 年初めて Kretschmer の体型学を本邦人に応用し、躁鬱病患者 57 名 (男 37 女 20) に就て生体計測は全く行はず、単に視診及び触診により男 28.7% 女 30% 平均 29.8% に Pykniker を認め、一般精神病患者中躁鬱病患者のみに比較的多数の Pykniker の群集するを認め、躁鬱病患者の中で明瞭な Pykniker と不然者と比較し、全体としては著しい特異点はないが、其経過及び予後に就て稍々注

意すべき特異点ありとした。其後多くの諸家によつて Kretschmer の体型論は承認せられ、体型と精神病的素質との間に一種の密接な関係があることが認められたが、本邦精神病患者の体型の示数的表現を初めて試みたのは杉原満次郎である。氏は昭和 5 年に日本人 46% 及朝鮮人 56% の診断のついていない男性精神病患者 312 名に就いて Kretschmer の体型分類に基礎を置き、先づ客観的体型を分類し次で身体各部を 11 項目 (身長、頸長、頸囲、頸部前後径、頸部横径、胸骨長、胸囲、胸廓前後径、胸廓横径、軀幹長、脚長) に就いて計測し、これを示数的に確定せんとし、其結果欧米人に於て認められるのと略々同一の特徴を具備する細長型並びに肥満型を証明し、定型的闘士型は存在せずとし、これに近い者を類闘士型とし、又肥満型に類似の者を類肥満型として区別し、此等の体型を細長—闘士型、肥満及類肥満型の二大群に大別した。示数的鑑別法には先づ第一に Wertheimer-Hesketh の示数を推奨し、次に季肋角に対する肋骨傾斜の示数、参考として頸長対頸囲、胸囲対身長を示数が重要なものと考ふとし、両体型群は長径の発達には大差なく、主として横径並前後径の著明なる差異に帰着するとし、情性に関しては欧米人と同様に細長—闘士型に分裂性情性、肥満型及び類肥満型に躁鬱性情性を認め、精神病患者に於ける体型分布も躁鬱病では 13 例中 93% の大多数の者に肥満型及び類肥満型、精神分裂病では細長—闘士型 74% 肥満型及び類肥満型 26% であるといふ。次に太田清之は昭和 8 年本邦健康人及び精神病患者 1340 名中から Kretschmer の三体型鑑別型によつて各体型に属する者を予め客観的に選定し、肥満型者 50 名、闘士型細長型者各 100 名計 250 名の男子に就き、身体各部を計測してこれを欧州人に比較し、体型示数を検討、本邦人体型を区別する示数配合を考察して先づ Wertheimer, B 及び C の三示数で細長型を他の二体型から区別し、その残余を Andreew, D 及び E 示

数によつて肥満型と闘士型とに分つとし、又昭和 10 年男子に於けると同様本邦女子に就ても多数の材料の中から臨牀的綜合診断によつて純粹なりと思惟せられる細長、闘士型及び肥満型を各 50 名宛選定し、此等の 150 名に就て身体各部を測定し、これを独逸人及び本邦人男子と比較し、又各種体型示数を算出して本邦女子体型診断のための体型示数の組合せを考へ、先づ A、B 及び E の三示数にて細長型を他の二体型から分離し、次に肩幅胸囲、Andreew 及び D の三示数にて闘士型と肥満型とを分つとし、本邦人体型の示数的表現に一つの系統が与へられたのである。昭和 27 年和田通譚は精神病患者頭顔部の生体計測学的研究を行い、東京都内 8 精神病院の患者 2195 名（男 1245、女 950、関東地方出身者 78.5%）に就て患者を内因性、外因性及び中間性精神病患者の 3 群に分類し、頭顔部に就て 15 項目（頭最大長、頭最大幅、最小前頭幅、外眼窩縁間幅、頭耳高、頬骨弓幅、下顎角幅、相貌学上顔面高、相貌学上上顔面高、下顔面高、内眥間幅、鼻高、鼻長、鼻幅、鼻低深、口裂幅、粘膜唇高、全上唇高、口唇高）の計測を行い一般健康人に比べて精神病患者では頭最大長は男女共に小さく、頭最大幅は男子内因性精神病患者は中以上の大きさ女子成年期以後では大の部に属する。頭耳高は男子では健康者と大差ないが女子成年期以後では大の部に属する。頬骨弓幅は男女共に小で男女共に一般人に比して短頭及び高頭の部に属し又男子では尖頭の部に属するとした。

余は診断の確定した入院中の本邦人精神病患者の詳細なる生体計測を行い健康人と比較し又前記諸家の報告に基き示数を計算し数値的に Kretschmer の三体型を分離して各体型の分布状態を見た。

研究材料及び方法

研究材料は大阪府下七山病院の入院患者中より比較的顕著な精神分裂病様症状の患者（以下分裂型と略称する）男子 307 名女子 109 名躁鬱病様症状の患者（以下躁鬱型と略称する）男子 28 名女子 17 名計 461 名につき計測した。その出生地は近畿地方 83.6% 其他

年 令 分 布

病型	年 令					
	15~19	20~29	30~39	40~49	50~59	計
男 分裂型	23	176	67	30	10	307
男 躁鬱型	6	6	3	5	8	28
女 分裂型	10	65	26	8	0	109
女 躁鬱型	2	7	2	5	1	17
計	41	254	98	48	19	461

は本邦の殆ど全府県に及んでいる。年齢は満 15 歳より 60 歳まで其分布は別表の通りである。

身体各部の測定には大体日本学術会議計測委員会の協定に従い測定方法は Martin 横尾により山越製の Martin 式人体測定器を用い体重計は根岸計機製作製を使用した。

計測項目は身長、肩峰高、中指尖端高、胸骨上縁高、胸骨下縁高、恥骨上縁高、腸骨前棘高、胸廓長、胸廓矢状径、胸廓横径、胸骨長、肩峰幅、腸骨嵴間距離、大転子間距離、顔高、顔幅、頭耳高、頭矢状径、頭横径、頭囲、頸囲、上膊囲、前膊囲、手囲、胸囲、腹囲、腰囲、大腿囲、下腿囲及び体重の 30 項目である。長さは cm にて重さは kg にて現はした。比較には主として男子は池田の近畿地方の人類学的研究、太田の Kretschmer 三体型の示数的表現と本邦内地人の体型及び田中の長野地方人の人類学的研究に於ける計測値を用い女子は阿部の日本婦人の体型の研究及び太田の本邦女子に於ける Kretschmer 三体型の示数的表現及び男女共頭顔部の比較には和田通譚の精神病患者頭顔部の生体計測学的研究の計測値を参考とした。

研 究 成 績

I. 男 性

男子に於ける計測値を比較すると（表 1）身長は分裂型の方が平均値は大きいが差は 1.07 ± 1.18 ではつきりした事が云へない。

両病型共に池田の例の身長よりやや劣り（差 $1.19 \pm .63$ ）田中の例の身長に近い。又両れも太田の三体型の値の闘士型と細長型との中間にあつて、より一層細長型の値に近い。故に身長では両病型共に本邦健康人平均の中短身の部に属し、三体型中の細長型に近い。

肩峰高も分裂型の方が平均値が少々優るが、差（ 1.06 ± 1.03 ）は明かでない。池田の平均値は両病型の間にある。

中指尖端高は両病型間の差殆どなく池田の平均値とも略々同じである。

胸骨上縁高は分裂型の方が平均値が少々優るが其差（ 0.7 ± 1.27 ）明かでない、両病型共に池田の値より劣るのみならず田中の値にも劣る。分裂型の平均値は田中の平均値より $0.45 \pm .56$ 池田の平均値より $0.94 \pm .61$ 小さい。

恥骨上縁高は分裂型の方が僅かに優つてゐるが（差 2.03 ± 1.11 ）其分裂型の平均値は池田（差 $2.95 \pm .42$ ）にも田中（差 $2.36 \pm .38$ ）にも劣る。

表 1

計測者 項目 \ 型	本 多		池 田	田 中	太 田		
	分 裂 型 307	躁 鬱 型 28	477	140	肥満型 50	闘士型 100	細長型 100
身 長	160.61±.033	159.54±1.14	161.8±.54	160.31±.53	15.40	16.50	15.80
肩 峰 高	132.44±.31	131.38±1.27	131.6±.53	—	—	—	—
中 指 尖 端 高	61.43±.19	61.41±.75	61.4±.31	—	—	—	—
胸 骨 上 縁 高	129.36±.35	128.66±1.23	130.3±.50	129.81±.44	—	—	—
恥 骨 上 縁 高	76.85±.21	74.84±1.10	79.8±.36	79.21±.32	—	—	—
胸 廓 長	28.03±.24	27.73±.77	—	29.92±.17	—	—	—
胸 骨 長	16.32±.23	16.64±.87	—	16.55±.10	—	—	—
前 軀 幹 長	52.96±.13	51.60±.51	50.3±.28	—	50.9	51.7	49.6
上 肢 長	71.08±.19	73.04±.85	70.2±.30	—	66.6	72.1	68.5
下 肢 長	82.95±.24	83.11±.88	83.8±.37	—	75.6	81.8	77.9

胸廓長は両病型の間に差 (0.3±.8) なく、共に田中の値より劣っている (差 1.89±.29)。

胸骨長も両病型の間に差 (0.32±.9) なく、田中の値も両病型の中間にあつて差がない。

前軀幹長は分裂型の方がやゝ優り (差 1.32±.53) 池田の平均値より躁鬱型はやゝ (差 1.30±.42) 分裂型はかなり (差 2.62±.31) 優り、又両病型共に太田の三体型中の闘士型の平均値に近い。

上肢長は分裂型の方がやゝ劣り (差 1.96±.87) 其分裂型が池田の値よりやゝ (差 0.88±.36) 優る。又太田の肥満型 (66.6 cm) や細長型 (68.5 cm) は明かに劣っているが、その闘士型の平均値は両病型の略々中間にある。

下肢長は両病型の間に差 (0.16±.92) なく、池田の下肢長に僅かに劣り、分裂型と池田との差 0.85±.44

は明らかとは云へないが、太田の三体型の下肢長は皆少しく小さい。

以上を総括して見ると、長軸の方向に於ては分裂型の方が躁鬱型より恥骨上縁高、前軀幹長、に於て稍々優り、上肢長に於て劣り、両病型共に本邦健康人平均より身長、胸骨上縁高、恥骨上縁高、胸廓長、上肢長に於て稍々劣り前軀幹長に於て優るが有意差のあるのは恥骨上縁高、胸廓長、及び前軀幹長である。即、健康人より稍々短身で、前軀幹長と上肢長に於て稍々優り、長軸の方向に於ては健康人に比し稍々闘士型の傾向がある。太田の三体型中の闘士型の値に略々近い。

次に横軸の方向 (表 2) に就て見ると、肩幅は両病型の間に差なく、共に池田 (差 2.68±.30) 田中 (差 2.25±.29) の値より大きく、太田の闘士型と肥満型との中間の値である。

表 2

計測者 項目 \ 型	本 多		池 田	田 中	太 田		
	分 裂 型 307	躁 鬱 型 28	477	140	肥満型 50	闘士型 100	細長型 100
肩 幅	38.98±.25	38.68±.87	36.3±.16	36.73±.14	37.1	39.7	36.3
腸 骨 櫛 間 距 離	26.74±.16	26.96±.69	—	26.83±.14	24.1	25.0	23.9
胸 廓 矢 状 径	18.61±.85	18.65±.49	—	18.13±.11	20.0	19.0	17.0
胸 廓 横 径	26.41±.92	26.14±.40	—	26.10±.13	29.6	28.6	25.5
胸 囲	83.82±.24	83.54±1.14	83.9±.38	84.52±.36	82.0	85.0	74.1
腹 囲	71.21±.30	73.29±.14	—	—	82.0	75.0	69.9
腰 囲	75.67±.29	76.45±.84	—	—	87.4	88.7	80.2
下 腿 囲	32.46±.15	32.36±.52	—	—	34.2	34.9	30.0
頸 囲	35.06±.22	34.80±.92	—	—	36.4	36.4	33.4
前 膊 囲	22.56±.08	23.50±.42	—	—	24.9	25.4	22.5
手 囲	19.84±.15	20.24±.36	—	—	19.2	20.7	18.5
体 重	52.74±.33	51.64±1.09	—	55.31±.54	59.7	61.9	48.8

腸骨櫛間距離も両病型の間の差明らかでなく、田中の値は両病型の間にあつて矢張り差がない。両病型共に太田の何れの体型の値よりも大きく、その闘士型の値が最も近い。

胸廓矢状径及び横径は両病型の間に差なく、田中の値とも差なく、太田の闘士型と細長型との間の値で矢状径は闘士型に近く、横径は細長型に近い。

胸囲も両病型の間に差なく共に池田の値に近く田中の値より稍々小さい。太田の細長型 74.1 cm は著しく小さい。両病型の平均値は肥満型と闘士型との略々中間の値である。

腹囲は分裂型の方が明らかに劣り (差 $2.08 \pm .33$) 共に太田の闘士型と細長型との間の値で、分裂型はその細長型に躁鬱型はその闘士型に近い。腰囲では両病型の間に差がなく、共に太田の何れの平均値よりも小さい。下腿囲も頸囲も両病型間に差がなく、共に太田の闘士型と細長型との略々中間の値である。

前膊囲は分裂型の方が僅かに (差 $0.94 \pm .43$) 劣り太田の細長型の値に略々等しく、躁鬱型はそれより稍々大きく太田の肥満型と細長型との間にある。手囲も分裂型の方がいくらか小さい様子が有り (差 $0.4 \pm .39$) 又分裂型は太田の肥満型に、躁鬱型はその闘士型に略々近い。

体重は両病型に殆ど差なく両れも田中の値より (分裂型との差 $2.6 \pm .63$) 小さく、両病型共に太田の肥満型と細長型との間にあるが、細長型の値に近い。

以上より見て、横軸の方向には分裂型が躁鬱型より腹囲、前膊囲、手囲に於て稍々劣るが、有意差のあるのは腹囲だけで、両病型共に健康人平均に比し胸囲は小さく、体重は明らかに劣っている。肩幅が大きくなっているのは或は計測点の相異も考へられる。

両病型共に太田の三体型中の闘士型と細長型との間

の値を示す場合が多い。

頭顔部 (表 3) に就て見ると顔高は両側の Margo supraorbitalis を結ぶ線と [Gnathion との距離を計測したので、両病型の間の差は明らかでない、顔幅も両病型間に殆ど差なく顔高、顔幅ともに池田の近畿地方人の値と略々等しい。和田の例や (13.82) 太田の例では顔幅が少しく小さい。

頭耳高でも両病型間の差は殆どなく、平均値は躁鬱型、和田、分裂型、池田の順で小さくなっているが躁鬱型の値と池田の値との差は $0.64 \pm .75$ にすぎない。

頭矢状径も頭横径も両病型の間の差が明らかでない。又両病型共に池田、和田の値とも差が明らかでない。太田の三体型中肥満型の値が躁鬱型に近いが分裂型は何れの値よりも小さい。太田の頭横径が三体型とも少しく小さいのは地方差であろう。

頭囲も又両病型の間に差明らかでない。太田の頭囲は一般に大きいとそのうち一番小さい肥満型の値との間に差がない。以上より頭顔部では両病型の差らしいものは明らかでない許りでなく健康人平均値とも差が殆どなく、平均値を較べて見ると健康人に対して顔高、頭耳高、頭横径は僅かに大きく頭矢状径は僅かに小さい。

又太田三体型の値と較べて見ると、両病型とも顔幅、頭横径は稍々大きい、頭矢状径と頭囲とは反対に稍々小さい。

次に身体各部の釣合を示数によつて見ると (表 4) 胸廓示数では分裂型の方が平均値は僅かに劣るが其差 (0.63 ± 1.51) は明らかでない。田中の健康人の示数は $71.49 \pm .45$ で、これに較べるといくらか精神病者の示数は劣るが差は明らかでない。

胸腹横示数は分裂型の方が稍々大きい (差 1.63 ± 1.05) 即分裂型では胸廓横径に対し腸骨櫛間距離が稍

表 3

計測者 項目	本 多		池 田	和 田	太 田		
	分 裂 型	躁 鬱 型	477	内 因 郡	肥満型	闘士型	細長型
頭 矢 状 径	$18.17 \pm .83$	$18.39 \pm .27$	$18.41 \pm .65$	18.34 ($18.27 \sim 18.42$)	18.4	18.6	18.3
頭 横 径	$15.38 \pm .71$	$15.52 \pm .22$	$15.29 \pm .57$	15.23 ($15.17 \sim 15.29$)	14.9	14.9	14.6
頭 囲	$55.06 \pm .15$	$55.23 \pm .59$	—	—	55.8	56.0	56.7
頭 耳 高	$12.91 \pm .67$	$13.23 \pm .30$	$12.59 \pm .69$	13.14 ($13.05 \sim 13.23$)	—	—	—
顔 高	$13.46 \pm .10$	$13.52 \pm .37$	$13.42 \pm .68$	—	—	—	—
顔 幅	$14.15 \pm .67$	$14.11 \pm .53$	$14.14 \pm .53$	13.82 ($13.74 \sim 13.90$)	14.0	13.9	13.6

表 4

計測者 項目 型	本 多		池 田	田 中
	分 裂 型	躁 鬱 型	477	140
胸 廓 示 数	70.43 ±.54	71.06 ±1.41	—	71.49 ±.45
胸腹横示数	98.99 ±.35	97.37 ±.97	—	—
肩腰横示数	133.01 ±.37	130.45 ±.36	—	—
頭 胸 示 数	65.67 ±.18	66.34 ±.77	—	—
頭長幅示数	84.83 ±.28	84.99 ±.82	83.0 ±.40	—
比 軀 幹 長	32.78 ±.07	32.46 ±.20	31.1 ±.12	31.65 ±.11
比 上 肢 長	44.31 ±.09	43.93 ±.24	43.4 ±.13	—
比 下 肢 長	51.65 ±.07	51.93 ±.19	51.9 ±.12	—
比 胸 囲	52.14 ±.15	52.34 ±.58	52.1 ±.25	53.28 ±.23

々小さいことになる。肩腰横示数は分裂型の方が明らかに大きく(差 $2.56 \pm .52$)、従つて肩幅に対し大転子間距離が小さいことになる。

頭胸示数は分裂型の方が僅かに劣るが其差は明らかでない。

頭長幅示数は両病型相等しく、池田の値より大きく(分裂型との差 $1.83 \pm .50$)健康人に比し此等の精神病者は短頭に傾くが、これは和田の所見と一致する。

比軀幹長は分裂型の方が僅かに優るが其差は明らかでなく、共に池田の値より大きい。(分裂型との差 $1.68 \pm .14$) 即健康人に比し身長に対する前軀幹長が稍々大きい。

比上肢長は分裂型の方が僅かに大きい其差は明らかでなく、又両病型共に池田の値より大きい。(分裂型との差 $0.91 \pm .15$) 比下肢長も両病型の差明らかでなく、池田の値とも殆ど等しい。

比胸囲も両病型の値及び池田の値共殆ど等しく、其差明らかでない。即健康人に比し両病型共に身長に対する下肢長、及び胸囲が殆ど同じである。

以上より見て、平均値では分裂型は躁鬱型より胸廓示数、頭胸示数は僅かに劣るが其差は明らかでなく、胸腹横示数(差 1.63 ± 1.05) 肩腰横示数(差 $2.56 \pm .52$)で優る。即、胸廓横径に比し腸骨嵴間距離が、又肩幅に比し大転子間距離が小さく、分裂型は躁鬱型に比して肩や胸廓に対して骨盤の幅が小さい。又

表 5

計測者 項目 型	本 多		太 田		
	分裂型 307	躁鬱型 28	肥満型 50	闊士型 100	細長型 100
ウエルトハイマー示数	31.20 ±.12	31.99 ±.52	27.4 ±.49	28.0 ±.43	35.0 ±.39
B 示 数	16.46 ±.14	17.32 ±.62	14.6 ±.35	13.8 ±.16	19.0 ±.24
C 示 数	24.44 ±.93	23.43 ±.26	40.8 ±.62	44.2 ±.53	32.1 ±.34
D 示 数	78.42 ±.12	72.20 ±.48	50.2 ±.69	73.6 ±.92	67.8 ±.86
アンドレーフ示数	0.17 ±.11	0.71 ±.45	4.7 ±.24	1.6 ±.13	0.45 ±.16
A 示 数	18.02 ±.08	19.00 ±.37	45.3 ±.84	55.5 ±.56	39.1 ±.48
肩幅胸囲示数	46.16 ±.12	46.00 ±.41	40.8 ±.26	43.7 ±.17	44.5 ±.20
ピニエ示数	24.56 ±.10	23.61 ±.41	4.6 ±.12	12.2 ±.93	24.2 ±.79
E 示 数	71.38 ±.16	72.07 ±.68	58.0 ±.75	84.8 ±.96	59.2 ±.77

健康人平均に比して両病型共に頭長幅示数(差 $1.83 \pm .50$) 比軀幹長(差 1.68 ± 0.14) 比上肢長(差 $0.91 \pm .15$) 優る。即身長に対する前軀幹長及び上肢長が稍々大きく、明らかに短頭である。

次に此とクレッチュメル三体型との関係を見るに(表5)、ウエルトハイマー示数では両病型の差殆どなく、共に太田の闊士型と細長型との間にある。今これを図1に示すと両病型共に21から47までの間にあり、太田の場合三体型全部が19から47までの間にあるのとよく一致している。又両病型の分布が殆ど相重なり、示数値の偏位が明らかでない。太田の云うように、31以上を細長型とすれば、分裂型では77.2% 躁鬱型では82.1%が細長型の方にある。太田の場合には肥満型と闊士型とが21から31までの間に

図 1 ウエルトハイマー氏示数

— 分裂型 ..... 躁鬱型

あるから、著者の場合も 21 から 31 までの間にある分裂型では 22.8% 躁鬱型では 17.8% の中に肥満型又は闘士型が含まれている事となる。

B 示数は両病型共に太田の細長型と肥満型との間にあつて、両病型の間に差は殆どない。故に図 2 に示すように両病型が殆ど相重り、9 から 25 までの間にある、太田の三体型全部が 9 から 25 までの間にあつてよくこれに一致している。太田に従つて 16 以上を細長型とすれば、分裂型では 62.5% 躁鬱型では 75.0% が細長型の方に入り、太田の肥満、闘士両型が 9 から 16 までの間にある故、著者の場合も 9 から 16 までの間にある分裂型の 37.5% 躁鬱型の 25% の中に肥満型か又は闘士型を含むことになる。

図 2 B 示数

図 3 C 示数

C 示数は分裂型の方が数値が少しく大きい、其差 ($1.01 \pm .92$) は明らかでない。太田の値は 肥満型、闘士型、細長型の順で小さい、著者の両病型は更にそれよりも小さい。これを図 3 について見ると、共に 14 から 34 までの間にあり、分裂型の数値の方が僅かに右側、数値の大きい方へ偏位し、太田の三体型が 24 から 52 までの間にあるに対し、両病型の数値は左側、即、数値の小さい方に偏位し、太田に従つて 36 以下を細長型、以上を闘士型とすれば、全部が細長型となり闘士型がないことになる。

以上の結果から見て、太田に従つて、先づウェルトハイマー示数 31 以上 B 示数 16 以上 C 示数 36 以下を細長型と看做して他の二体型から分離して見ると、分裂型では 49.5% 躁鬱型では 39.2% が細長型であることになる。

次で肥満型を分類する D 示数について見ると、分裂型の値の方が大きく (差 $6.22 \pm .49$) 太田の示数値は肥満型、細長型、闘士型の順に大きくなり、著者の分裂型は更にそれより大きい、躁鬱型は太田の闘士型の示数値より稍々小さい。これを図示すると (図 4) 両病型共に 47 から 107 までの間にあつて、示数値の偏位が明らかでない。太田に従つて 52 以下を肥満型とすれば、分裂型に 0.65% 躁鬱型に 10.7% 肥満型があることになる。

図 4 D 示数

アンドレーフ示数では分裂型の方が数値が稍々小さいが差 ($0.54 \pm .46$) は明らかでない。太田の示数値は肥満型、闘士型、細長型の順で小さいが、著者の分裂型はその細長型の値よりも一層小さい。躁鬱型は太田の細長型の示数値より稍々大きいと共に著者に細長型の値 0.17 に近いと云へよう。これを図示すると (図

5) —6 から 6 までの間にあつて、太田の場合のように三体型の値が -4 から 8 までの間にあるのに比べると、少々左側、即、数値の小さい方に偏位し、細長型の多い事を示す。両病型はこの図では殆ど相重っているが、躁鬱型の方が少しく右側、肥満型の方に偏位し、分裂型に比べて少々肥満型が多いことが分る。太田に従つて 2.5 以上を肥満型とすれば、分裂型に 9.4 % 躁鬱型に 25% の肥満型があることになる。

図 5 アンドレフ氏示数

次に闘士型を分類する A 示数を見ると分裂型の方が少々小さく (差 $0.98 \pm .38$) ! 両病型共に太田の三体型の値より遙かに小さい。図 6 に示すように、両病型は殆ど相重つて居り、10 から 28 までの間にある。太田の三体型全部が 31 から 70 までの間にあるのに

図 6 A 示数

対し、著者の例の数値は太田の細長型より尙一層左に偏位して太田の云う 58 以上闘士型とすれば定型的な闘士型は一名もない事となる。

肩幅胸囲示数は両病型の間に差なく、太田の三体型の何れの示数値よりも大きい。図 7 に示す如く、両病型共に 40 から 54 までの間にあり、両病型間の示数値の偏位は明らかでない。太田の場合のように三体型が 36 から 50 までの間にあるに対し数値が右側細長型の方に偏位している。太田に従つて 40 以下を肥満型であるとするれば、定型的な肥満型はないことになるが、太田の場合肥満型が 36 から 47 の間にあるから著者の場合 40 から 47 の間に類肥満型者はかなりあり得る。

図 7 肩幅胸囲示数

ピニエ示数は分裂型の値の方がやゝ大きく (差 $0.95 \pm .42$)、太田の細長型の値に略々一致し、著者の躁鬱型は太田の細長型よりも小さいが近似して居り、図 8 に示す如く、両病型共 -7 から 47 の間にある。太

図 8 ピニエ氏示数

田に従つて 27 以上を細長型であるとすれば、分裂型は 49.5% 躁鬱型は 39.28% が細長型であることになる。

以上より B, アンドレーフ, A の三示数は分裂型で稍々小さく, D, ピニエの二示数は反対に大きく, 其差異は両れも分裂型は躁鬱型より細長型の方に, 又躁鬱型は分裂型より肥満型の方に偏位している。又両病型ともウェルトハイマー, E, アンドレーフ三示数は太田の三体型中の細長型の値に近く, C, A, 肩幅胸囲の三示数は細長型の平均値より一層偏位して他の体型からは遠く, 従つて両病型共細長型が多く, その中でも躁鬱型の方が分裂型より肥満型が多くなっている。

さらにこれをウェルトハイマー, ピニエ, B, C の四示数を用いて, 細長型を分離して見ると, 分裂型は 49.5% 躁鬱型は 39.2% が細長型となり, 若し D, 及びアンドレーフ示数によつて肥満型を分離して見るならば, 分裂型に 9.4% 躁鬱型に 25% の肥満型があることになり, また A 示数により闘士型を分離して見るならば, 両病型共に定型的な闘士型がないということになる。

次に視診によつて分離して見るならば, 分裂型では細長型 37.4% 肥満型 2.6% 闘士型 1.3%, 躁鬱型では細長型 25.0% 肥満型 17.8% 闘士型 10.7% となり, 数値による分離に比べると両病型共細長型も肥満型も少ない。即, 視診では分離し難いにも不拘, 示数によれば分離し得るものがあるかと考へられる。又闘士型が視診によつて分離出来るのは, 測定数値の上では著るしい変化が認められぬにも不拘, 外観上骨及び筋の發育佳良, 逞しき骨及び肥満せる筋腹が全觀を支配し肩聳へ皮膚強韌なる所謂闘士型の外観を呈する, 附図に見るようなものが分裂型に 1.3% 躁鬱型に 10.7% ある。太田によれば純粹に近い闘士型者は約 7.5% あるとし, 杉原によれば本邦内地人にはクレツチュメル云うような定型的な闘士型を見る事は稀であると言う。著者の場合闘士型が示数による分離では全く現はれないにも不拘, 視診によつてかなり認められるのは, 歐洲人のように非常に顕著な闘士型が本邦人では稀であることを示すもので, 本邦人の闘士型を他の二体型より分離する鋭敏な示数が必要であつて, 太田はその目的の爲 E 示数を考案し, この示数が本邦人の闘士型を他の二体型から明瞭に區別し, 殊に本邦人で區別の困難な肥満型と闘士型との分離のために最も重要な示数の一つであると云つている。この E 示数は肩巾, 手囲, 身長, 上肢長及び下肢長を掛け合

はせ之を 10 の 7 乗にて除したもので, 72 以上を闘士型と看做している。試みに 72 以上を闘士型として考察して見るならば, 著者の場合, 分裂型に 50.7% 躁鬱型に 53.5% の闘士型がある事となる。今この分子となる, 肩幅, 手囲, 身長, 上肢長, 下肢長等を見るに, 共に太田の値に比して明らかに大きくなつていて一般に体位の向上していることが分る。故に判定基準を仮に 97 以上を闘士型とすれば, 分裂型に 6.5% 躁鬱型に 7.1% の闘士型がある事となり, 視診の場合の頻度と近くなり, 太田の本邦人, 闘士型頻度 7.5% に大体一致する。従つて太田の示数は本邦人について闘士型を他の二体型より分離するのに好都合な示数である事を認めるものである。又クレツチュメルによれば闘士型は精神基質の分裂性者の方に多く, 11.03%, 躁鬱性者では, 1.07% であると言つているが, 著者の場合は逆に躁鬱型に多く 10.7% あり, 分裂型には少なく 1.3% である。細長・肥満両型の分布はクレツチュメルに依れば精神基質の分裂性では 260 名中細長型 28.8% 肥満型 0.71%, 躁鬱性では 86 名中細長型 1.42% 肥満型 20.64% である云う。著者の視診に依る分離では躁鬱型にも細長型がかなり多く, 25.0% であるが, 其他の細長肥満両型の分布状態は略々一致している。

小 括

男子精神病患者では分裂型と躁鬱型との病型差は長軸の方向では分裂型が稍々優り, 横軸の方向では稍劣る, 即, 分裂型は躁鬱型に比べて一層細長型の傾向を示すが, 頭顔部では両病型間の差は殆ど認められない。

示数による病型差を見ると, 胸腹横示数及び肩腰横示数では分裂型の方が優るから, 分裂型の方が一層細長型の傾向が強い事になる。

また体型示数の分布によつて見ても, 分裂型の方が細長型の方に, 躁鬱型の方が肥満型の方に, 示数値が偏位している。

精神病患者と健康人と比べて見ると頭顔部では殆ど差なく, 身体の長軸方向では精神病患者稍々短身に傾き, 横軸の方向では胸囲及び体重にて劣る。示数では頭長幅示数, 比軀幹長及び比上肢長が大きく, 短身に傾くと共に身長に対する前軀幹長及び上肢長が稍々大きい。

体型示数による体型分布を見ると, 分裂型では細長型が 49.5% 肥満型が 9.4%, 躁鬱型では細長型 39.2% 肥満型が 25% で, 両病型共に細長型が多いが, 殊

に分裂型では約半数が細長型に属し、肥満型が少なく、躁鬱型では肥満型が多い。闘士型はE示数 97 によつて分離する事が出来るが、分裂型に 6.5% 躁鬱型に 7.1% である。視診で分類して見ると、分裂型では細長型 37.4% 肥満型 2.6% 闘士型 1.3%, 躁鬱型では細長型 25.0% 肥満型 17.8% 闘士型 10.7% で、クレツチュメルの体型分布に比し闘士型が分裂型

に少ないのに反して躁鬱型に多く、躁鬱型にも細長型がかなりある。

II. 女 性 (表 6)

身長では分裂型は躁鬱型に稍々劣り (差 2.39% ± 1.11) 阿部の細長型、太田の肥満型の身長に近い。躁鬱型は阿部の中肉型の身長に近く、太田の例の肥満型と闘士型との間の身長である。

表 6

計測者 型 項目	本 多		阿 部				太 田		
	分 裂 型 307	躁 鬱 型 28	206	肥 満 型 86	中 肉 型 92	細 長 型 28	肥 満 型 50	闘 士 型 100	細 長 型 100
身 長	149.58 ± .46	151.97 ± 1.01	150.60 ± .34	147.89 ± .98	151.61 ± .48	150.52 ± .48	150.0	154.0	146.8
肩 峰 高	123.12 ± .46	124.57 ± .82	123.22 ± .31	120.79 ± .90	124.22 ± .45	122.94 ± .44	—	—	—
中指尖端高	58.26 ± .30	58.22 ± .48	57.49 ± .20	56.64 ± .19	57.88 ± .30	57.34 ± .29	—	—	—
胸骨上縁高	120.97 ± .42	122.86 ± .86	120.91 ± .31	119.07 ± .88	121.95 ± .43	120.91 ± .43	—	—	—
恥骨上縁高	72.19 ± .30	71.86 ± .62	73.29 ± .22	72.36 ± .68	74.79 ± .32	73.58 ± .31	—	—	—
胸 廓 長	25.59 ± .39	24.84 ± .74	28.29 ± .12	28.07 ± .38	28.45 ± .19	28.23 ± .19	—	—	—
胸 骨 長	13.87 ± .33	16.37 ± .70	16.64 ± .12	17.02 ± .27	16.78 ± .18	16.29 ± .18	—	—	—
前 軀 幹 長	52.15 ± .24	50.55 ± .54	47.32 ± .14	46.89 ± .43	47.39 ± .20	47.38 ± .24	46.9	48.5	46.4
上 肢 長	65.06 ± .30	66.50 ± .59	65.80 ± .20	64.04 ± .58	66.41 ± .30	66.31 ± .25	63.3	65.9	60.7
下 肢 長	78.01 ± .29	78.15 ± .66	76.84 ± .23	75.00 ± .73	77.52 ± .32	76.64 ± .32	73.6	76.3	71.1

肩峰高は分裂型の方が僅かに劣り (差 1.45 ± .94) 阿部の細長型の値に近く、躁鬱型は阿部の中肉型の値に近い。

中指尖端高は両病型の値殆ど同じで阿部の何れの平均値よりも大きい、その内では中肉型の値に稍々近い。

胸骨上縁高は分裂型の方が (差 1.89 ± .52) 小さく、阿部の細長型の値と殆ど等しく、躁鬱型の値は阿部の三体型中最も大きい中肉型の値よりさらに稍々大きい (差 0.91 ± .96) は明らかでない。

恥骨上縁高は両病型の差なく阿部の平均値より一般に小さい、その内最も小さい肥満型の値と略々同じである。

胸廓長は分裂型の方が僅かに優るが其差は明らかでない。両病型共に阿部の何れの型の平均値よりも小さく、其総平均値と分裂型との差は (2.7 ± .41) である。

胸骨長は分裂型の値の方が小さく (差 2.5 ± .77) 又阿部の何れの値よりも小さくその総平均値との差 (2.77 ± .3) 明らかである。躁鬱型の胸骨長は阿部の中肉型と細長型との略々中間の値である。

前軀幹長は分裂型の方が稍々優 (差 1.6 ± .59) るが両病型共に阿部及び太田の平均値より大きく、その阿

部の総平均値と分裂型との差は 4.83 ± .27 である。

上肢長は分裂型の方が稍々劣り (差 1.44 ± .66) 阿部の肥満型と細長型との値の中間であつて、太田の闘士型の値に近い。躁鬱型の平均値は阿部の中肉型の値に略々等しく、太田の何れの体型の値よりも大きい。

下肢長は両病型共に阿部及び太田の何れの体型の値よりも大きい阿部の中肉型に最も近い。

以上を総括して見ると、女子分裂型は長軸の方向では躁鬱型より前軀幹長稍々優り、身長、肩峰高、胸骨上縁高、胸骨長、上肢長で劣る。その中でも差がはつきりしているのは胸骨上縁高と胸骨長とである。一般に分裂型の値は大体阿部の細長型の値に、躁鬱型のそれは中肉型の値に近い。

横軸の方向 (表 7) に就て見ると、肩幅は分裂型の方僅かに劣り (差 1.49 ± 1.11) 両病型共に太田の値よりも大きく、阿部の値より一層更らに大きい。此等の差は恐らく計測手枝の差違によるものであろう。

腸骨櫛間距離は両病型に差なく、阿部の細長型の平均値に近く、分裂型よりいくらか大きめの躁鬱型の値は阿部の細長型と中肉型との間の値となつて居り、太田の値は一般に少しく小さい。

大転子間距離も両病型間の差が明らかでないが、分裂型の平均値は阿部の細長型の値に略々等しく、躁鬱

表 7

計測者 項目	型	本 多		阿 部				太 田		
		分裂型 307	躁鬱型 28	206	肥満型 86	中肉型 92	細長型 28	肥満型 50	闘士型 100	細長型 100
肩 幅		36.04±.35	37.53±1.05	30.00±.09	30.91±.25	30.32±.13	29.56±.13	34.5	35.1	32.6
腸骨櫛間距離		27.26±.28	27.70±1.08	27.81±.10	28.91±.31	28.04±.13	27.33±.13	26.2	26.1	25.2
大転子間距離		29.57±.27	30.25±.95	30.13±.09	31.34±.31	30.32±.13	29.54±.13	28.4	28.1	26.1
胸廓矢状径		18.02±.16	18.50±.44	17.90±.10	19.41±.37	18.17±.11	17.13±.10	19.1	17.8	15.9
胸 廓 横 径		25.21±.19	25.27±.57	24.63±.10	29.51±.28	25.00±.12	23.84±.12	26.9	25.3	23.2
胸 囲		79.79±.45	80.97±1.61	79.51±.37	86.43±1.07	80.68±.38	75.99±.32	89.1	81.3	75.4
腹 囲		69.72±.64	70.27±.69	70.44±.46	79.29±1.58	70.98±.48	67.00±.41	80.5	67.6	60.0
腰 囲		80.85±.19	82.21±2.10	80.38±.43	88.04±1.77	80.47±.44	76.63±.36	—	—	—
大 腿 囲		48.05±.41	46.44±.13	44.23±.31	48.50±.68	45.12±.32	41.72±.27	—	—	—
下 腿 囲		32.27±.23	32.68±.64	32.49±.16	34.86±.47	33.22±.20	30.93±.15	—	—	—
頸 囲		34.94±.36	35.34±.94	31.25±.13	33.54±.42	31.57±.16	30.20±.14	—	—	—
前 膊 囲		21.67±.14	21.27±.51	21.64±.10	23.46±.26	22.04±.10	20.63±.10	—	—	—
手 囲		18.02±.13	16.70±.27	17.66±.05	18.04±.19	18.00±.10	17.21±.09	18.7	19.0	17.1
体 重		49.70±.58	50.15±2.03	49.15±.45	57.14±1.57	50.87±.47	44.98±.37	60.7	52.1	40.5

型の平均値はその中肉型の値に一致し、両病型共に太田の平均値よりは一般に大きい。

胸廓矢状径は分裂型の方が僅かに劣るが差 (0.48±.47) は明らかでなく、阿部の中肉型の値に一致する。躁鬱型の値は阿部の中肉型と肥満型との間にある。両病型共に太田の肥満型と闘士型との間にあるが分裂型は闘士型の平均値に、躁鬱型は肥満型の平均値に近い。

胸廓横径は両病型の値が略々等しく、阿部の中肉型の値、太田の闘士型の値に略々相当する。

胸囲は分裂型の方が平均値は僅かに劣るが、差 (1.18±1.67) は明らかでない。両病型共に阿部の細長型の胸囲よりは大きく、中肉型の値と一致する。太田の例でもその細長型よりは大きく、闘士型の胸囲に近い。

腹囲は両病型間の差なく、共に阿部の中肉型よりは小さいが、細長型よりは大きく、太田の例ではその肥満型よりは小さいが、その闘士型に近くこれよりは大きい。

腰囲も両病型間の差なく、阿部の中肉型の値に近い。

大腿囲は分裂型の方が優り (差 1.61±.26) 阿部の肥満型の値に一致し、分裂型より小さい躁鬱型の平均値は阿部の中肉型の値に近い。

下腿囲は両病型の間に差なく、共に阿部の中肉型と細長型との間の平均値である。

頸囲も両病型間の差なく、共に阿部の値よりも大き

い。(差 3.69±.38)

前膊囲も両病型間に差なく、共に阿部の中肉型と細長型との間の平均値である。

手囲は分裂型の方が優り (差 1.32±.3) 阿部の肥満型、太田の肥満型と一致し、躁鬱型の平均値は阿部の細長型及び太田の細長型より小さい。

体重は両病型間の差なく、分裂型は阿部の中肉型と細長型との間、太田の闘士型と細長型との間にある。

以上の事から分裂型は大腿囲、手囲で優り、肩幅胸廓矢状径でいくらか劣っているようであるが、後者群では差が明らかでない。その分裂型は阿部の三体型中細長型と中肉型との間の平均値に、躁鬱型は中肉型の平均値に近く両病型共に太田の分類体型のうちでは闘士型に近い。

頭顔部 (表 8) に就て見ると、顔高は両病型の値略々同じく、阿部の肥満型、中肉型の値とも略々等しい。顔幅は両病型間の差なく、阿部及び和田の平均値とも略々同じである。頭耳高は分裂型の方が僅かに (差 0.33±.61) 優るが差は明かでない。阿部の三体型何れの値よりも大きい、躁鬱型の平均値は阿部の肥満型の平均値に近く、和田の値は著者の両病型の間にある。

頭矢状径は両病型間の差なく、両病型共に阿部及び和田の矢状径との間も差なく、著者の分裂型の平均値と阿部の平均値との差は 0.06±.41 である。頭横径は分裂型の方が僅かに優り (差 0.12±.27) 両病型共に阿部及び和田の頭横径と略々等しく、著者の分裂型

表 8

計測者 項目 \ 型	本 多		阿 部				和 田
	分 裂 型	躁 鬱 型	206	肥 満 型	中 肉 型	細 長 型	内 因 群
頭 矢 状 径	17.48±.13	17.61±.40	17.54±.05	17.66±.13	17.70±.06	17.34±.07	17.60 (17.53~17.64)
頭 横 径	14.89±.13	14.77±.24	14.74±.04	14.80±.09	14.86±.06	14.60±.05	14.71 (14.64~14.79)
頭 囲	54.38±.30	54.10±.86	53.91±.08	54.43±.23	54.27±.12	53.36±.14	—
頭 耳 高	12.61±.46	12.28±.42	12.28±.04	12.29±.13	12.40±.05	12.15±.06	12.53 (12.46~12.60)
顔 高	12.58±.15	12.67±.87	12.56±.04	12.61±.14	12.62±.06	12.41±.06	—
顔 幅	13.62±.12	13.36±.32	13.42±.03	13.77±.23	13.55±.05	13.17±.05	13.03 (12.94~13.82)

表 9

計測者 項目 \ 型	本 多		阿 部			
	分 裂 型	躁 鬱 型	206	肥 満 型	中 肉 型	細 長 型
胸 廓 示 数	69.59±.54	72.33±1.05	72.80±.32	75.36±1.14	72.79±.13	72.07±.43
胸 腹 横 示 数	94.23±.61	90.97±1.31	88.68±.31	89.61±.79	89.52±.46	87.48±.47
肩 腰 横 示 数	122.17±.51	124.45±1.20	99.79±.32	97.11±.86	100.16±.46	100.26±.48
頭 胸 示 数	68.20±.36	67.39±.98	68.48±.29	63.29±.72	67.22±.35	70.43±.32
頭 長 幅 示 数	85.20±.46	83.90±1.01	84.15±.30	83.94±.84	84.10±.46	84.26±.50
比 軀 幹 長	33.17±.12	33.32±.28	31.65±.08	31.75±.25	31.21±.11	31.51±.12
比 上 肢 長	43.74±.23	43.79±.34	43.65±.09	43.25±.27	43.84±.14	43.65±.13
比 下 肢 長	51.96±.11	51.44±.72	51.05±.07	50.68±.29	51.27±.10	59.94±.12
比 胸 囲	52.99±.30	53.21±1.04	52.82±.24	58.68±.76	53.29±.11	50.52±.22

の平均値と阿部の平均値との差は 0.15 ± 0.1 である。頭囲は両病型間の差なく、阿部の中肉型の平均値に一致する。

以上のように、頭顔部では両病型間の差殆どなく、分裂型が躁鬱型より頭耳高及び頭横径にていくらか優るようであるがどちらも阿部及び和田の平均値より一般に稍々大きい。

次に示数に就て見ると（表9）胸廓示数では分裂型は躁鬱型より稍々小さく（差 2.74 ± 1.14 ）阿部の三体型中最小の細長型の平均値は $72.07 \pm .43$ であって、著者の躁鬱型の平均値 72.33 ± 1.05 よりいくらか小さい。即胸廓の横径に対する矢状径は健康人に比して、特に分裂型で劣っている。

胸腹横示数は分裂型の方が稍々大きく（差 3.26 ± 1.45 ）両病型共に阿部の平均値のどれよりも大きく、分裂型の平均値と阿部の平均値との差は $5.55 \pm .68$ で、一般にこの精神病者は健康人に比べて胸廓の横径に対する腸骨嵴間距離が小さい。

肩腰横示数は分裂型の方が僅かに小さく（差 2.28

± 1.30 ）両病型共に阿部の値より大きい。分裂型と阿部の総平均値との差は $22.38 \pm .60$ で、健康人に比べると肩幅に対する大転子間距離が小さい。

頭胸示数は両病型の間に殆ど差なく、両病型共にその平均値は阿部の中肉型と細長型との間にあつて、分裂型が細長型、躁鬱型が中肉型の方に近い平均値である。

頭長幅示数も両病型間に差なく、共に阿部の平均値より大きめで、其平均値と著者の分裂型との差は $1.05 \pm .55$ で健康人に比し男子の場合と同じように短頭に傾く。

比軀幹長は両病型間に差なく、共に阿部の値より大きく、その平均値と分裂型の平均値との差は $1.47 \pm .14$ で、健康人に比して身長に対する前軀幹長が大きい。

比上肢長も両病型間に差なく、阿部の三体型の平均値との間にも差がない。

比下肢長も両病型間に差なく、共に阿部の三体型中最も大きく、中肉型の平均値に近い。其平均値と分裂

型のそれとの差は $0.91 \pm .13$ で、健康人に比べていくらか比下肢長が大きいようである。

比胸囲は両病型間の差なく、共に阿部の中肉型の平均値に近い。

以上示数によつて見るところでは、両病型間に有意差はないが、分裂型の方が胸廓示数及び肩腰横示数稍々小さく、胸腹横示数は反対に稍々大きい様子がある。共に健康人平均より胸廓の横径に対する矢状径、胸廓横径に対する腸骨嵴間距離及び肩幅に対する大転子間距離が小さく、又身長に対する前軀幹長が大で頭

長幅示数では男子と同様短頭に傾く。

次に体型示数について見ると(表10) ウェルトハイマー示数では両病型の間に差なく、共に阿部の肥満型、太田の闊士型の夫々の平均値に近い。これを図1に示せば、20 から 51 までの間にあるが、太田の場合は細長型が 30 から 44 までの間にあつて右側に偏位し、その肥満型が 22 から 36 までの間にあつて左側に偏位している。著者の場合は、分裂型では 51 まで達しているのに、躁鬱型は分裂型よりいくらか左側に偏位しているから、これには肥満型が多いと思はれる。

表 10

計 測 者 項 目	本 多		阿 部				太 田		
	分裂型 307	躁鬱型 28	206	肥満型 86	中肉型 92	細長型 28	肥満型 50	闊士型 100	細長型 100
ウェルトハイマー示数	33.25 ±.27	33.39 ±.64	37.48 ±.32	32.43 ±.89	36.63 ±.35	40.03 ±.44	28.6 ±.52	33.6 ±.57	37.7 ±.52
B 示 数	18.54 ±.31	16.65 ±.59	24.68 ±.24	21.39 ±.79	23.74 ±.21	26.77 ±.26	16.2 ±.30	18.7 ±.34	23.9 ±5.38
C 示 数	20.81 ±.14	21.41 ±.38	22.82 ±.19	25.39 ±.76	23.55 ±.23	21.20 ±.18	34.1 ±.54	29.7 ±.50	24.6 ±.38
D 示 数	56.68 ±.18	61.83 ±.35	48.17 ±.49	38.81 ±1.02	49.27 ±.65	50.38 ±.67	41.7 ±.76	61.9 ±1.14	53.9 ±1.07
アンドレーフ示数	1.14 ±.20	1.18 ±.67	4.95 ±.54	17.93 ±1.60	5.11 ±.52	0.47 ±.49	5.5 ±.21	1.3 ±.28	0.9 ±.32
A 示 数	14.48 ±.14	16.35 ±.48	11.64 ±.12	13.14 ±.49	12.21 ±.14	10.55 ±.12	27.3 ±.47	24.5 ±.44	19.0 ±.33
肩 幅 胸 囲 示 数	45.15 ±.24	48.91 ±.48	37.88 ±.15	35.25 ±.39	37.65 ±.18	38.93 ±.20	38.2 ±.22	43.1 ±.37	43.6 ±.29
ピ ニ エ 示 数	20.99 ±.19	20.80 ±.69	21.94 ±.74	5.00 ±18.8	20.00 ±.63	29.95 ±.61	-3.9 ±1.14	18.8 ±1.38	27.2 ±2.03
E 示 数	51.47 ±.18	52.29 ±.39	40.40 ±.43	39.11 ±1.26	42.68 ±.67	38.37 ±.54	46.2 ±.83	54.6 ±.75	35.7 ±.65

B示数では分裂型の方稍々大きく(差 $1.89 \pm .67$) この分裂型は太田の闊士型、躁鬱型の方は太田の肥満型の平均値に近く、阿部の値は一般に少しく大きい。図2にその分布を見ると、11 から 28 までの間にあるが、太田の肥満型では 13 から 23 までの間で左側に、その細長型では 19 から 29 までの間で右側に偏位している。著者の躁鬱型は分裂型に比べて稍々左側に偏位しているから肥満型が多い事になる。今仮りに太田の云うように 20 以上を細長型として他の二型から分離するならば、分裂型には 36.7% 躁鬱型には 35.3% の細長型がある事になる。

C示数は分裂型の方が僅かに小さいが其差は明らかでない。(差 $0.6 \pm .4$)。又阿部の三体型中細長型の平均値に略々一致し、太田の平均値は三体型とも稍々大きい。図3にその分布を見ると、14 から 28 までの間にあつて、躁鬱型の方が稍々右側に偏位している。

仮りに太田の言うように 25 以下を細長型とするならば、分裂型の 91% 躁鬱型の 82% が細長型となる。然し著者の両病型が 14—28 間にあるに対して太田の三体型は 21—41 間にあつて、可なり右側に偏位している。故にこの分類方法はそのままでは用いにくい。

D示数は分裂型の方が小さく(差 $5.15 \pm .39$) 阿部のこの示数は三体型とも可なり小さい。太田の例ではその闊士型の示数は著者の躁鬱型の示数と略々等しく、著者の分裂型の示数は太田の細長型の平均値に近い。図4について見ると太田の三体型全体では 32 から 76 までの間にあり、そのうち肥満型が 32 から 52 までの間、細長型が 40 から 72 までの間にある。著者の分裂型は 40—72 間にあるから、この太田の細長型とよく一致し、又太田の闊士型の示数は 48 から 76 までの間にあるが、著者の躁鬱型は 52 から 77 までの間にある。故に後者も殆ど一致している。全体とし

て著者の分裂型は 32 から 92 までの間に、躁鬱型は 52 から 82 までの間にある。太田に従つて 42 以下を肥満型とするならば、分裂型に 6.4% 肥満型がある事となる。

アンドレーフ示数は両病型の平均値略々等しく、共に阿部及び太田の細長型の平均値に近い。図 5 について見ると、両病型ともに -4 から 7 までの間にあつて、太田の細長型が -3 から 6 までの間にあるのとよく一致し、両病型共細長型が多い事が分る。太田の肥満型は 2 から 8 までの間にある。仮りに太田に従つて 4 以上を肥満型とすれば分裂型に 11.9% 躁鬱型に 29.4% の肥満型がある事になる。

A 示数は分裂型の方が小さく (差 $1.87 \pm .25$) 阿部の各体型の平均値は皆両病型の値よりも小さく、太田の平均値は反対に大きい。図 6 について見ると、両病型共に 8 から 24 までの間にあるが、躁鬱型の方が少々右側に偏位している。太田の細長型は 15 から 25 までの間にあつて左側に、その肥満、闘士両型は 19 から 33 までの間にあつて右側に偏位している。これに対し著者の両病型共にこの細長型より尙一層左に偏位しているから、細長型の多い事が分る。又分裂型より示数の大きい躁鬱型の方が少々肥満型が多くなつてゐる事も分る。仮りに太田に従つて 19 以下を細長型とすれば著者の精神病者の大部分が細長型に入る。

肩幅胸囲示数では分裂型の方が小さく (差 $3.76 \pm .54$) 両病型共に阿部、太田の平均値よりも皆大きくなつてゐる。図 7 について見ると、分裂型では 40 から 53 までの間、躁鬱型では 42 から 50 までの間にあつて男子の場合によく似て居り、太田の細長、闘士両型は 40 から 50 までの間にあつて、両病型の分布とよく一致している。今仮りに 39 以下を肥満型とすれば、太田の言うような定型的な肥満型はない事になる。

ピニエ示数は両病型の平均値が略々同じであつて、阿部の中肉型の平均値とも一致し、太田の闘士型と細長型との間に来る。図 8 について見ると、両病型共に、-12 から 42 までの間に分布するが、右側に偏位する事男子と同様である。太田の三体型では -20 から 50 までの間に分布して居り、その内肥満型が -20 から 10 までの間、闘士型が 2 から 42 までの間にあるのに対し、両病型とも右側細長、闘士両型の方に偏位する。仮りに太田に従つて 5 以下を肥満型とすれば、分裂型に 5.5% 躁鬱型に 11.76% の肥満型がある事になる。

以上体型示数によつて両病型間の差のはつきりしてゐるものは D、A 及び肩幅胸囲の三示数であつて、共に分裂型は躁鬱型より細長型の方に、躁鬱型は分裂型より肥満型の方に偏位している。又両病型共大部分の示数値は太田の細長型か闘士型の値に近く、B 示数のみ躁鬱型の値が太田の肥満型の値に近い。又両病型とも C 及びアンドレーフ示数では阿部の細長型の平均値と、又ピニエ示数ではその中肉型の平均値に略々等しい。

次に A 示数 19 以上 B 示数 20 以上 C 示数 25 以下を細長型として分離して見るならば、分裂型では 33.2% 躁鬱型では 29.4% が定型的な細長型と見られる。又アンドレーフ示数 4 以上及び D 示数 42 以下を肥満型として、細長型を分離した残余の例から分離して見ると、分裂型では 11.9% 躁鬱型では 29.4% が肥満型に入る。

さらに此を視診による分離と比較して見ると、その体型分布は分裂型では細長型 33.85% 肥満型 12.8% 躁鬱型では細長型 29.4% 肥満型 29.4% となつていて、上述の示数値による分離と略々一致している。

小 括

女子精神病患者について、病型差を見るに、長軸の方向では大体分裂型の方が劣り、横軸の方向では其差少なく、大腿囲と手囲では反対に分裂型の方が優つてゐる。頭顔部では両病型の差は殆どない。

示数による病型差も僅少で、分裂型の方が胸腹横示数にて少々優り、胸廓示数で少々劣る。即胸廓横径に対し腸骨橈間距離が少々小さく、胸廓矢状径も小さく、躁鬱型よりもいづらか細長型の傾向を帯びてゐる。

体型示数による病型差は男子の場合と同様分裂型の方がより一層細長型の方に、躁鬱型の方はいづらか肥満型の方に傾く。

健康人の体型と比較して見ると、分裂型の体型は健康人の細長型の平均値に、躁鬱型の体型は健康人の中肉型の平均値に近く、頭顔部は一般に健康人よりもいづらか大きめの傾向がある。又両病型共に胸廓の横径に対するその矢状径及び腸骨橈間距離が小さく、又肩幅に対する大転子間距離も小さく、健康人体型に比べるとより一層短頭へ傾く。

体型示数による体型分布は、分裂型では細長型が 33.8% 肥満型が 12.8% 躁鬱型では細長型が 29.4% 肥満型 29.4% で男子の場合よりも細長型少なく、肥満型が多い。男女を通じて両病型共に細長型が多いが、殊に分裂型にそれが多く、躁鬱型には肥満型がい

くらか多くなっている。

III. 男女の比較

男女の計測値を比較すると(表 11), 長軸の方向では分裂型の前軀幹長のみが其差 $0.81 \pm .86$ で, 明らかでない他はすべて男子の方が明らかに大きく, 殊に身長(差 $11.03 \pm .54$) 肩峰高(差 $9.32 \pm .45$) 胸骨上縁高(差 $8.39 \pm .59$) 恥骨上縁高(差 $4.66 \pm .27$) 上肢長(差 $6.02 \pm .36$) 下肢長(差 $4.94 \pm .28$) では男子の方が遙に優っている。躁鬱型では分裂型の場合の差に比し男女差が少なく有意差のあるのは身長(差 7.57 ± 1.52) 肩峰高(差 6.81 ± 1.51) 中指尖端高(差 $3.19 \pm .52$) 胸骨上縁高(差 5.8 ± 1.50) 上肢長(差 6.54 ± 1.03) 下肢長(差 4.96 ± 1.1) で男子が明らかに優り其他の計測値の男女差はこれ等程明らかではない。

横軸の方向では分裂型で有意差のあるのは肩幅(差 $2.94 \pm .43$) 胸囲(差 $4.03 \pm .51$) で男子の方が優り, 反対に大腿囲(差 $1.85 \pm .47$) 腰囲(差 $5.18 \pm .36$) では女子の方が明かに優り, 下腿囲は僅かに女子が優るが, 其差は明らかとは云へない。躁鬱型では有意差のあるのは腹囲(差 $3.02 \pm .70$) 前膊囲(差 $2.23 \pm .66$) 手囲(差 $3.54 \pm .45$) で男子の方が明らかに優り, 反対に腰囲(差 5.76 ± 2.26) 大転子間距離(差 0.48 ± 1.11) 大腿囲(差 $0.48 \pm .58$) 下腿囲(差 $0.32 \pm .82$) は女子の方が僅かに優るが, 其差は明らかとは云へない。

頭顔部は一般に男性の方が大きめで, 統計的有意差のある頭囲は, 分裂型では差 $0.68 \pm .34$ 躁鬱型では差 1.13 ± 1.04 で, 僅かに男子の方が大きい。

示数による男女差を見ると, 有意差のあるのは胸腹横示数と肩腰横示数で, 両病型共に男子の方が明らかに大きい。即女子は男子よりも胸廓横径に対する腸骨横間距離, 肩幅に対する大転子間距離が明らかに大きい。又両病型共に胸廓示数比上肢長比下肢長は男子の方が僅かに優るが差は明らかでない。比軀幹長, 比胸囲は女子の方が僅かに優るがこれも差が明らかでない。

体型示数による体型分布は, 分裂型では男子は細長型 49.5% 肥満型 9.4% 闘士型 6.5% 女子は細長型 33.2% 肥満型 11.9% 闘士型はない。躁鬱型では男子は細長型 39.2% 肥満型 25% 闘士型 7.1% 女子は細長型 29.4% 肥満型 29.4% 闘士型なしで, 両病型共男子の方が細長型は約 10%—16% 多く, 反対に肥満型は女子の方が約 2.5%—4.4% 多い。

結 論

比較的症候の顕著な精神分裂症候の患者男子 307 名 女子 109 名躁鬱病様症候の患者男子 28 名女子 17 名に就て計測を行つた。躁鬱病の例数が少ない為其比較の幾分無理なところもあるが或程度傾向を明らかにする事が出来る。此等病型の計測値を両病型の間及び一般健康人体型と比較考察し, 体型示数によつて Kretschmer の三体型を分類し其分布状態を見た。

両病型間の差異を見ると, 男子では長軸の方向では分裂型の方が一般に稍々優っている傾向があるが, 女子では反対に劣っている。その内はつきりした差があるのは胸骨上縁高と胸骨長である。横軸の方向では男女共に分裂型の方が一般に劣る傾向があり, 分裂型の方がより一層細長型に傾く。

示数によると男女共分裂型の方がより細長型に傾き, 躁鬱型は分裂型に比べて肥満型の方に傾く。

男女の性差は長軸の方向には男子の方が明かに優り, 反対に横軸の方向では腰囲, 大腿囲は女子の方が明かに優る。頭顔部では著明な性差として, 頭囲が男子の方で優る。示数による性差では, 女子の方が胸廓横径に対する腸骨横間距離, 肩幅に対する大転子間距離が明らかに優っている。

健康人の体型と較べて見ると両病型共及び男女共に長軸及び横軸の方向共に一般に稍々劣る傾向を示し, 細長型の傾向が強い。

頭顔部では男女共短頭に傾く。

体型示数による体型分布は男子分裂型では細長型 49.5% 肥満型 9.4% 躁鬱型では細長型 39.2% 肥満型 25% である。女子分裂型では細長型 33.2% 肥満型 11.9% 躁鬱型では細長型 29.4% 肥満型 29.4% で, 一般に分裂型に細長型が多く又女子より男子の方に細長型が多く, 躁鬱型に肥満型が多く, 女子の方が男子より肥満型が多い。躁鬱型に肥満型が多く分裂型に細長型が多いのは他の多くの報告と一致するが, 躁鬱型にも男女共かなり細長型が多い。又視診によつて純粹に近い闘士型は, 男子分裂型に 1.3% 躁鬱型に 10.7% 分離出来た, にも不拘従来用いられていた数値によつては定型的な闘士型が分離出来ない。故に著者は太田の E 示数の 58 の代りに 97 を規準にとることにより, 男子分裂型に 6.5% 躁鬱型に 7.1% の闘士型を分離する事が出来た。

尚稿を終るに臨み終始御厚情ある御指導を賜つた恩師横尾安夫教授に衷心より謝意を捧げ, 多大の敬意を表します。

表 11

性 別		男 子				女 子			
項 目		分 裂 型		躁 鬱 型		分 裂 型		躁 鬱 型	
例 数		307		28		109		17	
		$M+m$	3σ	$M+m$	3σ	$M+m$	3σ	$M+m$	3σ
身 長		160.61±.33	17.30	159.54±1.14	22.30	149.58±.46	14.54	151.97±1.01	12.44
肩 峰 高		132.44±.31	16.22	131.38±1.27	20.22	123.12±.46	14.49	124.57±.82	10.18
中 指 尖 端 高		61.43±.19	10.17	61.41±.75	11.82	58.26±.30	9.29	58.22±.48	5.96
胸 骨 上 緣 高		129.36±.35	15.03	128.66±1.23	19.52	120.97±.42	13.02	122.86±.86	10.60
胸 恥 骨 上 緣 高		76.85±.21	11.21	74.82±1.10	15.90	72.19±.30	9.26	71.86±.62	7.67
胸 廓 長		28.03±.24	12.66	27.73±.77	12.27	25.59±.39	12.36	24.84±.74	9.15
胸 骨 長		16.32±.23	12.07	16.64±.87	13.76	13.87±.33	10.31	16.37±.70	8.62
前 軀 幹 長		52.96±.13	6.86	51.60±.51	8.15	52.15±.24	7.41	50.55±.54	6.62
上 肢 長		71.08±.19	10.07	73.04±.85	13.52	65.06±.30	9.24	66.50±.59	7.35
下 肢 長		82.95±.24	11.76	83.11±.88	13.92	78.01±.29	8.98	78.15±.66	8.19
肩 峰 幅		38.98±.25	13.21	38.68±.87	13.86	36.04±.35	10.86	37.53±1.05	13.04
腸 骨 櫛 間 距 離		26.74±.16	8.56	26.96±.69	10.92	27.26±.28	8.86	27.70±1.08	13.31
胸 廓 矢 狀 徑		18.61±.85	4.46	18.65±.49	7.76	18.02±.16	4.90	18.50±.44	5.44
胸 廓 橫 徑		26.41±.92	4.85	26.14±.40	6.39	25.21±.19	5.91	25.27±.57	7.09
胸 圍		83.82±.24	12.44	83.54±.14	18.17	79.79±.45	14.17	80.97±1.61	19.88
腹 圍		71.21±.30	15.82	73.29±.14	22.38	69.72±.64	20.01	70.27±.69	8.54
腰 圍		75.67±.29	15.46	76.45±.84	13.27	80.85±.19	6.04	82.21±2.10	26.06
大 軀 子 間 距 離		29.40±.17	8.43	29.77±.57	9.09	29.51±.27	8.43	30.25±.95	11.67
大 腿 圍		46.20±.22	11.37	45.96±.57	8.97	48.05±.41	12.99	46.44±.13	16.11
下 腿 圍		32.46±.15	8.05	32.36±.52	8.24	32.27±.23	6.99	32.68±.64	7.92
頸 圍		35.06±.22	11.42	34.80±.92	14.49	34.94±.36	1.33	35.34±.94	11.63
前 膊 圍		22.56±.08	4.39	23.50±.42	6.61	21.67±.01	4.53	21.27±.51	6.35
手 體 圍		19.84±.15	3.82	20.24±.36	5.73	18.02±.13	3.90	16.70±.27	3.39
頭 矢 狀 徑		52.74±.33	17.41	51.64±1.09	17.38	49.70±.50	18.16	50.15±2.03	25.12
頭 橫 徑		18.17±.83	4.38	18.39±.27	4.23	17.48±.13	4.06	17.61±.40	4.99
頭 圍		15.38±.71	3.74	15.52±.22	3.54	14.89±.13	3.95	14.77±.24	2.75
頭 耳 高		55.06±.15	8.12	55.23±.59	9.43	54.38±.30	9.44	54.10±.86	10.65
顏 面 高		12.91±.67	3.51	13.23±.30	4.71	12.61±.46	14.47	12.28±.42	5.19
顏 面 幅		13.46±.10	5.02	13.52±.37	5.81	12.58±.15	3.10	12.67±.87	10.72
胸 廓 示 數		14.15±.67	3.51	14.11±.53	4.04	13.62±.12	3.69	13.36±.32	3.92
胸 腹 橫 示 數		70.43±.54	18.78	71.06±1.41	16.61	69.59±.54	16.83	72.33±1.05	12.97
胸 腰 橫 示 數		98.99±.35	18.55	97.36±.99	15.73	94.23±.61	19.19	90.97±1.31	16.24
肩 胸 示 數		133.01±.37	19.59	130.45±.36	5.66	122.17±.51	15.85	124.45±1.20	15.43
頭 長 幅 示 數		65.67±.18	9.28	66.34±.77	12.22	68.20±.36	11.44	67.39±.98	12.06
比 軀 幹 長		84.83±.28	14.72	84.99±.82	12.95	85.66±.46	14.26	84.65±1.01	12.51
比 上 肢 長		32.78±.07	3.68	32.46±.20	3.15	33.17±.12	3.59	33.32±.28	3.45
比 下 肢 長		44.31±.09	4.65	43.93±.24	3.88	43.74±.23	7.19	43.79±.34	4.21
比 胸 圍		51.65±.07	3.76	51.93±.19	3.15	51.96±.11	3.46	51.44±.72	8.91
ウエルトハイマー示 數		52.14±.15	7.84	52.34±.58	9.26	52.99±.30	9.24	53.21±1.04	12.83
B 示 數		31.20±.12	6.11	31.99±.52	15.87	33.25±.27	8.49	33.39±.64	7.97
C 示 數		16.46±.14	7.17	17.32±.62	9.89	18.54±.31	9.65	16.65±.59	7.31
D 示 數		24.44±.93	4.87	23.43±.26	4.15	20.81±.14	4.40	21.41±.38	4.69
アンドレーフ示 數		78.42±.12	6.14	72.20±.48	7.58	56.68±.18	5.49	61.83±.35	4.31
A 示 數		0.17±.11	5.88	0.71±.45	7.16	1.14±.20	6.33	1.18±.67	8.31
肩 幅 胸 圍 示 數		18.02±.08	4.41	19.00±.37	5.81	14.48±.14	4.34	16.35±.48	5.93
ピ ニ エ 示 數		46.16±.12	6.45	46.00±.41	6.54	45.15±.24	7.41	48.91±.48	5.92
		24.56±.10	5.03	23.61±.41	6.47	20.99±.19	5.94	20.80±.69	8.57

M = 平均值 m = 平均誤差 σ = 標準偏差

男子分裂型

細長型

闊士型

肥満型

男子躁鬱型

細長型

闊士型

肥満型

女子分裂型

細長型

肥満型

女子躁鬱型

細長型

肥満型

主要文献

- 1) Andreew, M.P. : Z. Neur., **102**, 554 (1926)
- 2) Kretschmer : Körperbau und Character, 5.u. 6. Aufl. (1926)
- 3) Wertheimer and Hesketh : The significance of the physical constitution in mental disease, 1926
- 4) Wertheimer and Hesketh : Amer. Journ. Psych., **96**, 499 (1927)
- 5) Kühnel, G. : Z. Neur., **134**, 528 (1931)
- 6) Westphal, K.u. Hartner : Z. Neur., **127**, 216 (1930)
- 7) Martin, R., : Anthropometrie (1925)
- 8) 石川貞吉 : 神経誌, **23**, 573 (大13), **26**, 259; 332 (大15), **27**, 549 (大15)
- 9) 久保喜代二 : 日新医学, **17**, 4号; 5号 (昭2)
- 10) 高良武久 : 九大医報, **3**, 107; 174 (昭4)
- 11) 杉原満次郎 : 神経誌, **31**, 457 (昭5), **34**, 423 (昭7)
- 12) 太田清之 : 神経誌, **36**, 393 (昭8); **38**, 487 (昭9)
- 13) 池見猛 : 神経誌, **37**, 329 (昭9)
- 14) 永山千代作 : 成医誌, **55**, 204 (昭11)
- 15) 立野君子 : 東京女医誌, **9**, 323 (昭14)
- 16) 本多幸男 : 十全誌, **48**, 741 (昭18)
- 17) 池田良吉 : 日医大誌, **19**, 271 (昭27)
- 18) 和田通潭 : 人類学, 人類遺伝学, 体質学論文集, **17** (昭27)
- 19) 田中康夫 : 日医大誌, **21**, 1117 (昭29)
- 20) 阿部正直 : 日医大誌, **22**, 291 (昭30)