日本人胎児脊髓の発生学的研究

日本医科大学解剖学教室 (主任教授 横尾安夫)

森 本 正 昭

Masaaki Morimoto

ま え が き

成人の脊髓に関する研究は比較的詳細になされており、例へば脊髓の下界位についても略々、第一乃至第二腰椎の高さにあることなど周知の通りである。しかるに胎児の脊髓に関しては、その各時期における全貌は、未だ充分明らかにされていないように思はれる。著者は脊髓について主にその下端の高さ及構造を、胎児の発育に従つて追求し、同時に脊髓の各部の計測観察を併せ行つた結果、発生学的に興味ある二三の事実を観察することが出来たので、以下報告する。

材料及研究方法

材料は当解剖学教室所蔵のホルマリン固定によつて保存された、10 mm から 51 cm 体長の日本人胎児 141 例、中、男性 78 例、女性 59 例、性別不明 4 例を使用した。先づ肉眼的に観察し得る成長した胎児については、脊柱背部を背側より明瞭に露出して、各脊椎及び肋骨の数を確めた後、鋏、鋸等を用ひて椎弓切除を行ひ、脊椎管を開き、更に脊髓硬膜及び蜘蛛膜を排除した後、計測観察を行ひ、必要に応じて脊髓円錐下部及び終糸の一部を 20~30 μ のセロイデン連続切片とし、ヘマトキシリン・エオジン染色を施して顕微鏡的に観察した。又肉眼的に観察の困難な胎生初期の胎児については、同一方法により顕微鏡的に観察した。脊髓の下界位を示すのに、従来脊椎の高さを以つて表すのが慣習となつていたので、著者もその方法に準拠した。脊椎の高さを背側より決める方法は種々あるが、著者は従来行はれてゐる、椎間孔や棘突起を基準とする方法を検討した結果、これらの方法は実際上不便であり、又正確を欠くうらみがあるので、次の如き方法を考案した。即、計測にあたり特に必要である腰椎を、軟部組織を出来る丈除去して、脊柱をあらわした胎児について、前後方向及び側方より観察検討した結果、各横突起が常にその所属する腰椎の中心の高さを示すことを認めたので、以下背側より横突起を基準として、各腰椎の椎体中央を推測した (図 1)。この方

図 1 椎体と横突起との関係

法によれば、椎弓切除後も基準は明瞭であり簡便であると考え。又胎生初期の 4 ヶ月前後には脊髓の下界位を計測するのに、仙椎の測定が必要となる。しかるにこの時期に於ては、仙骨の形成が十分でないで、左右の外側仙骨稜上で仙骨管を開き、その断面により各仙椎の高さを推定した。以下便宜上、腰椎を L、仙椎を S、尾椎を Co で表し、椎体順位を L₁、L₂ の如く示し、椎体の上中下及び椎体間、の各位置を L₁ 上 L₁、L₁ 下、L₁₋₂ の如く略記する。胎児の体長は頂踵長を以つて測り、一部胎生初期の胎児では頂髂長を併用した。脊柱長は環椎上縁より尾骨尖までを脊柱彎曲に沿つて測定した。又脊髓の下界位は、脊髓円錐の終糸移行部に於て、円錐の太さが等しくなる部位を目測によつて定め下界位とした。従つて脊髓長としては環椎上縁よりこの下界位迄の長さを測定した。胎児の月齢を算推するには Haase 氏法及び国友、安井の測定値を参考として以下説明の便宜上、胎生の各月齢末を、体長により以下の如く定めた。

胎齡 1 ヶ月末	7 mm (頂髂長)
胎齡 2 ヶ月末	3 cm "
胎齡 3 ヶ月末	8 cm (頂踵長)
胎齡 4 ヶ月末	16 cm "
胎齡 5 ヶ月末	24 cm "
胎齡 6 ヶ月末	29 cm "
胎齡 7 ヶ月末	34 cm "

(本稿の要旨は第六十一回解剖学会において発表した)

胎齡 8 ヶ月末	39 cm	〃
胎齡 9 ヶ月末	44 cm	〃
胎齡 10 ヶ月末	51 cm	〃

第 1 章 脊髓各部の計測 所 見

1. 脊髓の下界位

10 mm 胎児：胎生初期の胎児では、胎児 尾 側 端に所謂、尾部を有しており、20 乃至 30 mm 胎児ではこの尾部は次第に短くなって尾 結 節 となる。この 10 mm 胎児では已に脊椎形成を始めており、その原基は 37 ケを算え得る。そして脊髓は可成広い中心管腔を持つ神経管として見られ、その末端は最下端の尾椎原基を越えて、上衣細胞壁で囲まれた小腔を作つて終つている（附図 1, A. 1）

16 mm 胎児：広い終室を形成した後、上衣 細胞塊は次第に細くなり、尾椎原基を越えて終つている。

18 mm 胎児：胎児尾側端背部に岬 状に突出した突起中に上衣細胞に囲まれた小腔を認める。脊椎原基は未だ脊索を残し、その小腔より上方で終つている（附図 1, A. 2）

23 mm 胎児♂, 28 mm 胎児♀：（附図 1, A. 4）
脊髓末端は脊椎末端と、略々等しく終つている。

32 mm 胎児♀：脊椎原基は 33, 終室は細狭となつた後、再び小腔を形成して尾椎原基の末端附近で終つている（附図 1, A. 6）

35 mm 胎児♂：S₅ 附近で複雑に分岐した終室を形成した後、尾椎原基末端の背部で小腔と連絡する。

以上の例の中、18, 23, 28 mm 胎児 3 例の尾部で、終室末端に近く表皮に突出した小結節が見られる。これは所謂 Schwanzknöpfchen である。この Schwanzknöpfchen に関しては、池田, Rosenberg, His, Kölliker 等の詳細な報告がある。

池田によれば、11.8 mm 胎児より明かに認められ、

表 1

S ₅	5.2♀ (cm)	5.8?	6.4♂	7.0♀	8.0♂	8.5♂	8.8♂	9.0♂	9.5♂	10.♂	10
Co ₁	5.55♀	8.2♀									2

表 2

S ₁	16 (cm) ♂	1	S ₃	12.5♂ 14♀	2
S _{1~2}	15.5♂	1	S _{3~4}	12.5♂	1
S ₂ ノ上	14.2♂	1	S ₄	11♂ 13♀ 13.2♀ 13.5♂ 15.6♂	5
S ₂	14.0♂ 14.0 ♀	2	S _{4~5}	13♀ 13♀	2
S _{2~3}	14.0♂	1	S ₅	11?	1

15.6 mm より 28 mm 胎児には略ど毎 常 認められ、これは早晚、吸収又は脱落すると云う。（附図 A. 2, 3, 4, 5）

以上胎生初期の脊髓の下界位は、10 乃至 28 mm 胎児では脊髓末端は尾椎末端を僅かに越え、後これと等しくなる。32, 35 mm 胎児では終 糸の始まりと思はれるものは尾椎末端に達し再び小腔を形成するが、Co₁ 下の高さで目立って細くなつていたので下界位は大体 Co₁ 下にあると考える。これを胎生月齢で云へば下界位は 2 ヶ月始めまでは尾椎末端を越え、2 ヶ月半ばでこれと等しくなり、2 ヶ月末で Co₁ 前後の高さになる。

次に胎生 3 ヶ月初めから 4 ヶ月始めまで、5.2 cm（以下頂腫長で示す）乃至 10 cm 長胎児 12 例について下界位を見ると表 1 の通りである。

従つて胎生 3 ヶ月から 4 ヶ月初めまでは下界位は S₅ にあり、中には今少し低く Co₁ に留るものもあると考えられる。

次に胎生 4 ヶ月後半の 11 乃至 16 cm 長胎児 17 例について見ると表 2 の通である。

即、胎生 4 ヶ月後半では仙骨管の下端から上端へと身長が増加と平行して下界位は上昇し、11 cm から 16 cm 迄の可成短い期間に仙骨管を上ることが認められる。従つて胎生 4 ヶ月を通して見れば、4 ヶ月初めの 9 cm から 10 cm までのものでは、下界位は S₅ を動かないが、4 ヶ月後半の 11 cm から 16 cm までの間に急速な上昇を示し、4 ヶ月末で仙骨管の上端に達する。この事実は胎生 3 ヶ月で下界位が S₅ を全く動かなかつたのに較べて見ると興味深く、胎児は第 4 ヶ月の主として後半の間に脊柱が急速な長軸發育をするため、脊髓の發育が脊柱のそれに取り残される事実を示している。

次に胎生 5 ヶ月の 17 乃至 24 cm 長の胎児 20 例の下界位は表 3 の通りである。

20 例中 L₅ が 7 例、L₅ 下が 5 例、S₁ が 3 例その他 5 例で、胎生 5 ヶ月では下界位は腰椎下端及び仙椎上端附近にあるが、S₂ 以下は一例もなく、この時期に概ね下界位は仙骨管の上端から腰椎に達する。

次に胎生 6 ヶ月の 25 乃至

表 3

L ₃ 下	23♂					1
L ₄	17♂	22♀	24.6♂			3
L _{4~5}	21.6♀					1
L ₅	18♂	18.7♀	20♀	21.9♀	23.5♂	7
	24♀	24.5♂				
L ₅ 下	20.2♂	24♀	24♀	24.3♂	24.5♀	5
S ₁	18.3♀	20♀	24.5♀			3

表 4

L ₃	25♂					1
L ₃ 下	27.5♂					1
L _{3~4}	28♀					1
L ₄ 上	26♂	27♂	29.5♂			3
L ₄	27♀	29♀				2
L _{4~5}	27.5♂	28♀	28♂			3
L ₅ 上	29♂					1
L ₅	25♂	25♀	26♂	27♂		4
L ₅ 下	26♀	27♂				2

29 cm 長胎児 18 例の下界位は表 4 の通りである。

L₅ 下 から L_{4~5} の間に 10 例あつて、18 例中過半数を占めているが、己に L₃, L₃ 下に達している 2 例もある。これを 5 ケ月と比較して見ると、5 ケ月では S₁ は 3 例、L₅ 下は 5 例、6 ケ月で S₁ はなく、L₅ 下 2 例で、L₄ 以上の高位例は 5 ケ月では 4 例、6 ケ月では 8 例で、高位例は 6 ケ月で著しく増えている。即、下界位は 5 ケ月から 6 ケ月にかけて S₁ から L₄ へ、又 L₅ から L_{4~5} へと着実に上昇して、6 ケ月に入ると最早下界位は仙骨管内にないことを示している。

次に胎生 7 ケ月の 30 cm から 34 cm 長胎児 26 例の下界位は表 5 の通りである。

26 例中 L_{4~5} が 4 例、L₄ 下が 3 例、L₄ 及び L₄ 上が各 5 例で合計 17 例が L_{4~5} から L₄ 上にあり過半

表 5

L ₂ 下	33♂					1
L ₃	30♂	32♂				2
L _{3~4}	34.4♂	34.5♂				2
L ₄ 上	31♂	31.3♀	31.5♀	32♀	32.5♀	5
L ₄	30.5♂	30.5♂	31.5♀	34♀	34.5♂	5
L ₄ 下	31♂	33♂	34♀			3
L _{4~5}	30♀	30♂	31♂	31.5♀		4
L ₅ 上	31.5♂					1
L ₅	30♀	34♂				2
S ₁ 上	31♂					1

数を占め、その他は S₁ 上から L₂ 下までに分散して著しい動揺はあるが、胎生 7 ケ月では下界位は概ね L₄ を中心として、L_{4~5} から L₄ 上の範囲にある。

次に胎生 8 ケ月の 35 cm から 39 cm 長胎児 20 例の下界位は表 6 の通りである。

表 6

L ₃ 上	35♂	35♀	36.2♂	39♂		4
L ₃	38.5♂					1
L ₃ 下	35♀	36♂	36.5♂	38♂	38.7♂	5
L _{3~4}	36♂	39♂				2
L ₄ 上	36♂	37♂				2
L ₄	35♀	38♂	39.5♂			3
L ₄ 下	36♀					1
L _{4~5}	38♀	39♂				2

20 例中 L₄ が 3 例、L₄ 上が 2 例、L_{3~4} が 2 例、L₃ 下が 5 例、L₃ 上が 4 例で、胎生 8 ケ月では下界位は概ね L_{3~4} 及 L₃ 下を中心に、L_{4~5} から L₃ 上までに分散している。

胎生 9 ケ月の 40 cm から 44 cm 長胎児 10 例の下界位は表 7 の通り・L_{2~3} が 2 例のように高位を示すものもあるが、尙 L₄ 附近にあるものも多い。

表 7

L _{2~3}	41♂	41.5♀				2
L ₃	44.5♂					1
L _{3~4}	43.8♀					1
L ₄ 上	43♂	43.8♂				2
L ₄	40♀	42.5♂				2
L ₄ 下	41.7♀					1
L ₅ 下	40♂					1

胎生 10 ケ月の 45 cm から 51 cm 長胎児 8 例の下界位は (表 8) L₄ 下から L₅ 上までに分散しているが、L₃ 上が 3 例あるから、胎生末期には L₃ 上に達すると考えられる。

表 8

L ₃ 上	45♀	49♀	50♀			3
L ₃	51♀					1
L ₃ 下	45♀					1
L _{3~4}	46♂					1
L ₄ 上	48.5♀					1
L ₄ 下	45♂					1

以上胎児脊髓の下界位を綜括すれば (表 9 図 2) 胎生 2 ケ月では、初めは尾椎末端を越えているが、半ばではこれと等しくなり、終りでは尾椎上端にある。

表 9 各月令における脊髄下界位頻度数

[illegible]

4~5				2						2	
S ₅	上									0	
		1	7	4						12	
	下									0	
Co ₁		3	2							5	
Co ₅		2								2	
	下	2								2	
計		8	10	19	20	18	26	20	10	8	139

図 2

胎生3ヶ月では全期間を通じて仙椎下端にある。

胎生4ヶ月では初めは仙椎下端にあるが、後半には急速に上昇して、終りには仙椎の上端に至る。即、4ヶ月では下界位は仙骨管内にある。

胎生5ヶ月では S₁ から L₅ に至り、この時期に下界位は仙骨管を出て腰椎に達する。

胎生6ヶ月では L₅ から L_{4~5} に至る。

胎生7ヶ月では L₄ を中心として L_{4~5} から L₄ 上に至る。

胎生8ヶ月では L_{3~4} 及び L₅。下を中心に L_{4~5} から L₃ 上に至る。

胎生9ヶ月では L_{3~4} にあり、一部は L_{2~3} に至る。

胎生10ヶ月では L_{3~4} から L₃ 上に至る。

性別による下界位の差異は、一般的に女性胎児が男性胎児より下界位はやゝ低い傾向を示す。即、比較を容易にするため、胎児を各身長単位 cm 毎に性別により下界位を比較し、各単位 cm で高低の比較出来ない、単数、同性、性別不明、同位のものを除いて比較した。94例(中♂46例, ♀48例)による20単位 cm の中、男性が高位を示すものが13, 女性の高位を示すものが7単位 cm で、女性がやゝ低位にある。

2. 脊柱長及脊髓長

胎児の脊柱長は、各胎生月齢末の平均値によつてその趨勢を見ると、胎生2ヶ月末から3ヶ月末までは約1cmの増加であるが、胎生3ヶ月末から4ヶ月末ま

でに3.7cmから7.1cmへと約2倍近くになり、胎生4ヶ月末から5ヶ月末までには7.1cmから11.6cmへと約1.5倍の長さとなり、胎生5ヶ月末から10ヶ月末までは、平均値がそれぞれ2.1, 3.1, 1.1, 4.1, 3.1cmと増加していて、胎生7ヶ月末から8ヶ月末

図 3

までの期間の増加は僅か1.1cmである外は、概ね均等に増加する。即、胎生5ヶ月までは脊柱長の増加は急速で、6ヶ月以後は緩かに増加する(表11)。

次に脊髓長を各胎生月齢末の平均値で見ると、各月の増加数値は胎生2ヶ月末から3ヶ月末までは1cm, 3ヶ月末から4ヶ月末までは2.4cm, 胎生4ヶ月末から5ヶ月末までは2.9cm, 胎生5ヶ月末から10ヶ月末まで各月の増加数値はそれぞれ1.1, 2.0, 1.3, 2.1, 1.8cmという風に増加していて、脊柱長の増加の割合に比較して見ると可成緩かな増加であり、その最も迅速にのびる胎生4ヶ月及び5ヶ月の頃でも、同期間の脊柱長の増加の速度に対しては、3.4:2.4cm乃至は4.5:2.9cmの如く可なり劣つている。この両者の増加する速度の差異が下界位の推移をあらはすわけであり、下界位が胎生3ヶ月では余り変化せず、4ヶ月、5ヶ月で著しい上昇を示し、6ヶ月からは比較的緩かに上昇する有様が理解出来る(表10, 11; 図3, 4)。

表 11 各月令末における各部平均

月令	身長 (cm) 括弧内 (頂臀長)	脊柱長 (cm)	脊髄長 (cm)	脊髄長 脊柱長 ×100%	頸膨大(mm)		胸 髓 (mm)		腰膨大(mm)		終 糸 (mm)	
					前後径	左右径	前後径	左右径	前後径	左右径	内終糸	外終糸
2	(3.70)	2.70	2.60	96.30	—	—	—	—	—	—	—	—
3	8.38 (6.25)	3.74	3.64	97.23	2.00	2.50	1.47	1.56	1.90	2.30	—	—
4	14.83	7.13	6.04	86.08	2.50	3.05	1.50	1.68	2.83	3.58	3.50	4.75
5	24.34	11.61	8.96	80.34	3.16	3.96	1.86	2.20	3.69	4.59	6.64	7.84
6	28.58	13.78	10.06	74.20	3.30	4.20	2.22	2.16	3.99	5.07	11.80	12.73
7	34.23	16.97	12.13	71.38	4.25	5.55	2.83	3.25	4.38	5.63	15.33	15.67
8	39.12	18.13	13.45	75.75	3.53	5.20	2.00	3.00	4.05	5.90	21.53	12.73
9	43.78	22.25	15.50	69.53	4.38	6.58	2.75	4.00	4.15	6.40	20.00	19.50
10	48.90	25.20	17.32	68.68	3.90	5.66	2.96	3.98	4.74	6.50	30.42	19.60

次に脊髄長を脊柱長の百分率で表はした数値を身長
の各単位 cm 別に求めた。(表 11, 図 4)

その結果各月令末の平均は胎生 2 ヶ月及び 3 ヶ月
では 96% 以上, 4 ヶ月末では 86%, 5 ヶ月末では 71
%, 8 ヶ月末では 76%, 9 ヶ月末では 69%, 10 ヶ
月末では 68% となり, 4 ヶ月末から 5 ヶ月末までが
最も変化が強く 15% の低下が見られる。植苗の成人
についての平均値は♂61.4%, ♀62.8% で, 胎生 10
ヶ月末の 63% が成人になるまでに尙これだけ変化す
るものと思はれる。著者の場合性別は明らかでない。

図 4

3. 脊髄の前後径及左右径

脊髄の両膨大は胎生 2 ヶ月の 28 mm 長胎児でも組
織学的に認められるが 3 ヶ月の 37 mm 長胎児では肉
眼的に明らかに認め得る。胎生 3 ヶ月以後の胎児につ
いて頸膨大, 胸髄及び腰膨大に於てその前後径, 左右
径を計測した。その月令末平均値によると各部とも胎
生 3 ヶ月末と 10 ヶ月末との数値を見ると, 頸膨大で
は前後径が 2.0 : 3.9 mm, 左右径が 2.5 : 5.6 mm,
胸髄ではそれぞれ 1.47 : 2.96 mm, 1.56 : 3.98 mm,
腰膨大では 1.9 : 4.74 mm, 2.3 : 6.5 mm となつてい
て, 10 ヶ月末では略々 2 倍乃至 2.5 倍となり, 特に
腰膨大は 3 倍近い増加を示す。(表 11) 128 例中前
後径, 左右径共頸膨大が腰膨大より大きいもの 14 例,
左右径のみ大きいもの 7 例, 又前後径, 左右径共腰膨

大と等しいもの 3 例, 左右径のみ腰膨大と等しく前後
径は小さいもの 16 例で, 一般に腰膨大が頸膨大より

表 12 各月令に於ける膨大位置頻度数

頸膨大

月令 脊椎高	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計
C ₃		2		1			1	1		5
3~4						1				1
C ₄		1	3	1		3	1	2		11
4~5				1	1	1				3
C ₅		3		4	5	8	8	5	3	36
5~6									1	1
C ₆		1	1	11	8	6	14	2	2	45
6~7					1		1			2
C ₇		2	10	3	3	1			2	21
Th ₁							1			1
計	0	9	14	21	18	20	26	10	8	126

腰膨大

月令 脊椎高	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計
Th ₁₂				2	1	1	5	4	1	14
Th ₁₂ ~L ₁					4	2	3	2	1	12
L ₁				5	6	7	13	4	4	39
1~2						3	1		2	6
L ₂		1	5	10	5	7	4			32
2~3				2						2
L ₃			5	4	2	2				13
L ₄			2	4						6
L ₅			1	1						2
計		9	14	21	18	20	26	10	8	126

表 10

番 号	身長 (単位 cm) (括弧内は 頂身長)	性	下界位	脊柱長 (cm)	脊髄長 (cm)	脊髄長 脊柱長 ×100%	頭膨大 (mm)			胸 髄(mm)			腰膨大 (mm)			終糸 (mm)		終室 形成	円錐 形状	脊髄神経節 (括弧内) (深個数)
							高さ	前後径	左右径	前後径	左右径	高さ	前後径	左右径	内終糸	外終糸				
No. 1	10 mm	?	Co ₃ 下																	
No. 2	16 mm	?	Co ₃ 下																	
No. 3	18 mm	♀	Co ₃																	
No. 4	23 mm	♂	Co ₃																	
No. 5	28 mm	♀	Co ₁																	
No. 6	32 mm	♀	Co ₁																	
No. 7	35 mm	♂	Co ₁																	
No. 8	37 mm	♂	S ₅	2.7	2.6	96.3														
No. 9	5.2 (4.0)	♀	S ₅	2.8	2.7	96.4	—	—	—	1.4	1.4	L ₄	1.75	2.0						
No. 10	5.55 (4.45)	♀	Co ₁	3.45	3.33	96.5	C ₅	1.7	2.0	1.4	1.4	L ₂	1.5	2.0						
No. 11	5.8 (4.85)	?	S ₃	3.1	2.95	95.2	C ₅	1.6	2.2	1.6	2.2	L ₄	1.4	1.8						
No. 12	6.4 (5.3)	♂	S ₂	3.46	3.3	95.3	C ₃	1.6	1.8	0.8	0.9	L ₃	1.7	1.9						
No. 13	7.0	♀	S ₅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
No. 14	8.0 (6.1)	♂	S ₅	3.8	3.7	97.3	C ₃	1.6	2.0	1.2	1.4	L ₃	2.0	2.4						
No. 15	8.2 (6.1)	♀	Co ₁	4.06	3.9	96.1	C ₅	2.0	2.7	1.4	1.5	L ₃	1.7	2.5						
No. 16	8.5 (6.3)	♂	S ₅	3.0	2.9	96.7	—	—	—	—	—	S ₁	—	1.5						
No. 17	8.8 (6.5)	♂	S ₃	4.1	4.05	98.8	C ₄	2.4	2.8	1.8	1.8	L ₃	2.0	2.8						
No. 18	9.0 (6.5)	♂	S ₃	4.15	3.92	94.5	C ₇	2.0	2.2	1.8	2.0	L ₅	1.8	2.7						
No. 19	9.5 (7.3)	♂	S ₅	4.4	4.1	93.2	C ₆	2.5	2.8	2.0	2.0	L ₄	2.0	3.0						
No. 20	10.0 (7.4)	♂	S ₂	4.6	4.4	95.7	C ₇	1.8	2.5	1.5	1.5	L ₂	2.0	2.8						
No. 21	11.0 (8.6)	♂	S ₄	5.1	4.7	92.2	—	—	—	—	—	—	—	—						
No. 22	11.0	?	S ₅	5.9	5.7	89.9	C ₄	3.5	4.5	1.0	1.5	L ₂	3.5	4.1						
No. 23	12.5	♂	S ₃	6.3	5.7	90.5	—	—	—	2.0	2.0	L ₂₋₄	2.5	3.0				著明		
No. 24	12.5	♂	S ₃₋₄	5.8	5.3	91.4	C ₇	2.0	2.5	1.8	1.8	L ₂	2.3	3.0						
No. 25	13.0	♀	S ₄₋₅	5.6	4.5	96.6	C ₄	2.5	2.8	1.8	2.1	L ₂	2.4	2.9				著明		
No. 26	13.0	♀	S ₄	5.8	5.4	93.1	C ₇	2.0	3.2	1.8	1.8	L ₃	2.3	3.0						
No. 27	13.0	♂	S ₄₋₅	6.6	6.0	90.9	C ₇	2.0	2.5	1.5	1.5	L ₄	2.5	3.0				著明		
No. 28	13.2	♀	S ₄	5.8	5.15	81.8	C ₇	2.0	2.2	1.0	1.7	L ₂	1.5	3.0						
No. 29	13.5	♂	S ₄	5.9	5.5	93.2	C ₇	2.0	3.0	1.8	1.8	L ₃	2.3	3.0						
No. 30	14.0	♂	S ₂	6.0	4.9	81.7	C ₇	2.0	2.5	1.5	1.5	L ₄	2.5	3.0						
No. 31	14.0	♀	S ₃	6.3	5.6	88.9	C ₇	2.0	2.5	1.5	1.5	L ₃	2.5	3.0						
No. 32	14.0	♂	S ₂₋₃	6.0	5.5	91.7	C ₆	2.0	2.5	1.7	1.7	L ₄	2.0	3.0						
No. 33	14.0	♀	S ₂	6.9	5.8	84.1	C ₇	2.5	2.7	1.7	1.7	L ₂	3.8	4.5	4.5	6.5	著明	短		
No. 34	14.2	♂	S ₂ 上	6.9	5.45	83.8	C ₇	2.5	2.8	1.6	1.6	L ₃	2.5	3.2						
No. 35	15.5	♂	S ₁₋₂	6.9	5.8	84.1	C ₇	2.5	2.7	1.7	1.7	L ₂	2.5	3.5	2.5	3.0	著明			
No. 36	15.6	♂	S ₄	7.8	7.2	92.3	C ₄	2.5	4.0	1.0	1.7	L ₄	2.5	3.1				著明		+ (2)
No. 37	16.0	♂	S ₁	6.5	5.2	80.0	C ₄	3.0	3.7	2.0	2.0	L ₂₋₃	2.8	3.5						
No. 38	17.0	♂	L ₄	9.3	5.8	62.4	C ₆	2.5	2.5	2.0	2.0	Th ₁₂	2.0	3.0	6.0	4.0				
No. 39	18.0	♂	L ₅	8.5	7.3	85.9	C ₆	2.8	3.5	1.9	1.9	L ₂	3.1	4.5	3.0	5.0				
No. 40	18.3	♀	S ₁	9.3	6.3	67.7	C ₆	2.0	3.0	2.0	2.0	L ₃	3.0	4.0	4.0	4.0	著明	短		
No. 41	18.7	♀	L ₃	9.4	7.2	76.7	C ₁₋₅	3.0	3.8	1.6	2.0	L ₂₋₃	3.0	4.0	5.6	7.6	著明	短		+ (4)
No. 42	20.0	♀	L ₅	10.5	8.6	81.9	C ₆	3.0	4.5	2.0	3.0	L ₁	4.0	4.5	6.5	4.0	著明	短		
No. 43	20.0	♀	S ₁	10.2	10.0	98.0	C ₃	3.0	4.0	2.0	2.0	L ₁	3.5	4.0	6.0	7.0	著明			+ (1)
No. 44	20.2	♂	L ₂ 下	10.4	7.8	75.0	C ₅	3.0	3.8	1.8	2.0	L ₂	3.0	3.6	4.5	6.0	著明			+ (2)
No. 45	21.6	♀	L ₁₋₃	10.2	8.0	78.4	C ₅	3.9	5.0	2.0	2.25	L ₂	3.0	5.0	8.7	1.0	著明			
No. 46	21.9	♀	L ₅	10.8	8.9	82.4	C ₆	2.5	3.5	1.5	2.0	L ₁	3.0	5.0	4.0	1.1	著明			
No. 47	22.0	♀	L ₄	12.4	9.8	79.0	C ₅	2.0	4.0	1.9	1.9	L ₁	3.0	5.0	7.0	6.0				
No. 48	23.0	♂	L ₂ 下	11.0	7.9	71.8	C ₅	2.5	3.0	1.5	2.0	Th ₁₂	3.0	3.0						
No. 49	23.5	♂	L ₃	10.3	7.8	75.7	C ₇	3.2	4.0	1.9	2.2	L ₃	3.2	4.2	4.5	9.0	著明	短		
No. 50	24.0	♀	L ₃ 下	10.9	8.6	79.1	C ₇	3.0	3.5	2.0	2.0	L ₂	4.0	5.0			著明	短		+ (1)
No. 51	24.0	♀	L ₂ 下	11.5	8.8	76.6	C ₆	3.2	4.0	2.0	2.5	L ₂	3.8	4.5	4.5	6.5	著明			
No. 52	24.0	♀	L ₅	10.9	8.5	78.9	C ₆	2.7	3.0	2.0	3.0	L ₂	3.0	4.0	10.0	9.0	著明			
No. 53	24.3	♂	L ₂ 下	11.4	9.0	89.9	C ₃	4.0	5.0	2.0	2.2	L ₂	4.2	5.0	4.0	8.0	著明			
No. 54	24.5	♀	S ₁	11.7	9.5	81.2	C ₆	3.0	4.0	1.5	1.7	L ₂	4.0	5.5	4.0	7.0				
No. 55	24.5	♂	L ₃	11.7	9.3	79.5	C ₆	3.0	3.2	2.0	2.0	L ₂	3.5	3.7	6.5	6.0	著明			
No. 56	24.5	♀	L ₂ 下	11.6	8.8	75.9	C ₆	3.2	4.0	2.0	2.5	L ₂	3.8	4.5	4.5	6.5	著明			
No. 57	24.6	♂	L ₄	12.5	8.8	80.4	C ₇	3.0	4.5	1.5	1.5	L ₁	3.5	4.9	13.0	11.0	著明	短		
No. 58	25.0	♂	L ₃	12.0	8.9	68.7	C ₇	4.0	5.0	3.5	4.0	L ₂	4.5	6.5	12.5	7.5	著明</			

大きく、ことに前後径においてその傾向が大きい。

両膨大の位置は各月齢別に見ると、表 12 の如く頸膨大では C_6 より Th_{11} に至る間に分散し、126 例中 C_6 が 36 例、 C_7 が 45 例、 C_7 が 21 例が主な高さで、各月齢による差異は殆ど見られない。反之腰膨大では、 Th_{12} から L_5 の間に分散し、126 例中 L_1 が 39 例、 L_2 が 32 例で過半数を占め、各月齢によつて高さが上昇し、胎生 3 ヶ月では L_5 以下、5 ヶ月では L_2 、以後月齢の進むにつれて L_2 から L_1 乃至 Th_{12} へと 10 ヶ月までに緩やかに上昇する様は下界位の場合に酷似している。

4. 終 糸

胎児において終糸を計測することはやゝ困難を伴う。特にその外終糸が仙椎下端又は尾椎背側に線維性に附着する状態を、肉眼的に明確に判別することは出来ない。著者は便宜上消息子を用いて外終糸を上方で左右に少しく動かして見て、動かない部位を附着部と定め、これを外終糸の下端として計測した。その結果終糸は胎生 4 ヶ月の初めから肉眼的に認められ、4 ヶ月から 7 ヶ月末までは外終糸が内終糸より僅かに長く、8 ヶ月から 10 ヶ月末では内終糸の方が外終糸より長くなる。終糸の長さは、胎生 10 ヶ月末で、内終糸が約 3 cm、外終糸が約 2 cm で 3:2 となるが、植苗の成人ではこの比は 2:1 で、生後に引続いて内終糸が長くなるやうである。これは胎児の脊髓下界位の上昇が続くからであろう。(表 10, 11)

5. 破格及双胎例

使用した材料中、2 例の破格例と、2 対の双胎例が含まれる。即、破格例は、いづれも胸椎数及び肋骨数が、1 個及び 1 対不足し胸椎 11、肋骨 11 対であり、双胎例はいづれも、1 卵性双胎で、脊髓各部において形態、数値に著しい相似が認められる。

考 察

1. 脊髓の下界位。胎児脊髓の下界位に関する、従来の報告を要約すれば、Eichhorst は脊髓の成長を胎生初期では脊髓は全脊椎管と仙骨管とを充たし、胎生 4 ヶ月から脊柱が長くなり、出産時に L_5 の高さになると云う。Rüdinger 及び Kölliker は胎生初期の 1, 2, 3 ヶ月では脊髓は脊柱と同じく发育し尾骨尖端まで充たし、胎生 4 ヶ月より脊柱の发育が脊髓の发育を超越すが、胎生 6 ヶ月で尙仙骨管に留り、胎生末期で $L_3 \sim L_4$ (Rüdinger) 又は L_3 (Kölliker) に至るといふ。Arnold も略々同様で、年齢性別により長さを異にし、屢々女子は男子より長いといふ。Ziehen も Kölliker らと同様胎生 1 ヶ月では仙椎下端まで充たし、4 ヶ月より脊髓が漸くその发育停滞し、6 ヶ月では尙仙骨管内にあるが分娩時には L_5 の高さに至ると云う。又 Henle によると初生児では L_2 下、福島によると初生児で L_3 下、乳児で L_3 上、2 歳で L_2 上、3 歳で L_2 上、4 歳で L_2 下にあると云う。又成人については植苗によると日本人男では L_1 が 33.3%, L_{1-2} が 19.0%, L_2 42.9%, L_{2-3} が 5.0%, 女では L_1 なく、 L_{1-2} が 10%, L_2 が 70%, L_{2-3} が 20% で、女性が男性より脊髓の下界位が低いと云う。著者は、胎生初期では 2 ヶ月初めには下界位は尾椎末端を越え、半ばでこれと等しくなり、胎生 3 ヶ月では全期間を通じて仙椎下端にあり。胎生 4 ヶ月では、初めは 3 ヶ月に引続き仙椎下端にあるが、後半には急速に上昇して終りには仙椎の上端に至ることを明らかにした。又、Rüdinger, Kölliker, Ziehen らは胎生 6 ヶ月までは脊髓末端は尙仙骨管内に留ると云うが、著者の例によれば、胎生 5 ヶ月で既に表 3 に示す如く 20 例中 L_5 が 7 例 L_5 下が 5 例、 S_1 が 3 例で下界位は腰椎下端部から仙椎上端部にかけて存在し、胎生 6 ヶ月では表 4 に

表 13 双 胎 例

番 号	身長 (単位 cm)	性	下界位	脊 柱 長 (cm)	脊 髓 長 (cm)	脊 髓 長 脊 柱 長 $\times 100\%$	頸 膨 大 (mm)	胸 膨 大 (mm)	腰 膨 大 (mm)	終 糸 (mm)	終形 室 成	円 錐 形 状	脊 髓 神 經 節 細 胞 (括弧内 個数)
No. 51	24.0	♀	L_5 下	11.5	8.8	76.6	C_6 3.2 4.0	2.0 2.5	L_2 3.8 4.5	4.5 6.5	著明		
No. 56	24.5	♀	L_5 下	11.6	8.8	75.9	C_6 3.2 4.0	2.0 2.5	L_2 3.8 4.5	4.5 6.5	著明		
No. 78	30.0	♂	L_{4-5}	14.7	10.7	72.8	C_6 3.0 4.0	2.5 3.0	L_2 5.0 6.0	7.0 11.0	著明		
No. 86	31.0	♂	L_{4-5}	14.8	11.1	75.0	C_6 3.0 4.0	2.5 3.0	L_2 4.0 5.0	9.0 8.0	著明		
破 格 例													
No. 1	28.0	♀	L_{4-5}	15.5	11.2	78.7	C_6 3.0 5.0	2.0 2.7	L_2 3.0 5.0	14.0 15.0	—		
No. 2	32.0	♀	L_{4-5}	14.8	10.5	77.8	C_6 3.5 5.0	2.5 3.5	L_2 5.0 6.0	19.0 13.0	著明	短	+(1)

示す如く 18 例中下界位が仙椎にあるものは 1 例もなく 10 例が L_5 下から L_{4-5} の間にあり、胎生 7 ヶ月で S_1 が 1 例あるが特殊例と見るべきで、胎生 6 ヶ月では下界位は仙骨管内になく、従来の報告と著しく相異なる。(表 3, 4, 9, 10) 胎生末期では L_{3-4} から L_5 上に多く、従来の報告と比較して大差がないことは、こゝに掲げた表からも理解出来る。

Kölliker	Eichhorst	Rüdinger	Henle	Ziehen
L_{3-4}	L_3	L_{3-4}	L_2 下 (初生児)	L_3

下界位の性別による比較については、Arnold によると女子は男子より低位にあると云い、成人では植苗、久保も同様の結果を述べ、著者の例も同じ結果を見た。

2. 脊柱長及び脊髓長 本邦では藤江が脊髓長を坐高と対比して、その結果胎生 24 週まではその百分率は低下の傾向著しいが、胎生中期、後半以後では低下の傾向僅少となり、24 週と 40 週との差は僅か 1.7% で、これは 13 週と 24 週との差 17.2% の 1/10 に過ぎないと云う。著者の脊柱長の百分率で表はした数値で同様比較すると、胎生 6 ヶ月末と 10 ヶ月末との差は 5.52%，胎生 3 ヶ月末と 6 ヶ月末との差は 23.0% で、前者は後者の 1/4 となる。各月胎末の平均脊髓長は Eichhorst の成績と比較すると著者の例は 7 ヶ月以後各々 1 cm 長い。(表 14)

3. 脊髓の前後径及び左右径。脊髓の両膨大の発生は、Kölliker によると胎生 2 ヶ月より已に認められ、3 ヶ月では非常に明瞭になると云う。両膨大の前後径、左右径を Eichhorst の成績と比較したが、各月胎末の平均は概ね一致する(表 14)。又藤江の報告に

よれば、胎児の脊髓の最大巾は常に頸膨大にあると云うが、著者の例では最大巾が頸膨大にある例は、128 例中 21 例で、一般に腰膨大が頸膨大より大きく、ことに前後径においてその傾向が大きい。各膨大の高さは、成人では、久保によれば表 15 の如く頸膨大では C_4 、 C_5 、 C_6 にあり、その中 C_5 が最も多く、腰膨大では Th_{10} 、 Th_{11} 、 Th_{12} 、 L_1 にあり、その中 Th_{12} が最も多く L_2 以下はない。

表 15

頸 膨 大			腰 膨 大		
	♂	♀		♂	♀
C_4	5	1	Th_{10}	3	1
C_5	10	4	Th_{11}	2	3
C_6	2	3	Th_{12}	12	3
			L_1	0	1

その他 Dunn は胎児 156 例の脊髓容積を測定し、その成績の概略は下表の如くである。

表 16

平均頂踵長 (cm)	推定脊髓容積 (cc)	平均頂踵長 (cm)	推定脊髓容積 (cc)
7.2	0.13	32.6	0.9
12.5	0.2	37.0	1.1
16.5	0.3	41.9	1.7
22.6	0.4	48.0	2.3
26.9	0.6	52.0	2.8

第 2 章 脊髓尾端の形態学的所見

所見

1. 脊髓円錐の形態

脊髓円錐は腰膨大から終糸へ移行する部位である

表 14

月 令	脊髓長(cm)		頸 膨 大 (mm)				胸 髓 (mm)				腰 膨 大 (mm)			
			前後径		左右径		前後径		左右径		前後径		左右径	
	Eichhorst	森本	Eichhorst	森本	Eichhorst	森本	Eichhorst	森本	Eichhorst	森本	Eichhorst	森本	Eichhorst	森本
3	4	3.64	1.80	2.00	2.5	2.50	1.0	1.47	1.5	1.56	2.0	1.90	3.0	2.30
4	8	6.04	—	2.50	—	3.05	1.0	1.50	1.5	1.68	2.0	2.83	3.0	3.58
5	9~9.5	8.96	3.8	3.16	4.0	3.96	2.0	1.86	2.0	2.20	3.5	3.69	4.0	4.59
6	10~11	10.06	4.0	3.30	4.0	4.20	2.0	2.22	3.0	2.16	3.5	3.99	4.0	5.07
7	11	12.13	4.0	4.25	5.0	5.55	3.0	2.83	4.0	3.25	4.0	4.38	5.0	5.63
8	12~12.5	13.45	4.0	3.53	5.0	5.20	3.0	2.00	4.0	3.00	4.0	4.05	5.0	5.90
9	13~14	15.50	4.0	4.38	6.0	6.58	3.0	2.75	4.0	4.00	4.0	4.15	6.0	6.40
10	15~16	17.32	4.0	3.90	6.0	5.66	3.0	2.96	4.0	3.98	4.0	4.74	6.0	6.50

が、その径を減じながら終糸へ移行する状態は一様でない。即、大別して急速に径が細くなつて下界位に達する、謂ば円錐の高さの低いものと(図5A)、緩かに径を減じて下界位に達する、円錐の高さの高いものと

図 5 円錐の形
の二種類がある。(図5B) 前者に属する例は胎生4ヶ月以後の胎児 123 例中 27 例 (21.1%) 後者に属するもの 96 例 (78.9%) で前者より遙かに多く、性別では前者の 27 例中 16 例が男性、11 例が女性で、男性がやゝ多い。これを月齢別に比較すれば、表 17 の如く、前者は4ヶ月及び9ヶ月で少いが10ヶ月では55%と著しく多くなっている。

表 17

月令	A	B	計	月令	A	B	計
4	1(5.8%)	16(94.2%)	17	8	4(19%)	17(81%)	21
5	6(30%)	14(70%)	20	9	1(10%)	9(90%)	10
6	4(22%)	14(78%)	18	10	5(55%)	4(45%)	9
7	6(22%)	22(78%)	28				

2. 終室及終糸

胎児の脊髓の終室は成人に比して著明で、多くは脊髓円錐下部に於て、背側より肉眼的にうすい上衣細胞壁を透過して、上下に細長く、上部に広く下部に細い漏斗状の小胞として認められるが、肉眼的には全例には認め難く、肉眼的に認める事の出来る例は123例中59例(47.2%)である。終室の上部は中心管と連絡する。中心管は初め腹背方向に細長く、背側部よりは腹側部の方がやゝ広い腔であるが、これが下端に近づくと次第に背側部が拡がつて来て、終室の頭端部と連絡する。この場合、中心管が背腹側の二条に完全に分離し、その腹側の方は終室へ連絡せずに終り、背側の方のみが終室と連絡するものや、中心管とは別に背側部に上衣細胞塊が現れこれが三角形の終室腔を作りやがてその三角形の頂点で中心管の作る終室腔と連絡融合して一つの終室となるものもある。この場合は終室の天井が上方にのびてゐることとなる。(附図1, B 1, 2, 3 及び C 1, 2, 3) 終室腔の水平断面の形状は、組織学的に見る場合、固定脱水などによる変形を考慮しなければならない。即、ホルマリン固定直後では未だ原形に近い状態で観察出来ると思はれるが、この場合終室壁は髄液により適度の緊張を保っているが、アルコール脱水後は弛緩萎縮の状態となる。以上を考慮に入れ

て組織学的に水平断面を見ると、背側に一边をおく五角形、或は左右に長い楕円形、或は背側に底辺をおく三角形などが多く、その周囲はいづれも側方に厚い上衣細胞壁からなり、髄質は腹側に厚く、背側は単に上衣細胞壁と軟膜のみからなる場合が多い。脊髓軟膜中には血管が含まれ、特に前正中裂の凹みの前脊髓動脈と、それに伴う2, 3の静脈がよく認められる。終室下部は、縮少しながら終糸へ移行するが、その際終室腔が2, 3に分岐した細管をなすことが屢々ある。(附図1, B 5, 6) この終室腔は終糸の下部で腔を閉ち、これ以下は毛細血管を含む結合組織性の索となる。この終室腔を閉ちる部位を追究して見ると、胎生7ヶ月の1例では内終糸の下1/3附近にある。

考 察

終室に関しては Krause (1875) が記載して以来、Argutinsky, Brugsch, Unger, Kernohan 池田らの報告が詳細になされている。Kernohan は胎児18例、1歳より70歳の生後例7例について終室の大きさを長さ、巾、前後径及び容積について計測し、その結果終室は22mm 胎児から認められ、22mm から77mm の間で減少する前後径以外は他の径と同じように増加する。又容積は22mmから出生まで増加し、77mm まではその増加曲線は直線状をなし、以後は拋物線状をなすという。記載表によると胎生7ヶ月例と44~70才例との終室の長さ、前後径、左右径を比較すると、長さは5~7mm で略々等しいが、前後径、左右径は寧ろ減少している。

表 18 Kernohan による略表

	体 長 (mm)	終室の長 さ (mm)	左右径 (mm)	前後径 (mm)	容 積 (c.mm)
胎 児	22	0.30	0.30	0.55	0.010
	93	1.90	0.70	0.22	1.00
	155	3.58	0.83	0.50	2.00
	330	7.00	1.23	0.89	
生 後	年令 1	5.08	0.851	0.431	
	2.5	15.00	0.50	1.50	
	44	4.90	0.70	0.37	
	70	6.00	0.78	0.50	

第3章 胎児の脊髓円錐及終糸附近に認められる小脊髓神経節について

著者は胎児の脊髓円錐を組織学的に検索した結果、円錐及び終糸附近に、正常脊髓神経節以外に、明らかに痕跡的な脊髓神経節を発見した。以下例によつて説

明する。

所 見

1. 胎生8ヶ月♂ (附図 1, C1~6)

円錐の比較的上部で終室の上部が見られ、円錐の周囲は、腹側には脊髄軟膜の中に 3, 4 条の小動静脈、左側には神経線維束が見られ円錐に粗に附着している。その下方 80 μ の部位で上記の右側神経線維中に 1 本の脊髄神経節細胞が現れ、尾側方に追究すると次第にその数を増し、小神経節 (以下 Spg. と略す) を形成し、その神経節細胞 (以下 Spgc. と略す) の数は 1 切片中に 12~13 本を算える。これを強拡大で見れば、中心に細胞核及び核小体、周囲に外套細胞を有する、Spgc. であることが判る。(附図 C5) この Spg. はさらに尾側方へ次第に縮小し、やがて神経線維が増加して Spg. と代り、遂に神経線維のみとなる。これを前後を通じて詳細に観察すると Spg. の径は約 0.5 mm でその上下端に節前節後線維の痕跡と思はれる繊細な短い神経線維を有している。即、その神経線維の起始は円錐外側部で、Spg. と連絡した後再び円錐外側部に終っている。

2. 胎生7ヶ月♀

円錐下部の終室最広部のやゝ尾側方で楕円形をなす終室はやゝ厚い軟膜で被はれ、その外側方に少し離れて細い神経線維があり、これを尾側方に向つて観察すると、やがてその線維に Spg. が現れるが、再び Spgc. の数を減じながら細い神経線維と交代する。

3. 胎生7ヶ月♂ (附図 2, D1~6)

円錐中部の右側に殆ど接する如く Spg. が見られる。この高さでは終室は未だ現れず、中心管腔が腹背方向にやゝ拡張し、やがて背側を頂点とする三角形の終室が見られるところで、右側の神経線維に次の Spg. が現れた後、再び短い神経線維を以て円錐外側部に消える。この Spg. が消える頃、左側の神経線維に Spg が更に 1 本現れて、やゝ長い 2 本の神経線維と尾側方で連絡する。

4. 胎生6ヶ月♂ (附図 2, E1~6)

円錐周囲に、腹側に近い左側に血管に富んだ神経線維が多く見られるが、終室は腹背方向に扁平で終室腔は狭い。円錐左側のやゝ離れた神経線維中に Spg. が現れ、毛細管を数条含んでいる。この Spg. は最大部では葉に分れるが、別に更にその下方で両側に対称的に左右略同大の Spg. が現れる。

5. 胎生5ヶ月♀

終室の形成は著明でなく、背側に曲つているくの字

形の狭い終室腔が見られる。この円錐の左側に接して Spg. が現れる。この Spg. は尾側方で神経線維の隆起と交代する。

6. 胎生7ヶ月♀ (附図 2, F)

脊髄円錐を矢状断として観察する。

中心管は円錐下部で、腹側上方と背側下方に細い分歧管を作り、終室を形成する。この円錐下部の背側に上下に長い楕円形の Spg. が円錐に線維性にゆるく附着する。

7. 胎生6ヶ月♂

ホルマリン固定後の円錐下部と終糸とを位相差顕微鏡によつて観察し、終糸附近の神経線維に外套細胞、細胞核及び核小体を明らかに認める Spgc. の集団を観察した。

以上の所見に基き円錐及び終糸を肉眼的に精査して、Spg. を判別出来たので以後組織標本によらず肉眼的又はルーペを用いて観察した。(附図 2, G, H)

Spg. の認められる部位：多くは円錐下部において、外側部に接して結節をなす場合と (図 6 A), 側方に離れた神経線維にある場合と (図 6 B), 終糸に接して結節をなす場合と (図 6 D), 或は馬尾中にある細い神経線維の中部又は下部の線維中に結節をなす場合があり (図 6 C) いづれの場合も硬膜内にある。

図 6 脊髄円錐附近の小脊髄神経節の分布状態

大きさ：0.5 mm 径前後が多く、小さいものは肉眼的に認められないが、顕微鏡的に僅か数本の Spgc. から成るものもあり、いづれも正常の脊髄神経節に比べると著しく小さい。

形態：多くは球形又は卵円形で、真珠様光沢を呈し、その上下端には細い神経線維を有する。この神経線維の頭側起始は円錐外側部で多くは短い神経線維を以て Spg. の上部に連絡し、下部より再び起つて長く馬尾と平行して脊髄硬膜内を下る。この神経線維は円錐外側を僅かに離れていることが多いが、時には前後

で円錐外側に密着して肉眼的には独立しては認め難い場合もある。この神経線維は Spg. と連絡する前後で、よく2本に分れ、これらは恐らく節前線維の前根、後根及び節後線維の前枝、後枝に相当するものと考えられる。

Spg. の個数：1個又は数個で、多いものは大小7ヶを算える。数個現れる場合は、左右対称の場合もあるが、多くは高さを異にし、例えば1ヶは円錐外側に、2ヶは馬尾中に混ざる神経線維の中部又は下部の線維にある如く不規則な場合が多く、左右の個数の間にも関連は見られない。又1本の神経線維に念珠状に2ヶの Spg. を見ることもある。(図6C)

この Spg. の認められる割合は、胎生4ヶ月以後10ヶ月までの122例(性別不明を除く)中32例(26.2%)で、内訳は表19の通りである。

表 19

月 令	使用例			Spg. の認められる例			
	♂	♀	計	♂	♀	計	%
4	12	6	18	1	0	1	5.5
5	8	12	20	1	3	4	20.0
6	12	7	19	2	1	3	15.8
7	18	9	27	6	3	9	33.3
8	13	7	20	5	2	7	35.0
9	6	4	10	1	0	1	10.0
10	2	6	8	1	3	4	50.0

これによると胎生4ヶ月は5.6%で少く、7、8ヶ月は35%前後、10ヶ月は50%で、胎生後半期に多い。性別では♂71例中17例23.9%、♀51例中12例23.5%で略々同率である。

考 察

Rauber, A. は1887年、成人の脊髓終糸内に脊髓神経節細胞を3例において、又横について1例認めたことを報告している。その記載では、終糸の中に Spgc. を認めているが、終糸外のものはない。

著者の例は、円錐及び終糸内でなくこれらの外側又は馬尾中に混ざる神経線維の中にあり、細い神経線維を伴っている。

胎生初期には、脊髓神経節が成長後より余分に出現し、それが整理されて一定数となることは明らかである。著者の上述した Spg. もこのやうな整理現象の一部であらうと想像せられ、人類進化の一過程を物語るものとして興味深い。

又 Humphrey, T. は1947年 Sensory ganglion

cells within the central canal of the embryonic human spinal cord. の標題の論文を発表しているが未だ原著に接し得ない。

む す び

著者は日本人胎児141例について、脊髓各部計測と、形態学的観察とを行つた結果、次の如く従来の報告と異つた2、3の所見と、新見聞とを得た。

1. 胎児の脊髓下界位は、胎生2ヶ月初めは尾椎末端を越え、2ヶ月半ばでこれと等しく2ヶ月末で第1尾椎附近の高さになる。胎生3ヶ月では、全期間を通じて仙椎下端にある。胎生4ヶ月では、始め仙椎下端にあるが、その後半には急速に上昇して、4ヶ月末には仙椎上端に至る。胎生5ヶ月では仙椎上端から腰椎下端に達し、下界位は仙骨管内にない。これは従来 Kölliker, Rüdinger らの、下界位は胎生6ヶ月までは仙骨管内にあると云う報告と著しく相異なる。胎生6ヶ月では L_5 から L_{4-5} に至り、仙椎の高さにある例は皆無である。胎生10ヶ月では L_{3-4} 乃至 L_5 上で Kölliker, Eichhorst, Rüdinger, Ziehen らの報告と大差はない。性別がいくらかあり、女性の下界位がやや低位にある。

2. 脊髓長及び脊柱長は、各胎生月齢で比較すると、両者とも胎生5ヶ月までは急速に増加するが、脊髓長の増加率は4ヶ月から遅れ6ヶ月以後は両者とも緩かに増加する。

3. 脊髓の頸膨大及び腰膨大の前後径及び左右径は、藤江によれば最大左右径は常に頸膨大にあると云うが、著者の例によれば、一般に腰膨大が頸膨大より大きく、ことに前後径においてその傾向がある。

4. 胎児の終糸は、胎生4ヶ月始めから肉眼的に認められ、胎生4ヶ月から7ヶ月末までは、外終糸が内終糸より僅かに長く、8ヶ月より10ヶ月末では内終糸が外終糸より長くなり、10ヶ月末ではその比は3:2となる。

5. 脊髓円錐の形態は、急速にその径を減じて下界位に達する円錐の高さの低いものと、緩かに径を減じて下界位に達する円錐の高さの高いものと二種類に大別され、前者に属するものは全体の21%で少く、その中男性が女性より多い。

6. 胎生4ヶ月以後の胎児123例中32例において脊髓硬膜腔内の脊髓円錐及び終糸附近に正常の脊髓神経節に属さない、小脊髓神経節を発見した。その大きさは0.5mm径前後が最も多く、小さいものは肉眼的に認められず、数個の神経節細胞の集りをなす。形

は球形又は卵円形で、屢々前後に細い神経線維を有する。その神経節の数は1個より数個に及び、その分布は脊髓円錐及び終糸の外側、並びに馬尾の神経線維中に左右、上下に不規則にある。

稿を終るに臨み、終始御懇篤な御指導と、御校閲を賜はつた、恩師横尾教授に深く感謝致します。

参考文献

- 1) Argutinsky P. : Arch. für mikr. Anat., **52** (1898)
- 2) Arnold : Handbuch d. Anat. d. Menschen (1851)
- 3) Brügsh, F. und Unger E. : Arch. f. mikr. Anat., **61** (1903)
- 4) Dunn, H.L. : J. Comp. Neurol., **33** (1921).
- 5) Eichhorst : Virchow's Archiv, **64** (1875)
- 6) Henle : Handbuch d. system. Anat. (1879)
- 7) Humphrey, T. : J. Comp. Neurol., **86** (1947)
- 8) Krause, W. Arch. f. mikr. Anat., **11** (1875)
- 9) Kernohan, J. W. : J. Comp. Neurol., **38** (1924)
- 10) Kunitomo, K. : Contr. Embryol. **8** (1918)
- 11) Kölliker : Entwicklungsgesch., (1879)
- 12) Kramer, S.P. : Am. Journ. Insant., **75** (1918)
- 13) Pfitzner, W. : Morph. Jahrb., **9** (1884)
- 14) Ranvenel : Zeitschr. f. Anat. u. Entw-g., **2** (1877)
- 15) Rüdinger : Topograph. Anat.,
- 16) Streeter, G.L. : Am. Journ. Anat., **25** (1919)
- 17) Unger, E. u. Brugsch, J. : Arch. f. mikr. Anat., **61** (1903)
- 18) Siwe : Zeitschr. f. Anat. u. Entw-g., **92** (1930)
- 19) Y. Ikeda : Zeitschr. f. Anat. u. Entw-g., **92** (1930)
- 20) Ziehen : Nervensyst. (1899)
- 21) 植苗福次郎 : 解剖誌, **1**, 3号
- 22) 久保武 : 東京医誌, **17**, 2~4
- 23) 狩谷慶喜 : 北越医誌, **13**, (1914)
- 24) 国友鼎 : 日本学術協会報告, **4**, (1928)
- 25) 長尾美知 : 神経誌, **13** (1914)
- 26) 野崎公義 : 実地医家と臨床, **4**, 6 (1927)
- 27) 中川平次 : 大阪医誌, **42** (1943)
- 28) 藤江君夫 : 大阪医誌, **42** (1943)
- 29) 福島修一 : 東京医誌, **47**, 6 (1933)
- 30) 丸山正 : 解剖誌, **3**, 7 (1930)
- 31) 横尾安夫 : 人体の発生, (1950)
- 32) 安井修平 : 産科学,

Résumé

Studies on the development of the spinal cord in human embryos.

Masaaki Morimoto

The material consists of 141 Japanese embryos (♂ 78, ♀ 59), which lengths range from 10 mm to 51 cm. The spinal cords of these embryos were opened from back, their heights projected to the vertebral column. The vertebral heights were defined through their transverse process, as one can see in Fig.1.

The lengths of our embryos at the end of each month are as follows.

1 M, 7 mm (C-R), 2 M, 3 cm (C-R),
3 M, 8 cm (total or C-H), 4 M, 16 cm,
5 M 24 cm, 6 M 29cm, 7 M 34 cm, 8 M 39 cm,
9 M 44 cm, 10 M 51 cm

By the first month embryos are the caudal ends of the spinal cords beyond those of the vertebral columns, in the early 2nd month they move higher to the same level of those of the vertebral columns and at the end of the same month they are in the level of the upper part of the coccygeal vertebrae. During 3rd month they remain to the level of the caudal part of the sacral vertebrae and in the 4th they move from the caudal to the cranial part of the sacral canal. By almost all 5 month old embryos are the caudal ends of the spinal cord out of the sacral canal and in the level of the lower lumbar vertebrae. (By 17 embryos of this month from L₃ to L₅, only by 3 S₁.) Then they move in the 6th month from L₅ to L₄₋₅, in the 7th to L₄, in the 8th to L₃₋₄, in the 9th and 10th to L₃.

To see the sexual difference about the heights of the caudal ends were 46 male and 48 female embryos available, by which among 20 cm unit 13 were male and 7 female higher, so that the male seems to have higher caudal ends than the female.

The percentage of the length of the spinal cord to that of the vertebral column is 96.30 by the 2nd, 97.23 by the 3rd, 86.08 by the 4th, 80.34 by the 5th, and 74.20, 71.38, 75.75, 69.53 and

森本論文附図1

A. 10, 18, 28 (♀), 32 mm (♀) 脊柱尾端の矢状断面 (37, 34, 33 は脊椎原基数) B. 7ヶ月胎児脊髓円錐及び終糸の水平断面 C. 8ヶ月胎児脊髓円錐及び終糸の水平断面 T.B. tail bud (Schwanzknöpfchen) V.T. Ventriculus terminalis C.C. Central canal B.V. blood vessels N.F. nerve fiber SP.G. rudimentary spinal ganglion SP.G.C. spinal ganglion cells

森本論文附図2

D. 7ヶ月♂胎児脊髓円錐の水平断面 **E.** 6ヶ月♂胎児脊髓円錐の水平断面 **F.** 7ヶ月胎児脊髓円錐の矢状断面
G. 8ヶ月♂胎児脊髓円錐及び終糸附近の小脊髓神経節 **H.** 7ヶ月♀胎児脊髓円錐附近の小脊髓神経節 **SP.G.**
 rudimentary spinal ganglion **N.F.** nerve fiber **B.V.** blood vessels **SP.G.C.** spinal ganglion cells **C.M.**
 Conus medullaris **V.T.** Ventriculus terminalis **F.T.** Filum terminale **D.M.** Dura mater

68.68 respectively from the 6th to 10th month. So is the correlative change between spinal cord and vertebral column most remarkable from 3rd to 4th month, then from 4th to 5th. The same percentage of the adult is after Uenae 61.4 in the male, 62.8 in the female.

The sagittal and transverse diameters of the spinal cords are larger at the cervical swelling than at the lumbar in the 3rd month, from the 4th month upward those of the lumbar larger than those of the cervical.

The form of the conus can be classified in 2, one sloping gradually, the other abruptly; the latter is only in 21% to be seen.

The filum terminale is from the 4th month onward distinguishable with naked eye and from

4th to 7th is the Filum terminale externum^a little longer than the F. t. internum, from 8th to 10th become their correlation reverse. At termin is the Filum terminale internum ca 3 cm long, externum ca 2 cm. After Uenae is their length correction by the adult 2 : 1, while by our new born 3 : 2.

Among the elder from 4th to 10th month 122 embryos there are rudimentary spinal ganglion along the conus and filum terminale in 32 cases (26.2%). They measure about 0.5 mm or lesser, their number ranges from 1 to 7. When they are extremely rudimentary, they consist of only several ganglion cells. These rudimentary ganglions have regularly prae- and postganglionic nerve fiber bundles.