原 著

先天性多房性囊胞腎の成因に関する研究

日本赤十字社産院病理科

水 口 章

Akira Minakuchi

結 言

先天性に腎臓に発生する囊腫には多種多様なものがある。1855 年 Virchow¹⁾ がはじめて詳細なる発表を行つて以来欧米に於ては多数の報告がある。本邦に於ても 1911 (明治 44 年) 福島²⁾ 矢野等³⁾ によつてはじめて報告せられたが爾來現在までに 190 例余の報告がある。

しかしこれ等は多くは小兒又は成人に発見されたものであつて、新生児の例は極めて稀である。死産児及び新生児の報告が少数であるからと言つて新生児に発生が少いわけではない。同僚新田⁴⁾ の報告によると約 1 万の分娩に 1 回の割合にある。高度の囊胞腎は生活不能であるために死産或は出生直後死亡するものも多く、そのために闇から闇に葬り去られるのである。日赤産院に於ても新田が既に新生児の囊胞腎の十数例を報告し、病理組織学的に 6 分類を行つた。この多房性囊胞腎に就ては多く 1 例報告程度にとゞまつて、まとまつた成因に関する研究がない。成因の研究にあたり尿道、膀胱、尿管、腎杯、腎盂等に狭窄乃至閉塞が存在するために、腎囊腫を形成することも考えられるので、新田の行つた腎囊胞の例以外の例についても検索し、合せて偶然ではあるがマウスに発生せる例に就ても検索を加えた。

囊胞腎の成因に関する文献梗概

腎臓が囊状に変性したものには、種々の名称があつて、必ずしも報告者によつて統一されていない。腎臓囊腫変性 Cyste d. Niere もあり囊胞腎 Cystenniere もあり、また其の両方を見ているものもあつて、肉眼的に区別が困難な場合もある。また腎の一部が限局的に囊性に変化したものもあり、腎臓全体が囊腫状に変化したものもあつて個人的に著しい差異がある。大きさも様々で、正常の腎臓に比較して小なるものもあり、又明瞭に腹壁上からそれと触知し得られるものもある。大なるものは数百瓦に及びこの腫瘤によつて胎児の腹腔全体が充満され、そのために分娩の障碍を起

し截胎術によつて漸く分娩を終了した例もあつた。また左右の大きさにも著しい差異がある。また本症は数世代に亘つて家族的に証明せられる場合があるがしかし遺伝的な疾患と見做すことはできない。

本症を有する児の症状、経過は極めて不定である。既に高度の変化を先天的に有するものは腎臓機能の失墜のために生後間もなく死亡する。しかし腎の変化が徐々に進行する例に於てはよく 20~30 年の経過を保ち得ることがある。それ故に取り扱う年齢層によつて報告例の経過も区々で、Bell は 86 例を報告しているが、その中死産が 12 例、生後 1 ヶ月以内の例が 8 例、1 ヶ月より 1 年以内の例が僅に 2 例、残りの 64 例は 20 年以上にも及ぶ例であると言ふ。余等は死産児及び新生児死亡の剖検例中に定型的な囊胞腎を 17 例発見した。上述の通りこれ等は何れも死産か或は生後間もなく死亡した例であつて、最も長く生存し得たもので 31 時間 20 分であつた。何れにしても両側性であるため予後は不良である。Rall, Odel 両氏によると 70 例の症状自覚後の生存期間は約 9.3 年であると云う。これ等中年以後に発病するものの症状は第 1 が無痛性の血尿、第 2 が腎臓機能不全の症状で頭痛・全身倦怠・食慾不振・貧血等である。尿は多尿、比重低下、蛋白陽性で、血中残余窒素の増加、心臓肥大、Goldblatt の腎乏血性高血圧に類する高血圧等が現れる。腎腫瘍は両側性で圧痛があり、自発痛も現れてくる。

病理組織的所見、胎児及び新生児の囊胞腎をその成因から大略二つに分類することができる。その一は囊胞が大体一定の大きさとなをそなえているもので、尿細管の延長と増大による場合と、ボーマン氏囊の拡張に依る場合とがあつて、尿細管と糸球体とが常に必ずしも同一の病的変化を具えているとは限らない。その二は囊胞が球形を呈しているが尿細管の大きさが大小不同のもので、糸球体も屢々変化した尿細管及び糸球体が萎縮しているのが常である。

囊胞が尿細管の延長拡大によつて発生したもの、

(Cysts caused by uniform elongation and dilatation of tubules)

このものは両側性で大きさは200 g以上に及び表面は胎生期の小腎の像が認められる。囊胞の大きさは2~3 mmの直径である。組織的には稀に正常と見られる糸球体があるが大部分は拡張した尿管から成り、壁は低い扁平な細胞か又は骰子形の低い細胞で被れている。また隣接臓器である膀胱や尿管には異常なく只腎盂・腎杯は少々拡張して見られる。

囊胞がボーマン氏囊の拡張によつて構成されたものの、(Cysts caused by uniform dilatation of Bowman's capsules)

このものは極めて稀なものであつて針頭大の囊胞を形成する。組織的に見ると少々正常と思われる糸球体があり、拡張したボーマン氏囊の中に存在するのが見られる。而して、これに隣接する尿管の拡張は全く見られないが囊胞と尿管との関係が全く不明瞭である。

周囲組織と共に形成された囊胞、(Cysts associated with increase in connective tissue)

前述の二つの成因の外に囊胞の大きさの極めて不同で囊胞壁も肥厚したものがある。この囊胞の内容物は多くは血性粘潤性であつて、大きさは数百瓦の大なるものから僅か数瓦の小なるものまでである。狭窄閉鎖が皮質と髄質の境界部で起るものもあり、また腎盂・腎杯の部や尿管の部に起つているものもある。左右の腎臓でも一方は囊胞変性に陥つているが、他方は全く正常か又は顕微鏡的に僅かに囊胞変性を認め得る程度のものもある。

更に種々の例を組織学的に鏡検すると、大なる変性した尿管の周囲は線維性結合組織で取り囲まれ、小なる尿管もこれら周囲の組織に埋まつた形態を示している。而して大なる囊胞は皮質に近く、小尿管は髄質或は之に近い部位の所々に見られる。囊胞の円形で大なるものは通常尿管から発生している。腎小体は屢々硝子様変性に陥るか或は糸球体がボーマン氏囊の内壁から総の如く離れているのが見られる。又腎盂の壁に近く接して屢々軟骨組織が島状に見られる。

囊胞周囲の組織内には Lymphocyten, Erythroblasten, Normblasen, eosinophile Myelocyten などが散在性に見られることがある。发育不全のある囊胞腎の中には稀に尿管囊腫と合併するものがあるが、かゝる例では全く腎小体を認め得ないことがある。又胎生性結合組織の中に尿管原基の散在したもの、一部拡張囊胞を形成したものなど種々ある。多囊性囊胞腎が

先に発生して二次的に尿管の閉鎖が起るものか、或は尿管閉鎖が胎生早期に起つて囊胞腎を形成するものかは明かでない。

膀胱・尿管と次第に上方に尿が貯溜して水腫腎を形成して腎実質の萎縮をきたすことも考えられる。

稀には生後の正常と思われる新生児腎臓にも、或る部位に於てはボーマン氏囊の軽度拡張したものを発見することがある。また尿管に於てもかなり高度に限局性の拡張を見ることがある。これ等の変化のあるものが生後に於て如何なる転帰をとるものか明かでないが、或るものは生後に於ても拡張を続けて明白なる囊胞腎を形成し、また或るものは周囲の組織の圧迫によつて増殖の傾向を失い何等の症状も呈せず成人に達し得るということは想像に難くない。

心臓の先天性横紋筋腫で脳の multiple tubuloere Sklerose のある児の腎臓に小腎囊腫の一部形成せられたものがあるが、このことについては既に Potter¹⁾などの述べている所で、余等もまたかくの如き例に遭遇したが何故に Herz の Rhabdomyom と関係があるのか現在のところ不明である。以上の外に polycystic kidney と類似の囊腫が他の臓器に発生するや否やの問題があるが、多数の囊胞腎の中には肝・脾・肺に囊腫を合併せる報告がある。

之等の内、肝の囊腫 Cystic disease of the liver が最も多く、多数の葉間結合組織内胆管から発生している(附図写真1、参照)。脾は脾管に発生するもので稀である。

肺の囊腫 Pulmonary cystic disease は interlobulär に発生する。余はまた率々に囊状変性のある例に遭遇した。

発生原因、囊胞腎の発生に関する仮説は古くより多数唱えられているが、現在行われている説は大略二つに分けることができる。

即ちその一つは、腎髄質を形成する原基と皮質を形成する原基とがあつて、腎単位、Nephron (腎小体と尿管・ヘンレー氏篩係・総尿管と連絡する一連鎖)を形成する因子に障害が起つて、尿管原基の上昇による適当なる連絡結合が断たれ腎小体から分泌された尿が貯溜し、終に断絶して小囊腫を多数に形成するに至るとの説である。他の一つは胎生期の腎臓では普通少数の腎小体を有するのみであるが、その中にはその分化の途上に於て既に囊腫を形成しているものがあるとの説で、はじめ、腎小体に起つて次第に尿管に及ぶものである。この説は比較的新らしく 1923 年

Kampmeier⁵⁾ Kleinschmidt 等の述べた説であるが、発生当初に於ては胎生期の腎臓 Nephron に斯の如き変化のある所見を確認したものがないことを以て本説を否定する見解が多かつたが近時此の説に賛する学者もいる。即ち 1917 年以来 Sonntag は囊腫形成は細胞の異常増殖による新生物であると唱えている。余等も胎生期の皮質に新生増殖される腎小体に、ボーマン氏囊の著しく拡張した所見を屢々発見するので、本説も否定することはできないと思つている。

以上の 2 説は共に胎生期よりの腎發育不全のために尿滞留を来すことによつて、発生すると云う説であるが、余等も胎生期に腎發育不全を証明し得る小指頭大の腎臓に完全なる囊胞腎を発見することが屢々あるので、發育不全そのものがまた囊胞腎を形成し得ることも肯定せざるを得ない。

最も現行われている第一説の先天性形成不全説又は先天性奇形新生物説とも云うべき説をはじめて主張したのは Köster (1883) で、次いでこれに賛意を表するもの多く現われ、1894 年 Hildebrandt⁶⁾ は前述の如き Nephron を形成する因子の障害説を唱え、続いてこれと殆んど同様なる説を唱えている Ribbert (1899) は腎髓質・腎盂・尿管を形成する原基と、腎皮質を形成する原基との連絡接合に異常が起つて糸絨体と尿管との連絡を欠き分泌液が貯溜して腎小体並に曲尿管が拡張し囊胞を形成するに至ることを述べている。しかしこの先天性形成不全説に対しても幾多の疑問とする所がある。その主たる点は中胚葉性腎臓原基の極めて多数にある尿管原基が各々 Nephron と如何にしてよく結合するかの問題と腎小体の糸絨体毛細血管が如何にしてこれ等尿管と連絡するやの問題である。即ち Nephron は造後腎組織から発生し、集合管、腎盂・尿管は腎蕾から発生するものであることは胎生学の示す通りであるが、この両者が如何にしてよく連絡し得るものであるか寧ろ不思議とするところである。又分化の進行状態が果して尿管に始まつて次第に上昇するものか或いは皮質糸絨体が囊腫を形成して次第に下降して髓質の囊腫をも形成するものかの問題である。之等 2~3 の疑問について述べると髓質集合管芽胞が適当数の尿管分枝と結合するに當つて總ての Nephron が完全に連絡することの困難が起り得る。而してもし過剰の分枝があつた場合に於ては当然結合が不能に陥り集合管芽胞の盲端に終るものが存在するわけである。しかるに尿管が他の Nephron と接合したり、或いは狭窄の所見が現れたり、盲端に終

つたと思われる所見を見出すことがない。また、これと同様に腎小体との結合の異常も見ない。同じ二つの Nephron に於ても隣接する尿管の中途に於て相結合する部位もあつてよきようなものであるが、それを見出すことが出来ない。毛細管の発生にも殆んど同様のことが云える。即ちボーマン氏囊の中にも 2 つ以上の糸絨体が存在してもよいと思われるのに、それが無い。以上の如く現今最も行われている先天性腎形成不全説にも幾多の納得し得ない矛盾がある。

其の他の本症発生原因説にも尚幾多の有力なものがあるが、それは囊胞腎と云えども総て同一の病理組織的变化を具備しているのではないからである。其の発生が只皮質のボーマン氏囊のみから形成されたものもあり、反対に髓質の尿管のみから形成されたものもあり、また両方同時に発生したものもあり。

又囊腫の大小についても小指頭大から小児頭大に及ぶものがあり、囊腫そのものの性質についても差違の存在することが明かとなつた現在に於て、これを悉く同一原因にまとめんとするこそ誤りであることを認めざるを得ない。而して糸絨体の胎生期より存在しない腎臓に於ても能く囊腫を形成し又皮質には何等組織的变化のない腎の髓質に於て尿管の悉くが拡張して腎水腫の前徴の如き所見を限局的に見ることがある。因つて余は現在までに行われている上述の原因説のみでは満足出来ない。そこで他の有力な原因説の 2~3 に就て述べたいと思う。先ず最も古くから行われている胎生時尿鬱滞説であるが、その尿の鬱滞の原因として Virchow¹⁾ は 1855 年尿中に沈降した尿酸塩によつて尿管が閉塞してそのために腎盂に排泄されるべき尿が貯溜し尿管の拡張を来して本症が発生すると唱えた。しかしその後には胎生期の結合織性腎乳頭炎の結果、小集合管の一部の閉塞を起して尿貯溜を来して本症を惹起するものであると云う所謂炎症説なるものに改めた。Freichs, Rayer, Stieda 等の諸氏は、乳頭附近の結合織の増殖と小円形細胞の浸潤を認めてこの Virchow の説に賛意を表し裏付けとした。しかしながら Busse (1904) は胎生 5 ヶ月頃の腎臓を検索して小円形細胞の浸潤は腎小葉間に通常認めるものであることを発表してこの説に反対を表明した。一方 Petterson (1903) は家兎を用いて実験的に腎乳頭部尿管を閉塞して囊胞の形成されるものか否かを知らんとした結果、これ等閉塞のみによつては囊胞を形成し得ないことを明かにした。其の他集合管乳頭附近に閉塞の原因を求めるものも多く、この附近の尿管結合部は

縦に長く走行して、これを圍繞する線維の収縮によって尿管の閉塞を来し得ることを唱えるものもあり、また乳頭附近の炎症性変化はないにしても、その近くの結合組織の肥厚を証明しているものもある。尚腎盂に近接する結合組織内に軟骨組織の島を認めたり、未熟な血液の浸潤を認めた嚢胞腎の例の存在することも報じられている。

これ等の所見は余の例に於ても屢々見出された所であつて、乳頭附近の尿路の閉塞原因も強ち否定出来ないものと思う。

組織奇形的な意義を有するものに尿管管の増殖に當つて、間質結合組織の増殖と上皮細胞増殖との間に著しい不均衡があつて、本症を発生すると唱えるものもある。また隣接する他の臓器との関係に於て組織的に相接合することのある例がのべられている。即ち胆管と尿路と相通じて肝臓に尿管を証明する例がある。これは腫瘍性の原基の迷入とは考えられないで、尿管の接合が他の臓器排泄管に迷つて接合したと考える外はないので興味ある例である。既に前項に述べた如く本症の例で他の臓器即ち肝・肺・脾・睪丸等に同様の嚢腫を合併することのあることは、先天性の組織奇形として考えることが至当と思われる。而も本症に於ては他臓器の嚢腫変性の外に屢々奇形を伴うことがあることと、両側性に発生し可成りの例に於て遺伝的關係を証明することなどは組織奇形としての見方に重要な根拠を与えるものである。

扱て本症を腫瘍と見做しての原因論であるが、本症を嚢腺腫 *Zystoadenom* としての見方で組織的に尿管上皮の限りなき増殖と嚢腫壁細胞が明かに上皮細胞であることとの2つを主徴とし、結合組織細胞の増殖と屢々粘液細胞・軟骨組織の迷入することが挙げられている。Brigidi 及び Severi (1880) をはじめとして Chotinsky, Philipson (1888), V. Kahlden (1893), Nauwerck 及び Hufschmid (1893) 等の学者が此の腫瘍説に賛意を表している。

本症は既に胎生時期より先天的に発生するものであつて、新産時期に既に著明な腫瘍を形造るものは寧ろ稀である。多くは徐々に發育するものであるから高令に達するまで何等症状を現さないものもある。Rall 及び Odel (1945) は文献上より本症の 270 例に就き調査の結果、その 80% が 30~59 才の年齢層にあることを明かにした。また本邦に於ける報告でも 188 例を集計して 84% が 30~60 才にあると述べている。斯の如く本症は比較的高年に至つて發育発見されること

が多い。男女の性別を見ると、一本杉氏⁹⁾によれば、188 例中男 107 名・女 81 名である。本症は殆んど大部分が両側性に発生することの特徴とするが、Luzzato は、本症 226 例中 185 例が両側性であつたと述べている。本邦に於ける一本杉氏の集計によると 188 例中片側性は僅か 24 例に過ぎない。本症の遺伝性について Rall・Odel 両氏によると症例の 1/3 が遺伝的關係が認められると云う。Cannon は優性形質に遺伝して、伴性遺伝は認められないと云う。何れにしても家族的に発生するものが可成りの例に認められている。

先天性腎臓水腫を形成せる際の腎実質の態度

先天的に著明なる腎臓水腫を形成せる例は新生児剖検例中に於ても稀で 2,300 例の剖検中僅に 3 例を発見するを得たに過ぎない。

例 1. 産婦 某 24 才 初産婦

本例の詳細は既に高橋⁹⁾が臨床産科婦人科 8 (9) 81 4 (1933) に発表したものであるが、この剖検的診断所見は巨大膀胱、両側腎臓水腫、両側尿管拡張、重複子宮、子宮腔部及腔の欠損、移動性盲腸、肛門及直腸の欠損であつた。

この腎臓水腫の所見は左側は $4 \times 2 \times 0.4$ cm で触れると明かに波動がある。重さ 6.5 g、刺を加えると皮質は狭く萎縮し腎盂は広く暗褐色不透明の液体を充滿している。右腎は $5.4 \times 3.5 \times 0.7$ cm、重さ 13 g 剖面の性状は左側に同じ。

尿管は両側共に著しく拡張している。膀胱はまた強く拡張充滿して鷄卵大となる。尿道を欠如する。

腎臓の組織的所見に於ても、嚢腫の如きは全く認めず。

例 2. 産婦 某 35 才 4 回目経産婦

(図写真 2A・B 参照)

家族史：父健在，母子宮癌にて 48 才時死亡，同胞 9 人中 6 人死亡。良人健在，性病なし。兄 3 人健在。

既往症：幼時健康，初経 16 才，27 才 1 月結婚，其の年に左卵巢嚢腫の剔出手術を受けた。初産 28 才 10 月，前期破水，骨盤位でコルポリーゼを行い，夜臀位でファイト・スメリー氏法を行い遂娩した。2 回目は同じく前期破水であつたが自然分娩に終つた。兄の体重 780 匁。第 3 回目は 33 才 3 月で同じく前期破水で鉗子手術により 800 匁の児を娩出した。兄は何れも健康で腫瘍などを認めない。

今回の妊娠歴：最終月経，昭和 11 年 6 月 17 日よ

り3日間で常より稍々多くあつた。8月初旬より約1ヶ月間食思不振、流涎、悪心あり。初胎動12月初旬。

初診、昭和12年1月16日、子宮底臍上4指横径児頭は下方に於て移動する。児心音左下腹部に於て著明、下肢に異常なし。恥底25cm

再来、2月13日、子宮底は臍と剣状突起の中央、恥底28cm、児頭骨盤入口上に於て移動、児心音は右下腹部に於て整調に聴取し得。

下肢に浮腫あり。

入院時所見：2月15日午前11時頃に血清帯下あり、午後5時30分入院した。

体格・栄養共に中等、肺に異常なく、心臓は第1肺動脈管の濁濁ある外変りなし。腹部は卵円形で旧妊娠線多数を認め、腹囲85cm、子宮底は胸骨剣状突起下3.5指横径にあり、恥骨結合子宮底間距離27cm、児頭は骨盤入口に於て移動性あり、児心音は右臍棘線中央に於て著明に聴取す。下肢に知覚異常・運動障害なく、たゞ軽度の浮腫を認める。血圧130~70、尿は黄色、中性、比重1020、蛋白(+)。内診する外子宮口は2指を通じ、児頭先進し、骨盤入口上に移動する。胎胞の形成不明。

胎盤は触知し得ないが右側腔円蓋の部はやや肥厚して、他の部より軟かく触るので、万一を考えて翌16日膀胱造形術を試みた。しかし前置胎盤の所見は得られなかつた。

分娩経過：2月16日午後8時30分頃より陣痛発来。発作40秒間歇5分、児心音に異常なし。午後10時頃破水し、発作40秒間歇2分となり、午後11時29分、妊娠9ヶ月で第2後頭位を以て分娩を終了した。後産娩出午後11時55分、分娩所要時間3時間25分、出血全量400ccであつた。

臍帯36×1.1cm、胎盤18×16cm、重量490g、卵膜の裂孔は胎盤辺縁より2~3cmの所にあつて、之の部位に暗赤色の凝血の附着するのを認めた。上述の所見から低置胎盤と推測されたが、胎盤には囊腫等の異常所見は認められなかつた。

児は身長41cm、体重2,110g、頭囲28cm、胸囲28cm、肩囲30cm、腰囲22cm、小腸の一部を内容とする臍ヘルニアあり、娩出後数分にして弱く啼泣したが、呼吸状態不良で皮膚色チアノーゼを呈し、児心音は極めて微弱緩徐となり、ピタカンファー・ロベリン等の皮下注射を行つたが、17日午前0時15分終に心音は停止した。

母体産褥経過は良好で、2月21日産褥5日に無事

退院した。

児の剖検診断：

1. 小腸の一部を内容とする臍ヘルニア。
2. 鎖肛、陰挺肛門を伴う排泄腔の異常。
3. 心外膜の溢血。
4. 肺の鬱血と無気肺。
5. 脾リンパ節の腫大。
6. 両腎の腎臓水腫。
7. 右尿管の拡張。
8. 子宮の形成不全。
9. 膀胱・腔・直腸の連絡。
10. 大腸の發育不全と移動性盲腸。

剖検経過：昭和12年2月17日(1937)午後1時剖検着手。

体格小、栄養中等、皮膚の湿度尋常、皮下脂肪組織・筋肉の發育中等、死斑は全身に著明、外表の異常として臍ヘルニアあり小腸の一部を内容とすることは既に述べた通りである。腹腔を開くと黄色漿液の少量を認めた。大網膜は萎縮し、大腸も亦萎縮して移動性盲腸を証明した。横隔膜の高さは、左第4肋骨に、右同じく第4肋骨に一致する。助膜腔に異常なし。心嚢を開くに約3ccの黄色稍々濁濁した漿液を容る。

胸腺、大き4.0×4.5×0.8g、重さ8.0g、著明なる充血あり。

心臓、大き尋常、重さ19g、多数の溢血点あり、冠状静脈の鬱血著明、両心房及び室には多量の流動性血液あり。

左肺、大き4.8×4.4×1.4cm、形態尋常、重さ11g、鬱血著明で暗赤色、表面滑沢、硬度増加、剖面無気肺状で鬱血著明。

右肺、大き4.6×5.4×1.7cm、重さ17.0g、所見は左肺に同じ。

肝臓、大き11.4×6.0×2.7cm、重さ130g、暗紫色、剖面尋常。

胆嚢には中等量の胆汁を容れ、その性状は暗褐色粘稠である。

脾臓、大き4.4×2.8×1.0cm、重さ8.0g、表面滑沢、紫黑色、剖面リンパ節の腫脹あり。

左腎臓は小囊胞状で極めて小。右腎臓も同様囊胞状である。右の腎盂尿管は著しく拡張している。左右の副腎には異常を認めない。

胃には少量の粘液を容れる。

脾臓、大き4.0×1.4×0.7cm、重さ2.0g。

小腸の長さ 170 cm, 盲腸より上方約 5 cm の所で膈ヘルニア囊と癒着している。

大腸は短く極めてよく移動する。虫垂も短い。

子宮に相当する部分は囊状となつて、膀胱・直腸と交通し、その両側に小なる卵管と卵巣とを証明することができる。

脳髓の重さ 222 g, 軟脳膜は鬱血している。

頭蓋骨は非薄で軟かく、大小泉門も著しく開大する。

大腿骨骨端に異常所見なし。

主要臓器の組織的所見： 胸腺に於ける皮質と髄質の境は極めて明瞭である。皮質の増殖がある。髄質のハツサル氏小体は少なく且つ小である。

心臓は左心室壁を全層に亘つて鏡検したが、異常所見がない。

肺臓は左下肺葉の一部を鏡検したが、中小気管支の拡張も少なく、肺泡の拡張も全面的に殆んど認められない。僅に組織間隙の程度である。大・中・小を問わず血管の拡張・充血は著明で中に膠状赤褐色の血液を充滿している。肺泡その他にも淡紅色の液体成分が認められる。そのため肺泡隔壁の境が不明瞭である。

肺被膜に異常なく、肝小葉の像は比較的明瞭であるが不規則な肝細胞索である。中心静脈の拡張著明で、肝細胞個々の境界も認められない。毛細血管の拡張を僅に認め得る程度で星芒細胞の状態を知ることができない。間質は少々肥厚して円形細胞の浸潤が高度である。動静脈・胆管に異常なく、造血組織は実質内に全面的に強度に認められる。

脾の被膜に異常なく、リンパ濾胞は極めて大で周囲に瀰漫性に移行する。中心動脈正常。

脾洞は比較的明瞭、細網細胞に異常なし。脾髄に於ける血液の量は少々増量している。細網細胞も増殖の像が見られる。

左腎は小腎の像が著明で著しく發育不良に見られるが、組織的には皮質の發育の不良なるを認めるのみで著変がない。

右腎は尿管・腎盂の著しい拡張がある。皮質から腎盂に及ぶ全層に亘つて組織的検査を行うに、皮質に於ける腎小体は大小不同で配列不規則ではあるが著明な変化はない。曲尿管・ヘンレー氏襻係共に瀾濁腫脹は認められるが、特に囊状に拡張した所見がない。髄質との境界部の弓形静脈の拡張鬱血の像がある。髄質に於ける毛細血管の拡張鬱血も著明である。腎乳頭の集合管には異常なる拡張は見られない。突出した乳頭

と乳頭との間の腎臓の部位は著しく肥厚し浮腫状で所によると円形細胞の浸潤が著明である。而して腎杯の部が、著しく陥凹したかの如く思われる所見が見られる。しかし囊状に変化したような所見は見られない。

副腎は一般に浮腫状で球状層は見られぬ。束状層は著明で、網状層は浮腫状で血液にも富む。髄質は認められぬ。

膝臓の發育は未だしの感あり、リンパ節の如き円形細胞の浸潤の著明な部位がある。

大脳及び小脳には特に異なつた所見は見られない。

例 3. 産婦 某 38 才 4 回目経産婦

家族史： 父 42 才時脳梅毒にて死亡、母健在、同胞 7 人中 4 人健在、第 5 児は生後 1 年にてチフテリアで死亡、第 6 児は 18 才時急性肺炎で死亡、第 7 児は 11 才時同じく肺炎で死亡した。良人健康、性病なし。児 3 人共健在。

既往症： 幼時健康、初潮 17 才 9 月、爾來整調、来潮後も著患なし。結婚 25 才 11 月、初産 26 才の 11 月、終産は 33 才 4 月、3 回共妊娠・分娩・産褥に異常なし。

今回妊娠歴： 最終月経昭和 21 年 10 月 14 日から 3 日間平常通り。10 月の終り及び 11 月 14 日に少量の出血あり。悪阻症状を欠く。胎動初感 1 月中旬。

初診、昭和 22 年 5 月 21 日。4 月 2 日に淡紅色の帯下 1 回あり、5 月 13 日にも再び鮮紅色の帯下 1 回あり、5 月 21 日の午前 2 時頃に多量の出血あり、出血を主訴として都内の某医院を訪問、前置胎盤の診断の下に当院を訪れた。内診すると子宮頸管は凝血を以て満されている。外子宮口は 2 指を通ずることができない。前腔壁は甚しく肥厚して柔軟である。先進胎部は不明瞭。外診すると子宮底は臍と劍状突起の中央にあり、下方に児頭に触れる様に思われる。胎動をよく触知する。児心音は正中線上に於て整調である。血圧右 110—82。

尿中蛋白陰性。所見上前置胎盤と診断、直ちに入院して手術を施行することとした。

入院時所見： 体格栄養中等、顔貌普通、肺臓・心臓に異常なく、脈搏整、中、80、乳房發育中等、腹部卵円形、子宮底は臍と劍状突起の中央にあり、緊張度は弱い。羊水量普通、子宮の収縮は認められない。児頭は骨盤入口より遙に高位に移動している。臀部上方、背部右、胎動は著明、児心音は右下腹部に整調。下肢に知覚・運動障害はない。腱反射普通、浮腫も認めな

い。血圧右 126~70, 尿は濁濁なく, 弱アルカリ性, 蛋白陰性。

妊娠 8 ヶ月, 全前置胎盤の診断の下に, 出血甚しき為帝王切開手術を施行することとした。

手術所見: 午後 1 時 35 分, エフェドリン 1 cc, 同 37 分, カンフェナール 1 cc 皮下注射, 午後 1 時 41 分, トロパコカイン 0.07, ヌペルカイン 1.0 cc の腰髄麻酔を施行, 同 46 分カンフェナール 1 cc, 同 47 分, デギタミン 1 cc 皮下注射をなし, 1 時 50 分に執刀, 同 52 分 20% 葡萄糖 200 cc, , カンフェナール 1 cc 加えて静注, 腹壁正世切開, 子宮頸部横切ゲツペルト氏法にて頸管切開部開大, 胎盤は左前方より内子宮口にかけて位置している。児は第 1 骨盤位の胎位であるから右下肢を把握して娩出した。時に 1 時 54 分。児は小なるも啼泣した。胎盤娩出 1 時 55 分, エルゴクリン 1 cc, アトニン 0.5 cc を子宮壁に注射, 更に 1 時 58 分にもエルゴクリン 1 cc を注射した。直ちに腹壁 3 層に縫合クレンメ 12 ケを施して手術を終る。創長 14 cm, 終了時間午後 2 時 17 分。所要時間 27 分。手術直前の出血約 500 cc, 手術による出血は少量であつた。午後 2 時 40 分の血圧 108~72。午後 2 時 45 分リゲル氏液 1,000 cc, 午後 3 時 55 分輸血 200 cc, 午後 4 時 20 分血圧 124~88 に恢復した。手術後の体温 36.4°C, 脈搏 80 である。

身長 42 cm, 太さ 1.2 cm, 胎盤 19×17 cm, 重さ 510 g で異常所見はない。

児は男性, 身長 48 cm, 体重 2,340 g, 頭囲 33 cm, 肩囲 33 cm, 胸囲 30 cm, 腰囲 25 cm。児は分娩後時々チアノーゼを来すので, デギタミン 0.3 cc を皮下注射した。其の後, 午後 4 時頃まではチアノーゼも起らず啼泣していたが, 午後 4 時 30 分に急に死亡せるに気付く。

母体産褥経過は良好で 23 日午前 2 時にガス排出, 26 日に 37.3°C の発熱, 27 日に 37.7°C の発熱があつたが, その他は全く無熱に経過して 28 日, 術後 7 日目に抜糸, 6 月 5 日術後 15 日目に無事退院した。

児の剖検診断:

1. 左腎臓囊胞状。
2. 左腎臓の腎杯・腎盂。

の拡張。

3. 肝臓の浮腫と濁濁。
4. 右肺下葉の溢血点。
5. 胸腺の肥大。

剖検経過: 昭和 22 年 5 月 22 日午前 7 時 10 分剖

検着手, 体格は妊娠 7 ヶ月の児に相当, 栄養はその割に良好。皮膚は湿度普通, 皮下脂肪の發育良, 筋肉の發育中等, 屍斑は頭部・背部・下肢に著明, 屍剛性は全身にあり, 表面平滑。

腹腔を開く, 腹水なし, 大網膜脂肪少量, 各臓器の位置に異常なし。横隔膜の高さ, 左第 5 肋骨の高さに一致, 右第 5~6 肋骨の中間に位置する。

胸腔を開くに, 左右助膜腔に異常内容なし。心嚢には約 4 cc の黒赤色の血液を容れている。この血液の原因は明でない。

胸腺, 大き 6.0×4.0×0.6 cm, 型態尋常, 重さ 12.0 g, 児の体格に比して著しく大きい。

心臓, 型態・大き尋常, 重さ 16.0 g, 心尖は左, 心冠狀動脈に異常なし。心外膜にも異常なし。左右心房・心室には流動性血液を容る。心筋は充血性, 心卵円孔開存する。

左肺臓, 大き 6.0×5.0×1.1 cm, 型態尋常, 重さ 20 g, 色は黒赤色, 表面滑沢, 硬変尋常, 剖面は高度に鬱血して無気肺状である。大なる気管支に泡沫性の内容を少量に容る。

右肺臓, 大き 7.0×6.0×1.3 cm, 型態尋常, 重さ 25 g, 下葉に溢血点あり。其の他の所見は左肺に同じ。

肝臓, 大き 11.3×6.8×2.0 cm, 形態尋常, 重さ 108.0 g, 暗褐色, 表面滑沢, 硬度普通, 剖面浮腫状, 濁濁あり。

胆嚢に著変なし。

脾臓, 大き 4.0×2.0×0.6 cm, 重さ 4.0 g, 被膜は滑沢黒紫色, 硬度普通, 剖面鬱血, 脾材不明瞭, リンパ結節も不明瞭, 脾髄は固着する。

左腎臓, 大き 1.8×4.0×1.0 cm, 型態は普通, 重さ 13.0 g, 硬度普通, 被膜の剝離は容易, 表面小腎の像著明, 剖面は鬱血の像著明, 皮質・髓質の境界明瞭なるも共に菲薄となり, 腎盂・腎杯の拡張著明である。右腎臓, 大き 2.0×3.8×1.0 cm, 型態尋常, 重さ 10 g

副腎, 左 4.0×2.0×0.3 cm, 重さ 3.0 g

右 4.0×2.0×0.4 cm, 重さ 3.0 g

胃, 型態尋常, 内容はガスと粘液約 0.5 g である。

脾臓, 大き 4.0×1.8×0.4 cm, 重さ 3.0 g, 剖面普通。

小腸の全長 306 cm, 大腸 37.0 cm, 虫垂 3.4 cm

膀胱の重さ 6.0 g, 左右睪丸の重さ 3.0 g

頸部諸臓器の重さ 38.0 g

甲状腺の重さ 2.0 g

軟脳膜浮腫状, 脳髄の重さ 346.0 g

大腿骨々端部に異常なし。

追 加

例 4. 産婦 某

診断： 児の腎臓水腫。

昭和 27 年 1 月 14 日分娩，児は男性，身長 44.0 cm，体重 2,100 g，生後 6 日目鎖肛にて死亡。

剖検番号 1850。

剖検診断：

1. 直腸肛門閉塞
2. 腎盂の著しき拡張
3. 右腎臓の發育不全と尿管の拡張
4. 廻腸と結腸の著しき拡張
5. 胸腺の肥大
6. 心外膜並に肺臓の溢血

主要臓器の組織的所見：

胸腺，皮質・髓質の境界明瞭，両者の發育程度は普通で特に変つた所見はない。

心臓，心室全周に亘つて検したが，心外膜は稍々肥厚浮腫状に見られる。血管の拡張・鬱血は著明，浸潤は認められない。心筋全般に異常を認めない。

肺臓，肺助膜や肺厚，葉間結合組織の増殖を僅に認める。大・中・小静脈の怒張鬱血極めて著明，中小気管支は全く拡張の像なく粘膜皺襞の凹凸著明，内容は殆んどない。肺胞の正常に拡張したものがなく組織間隙を見るようである。僅に肥大した上皮細胞を容れた所がある。毛細血管の像も不著明，隔壁は勿論肥厚している。出血の像は認められない。

肝臓，被膜は異常がない。肝小葉の像比較的明らかな。肝細胞索の配列不明瞭。細胞個々の境界明瞭，原形質透明，毛細血管の像不明瞭，結合組織は少く，異常なる浸潤もない。肝動静脈にも異常がない。胆管の像にも異常がない。実質内の造血細胞群は集合して多量に見られる。

脾臓，被膜に異常がない。リンパ濾胞の大きさは比較的小，中心動脈も小，結合組織も少い。

細網細胞の増殖が認められる。脾洞は狭小で血液成分に乏しい。

腎臓，皮質の腎小体の大小不同が著明，配列は比較的正しい。皮質外側には尚増殖の像が認められる。尿細管の像も普通，弓状静脈の拡張鬱血が著明，髓質に於ける直尿細管・集合管に拡張の像がない。また浸潤の像もない。腎盂壁は多少肥厚が認められるが異常なる浸潤の像がない。

副腎は球状層が認められない。束状層は明瞭，網状層は肥厚して毛細血管の鬱血の像は認められない。

脾臓，腺の増殖はかなり可良である。ランゲルハンス氏島は未だ不明瞭である。

大腸，粘膜・粘膜下層・筋層など変りがない。

甲状腺，殆んど正常と思われる濾胞の細胞の配列を認めない。実質は甲状腺腫の所見である。即ち不規則なる濾胞内に壁細胞が充満して，膠様物を容れている所は少い。

脳髄，大脳・小脳共に蜘蛛膜にも，実質内にも異常所見がない。実質内毛細管の拡張や鬱血の像もない。

先天性腎臓水腫の総括

先天性腎臓水腫は先天性腎臓異常のうち稀なものであつて，其の高度なる水腫を形成するものは少く，多くは鳩卵大程度で，鶏卵大に及ぶものは報告例に見当らない。重複子宮に腎臓水腫を伴つた例は，Schupfman によつて初めて経験されたと言う。Dienst は重複子宮に腎臓水腫・両側尿管の拡張及び膀胱の肥大拡張を伴つた例を報告している。Magid も重複子宮に巨大膀胱を合併した例を報告している。高橋⁹⁾の報告した例 1. は肛門及び直腸の欠損・移動盲腸・胃腸管と諸臓器との先天性癒着・腔及び子宮腔部欠損・重複子宮・子宮腔の尿道内開口・両側腎臓水腫・両側尿管拡張・巨大膀胱等の奇形を有する例で前述の如く，重複子宮に腎臓水腫を伴う例は内外の文献を通じて僅に数例を数えるに過ぎない。

著者は再びこの稀な，重複子宮に腎臓水腫を伴つた例に遭遇して「例 2」として前述の如く詳細なる検索を行つた。斯の如き例の成因に関しては既に古くから論じられた所であつて Keibel, Stieda, Dienst, Halban 等の諸氏の述べている如く，重複子宮の発生は言うまでもなく Mueller 氏管の胎生期癒合の不完全によるものであるが，かくの如き胎生期の障碍をきたす真因については，種々の場合が想像されるのであるが，単一なる原因と考えることはできない。これと同様に腎臓・尿路等との癒着，肛門・直腸などの閉鎖との関係についても単一原因に非ざることが想像できる。

高橋⁹⁾は氏の例の発生原因に就て，重複子宮の発生原因の存在する場合には，尿生成機転の障害と共に，何等かの機因によつて，尿生殖腔を閉す所の尿生殖洞膜の消失の遅延を伴うために，かくの如き奇形を生ずるものならんと述べている。

Nagel, Veit 等は胎生期の炎症がこの原因の大部分

を占めると述べているが、余の「例2」では組織所見に於て炎症性変化を認め、腎盂壁の肥厚・出血・壊疽性変化等のあること、また脾臓のリンパ濾胞の腫脹、その他のリンパ腺の腫脹が方々に認められることなどから、この説も亦主要なる原因の一つであることが理解される。

先天性嚢胞腎を腫瘍として取扱うことも古くから Brigidi, Severi などによつて述べられている。嚢胞壁細胞が上皮性であること、また屢々軟骨組織を証明することなどからかくの如き見解をもつものも当然である。新田の報告した例にもこの軟骨組織を発見したこととは、此の説を裏書するものである。

Potter¹⁾ などの述る如く cystic disease としての考えもまた腎嚢腫の成因として重要なものである。それ故に各例共凡る臓器について組織的に嚢腫の形成の有無を精査したが、肺・肝・脾の如き臓器に異常なる嚢腫の形成を認めることができなかった。

以上4例の下部尿路の通過障害を伴い、完全なる胎生期排尿障害のために起つた腎盂の異常なる拡張のある場合に腎臓水腫から嚢胞腎を形成し得るものであるや否やを検討して見るに、尿がいくら多量に蓄積して腎盂内圧が亢進しても決して尿が集合管・乳頭管の如き直尿管に貯溜して、その部が拡大嚢腫状になるものではないことが明かとなつた。即ち各例共に腎盂は拡張するが乳頭に沿う集合管は全く正常であることを明かにした。

先天性腎杯 (Nierenkelch) の拡張を

有する例の腎実質の態度

先天性に腎杯のみ著明なる拡張を示す例は稀ではあるが、腎臓水腫の如き腎盂の拡張よりは屢々存在するものである。斯の如き腎杯の拡張の報告は特にこれを取り上げているものがない。またその成因に関しても論じられた報告を見ない。しかしその原因が先天性に尿の貯溜によつて発生したものであることは論を俟たないところである。それは下部尿管の拡張または膀胱の拡張を伴う例が多数にあるからである。只尿の貯溜のみによつて発生するものであるならば、腎盂も共に拡張して前述の腎臓水腫を形成して可なりと考えられるのに腎杯のみが著明に拡張することは不可解である。しかし腎杯の拡張はその部に尿の貯溜した事実を示すのであるから、腎杯に尿が鬱滞した場合に尿管或は腎小体に尿が貯溜して嚢胞腎を形成することがあるや否やに就き検索を施した。

最初の数例は妊娠の経過、分娩時の状態を詳細に記

述し、児の生存時の状態、剖検の所見、他臓器との関係、必要によつては他臓器の組織所見をも詳述した。その後の例は表にして総括的に述べることにした。

例1. 産婦 某 27 才 2 回目経産婦

家族史：父 47 才時腎臓病で死亡、母 50 才時胃癌にて死亡、同胞 7 人の内 3 人死亡、夫健在、性病なし児 1 人健在。

産婦既応症：幼時健康、初経 15 才 8 月、整、3~5 日間、30 日週間、中等量、障害なし、来潮後も著患なし。結婚 24 才 3 月、初産 25 才 5 月、妊娠中黄疽に罹患し 1 ヶ月にて治癒した。

分娩・産褥に異常なし。

今回妊娠経過：最終月経昭和 8 年 5 月 10 日より 14 日まで中等量あり、悪阻症状なし。初発胎動 10 月初旬。

初診、昭和 9 年 3 月 7 日、子宮底は剣状突起直下にあつて、恥底距離 40 cm、腹囲 94 cm、羊水過多症を疑う。児頭は骨盤入口で移動する。児心音は右下腹部に於て整調、下肢に異常なし。妊娠 10 ヶ月、羊水過多症と診断。

再診、昭和 9 年 3 月 14 日、腹囲 96 cm、子宮底は剣状突起下 2 指横径にあつて 35 cm、胎児の位置不明瞭、胎動を右下腹部に著明に証明することができる。児心音は恥骨結合の上方に於て著明に聴取する。内診するに先進胎部は不明瞭で骨盤入口上に移動する。子宮外口は 2 指を通ずる。下肢に異常なし。

再診、3 月 16 日、子宮底は剣状突起直下に達する児頭は下方に移動して触れる。児心音は左下腹部に整調、腹部膨満して羊水過多著明、下肢に軽度の浮腫あり。内診するに腔の鬚軟著明、子宮腔部は未だに消失せず。外子宮口 3 cm 開大し胎胞を触れる。直ちに入院する。

入院時所見：昭和 9 年 3 月 16 日午前 4 時入院、体格栄養中等、顔貌正常、皮膚・眼・口腔に異常を認めない。肺臓・心臓に著変なし。腹部膨隆、中央線の着色著明、臍窩扁平、腹囲 95 cm、子宮底剣状突起下 2 指横径 42 cm、母体脈搏 120、羊水過多症で波動著明陣痛は正常の強度、胎児の位置全く不明瞭、児心音は左臍棘線中央で著明に聴取す。下肢に知覚・運動障害なし。軽度の浮腫あり。腓腸筋痛なし。尿は酸性、比重 1021、蛋白なし。

分娩経過：初発陣痛 3 月 16 日午前 8 時、午後 4 時の陣痛、発作 20 秒、間歇 2 分 30 秒、強度中等、児

心音 12, 12, 11, 整強, 午後 11 時の陣痛, 発作 35 秒, 間歇 1 分, 少々増強, 児心音 11, 11, 11, 整強, 3 月 17 日午前 2 時 59 分人工破水, 陣痛発作 40 秒, 間歇 55 秒, 少々強度, 児心音 10, 11, 11, 整強, 児の娩出午前 3 時 35 分, 無脳児で児頭が先進したが肩胛の娩出は, 少々困難であつた。後産娩出午前 3 時 40 分, 分娩所要時間 19 時間 40 分, 全出血量 100 cc, 羊水全量 6,750 cc であつた。

臍帯長さ 40 cm, 太さ 1.2 cm, 胎盤 21×21 cm, 重量 500 g。

母体産褥経過: 分娩当日は体温 37.9°C, 産褥 3 日目に至りて悪寒発熱あり 40.2°C に上昇, 翌日悪露の培養を行つたが, 大腸菌を証明したのみであつた。其の他乳房の著しい腫脹と咽喉の発赤を認めたが, 産褥 5 日目には下熱。

産褥 10 日目に採出してワ氏反応を検査したが, 結果は陰性であつた。3 月 25 日無事退院。

児は女性, 身長 47 cm, 体重 2,590 g, 肩囲 36 cm, 腰囲 30 cm, 娩出後殆んど呼吸運動は認められず, 啼泣することもなく, 約 20 分にして心音は停止した。

児の剖検診断:

1. 無脳症
2. 胸腺の肥大
3. 肺臓の發育不全
4. 副腎の發育不良
5. 腎杯の拡張

剖検経過: 剖検着手昭和 9 年 3 月 17 日午後 3 時 30 分, 体格は大, 栄養可良, 皮膚は乾燥, 皮下脂肪組織の發育極めて可良, 筋肉の發育も良, 屍斑は全身に軽度, 死剛は認められない。小脳・大脳・延髄共に欠損し脊髄を認めるのみである。

腹腔を開くに腹水全く認められぬ。腹腔内諸臓器の位置に異常はない。

両側肋膜の高さ第 4 肋骨に一致する。肋膜腔・心嚢にも異常はない。

胸腺, 大き 6.3×5.6×1.2 cm, 重さ 15.7 g, 型態普通。

心臓, 大き正常, 重さ 15.3 g, 心尖は両心室より成る。心外膜正常, 脂肪なし。心室・心房には流動性の血液あり。心筋・心内膜正常。

左肺臓, 大き 5.8×4.4×1.1 cm, 体重の割に小, 重さ 13.3 g, 紫黒色で鬱血状, 硬度増大, 剖面鬱血著明。

右肺臓, 大き 5.6×4.8×1.3 cm, 重さ 17.1 g, 所

見左肺に同じ。

肝臓, 大き 10×6.0×3.3 cm, 重さ 118.1 g, 紫黒色, 表面滑, 剖面鬱血著明。

胆嚢には粘潤なる褐色の胆汁を容れる。

脾臓, 大き 4.5×2.4×1.2 cm, 形態尋常, 重さ 6.3 g, 被膜緊張黒色, 剖面の鬱血著明, 脾材・リンパ結節の像不明瞭。

左腎臓, 大き 4.2×2.6×1.3 cm, 形態尋常, 重さ 9.2 g, 軟, 被膜の剝離困難, 剖面鬱血著明, 皮質は正常なるも髓質は菲薄となり, 腎杯は囊胞状, 尿管正常。

右腎臓, 大き 3.7×2.4×1.2 cm, 重さ 6.7 g, 所見は全く正常。

左副腎, 大き 3.0×1.2×0.2 cm, 小, 重さ 0.7 g。

右副腎, 大き 2.6×1.3×0.2 cm, 重さ 0.8 g。

胃, 形態正常。

脾臓, 大き 5.2×1.6×0.9 g, 重さ 4.5 g。

小腸, 315 cm。

大腸, 58.0 cm。

虫垂, 3.4 cm。

大腸には多量の胎糞あり, 膀胱内に少量の尿を容れる。

子宮・卵管・卵巢正常。

舌は小, 中に溝あり, 喉頭・気管の鬱血著明, 甲状腺肥大あり, 1.9 g, 脳下垂体の如きあり。眼球突出あり。骨正常。

例 2. 産婦 某 24 才 2 回目経産婦

家族史: 父母健在, 同胞 4 人健, 良人健, 性病なし 児は 3 才時消化不良症で死亡。

産婦既往症: 幼時健, 初経 17 才 3 月, 整, 4~7 日間, 30 日週期, 中等量, 軽度の下腹痛あり。来潮後著患なし。結婚 21 才 7 月, 初産 22 才 9 月, 妊娠・分娩・産褥異常なし。

今回の妊娠歴: 最終月経昭和 8 年 10 月 6 日より 5 日間普通にあり。悪阻 12 月初旬より 1 ヶ月間食慾不振・悪心があつた。初発胎動, 昭和 9 年 2 月中旬。

初診, 昭和 9 年 4 月 24 日, 子宮底臍上 2 指横径, 21.5 cm, 児頭は上方子宮底にあり, 移動する。児心音は臍と恥骨結合との中央で, 少しく右方に偏して著明, 脛骨内面に浮腫著明, 腓腸筋痛なし。膝蓋腱反射弱, 尿中蛋白陰性。

再診, 4 月 26 日, 所見前回と同様, 下肢の浮腫は減少した。痔の疼痛を訴えたので肛坐を与えた。4 月

28 日にも、コカイン・タンニン紅坐を投与。

再診、5 月 4 日、腓腸筋痛著明、膝蓋腱反射消失、第 2 肺動脈音亢進、脚氣を疑つて緩下剤と照内末を投与。

再診、5 月 12 日、子宮底臍と剣状突起の中央、児頭は下方に移動、児心音は右下腹部に著明、脚氣の診断の下に前の処方を与えた。5 月 16 日にも同前処方。

再診、5 月 30 日、所見前回と同じ。膝蓋腱反射なお消失。

再診、6 月 10 日、子宮底は剣状突起下 3 指横径、児頭は下方にて移動、児心音右下腹部、下肢に浮腫なし。腱反射は前と同じく消失。

入院時所見：昭和 9 年 7 月 13 日午後 8 時、初発陣痛ありて 14 日午前 0 時 15 分入院。

体格・栄養中等、顔貌正常、眼・口腔・咽頭正常、肺正常、心臓の肺動脈孔第 2 音強勢、大動脈孔及び三尖弁口の強勢あり。乳房發育良好、腹部は球形、腹囲 85 cm、臍窩扁平、腹壁緊張、子宮も球状、子宮底は剣状突起下 2.5 指横径、33 cm、児頭は骨盤入口に固定、児背右側、臀部左上、児心音右臍棘線上に著明、11、12、12、下肢に軽度の浮腫あり。血圧、136~96、尿は中性、蛋白 (+)。

分娩経過：午前 1 時 35 分、陣痛発作 50 秒、間歇 40 秒、強度の発作あり。児心音 13、13、13、整強、1 時 50 分自然破水、午前 2 時 4 分、第 2 後頭位にて女兒分娩、後産娩出、2 時 27 分。分娩所要時間、6 時間 27 分、出血全量約 70 cc。

臍帯の長さ 30 cm、太さ 1.0 cm、胎盤太さ 15×12.5 cm、重さ 330 g。

児の経過、児は女性で身長 49 cm、体重 2,450 g、頭囲 32 cm、肩囲 32 cm、胸囲 27 cm、腰囲 22 cm、児は狼咽にして 2 時 40 分、即ち生後 36 分にて死亡した。

母体産褥経過良好で第 4 日目に 38.4°C の発熱があったが翌日は下熱して、産褥 7 日目に無事退院した。

児の剖検診断：

1. 心室中隔の一部欠損
2. 肺の貧血と無気肺
3. 肝臓の浮腫と鬱血
4. 両側腎盂・腎杯の拡張と皮質に於ける小嚢胞
5. 膣及び子宮の重複
6. 甲状腺の小嚢胞変性
7. メッケル氏憩室
8. 左横隔膜の弛緩

剖検経過：7 月 14 日午後 0 時 30 分剖検着手。児の体格正常。皮膚は湿度普通、皮下脂肪・筋肉の發育正常、両側 3 度歪唇、口蓋破裂。腹腔を開く、液状内容はない。大網膜萎縮、臓器の位置正常、横隔膜の高さ左右共に第 4 肋骨に一致、胸腔正常。

胸腺、太さ 3.4×3.0×0.5 cm、型態正常、重さ 3.0 g、充血、軟。

心臓、太さ正常、円形に近い、重さ 17.0 g、心尖は両側より成る。右心室壁は左側に比して肥厚す。心室中隔欠損あり。卵円孔大きく開存する。

左肺、太さ 5.2×4.6×1.6 cm、稍々小、重さ 12.0 g、淡赤黄色、表面平滑、無気肺、小。

右肺、太さ 5.0×6.6×1.5 cm、重さ 14.0 g、左に同じ。

肝臓、太さ 11.0×6.5×2.8 cm、型態尋常、重さ 110.0 g、紫赤色、滑、軟、剖面浮腫状。

胆嚢、僅に内容あるのみ、粘稠、褐黑色。

脾臓、太さ 4.8×2.0×0.9 cm、重さ 6.0 g、紫黑色、鬱血、剖面、脾材、濾胞を僅に認む。

左腎臓、太さ 5.0×3.0×1.5 cm、型態尋常、重さ 17.0 g、硬度正常、被膜の剝離、困難、表面に粟粒大より丸葉大の小嚢胞多数あり。剖面鬱血、皮質は狭小髓質鬱血、腎盂・腎杯は著しく拡大する。尿管正常。

右腎臓、太さ 5.0×3.2×1.5 cm、重さ 18.0 g、左側と同様。

左副腎、太さ 3.7×2.5×1.1 cm、重さ 6.0 g、浮腫状。

右副腎、太さ 3.7×2.8×2.0 cm、重さ 5.0 g、左に同じ。

胃正常、小腸の長さ 279.0 cm、大腸 53.0 cm。

虫垂、3.0 cm。

膵臓、太さ 5.8×1.4×0.8 cm、重さ 4.5 g。

膀胱、僅に尿を容る。

子宮は重複し、膣も重複する。

頸部正常。

脳の重量、268.0 g、正常。

例 3. 産婦 某 23 才 初妊

家族史：父 70 才にて老衰死、母健在、同胞 4 人中 2 人健在、良人健康、性病なし。

既往症：幼時健康、初経 14 才 10 月、整、28 日週期、持続 5 日間、中等量、下腹痛を伴う。来潮後著患なし。結婚 22 才 12 月。

今回の妊娠経過：最終月経、昭和 9 年 3 月 20 日より

り6日間、4月末より約2ヶ月間食思不振・悪心・嘔吐あり。胎動初感、7月中旬。

初診、昭和9年7月25日、子宮は前傾前屈、児頭大、両側付属器を触知せず。子宮腔部に異常なく、リビド著明。

再診、7月30日、子宮底は臍下1指横径にあり。胎動・心音共に不明瞭。内診するに所見前回と変りなし。咳嗽を訴えるので、ゼネガ浸を投与。

再診、8月17日、子宮底臍高、胎位不明、児心音は中央線上にて著明、下肢は浮腫なし。

再診、9月20日、子宮底は臍上2指横径にあり。胎児の位置不明瞭、児心音は右下腹部に於て整強、下肢に異常なし。尿所見正常。

再診、10月20日、子宮底は臍と剣状突起の中央にあり。児頭は骨盤入口に固定し、児心音は左臍棘線上に於て整調。下肢に異常なし。

入院時所見、昭和9年11月8日午前0時入院。体格・栄養中等、身長150cm、体重53.4kg、顔貌普通、両側扁桃腺の肥大・充血あり。

肺臓・心臓共に異常なく、乳腺发育可良、腹部卵円形、中央線着色著明、妊娠線を認めず。臍窩未だ消失せず、腹囲87cm、子宮底剣状突起下手掌巾、28cm、羊水量普通、既に陣痛発来し、間歇3~5分、発作40秒、強度中等。児頭は骨盤入口に陥入し、児背右、児心音は臍と恥骨結合との中央に著明、12、12、13、下肢に知覚・運動障害なし。たゞ軽度の浮腫を認める。血圧右146~80、尿淡黄色、中性、比重1013、蛋白(±)、体温35.9°C、脈搏74を算す。

分娩経過：初発陣痛11月7日午前9時。破水翌8日午前1時35分、分娩経過中、児心音に異常なく、11月8日午前7時42分、第1後頭位を以て、妊娠9ヶ月で早産の分娩を終る。後産娩出、8時8分。分娩所要時間は17時間1分。第3期出血350cc、直後出血50cc、全量400cc、臍帯の長さ、56cm、太さ1cm、胎盤17×18cm、重さ420g。

母体産褥経過可良にして、産褥8日目、無事退院する。時に昭和9年11月15日。

児の所見並に経過、児は女性、身長39cm、体重2380g、頭囲30cm、胸囲27cm、肩囲28cm、腰囲25cm、頭部の前後径10cm、小横径7.5cm、大横径8.5cm、小斜径8.0cm、大斜径12.0cm、臀部に驚卵大の腫瘍あり。此の部を「レ」線撮影す。

出生第1日は著変なし。

11月9日(2日目)午前9時頃に急に発熱41°Cに

達す。午後11時頃には下降す。便通(胎糞)2回、尿利2回。

11月10日(3日目)午後3時30分急に「チアノーゼ」を来して死亡す。

11月12日午後2時30分剖検開始。

児の剖検診断：

1. 臀部腫瘍
2. 両側腎盂・腎杯拡張及び囊状変性
3. 出血性胃粘膜糜爛
4. 膀胱粘膜の出血

剖検経過：栄養中等、稍々小なる新生児屍体。臀部に驚卵大の腫瘍あり。正中を開くに、腹腔内に黄色の液体多量に認む。両側肋膜腔に異常なし。

胸腺、大き4.2×3.0×0.7cm、重さ5g、硬度硬し
心臓、大き普通、重さ16.5g、心房・心室共に多量の凝固性血液を充滿す。卵円孔開存す。

左肺、大き5.0×5.0×1.5cm、重さ14.5g、紫赤色硬度普通、鬱血す。

右肺、大き4.4×6.0×1.5cm、重さ19g。

肝臓、大き13.0×7.0×2.3cm、重さ109.0g、紫色、剖面浮腫状。

脾臓、大き5.5×2.8×1.2cm、重さ9.0g、濾胞不明瞭。

左腎臓、大き4.6×3.0×1.5cm、重さ13.0g、髓質は萎縮す。腎盂は甚しく拡張し、黄色の尿を容れる尿管も拡張す。

右腎臓、大き4.0×3.0×1.1cm、重さ13.5g、所見左腎に同じ。

左副腎、大き3.5×2.4×0.8cm、重さ3.0g、皮質の脂肪物質は多量なり。

右副腎、大き3.0×2.6×0.8cm、重さ3.0g。

胃は型態普通、内容は粘液に少量の「コーヒー」様残渣物混ず。粘膜には大彎に多数の粟粒大の黄色に蓋れたる糜爛面あり。

脾臓、大き5.0×1.4×0.7cm、重さ3.0g。

小腸、長さ218.0cm、大腸、長さ60.0cm、尚少量の胎糞を蔵す。虫垂。4.5cm。

膀胱には少量の尿あり。粘膜に出血斑を認む。

卵巣・子宮に異常なし。子宮周囲鬱血す。

甲状腺、重さ1.1g。

脳、重さ255.0g。

脳下垂体・松果腺に異常なし。

頭蓋は軟なり。

骨及び骨髓に異常なし。

主要臓器の組織的所見： 心筋に於ける横紋の像は不明瞭にして、空胞の形成著明なり。

毛細管拡張し、鬱血著明なる部分あり。

左肺の下葉の一部を鏡検するに、肺胞腔は一般に拡張少なく肺胞壁は著しく肥厚して、毛細管の鬱血著明なり。浮腫又著明にして、ために肺胞腔全く満さるゝものあり。又部位により羊水内容物と思惟し得べき巨大なる細胞を以て充滿せられている。気管支は大なるもの、小なるものを問わず上皮脱落し、処によつては全く浸出物及び脱落せる粘膜を以て充滿されている。右下葉同様。

肝臓、被膜は稍々肥厚す。肝小葉の像未だ不著明なり。肝細胞索の配列不規則なれども明瞭に認める。肝細胞個々の境界不明瞭にして濁濁著し。軽度の浮腫を認める。星芒細胞は比較的大にして、毛細管は著しく拡張し、血液を充滿す。「グ」氏鞘に異常なく、胆管の像著明なり。造血細胞群は可成多量に認む。

脾臓、被膜に異常なく。リンパ濾胞の像大にして、周囲に漸散性に移行す。中心動脈に異常なし。脾材の増殖なし。脾洞は不明瞭にして脾髄は血液に富む。

腎臓、皮質に於ける「マルビギー」氏小体の配列極めて不規則なり。又「マ」氏小体の大小も甚しい。糸球体も極めて大小不同であるが、核の多少は著明でない。処によつては全く糸球体の認められぬ、ボーマン氏囊のみより形成せられたと思われる小体あり。而して、ボーマン氏囊は一般に拡張せるもの多く、処によつては著しく拡張して、中に多量の分泌物を藏している。而して斯の如きもののボーマン氏囊は、内被細胞は穀子形にして其の形態も著しく異つている。処によつて出血点を認める。髄質には結合組織の増殖あり。

脾臓、頭部の一部を鏡検するに、腺組織は未だ發育不充分にして結合組織の増殖のみ著明である。ラングハンス氏島は僅かに認め得る。

甲状腺、濾胞の円形に拡張するもの甚だ少く、大部分は濾胞を形成せずして、上皮細胞が極めて不規則に配列しているだけである。

僅に存在する濾胞腔内に於ても殆んど膠様物質を証明することが出来ない。

毛細血管は著しく拡張して、比較的多量の血液を容れる。

胸腺、皮質・髄質の境界は、極めて不明瞭に移行する。一般に皮質の發育髄質に比して不充分なり。髄質に於ける毛細血管の拡張・充血著し。ハツサル氏小体は比較的大にして、多数存在する。

副腎、髄質の發育未だ不充分なるものの如く、本切片に於ては髄質の如き部位を認め得ない。束状層に異常なく、網状層は鬱血比較的多量なり。

膀胱、粘膜に出血点を認める外異常なし。

子宮、未發育で上皮の形成未だ行われず。

脳下垂体、前・中・後葉を著明に區別し得。

後葉に著変なく、中葉に於ける腺葉構造著明なるも膠様物質は認めず。前葉に於ける「エ」嗜好細胞は比較的多数なり。前葉に於ける毛細管の鬱血著明なり。

腫瘍の一部を5ヶ所に於て鏡検するに、扁平上皮・顆毛上皮・結合組織・軟骨組織・骨組織・滑平筋・横紋筋・中枢神経細胞・リンパ腺・腸管の如き管腔を示す組織等の諸組織を証明し得た。

例4. 産婦 某 35 才 3 回目経産婦。

家族史： 父 68 才時心臓病で死亡、母健在。同胞 11 人中 8 人健在、良人健康、性病なし。兄 2 人共健在。

既往症、幼時健康、初経 16 才夏、爾來不整、1 年間に 2～3 回あるのみ。持続 7 日間、中量、障礙はない。来潮後の疾患として、23 才の時、脚氣に罹患したが、約 2 ヶ月で全治した。初産 23 才 10 月、終産 26 才 10 月、妊娠・分娩・産褥に異常はない。

今回の妊娠歴： 最終月経、昭和 10 年 3 月 26 より 8 日間あり、悪阻症状は 5 月末より約 2 ヶ月間食思不振・悪心・嘔吐あり。初発胎動 8 月初旬。

初診、昭和 10 年 10 月 29 日、胸部正常、心臓の大き普通、子宮底 3 指横徑臍上にあり、胎児の位置不明。児心音は左下腹部に於て著明、母体の肺動脈音強盛なるも、下肢に浮腫を認めず、膝蓋腱反射亢進せず。

再診、12 月 3 日、下肢に異常なく、子宮底は剣状突起直下にあり、36 cm、羊水過多症を認める。胎位不明なるも浮球感ある大部分を上方子宮底に触れる。児心音は右下腹部に著明、腹圍 94 cm、母体心音は普通で雑音を認めない。11 月 30 日、午後 9 時頃に少量の出血ありとのことにて、内診を行うに、下向部は浮球感著明、外子宮口は閉鎖して出血部を発見しない。糜爛はない。静脈瘤も認めない。リビード着色著明。

再診、12 月 20 日、子宮底は剣状突起下 1 指横徑にあり、児頭は右上方に触知するものの如し。先進胎部は不明瞭である。子宮底長は 40 cm、羊水過多症著明。児心音は正中線に於て臍高で整強に聴取する。念の為に「レ」線写真を取つて外回転術を行つた (Nr. 812 号)。

入院時所見： 昭和 11 年 1 月 18 日、午前 0 時 50

分に、前日午前 11 時頃より陣痛開始し、同 11 時 30 分頃より粘血分泌物を認めた由で入院した。体格中等、栄養可良なる妊婦で、顔貌に異常なし、心臓・肺臓に特別な所見なし。

脈搏整 110、緊張中等、乳房は固座し、發育可良、腹部は卵円形、浮腫を認めず、腹壁緊張する。腹囲は 91.5 cm、子宮底長 29 cm、剣状突起下 3 指横径、羊水量稍々多量。児頭は骨盤入口に固定し、臀部上方、兒背左側、兒心音左臍棘線中央に於て著明、下肢に知覚・運動障害は認めない。軽度の浮腫がある。血圧左 142~104、尿黄色酸性、比重は 1018、蛋白 (+)。

分娩経過：入院時陣痛発作は毎 4 分に 1 回 35 秒、兒心音 13、12、12、整強、午前 10 時 55 分、自然破水、午前 11 時、間歇 1 分 30 秒、発作 1 分 10 秒となり、午前 11 時 8 分に第 2 後頭位にて自然分娩、11 時 17 分後産陣痛、午前 11 時 25 分後産娩出、分娩所要時間、12 時間 25 分、出血全量 80 cc、異常損傷を認めない。

臍帯 52 cm、大き 1.2 cm、胎盤 19×18 cm、重さ 500 g、児は女性、身長 49 cm、体重 2,790 g、頭囲 32 cm、肩囲 34.5 cm、胸囲 32 cm、腰囲 26.5 cm、分娩直後から全身が全く、チアノーゼを呈しているが、心臓には雑音を聴取しない。元気に啼泣する。ビタカンファー 0.5 cc 注射し、酸素吸入を施行すると、その為か午後 6 時頃より、チアノーゼを消失した。因つて酸素吸入を中止した。19 日午前 2 時 50 分頃より再びチアノーゼが現れたので、又ビタカンファー 0.5 cc 注射し、3 時 50 分にはロベリン 0.5 cc を注射したが、反応なく 3 時 59 分に遂に死亡した。

産褥経過：産褥 4 日目 38.0°C の発熱あり、乳房著しく腫脹、翌 1 月 22 日の血液所見は、赤血球数 439 万、白血球数 7800、血色素量 83%ザリー、白血球の種類は、桿状核 4.5%、分葉核 72%、リンパ球 21.5%、大単核円形細胞 2%であつた。赤血球沈降速度、87、111、125 mm、産褥 7 日目に、体温なお 38.6°C であつたが、その後、漸次に下降したので、1 月 25 日希望退院した。

児の剖検診断：

1. 4 箇の副脾
2. 左腎盂・腎杯の囊胞状変性
3. 胸腺の發育不全
4. 無気肺様の鬱血肺
5. 心臓の肥大
6. 萎縮した胆嚢

剖検経過：昭和 11 年 1 月 20 日午前 11 時 30 分剖検着手。体格小、栄養中等、皮膚の乾燥状態尋常、皮下脂肪及び筋肉の發育中等、屍斑は全身に著明である。また、屍剛も全関節に著明に証明することができる。体表に異常はない。腹部の膨満も認めない。

腹腔を開くに少量の黄色の液体を容る。諸臓器の位置は異常はない。腸間膜リンパ腺の腫脹米粒大。横隔膜の高さ左右共に第 4 肋骨に一致する。

胸腔を開くに左右肋膜腔に異常なく、心嚢にも異常なし。

胸腺、大き 3.0×2.2×0.6 cm、形普通、重さ 3.0 g で萎縮している。

心臓は児の大きに比較して大、重さ 28.0 g あり。形態普通。心尖は左右の心室を以て形成する。冠状静脈の鬱血著明。左右の心房・心室共に多量の血液の凝固したものを認める。

弁膜に異常なし。

左肺、大き 6.0×5.0×1.7 cm、形態尋常、重さ 20.0 g、表面滑沢で紫黑色、硬度増加、後下方に鬱血著明、気管には多量の血性泡沫を容る。

右肺、大き 6.0×7.0×2.0 cm、重さ 31.0 g、大略の所見左肺に同じ、只下葉に於て硬度一層増加して、鬱血が極めて著明である。

肝臓、大き 12.0×7.0×3.4 cm、形態尋常重さ 165.0 g で比較的大、紫色、表面滑沢、硬度尋常、剖面は浮腫状に濁濁して、小葉の像不明瞭、一般に血液に富む。

胆嚢は甚しく小で、少量の胆汁を容る。胆汁は粘稠で褐色少量である。

脾臓、大き 7.0×3.0×1.3 cm、米粒大の副脾 4 ケあり。重さ 13.0 g、被膜緊張、紫黑色、硬度尋常、剖面は鬱血高度、脾髄は硬く、脾材は不明瞭、リンパ結節不明瞭。

左腎臓、大き 4.2×3.0×1.5 cm、型態尋常、重さ 14.0 g、硬度普通、被膜の剝離容易。表面は小腎の像あるのみで平滑、星芒静脈の像を認めない。剖面は著しく鬱血して濁濁あり。皮質・髓質の境界不明瞭で、菲薄である。即ち腎盂腎杯が著しく拡張せる為である。

右腎臓、大き 4.0×2.8×1.5 cm、型態尋常、重さ 12.0 g、左腎と異り全く腎盂の拡張の像が見られない。

左副腎、大き 4.4×2.4×1.1 cm、型態尋常、重さ 6.0 g、剖面尋常。

右副腎、大き 3.4×2.6×0.9 cm、重さ 6.0 g、所見

左に同じ。

胃は異常なし。

脾臓、大さ $7.0 \times 1.4 \times 0.9$ cm, 型態尋常, 重さ 5.0 g, 硬度尋常。

小腸の長さ 260 cm, 大腸 55 cm, 少量の胎糞を容る。虫垂 3.0 cm。

子宮は普通, 周囲の静血著明。卵巣・卵管普通。

気管にも血性の泡沫物を容る。

甲状腺, 2.0 g。

矢状縫合, 大小泉門は著しく大。脳髄開かず。

骨に異常なし。

例5. 産婦 某 36 才 5 回目経産婦
家族史: 父母健在, 同胞 5 人皆健在。良人健, 性病なし。児 3 人共に健在。

既往症: 幼時健, 初経来潮 14 才 11 月, 整, 28 日週期, 継続 3 日間中等量, 月経時障害なし, 来潮後も著患なし。結婚 27 才 12 月, 初産 29 年 7 月, 前期破水, 9 ヶ月早産, 2 回目の分娩は正常産, 3 回目は弛緩出血, 4 回目は 34 才 11 月に妊娠 4 ヶ月にて原因不明で自然流産を起し, 子宮内容除去術を受けた。

今回の妊娠経過: 最終月経昭和 11 年 5 月 22 日から 3 日間, 常の如くあり, 悪阻症状を欠く。

胎動初感昭和 11 年 11 月中旬。

初診, 昭和 12 年 1 月 19 日, 子宮底長 27 cm, 児頭は上方子宮底にあり, 臀部骨盤入口上に於て移動す, 児心音は, 右下腹部に於て整強, 下肢に軽度の浮腫あり, 膝蓋腱反射正常, 尿アルカリ性, 濁濁なく, 蛋白痕跡陽性。

再診, 2 月 5 日, 児頭上方に於いて浮動。児心音右下腹部に於て整調, 下肢に軽度の浮腫あり。

再診, 2 月 8 日, 子宮底長 30 cm, 腹囲 83 cm, 児頭上方子宮底にあり, 児心音正中線上にて著明, 下肢に軽度の浮腫あり, 尿中蛋白陰性。

入院時所見: 昭和 12 年 3 月 14 日午後 5 時頃に前期破水を起し, 翌 15 日午前 11 時入院す。体格栄養共に中等, 顔貌正常, 肺・心臓に異常なし。腹部円形に近い。腹壁稍々緊張, 腹囲 82 cm, 子宮底長 32 cm, 底は剣状突起下 3 指横徑にあり。羊水量普通, 児頭は骨盤入口に僅に固定し, 児心音は左下腹部に於て整強に聴取す。下肢に知覚及び運動障害なく, 軽度の浮腫を認めた。血圧右 158~90, 尿は濁濁して蛋白は痕跡陽性。

分娩経過: 昭和 12 年 3 月 15 日午後 3 時頃より陣

痛開始, 間歇 10 分, 発作 30 秒の状態で, 午後 3 時 30 分デンプール 5 cc 臀筋内注射, 児心音整強, 午後 5 時には, 間歇 1 分 30 秒, 発作 40 秒で強度中等の発作あり, 児心音は 15, 15, 14, 確実, 午後 5 時 20 分頃, 異様のもの排膿すとの報告に半脳児なることを知り得た。

午後 5 時 45 分頃より心音の聴取不能となる。

午後 5 時 56 分頭位にて, 頭蓋底を先進部として胎児分娩す。後産娩出午後 6 時 6 分 分娩所要時間, 3 時間 6 分, 全出血量 100 cc, 側切開縫合 2 針。

臍帯, 44.0×13 cm, 胎盤 17.0×18.0 cm, 重さ 450 g, 児は男性, 分娩中死亡児, 身長 51 cm, 体重 2,610 g, 半脳児であつて, 陰囊極めて小にして, 停留睾丸。肩囲 34 cm, 胸囲 30 cm, 腰囲 28 cm。

母体産褥経過, 分娩後発熱もなく, 3 月 22 日, 産褥第 7 日目に無事退院した。

児の剖検診断:

1. 半脳児
2. 両側副腎の萎縮
3. 停留睾丸
4. 胸腺の溢血点
5. 肺の溢血点
6. 心外膜の溢血点
7. 左腎臓の腎杯の囊胞状拡張

剖検経過: 昭和 12 年 3 月 17 日, 午前 9 時 30 分剖検着手。体格大, 皮下脂肪組織の發育極めて可良, 特に背頸部に著明, 筋肉の發育尋常, 屍斑は全身に著明, 屍強直不明, 頭部は半脳児で両半球を相合して, 手拳大の血腫を形成している。大後頭孔及び側頭骨には異常はない。勿論, 後頭載域関節には異常を認めない。

鞍背の部位を認め, 脳下垂体の如きものを切除固定したが, 松果体の如きものは認めることが出来ぬ。眼球は著しく突出し, 定型的なる半脳児の顔貌を呈している。

腹腔を開く, 腹水は殆んど認めず, 腹腔内臓器の位置に異常がない。また腸管内にガスを認めない。腸管膜リンパ腺の腫脹と静血あり。左右の横隔膜の高さ共に第 4 肋骨に相当している。胸腔を開く。肋膜腔及び心囊腔に異常はない。

胸腺, 大さ $5.0 \times 3.6 \times 1.0$ cm, 型態尋常, 重さ 9.5 g 点状の出血あり。

心臓, 大さ異常, 重さ 16 g, 心尖は左室で形成し, 冠状静脈の静血あり, 心外膜の溢血点あり。心房・心

室弁に異常なし。卵円孔開存。

左肺、大さ $6.0 \times 5.0 \times 1.3$ cm, 形態尋常, 重さ 16 g
紫赤色, 表面滑沢, 溢血点あり。硬度尋常, 剖面無気肺。

右肺、大さ $6.0 \times 5.5 \times 1.4$ cm, 重さ 19.0 g, 所見
左肺に同じ。

肝臓、大さ $10.0 \times 5.4 \times 2.5$ cm, 形態尋常, 重さ
76.0 g, 濃紫色, 表面滑沢, 硬度普通, 剖面鬱血に富
む。

胆嚢に暗褐色粘濁なる胆汁中等度に容る。

脾臓、大さ $4.6 \times 4.0 \times 0.9$ cm, 形態尋常, 重さ
10.0 g, 被膜緊張, 紫黒色, 軟, 剖面も著しく軟, リ
ンパ結節並に脾材不明瞭。

左腎臓、大さ $4.6 \times 3.0 \times 1.4$ cm, 形態尋常, 重さ
13.5 g, 硬度尋常, 被膜緊張, 表面滑沢, 剖面は皮質
・髄質の境界不明瞭, 腎杯の囊状に拡張するを見た。
尿管も少しく拡張するが走行に異常なし。

右腎臓、大さ $4.4 \times 2.8 \times 1.3$ cm, 形態尋常, 重さ
9.5 g, 剖面に異常なし。

左副腎、大さ $1.8 \times 1.0 \times 0.15$ cm, 小, 重さ 0.3 g。

右副腎、大さ $1.8 \times 1.0 \times 0.2$ cm, 重さ 0.3 g。

胃、少量の粘液を容る。

脾臓、大さ $5.0 \times 1.6 \times 0.8$ cm, 重さ 4.0 g。

小腸の全長 328 cm, 大腸 52 cm, 中等量の胎糞を
容る。虫垂の長さ 3.5 cm。

膀胱には可成多量の尿を容る。

睪丸に腹腔に停留して小。

頸部諸臓器の鬱血著明, 甲状腺の重さ 1.7 g, 骨端線
に異常なし。

例6. 産婦 某 27 才 5 回目経産婦

家族史: 父母健在, 同胞 12 人中 8 人健在, 1 人は
28 才時脚気で死亡したが, 外の 3 人は原因不明で死
亡。良人現在健康, 性病に罹患したことあり, 児 3 人
中 2 人健在, 1 人は 8 カ月早産児で死亡した。

既往症: 幼期健康, 初経来潮 17 才 11 月, 爾来整
調で 28 日週期, 持続 5 日間, 中量, 障害なし。結婚
19 才 4 月, 来潮後の著想としては 24 才時梅毒に罹つ
たことがある。

初産 20 才 6 月, 妊娠 9 カ月で鉗子分娩であつた。
2 回目は 8 カ月早産で児は 3 日目に死亡した。3 回目
は, 妊娠 7 カ月で子宮内死亡児を死産した。4 回目は
24 才 3 月妊娠・分娩・産褥異常なし。

今回妊娠経過: 最終月経, 昭和 11 年 7 月 30 日よ
り 4 日間, 常の如くあり, 9 月下旬より 10 月初旬ま

で軽度の悪心があつたのみ。初発胎動 12 月初旬。

初診, 昭和 12 年 4 月 14 日, 4 月 4 日の日に過度
の労働をなし爾来腹部の緊張並に下腹部痛が持続する
ので, 之を主訴として外来を訪れた。下肢に僅に浮腫
を認めた。腱反射普通, 子宮底は剣状突起下 3 指横径
にあり 30 cm, 児頭は下方にあり, 移動する。児心音
は左臍棘線に於て著明, 骨盤は, 前上棘間 24, 腸骨
棘間 28, 大転子間 30, 第 1 斜径 23, 第 2 斜径 22.5,
外結 19 cm。

入院時所見: 4 月 26 日午前 11 時, 血性分泌物が
あって, 午後 6 時 30 分頃に初発陣痛を感じ, 午後 8
時 30 分に入院した。

体格・栄養共に中等, 顔貌に異常なし, 肺臓・心臓
にも異常なし。脈搏整, 中, 腹部卵円形, 中等度に緊
張, 腹囲 93.5 cm, 子宮底は剣状突起下 2 指横径にあ
り, 31 cm。羊水量は普通, 陣痛未だ弱く, 間歇 9 分,
発作 25 秒, 児心音は左臍棘線上に於て, 11, 11, 11,
に聴取する。児頭は骨盤入口に僅に固定する。下肢に
知覚・運動障害はない。唯軽度の浮腫あり, 尿は黄色
濁濁なく, 蛋白 (+), 血圧左 116~68。

分娩経過: 4 月 26 日午後 10 時, 間歇 5 分, 発作
は尚弱く 25 秒, 児心音は 12, 12, 12, 強整, 翌 27
日午前 0 時頃より間歇短縮し 2 分, 発作 35 秒, 強度
中等。児心音は 12, 12, 12, 強整。午前 4 時 30 分
には間歇 1 分 10 秒, 発作 35 秒, 強度となる。午前 5
時 43 分自然破水, 午前 5 時 49 分に第 1 前頭位で分
娩した。羊水量 1,500 cc, 後産娩出, 午前 6 時 3 分,
分娩所要時間, 12 時間 3 分。出血総量 400 cc。

臍帯, 50.0×1.2 cm, 胎盤, 24×19 cm, 重さ 860 g
異常所見なし。

児は男性, 身長 49 cm, 体重 2,680 g, 頭囲 33.5 cm,
肩囲 30 cm, 胸囲 32 cm, 腰囲 25 cm。

分娩直後僅に 2 回ばかり啼泣したが, 次第に顔面蒼
白となり, 児心音も不整且つ小となつた。呼吸も時々
停止する状態となるので, 午前 5 時 55 分, ロベリン
1 cc 皮下注射, 同 6 時 ビタカンファー 1 cc 皮下注射,
人工呼吸法等を行つて, 次第に恢復し, 又 2 回程啼泣
した。よつて更に酸素吸入を行つたが, 再び間もなく
一般状態不良となるので, 午後 6 時 55 分, ビタカン
ファー 1 cc・コラミン 0.5 cc を注射したが効なく,
午後 7 時 1 分, 心音は停止した。臍帯血液のワ氏反応
陽性(++)。村田氏反応(++)。マイニッケ氏反応(++)
であつた。児は腹部著しく膨満して, 腫張した肝臓を
触知するが, 其の他の部位には異常を認めない。頭髮

は極めてよく脱落する。

母体産褥経過：分娩後軽度の発熱(37.5°C)があつたが、間もなく下熱して、以後は全く無熱に経過し、5月1日産褥5日目に退院した。産褥2日目の血液でワ氏反応を検したが、強陽性であつた。村田・マ氏反応も共に強陽性であつた。

児の剖検診断：

1. 肝臓・脾臓の腫大
2. 右腎盂・腎杯の拡張
3. 両肺の溢血点
4. 梅毒性軟骨炎
5. 右半頭蓋内出血

剖検経過：昭和12年4月28日午後2時剖検着

手。体格中等、栄養可良、皮膚稍々浮腫状、皮下脂肪組織並に筋肉の発育中等、屍斑は左半身に著明。死後の強直不明瞭、体表面に異常なし。

腹腔を開くに、少量の黄色の液体あり、大網膜は浮腫状、腹腔内諸臓器悉く浮腫状を呈し、腸間膜リンパ腺は、小豆大に腫脹する。横膈膜の高さは左右共に第4肋骨に一致する。胸腔を開く。肋膜腔に異常なし。心嚢には1.8ccの血性漿液性の内容あり。

胸腺、長さ5.0×4.4×0.7cm。型態正常、重さ7.0g、貧血浮腫状。

心臓、大きさ普通、型態普通、重さ12.0g、心尖は左室より成り、心冠狀動脈に異常なし。心房・心室に流動性血液あり。弁に異常なし。

第1表 腎盂・腎杯・尿管の拡張例の総括

症例 番号	剖検 番号	産 氏 氏 名	婦 名	年 令	経 産	妊娠・分娩 中の異常	児 の 性	身長 cm	体重 g	児の生存 期 間	剖 検 所 見
1	509			27	2.P.	羊水過多症 無脳児	♀	47.0	2,590	生後20分心 音停止	無脳児、胸腺肥大、肺發育不全、副腎發育不全 左腎杯の拡張、右腎正常。
2	558			24	2.P.		♀	49.0	2,450	生後40分心 音停止	両側腎杯拡張、腎皮質小囊胎変性、甲状腺の小 囊胎変性、重複子宮、心室中隔欠損、横膈膜弛 緩症、メッケル氏の憩室。
3	621			23	P.P.	9ヶ月早産 腎部奇形腫	♀	39.0	2,380	3日目死亡	腎部腫瘍、両側腎盂、腎杯の拡張、出血性胃粘 膜糜爛、膀胱粘膜出血。
4	791			35	3.P.		♀	49.0	2,790	2日目死亡	4個の副脾、左腎盂、腎杯の囊状拡張、胸腺發 育不全、鬱血性無気肺、心臓肥大、胆嚢の萎縮
5	965			36	5.P.	前期破水 無脳児	♂	51.0	2,610	分娩中死亡	左腎杯の囊状拡張、無脳児、心外膜溢血、胸 腺溢血、肺溢血、副腎萎縮、停留嚢丸。
6	987			27	5.P.	梅毒 羊水過多症	♂	49.0	2,680	生後1時間 10分で死亡	右腎盂、腎杯の拡張、肝脾腫大、両肺の溢血、 梅毒性骨軟骨炎、頭蓋内出血。
7	1164			32	3.P.	9ヶ月早産	♂	44.0	2,236	5日目死亡	両側腎盂、腎杯拡張、両側尿管拡張、先天性腹 膜炎、皮膚硬化、浮腫、肺、胸腺、小脳の溢血点
8	1199			31	5.P.	狭骨盤	♂	52.0	2,960	仮死より真 死に移行	両側腎盂、腎杯の拡張、小腸壁の腫瘍、頭蓋内 出血、無気肺、胸腺の溢血、メッケル氏憩室。
9	1554			22	P.P.	梅毒	♀	43.0	2,168	生後1時間 20分で死亡	両側腎杯囊胎変性、頭蓋内出血、白色肺炎、双 角子宮、脾臓肥大、胃粘膜の糜爛、右内足、 梅毒性骨軟骨炎。
10	1725			30	3.P.	臍帯下垂	♂	50.0	2,840	分娩中死亡	左側腎杯拡張、頭蓋の穿頭孔、胸腺の肥大と溢血 脾の肥大、肺の溢血と無気肺(附図写真3参照)
11	1747			29	2.P.	9ヶ月早産	♂	42.0	2,000	生後6時間 にて死亡	両側腎杯拡張、軟膜の鬱血、胸腺の肥大、心外 膜、肺の溢血。
12	1770			31	5.P.	無脳児	♂	47.5	3,113	仮死より真 死に移行	無脳児、両側腎杯、尿管、膀胱の拡張、心室中 隔欠損、右肺2葉、肺の溢血、副脾と脾の不正 形、胸腺の肥大、副腎の發育不全、肝被膜下出 血、左腎溢血点。
13	1838			26	2.P.	8ヶ月早産 羊水過多症	♂	41.0	2,220	分娩中死亡	両側腎杯拡張、胎児性浮腫、胸内水腫、臍尿管 内嚢丸停留、肝被膜下出血、両肺發育不全。
14	1850			25	P.P.		♂	44.0	2,100	6日目死亡	直腸閉塞、左腎盂、腎杯、尿管拡張、右腎發育 不全と尿管拡張、胸腺發育不良、肺、心外膜溢 血、迴腸結腸の拡張。
15	1975			25	2.P.	頸管の瘻疽 第3期出血	♂	50.0	3,656	鎖肛4日目 死亡	鎖肛、両側腎杯の拡張、膀胱周囲の出血腹膜炎 肝被膜出血、肺炎症状を呈する鬱血肺メッケル 氏憩室。
16	1992			24	P.P.	双胎	♂	48.0	2,025	5日目死亡	左腎盂、腎杯の拡張、肺炎、胃出血、核黄疽、 肝臓鬱血、胸腺、心外膜溢血。
17	2034			29	2.P.	全足位 フライト スメリー氏法	♂	36.5	1,870	分娩中死亡	両側腎盂、腎杯の拡張、胎生軟骨萎縮症、無気 肺、軟膜膜鬱血、胸腺、心外膜の溢血。
18	2193			22	2.P.		♂	49.0	2,580	3日目死亡	両側腎盂、腎杯の拡張、左尿管の拡張、肺の溢 血点、狼咽、両足小趾側過剰趾、左右手指側過 剰指、両側側副室拡張、メッケル氏憩室。
19	2271			28	2.P.	1卵性双胎 Ⅱ児子宮内死亡	♀	—	1,500	浸軟二期	浸軟児、發育不全、左腎盂、腎杯拡張、左尿管 拡張。
20	2327			28	3.P.	全足位娩出術	♂	56.0	4,605	仮死→真死	両側腎杯拡張、右腎臓の転位、胆嚢の欠損、幽 門狭窄、側頭骨骨折、頭蓋内出血、嚢丸腹腔内 停留、メッケル氏憩室、胸腺の肥大と溢血、肺 の溢血点と無気肺。

左肺、大さ $6.6 \times 6.0 \times 2.0$ cm, 型態普通, 重さ 32.0 g, 紫灰色, 硬度増加, 溢血点多数, 剖面浮腫状, 気管支粘膜も浮腫状。

右肺、大さ $6.0 \times 7.0 \times 2.4$ cm, 型態尋常, 所見全く左肺に同じ。

肝臓、大さ $14.0 \times 8.0 \times 3.5$ cm, 型態尋常, 重さ 208.5 g, 紫褐色, 表面滑沢, 硬度増加, 剖面浮腫状濁濁。

胆嚢に多量の褐黒色粘潤なる胆汁を容る。

脾臓、大さ $9.0 \times 5.0 \times 2.0$ cm, 型態尋常, 重さ 49.0 g, 著しく腫大す。表面緊張, 紫黒色, 表面は汚色の苔を被る。硬度普通, 剖面濁濁, 鬱血著明, 脾材の像著明, リンパ結節著明且腫大する。

左腎臓、大さ $4.8 \times 2.6 \times 2.1$ cm, 型態尋常, 重さ 18.0 g, 硬度尋常, 被膜は剝離容易, 表面滑沢, 剖面浮腫状に濁濁する。皮質・髄質の境界明瞭, 腎盂・尿管に異常なし。

右腎臓、大さ $4.8 \times 3.0 \times 1.9$ cm, 型態尋常, 重さ 17.5 g, 腎盂・腎杯は著しく拡張する。其の他の所見左に同じ。

左副腎、大さ $3.8 \times 2.0 \times 1.0$ cm, 型態尋常, 重さ 3.0 g。

右副腎、大さ $3.0 \times 2.2 \times 0.7$ cm, 重さ 3.0 g。

胃、大さ・型態普通, 内面は粘液を以て被はる。

脾臓、大さ $5.6 \times 1.8 \times 1.4$ cm, 型態尋常, 重さ 8.0 g, 所見異常なし。

小腸の長さ 367 cm, 大腸 65 cm, 浮腫状, 大腸には多量の胎糞あり。

虫垂、5.0 cm。

膀胱には液体なし。

睪丸、普通。

頸部臓器正常。甲状腺。1.0 g。

脳髓の重さ 332.0 g, 大脳剖面浮腫状, 右頭蓋頂部に凝血あり。

大腿骨端肥厚して鋸歯状を呈する。

先天性腎杯拡張を有する例の総括

本項目に於ては腎杯の拡張例に就て検索を行い、腎杯の拡張によつて尿路の通過障害のあつたことを想像し、かくの如き尿の通過障害の存在するときに囊胞腎を形成し得るや否やについて検討を施した。

先づ先天性の腎杯の拡張の発生原因を追求するために産婦の家族歴・妊娠・分娩経過・この児の病理解剖・組織的研究を施した。その大略の要領は例 1 より例 6 まで詳細に記述した通りに行つた。しかし用紙に限

度があるので組織的所見の記述は例 3 のみにとどめた。

また例 7 より例 18 までは前表の如く主要点のみを総括的に図表に示した。

先天性腎杯拡張の頻度は死産及び新生児死亡剖検例 2500 例中 20 例で 0.8% に過ぎない。この頻度は新田の報告した先天性囊胞腎の頻度と相似ている。

家族歴に就て見るに産婦の同胞に死亡者が多く、又児の兄姉に死亡児が多いが遺伝的關係を想像するような家族的關係を認めることはできない。

産婦の年令、経産と本症発生との間には何等の關係も見出すことはできない。

産婦の妊娠中の経過に羊水過多症を証明したものが 3 例あるが何れも高度の羊水過多症であつて、例 1 では分娩時 6750 cc を計量した。他の奇形によつて羊水過多の発生も考えられるが、又腎臓機能の障害と云うことも考えられると思う。また無脳児の合併するもの 3 例を数えるが之も偶然と云えばあまりにも多すぎると思う。これは無脳児のときに屢々実質性腎炎の像を証明することのあることによつて想像される。

男女の性は男 14 : 女 6 で絶対的に男児に発生するものが多い。

身長・体重は本症の発生とは何等關係がないようである。妊娠 10 カ月になつても發育の不良なるものもあるが、例 18 の如く巨大児もある。

児の予後も必ずしも不良と云うわけではない。組織学的所見に於ても機能を営んでいることは明白であつて、多くの死亡の原因は他の主要臓器の異常にあるように思われる。勿論本症の軽度のものとか、或は片側性のものは、生存に堪え得るものであると思はれる。それ故に、生後生存發育している児の中にも多数の本症の存在していることが想像される。

本症と他の臓器の奇形との關係であるが、最も多く存在するのはメッケル氏憩室の 4 例である。

腎囊腫の発生と尿管との間には密接なる關係があると解されているが、それ故にメッケル氏憩室を伴う例が多いものとする。

双角子宮の類も発生学上尿路と密接なる關係を有するものであるから、かくの如き奇形を有すると思われる 2 例に見ることができる。

心室中隔欠損も 2 例に認めることができた。

睪丸の鼠蹊管内、又は腹腔内に停留するものは 3 例あつた。

腎臓の所見であるが、完全に拡張が腎杯のみに証明

られるものと、腎盂の方にも拡張の所見が認められるものとある。更に尿管にも拡張を証明し、膀胱にまでも拡張の認められる例 12 の如きものもある。両側の腎杯に拡張を証明するものは 20 例中 13 例で大多数に於て両側に発生するものであることを認めた。他の 7 例は何れも偏側例で、そのうち 6 例が左側に発生している。1 例のみが右側である。何故に左側に発生し易いか明かでない。左側に発生した 6 例中 1 例のみが右腎の發育不全と右側の尿管の拡張を認めたが、他の 5 例は他側が全く健康な腎臓であつた。例 2 に於ては両側腎杯と共に肉眼的に両側腎共に小囊胞の変性を認めた外に甲状腺にも、囊胞変性のあるのを認めた。

組織的に腎臓以外の諸臓器に特に関係のある所見を認めることがないので省略する。腎臓の所見は例 3 が代表的な著明な例であるので、この例のみを本文中に記載した。この例は腎杯が著しく拡張して、皮質・髓質共に著しく菲薄となつた例で、そのため多少腎盂も拡張が認められた例である。尿管は僅に拡張しているが、膀胱には何等拡張の所見はない。

一般に皮質の腎小体の配列は極めて不規則な例が多く、また腎小体の大小不同が著明である。糸球体の核の多少にも著しい差異がある。中には殆んど糸球体として認め得ないようなものもある。糸球体囊の著しく拡張したものも見られる。中には全く内容を認め得ないで囊状になつたものもある。或は僅に細胞を数個だけ認め得るものもある。而して大なる囊胞状となつたものは壁は骰子形の細胞で取り囲まれている。これ等の小囊胞は極めて散在性に存在するのみであつて、あまり大なるものがない。従つて肉眼的に証明し得ないものであるが、鏡検によつてはじめて之の囊胞の存在を認めることができる。

例 10 の如きも表面や割面には殆んど囊胞の如きものは認めることができないが、組織的には小囊胞を確認することが出来る。その他例 2 に於ては肉眼的にも著明に認め得るので、組織学的には可成大なるものに属する。

その他の例に於ては著明に拡張したと思われる囊胞変性の所見は認められなかつた。髓質に於ては多少結合織の増殖を認めることができるが、集合管・乳頭管に於ても拡張の像は全く認めることができなかった。又円形細胞の浸潤の像も認められない。出血の像は僅に例 3 に於て認めたのみで、他の例に於ては認めることが出来なかつた。

以上の如くで腎盂・腎杯の拡張を来すような尿嚢帯

の所見はあつても、腎の囊胞を来すような所見は認めることができなかった。只これ等の例の中には、皮質の小囊胞変性を来す所見が数例あつたので、これ等の例に就て更に検討を加えて見ることとする。

先天性腎皮質小囊胞変性を有する腎の所見

腎皮質に粟粒大の散在性の小囊胞を認めることは死産児及び新生児に於ては極めて稀れなものである。しかし前項に述べた如く腎盂・腎杯の拡張を有する例に於ては肉眼的に 2 例の小囊胞変性を認め、また組織的にもこれに類する小囊胞を証明したので、この小囊胞変性は囊胞腎の如き腫瘍状のものではないが、これ等の例に就て検討を加えて見る。

例 1. の 〇〇〇 の例は既に前項の例 2 として掲げたものであるから、本項例 2 の 〇〇〇 の例に就て研究方法等詳細に記述することにする。この例は梅毒「ワ」氏反応強陽性に梅毒性変化の著明な例であるので特に此の例を選んで記載した。以下の例は主要点のみを第 2 表の如く総括的に表示した。

先天的に腎小囊胞を形成する疾患の児の母体に関しでは特に原因的関係ありと思はれる所見を見出すことは出来ない。やはり早産児が多く児全体の發育は不良である。

性は前項の場合と同様、男性が遙に多い。6 例中 4 例までが男性である。

児の予後は、他臓器の異常と密接な関係があるので、小囊胞の発生のみでは児の生命には大なる関係なきものと考えられる。それ故に、一見本症と無関係と思われる新生児をも、詳細に組織学的に観察するならば、尚多数の、小囊胞を有する例を発見し得るものと思う。

例 2. 産婦 〇〇〇 某 31 才 (10 月生) 4 回経産
家族史：父健在、母 39 才で肺炎にて死亡、良人 33 才、梅毒に罹患、ワ氏反応 (卅)，児 2 人健康。

既往症：幼時健康、初経 14 才秋、整、3 日間、30 日週期、中量、障害、(一)、来潮後著患なし、結婚 22 才 11 月、初産 23 才 8 月、妊娠・分娩・産褥正常 2 回目妊娠は卵巣囊腫の為 7 ヶ月にて流産した。終産は 29 才 10 月、妊娠・分娩・産褥正常。

今回の妊娠経過：最終月経、昭和 9 年 1 月 20 日より 3 日間正常にあり。悪阻症状を欠く。初発胎動 5 月中旬。

初診、昭和 9 年 8 月 28 日、子宮底 25 cm、臍上 1.5 指横徑にあり。児頭は骨盤入口上に於て移動し、児心

第 2 表

症例 番号	剖検 番号	氏 名	年令	経産	妊娠・分娩 中の異常	児の 性	身長 cm	体重 g	児の生存期間	剖 検 診 断
1	558		24	2.P.		♀	49.0	2,450	40分後死亡	両側腎杯拡張、腎皮質小囊胞変性、甲状腺の小囊胞変性、重複子宮、心室中隔欠損、横隔膜弛緩症、メッケル氏憩室
2	602		21	4.P.	先天梅毒児	♂	43.0	1,790	10時間後死亡	腎皮質小囊胞変性、肺、肝、脾、の梅毒性腫瘍、廻腸の潰瘍、腹膜炎
3	1222		35	6.P.	9ヶ月早産 羊水過多症	♀	45.0	2,160	1時間後死亡	左横隔膜ヘルニア、双角子宮、心室中隔欠損、肺動脈口狭窄、前庭肛門、腎皮質小囊胞変性。
4	1465		40	7.P.	妊娠9ヶ月・腎 臓炎・脳出血帝 王切開術	♂	43.0	1,510	4日目死亡	腎皮質小囊胞変性、胃の拡張、肺の沈下性肺血膀胱粘膜の溢血、胸腺発育不全。
5	1896		39	P.P.	鉗子分娩	♂	49.0	2,510	7日目死亡	頭蓋底出血、肺炎、右腎皮質小囊胞変性、メッケル氏憩室、胸腺の発育不全。
6	2493		24	4.P.	9ヶ月早産	♂	42.0	2,060	60日目死亡	腎皮質小囊胞変性、胸腺発育不全、左陰囊水腫、肢節関節白、肝臓脂肪変性（附図写真4参照）

首左下腹部に於て著明。母体心音に雑音を聴取せず。頭部リンパ腺の腫大もない。内診するに膣は驕軟、前腔円蓋に先進児頭を触れる。尿は酸性、混濁なく、蛋白は痕跡量。ワ氏反応を検査する強陽性で、マ氏反応も亦（++）。

再診、9月11日、子宮底剣状突起下3.5指横径、児心音左下腹部整調。下肢に異常はない。

再診、9月17日、子宮底臍と剣状突起の中央、児頭は骨盤入口に稍々固定、児心音左臍線線上に著明。再診、10月10日、3日程前より下腹部の緊張感を訴へ来院した。子宮底は寧ろ低下して臍上2指横径にあり、児頭は著しく下降して骨盤入口内にある。内診するに外子宮口は5cm開大、卵胞を触れる。直に入院をすゝめる。

入院、昭和9年10月10日午後2時45分、体格小、栄養中等、皮膚、瞳孔、眼結膜に異常なし。リンパ腺の腫張はない。心臓・肺臓に異常はない。脈搏整中、乳房中等大、乳腺の発育中等、腹部卵円形、腹囲78cm、中央線に軽度の色素沈着あり。妊娠線あり、浮腫なし、臍窩扁平、子宮底23cm、臍上2.5指横径、緊張中等、収縮亦中等、児頭骨盤入口に深く嵌入児心音右下腹部に整強、下肢に浮腫なし。血圧右130～70。

分娩経過：初発陣痛と思われるもの10月8日午後7時頃。10月10日午後0時30分陣痛間歇10分30秒、発作30秒、強度中等、児心音は12、11、11、整強。午後4時30分、間歇4分、発作45秒、強度中等、児心音12、12、12、整強、午後5時47分自然破水、間歇2分、発作55秒、強度中等、児心音12、12、12、整強。午後5時52分第2頭位で分娩した。後産娩出午後6時15分、分娩所要時間47時間15分、出血量150cc、臍長48cm×1.0cm、胎盤19×17cm重さ480g臍帯巻絡1回。

産褥経過：分娩後体温37.2℃産褥4日目に約40分間悪寒戦慄があつたが、発熱は37.2℃産褥5日目ワ氏反応（+++），村田（+），血液、赤血球470万白血球15000、血色素量72%，赤血球沈降速度120，131，143，白血球分類は桿状核15%，分葉65.5%，リンパ球15.5%，モノチーテン4%当日無事退院した。

児は♂、身長43cm、体重1,790g、頭囲30.5cm、胸囲27cm、肩囲28cm、腰囲25cm、臍帯血液のワ氏反応（++），村田（+），マイニッケ（++），分娩後異常なかつたが翌11日午前4時頃児の脈搏不良となり、顔面特に口唇のチアノーゼ著明で、午前4時32分に死亡した。（生後11時間20分）

児の剖検診断：

1. 梅毒性骨軟骨炎
2. 肺及肝臓に及ける膿瘍
3. 肝臓及び脾臓の肥大
4. 腎皮質の小囊胞変性
5. 廻腸の潰瘍
6. 腹膜炎

剖検経過：剖検着手、10月11日午後1時、体格小発育不良、皮膚は湿度正常、皮下脂肪及び筋肉の発育不良、屍斑不明、腹部は著しく膨隆、腹腔に少量の漿液性の腹水あり、大網膜萎縮、腹膜多少濁濁、腸管は相互に線維素性に癒着、腸間膜リンパ腺の腫張著明にして大なるものは小豆大、左右横隔膜の高さ第4肋骨に相当。

胸腔を開く。両側肋膜腔に異常なし。心嚢又異常なし。

胸腺、大さ4.0×2.6×0.4cm、型態尋常、重さ3.0g、多少浮腫状。

心臓、大さ尋常、重さ17.0g、心尖両側、心冠状静脈嚢血、両側の心房には凝血多量、心室内には豚脂様物あり。内膜異常なく、卵円孔僅に開存。

左肺、大さ5.2×6.4×1.7cm、型態正常、重さ23.

0 g, 灰紫色, 表面滑, 肺門リンパ腺は小, 剖面に粟粒大から小豆大の化膿☆あり, 又2~3個の浸潤部位もある。

右肺, 大さ 5.0×7.0×1.8 cm, 重さ 27.0 g, 所見左肺に同じ。

肝臓, 大さ 11.0×7.5×3.3 m, 型態尋常, 重さ 131.0 g, 紫褐色, 表面平滑, 表面に多少線維素状のものあり, 硬度増加, 剖面浮腫状で所々に黄色の化膿瘍あり。胆嚢, 甚しく腫脹して多量の淡黄色粘濁の内容を容る。

脾臓, 大さ 5.0×3.4×1.3 cm, 型態正常, 重さ 8.0 g, 被膜緊張して線維素性物あり。硬度増加, 脾材不明瞭, リンパ結節の腫脹著名。

左腎, 大さ 4.4×3.0×1.5 cm, 型態正常, 重さ 16.0 g, 硬度増加, 被膜の剝離は容易, 表面には多数の粟粒大の水泡状のものあり。剖面濁潤浮腫状, 皮髄の境明瞭, 腎盂, 尿管正常。

右腎, 大さ 4.2×2.6×1.9 cm, 型態正常, 重さ 14.0 g。

左副腎, 大さ 4.4×3.2×1.0 cm, 型態正常, 重さ 6.5 g, 剖面浮腫状, 脂肪質少なし。

右副腎, 大さ 3.6×2.8×1.0 cm, 重さ 6.0 g。

胃, 少量粘液にて粘膜被わる。

膵臓, 大さ 5.0×1.6×0.8 cm, 重さ 4.5 g。

小腸の長さ 180 cm, 虫垂 3.5 cm, 大腸 38.0 cm, 小腸に多数の小潰瘍あり。大腸内には尚胎糞あり。

睪丸, 膀胱, 頸部諸臓器正常。

甲状腺, 重さ 1.5 g。

脳髓, 重さ 251.0 g。

骨は境界不明瞭肥厚, 不整形。

先天性腎皮質小嚢胞変性例の総括

上記の通り解剖所見に明かな如く, 他臓器の奇形を合併することが甚だ多く, 而も腎盂・腎杯の拡張例群に合併したと同様の臓器に変化あるを知ることが出来る。即ち6例中, 2例に心室中隔の欠損を認め, 2例に重複子宮, 2例にメッセル氏憩室を認めた。

腎以外の主要臓器の所見を総括するに, 心筋に異常なく例5に於て心筋間の毛細血管の拡張充血を認めたのみである。肺は各例に於て甚しい差異があつて生後間もなく死亡した例3の如きは, 無気肺の所見が著明であつて, 生後生存期間の比較的長い第6例の如きは肺胞の拡張著明である。第5例は, 気管支肺炎の像を所々に認められた。

肝も所見大いに異り, 第3例に於ては造血像が極め

て著明であつた。しかし何れの例に於ても嚢胞の形成は認められなかつた。

脾は, 第6例に於てはリンパ節の像極めて大であるが, 第3例に於ては甚だ小である。

副腎の束状層の像極めて著明, 網状層は比較的薄く毛細管の鬱血も著明でない。

膵臓は皆比較的良好, 發育して島の發育も可良である。

胸腺の發育は例5, 例6に於ては不良で, 皮質と髓質の境界不明瞭, 髓質の發育極めて不良である。例3に於ては之に反して極めて可良で, 皮質, 髓質の境界明瞭, 髓質のハツサル氏小体は小ではあるが多数認められる。例6の睪丸, 副睪丸には異常所見がない。大脳・小脳は何れの例に於ても著変がない。消化管粘膜にも著変を認めなかつた。

腎所見は一般に皮質に散在性の嚢胞状の箇所を証明するものであつて, 第1例, 第2例, 第3例に於ては極めて少数に認められるので, 其の他の実質には殆んど出血, 浸潤などの所見を認むることができない。第4例と第6例は皮質の至る所に小嚢胞が形成されている。殆んど嚢胞は腎小体から形成されている。それ故に糸球体囊の著しく拡張したものの中にも, 糸球体を証明することができる。

而してこの拡張した糸球体囊の中にも, 上皮性細胞物或は血球様物, 線維素様物質等を証明し得るものもある。嚢胞状となつた糸球体の周囲にもまた多数の, 糸球体囊の多少拡張したものがあつて, 嚢胞を形成する前階梯の症状を思ひしめる所見がある。これ等のものの中には糸球体囊はさまで拡張していないが, その中に糸球体の變化したと思われる硝子体物質を証明し得るものもある。只単に糸球体のみでなく, 極めて稀ではあるが, 不正形な曲尿管の拡張したものと想像される。散子形の上皮で覆れた嚢状所見を認めることがある。また第5例は頭初は右腎皮質にのみ小嚢胞変性を呈したと思われた例であるが, 詳細に組織的に観察すると, 皮質の一部には小嚢胞が糸球体と尿管との区別なく広汎に網の目の如くひろがつて, 全く嚢胞腎の初期の所見を呈する部位のあることを発見した。而して本例の左側の健常と思われた皮質の中にも僅に嚢状を呈する所のあることを発見した。

以上の如く先天的に嚢胞を散在性に証明し得る例に於ても, この嚢胞が多発するならば, 結局, 嚢胞腎と全く同一の所見を呈するに至るものであることを知つた。即ち小嚢胞変性もその成因は結局嚢胞腎と同様の

ものであつて、只程度の差であることを知り得た
(附図写真 5~10 参照)。

マウスに発生した囊胞腎

妊娠尿を使用してツオンデック・アッシュハイム両氏反応を試る際に偶然にマウスの腎臓に囊胞腎を発生することがある。これ等の検査の際、同一条件で行つたマウスの内 1 匹のみが斯の如き変化を起したものであつて、これを更に追求することはできなかつた。また左右同様の变化を起すものでなく、一方は極めて大なる囊胞腎を形成しているのに、他方の腎は僅にその所見を呈するのみのものもある。

これ等の所見から、妊娠尿中に於ける、囊胞腎発生に関係ある物質の存在を疑はしめる。

然し同一妊娠尿を使用しても、必ずしも同一の囊胞腎を発生するものでない点、及び同一マウスの左右両腎の変化も、その所見が同一でない点等から、この推定を全面的に肯定することはできないが、少くとも妊娠尿が囊胞腎の発生に何等かの関係のあることは事実である。

このマウスの囊胞腎は著明な例、A.B.C. の 3 例を掲げた (附図写真 A.B.C. 参照)。

尚組織学的所見に於て糸球体には著明な変化は見られないが、髄質に於ける著明なる囊胞を認め、而もその所見が新生児に見る所見と同様である。

結 論

先天性腎臓水腫の 4 例の産婦の既往症、妊娠、分娩産褥を観察し、その発生の原因的関係を明かにするために、この 4 例の児の剖検並に組織的検索を行い、腎臓水腫が囊胞腎の発生に何等の関係を有しないことを確かめた。

先天性腎盂、腎杯の拡張を有する新生児 20 例について、前述同様、産婦の妊娠、分娩の経過を観察し、また病理解剖学的、組織学的検索を施し、この様な尿の鬱滞が囊胞腎を形成するや否やを検討した。その結果、腎盂、腎杯の拡張、尿の鬱滞が必ずしも囊胞腎を形成するのに非ざることを明かにした。

次に先天性腎皮質囊胞変性を有するもの 6 例に就ても詳細なる研究を試み、之等の例は、囊胞腎を形成する原因と殆んど同様なる原因によつて発生するものの如くで、その所見の高度のものは、肉眼的には囊胞腎

と見做し得ないが、組織学的には囊胞腎の初期の変化の如く思考せられた。

又マウスに見る腎の囊胞状変化よりして、妊娠尿の中に囊胞腎を形成する或種の物質の存在することを想像するに充分である。

稿を終るにあたり、本研究に終始御懇切なる御指導と御教聞を賜つた、恩師 三谷茂教授並びに本研究に対する御援助と御指導を賜つた、日赤本部産院々長 久慈直太郎博士に深甚なる感謝の意を捧げます。又病理解剖に御援助を頂いた 北村益博士、病理試験室技士 大山重元氏に併せて謝意を表します。

文 献

- 1) Virchow, R.: Virchows Arch. f. Path. Anat., **48**, 506 (1869)
- 2) 福島輝雄・柳沢 旭: 日赤医学, **9**, (5), 313 (1956)
- 3) 新田武雄: 日医大誌, **26**, (12), 1296 (1959)
- 4) Potter, E.L. & Thierstein, S.: J. Pediat., **22**, 695 (1943)
- 5) Kampmeier, O.F.: Surg. Gynec. & Obst., **36**, 208 (1923)
- 5') Mc Kenna, C.M. & Kampmeier, O.F.: Tr. Am. A. genito-urin. Surg., **26**, 373 (1933)
- 6) Hildebrand: Arch. Klin. chir., **40**, 343 (1896)
- 7) Busse: Virchows Arch. f. Path. Anat., **175**, 442 (1604)
- 8) 一本杉秀雄: 皮膚と泌尿, **15**, (3), 326 (1953)
- 9) 高橋恭平: 臨産婦, **8**, (9), 814 (1933)
- 10) Sieber: Deutsch. Zschr., **79**, 406 (1905)
- 11) 大道峰雄: 日本泌会誌, **24**, (6), 508 (1935)
- 12) Fish: J.A.M.A., **112**, 512-517 (1937)
- 13) 服部 保・水谷不二夫: グレンツチビート, **13**, (5), 539 (1939)
- 14) 矢野 澄: 皮膚科紀要, **41**, (5), 333 (1943)
- 15) Young: J. Urol., **55**, 323 (1947)
- 16) Mayers: J. Urol., **59**, 471 (1948)
- 17) 井上彦八郎: 臨床皮膚泌尿科, **4**, (2), 69 (1949)
- 18) Herbut: Urol Path., **1** (1952)
- 19) Longins, L.A. & Martin, L.W.: Pediatrics, **21**, 4, 596 (1958)
- 20) Bunting, C.H.: J. Exper., **8**, 270 (1906)
- 21) Campbell, M.F.: Pediatric urology, (New York): Macmillan Co., **1** (1937)
- 22) Campbell, M.F.: M. clin. North. Am., **31**, 659 (1947)
- 23) Frieddam, H.H., Grayzel, D.M. & Leder, M.: Am. J. Path., **18**, 699 (1942)
- 24) Norris, R.F. & Herman, L.: J. Urol., **46**, 147 (1941)
- 25) Roos, A.: Am. J. Dis. Child., **61**, 116 (1941)
- 26) Willstein, M.: Arch. Path., **3**, 1 (1927)
- 27) 前田義雄・山果貞造: 日赤医学, **9**, (3), 201 (1956)
- 28) 佐久間 一: 近畿婦人科学会誌, **10**, (1), 37 (1927)

水口論文附図(1)

写真1 肝 囊 腫

写真 2-A
腎 臓 水 腫 (例2. [redacted])

写真3 腎杯拡張 (例10. [redacted])

写真4 腎臓皮質小囊胞変性

水口論文附図(2)

写真 5

写真 6

写真 7

写真 8

写真 9

写真 10

水口論文附图(3)

写真 A-1

写真 A-2

写真 B-1

写真 B-2

写真 C-1

写真 C-2