上肢静脈管の年令的变化

日本医科大学解剖学教室 (指導 金子丑之助教授)

佐 伯 梧 郎

Goro Saheki

緒 言

動脈管の計測並びに年令の変化に関する研究は、内外多数の学者により行われているが、静脈管特に四肢静脈管の計測または組織学的研究は著者の寡聞のため欧米においても余り多く見られない。本邦では山下¹⁾が上肢の皮静脈 16 部位、深静脈 62 部位にわたり系統的に静脈管周囲径及び厚径を測定して左右、性別、年令との関係を詳細に報告しているが、組織学的な面にはふれていない。渡辺^{2)~9)}、西丸、西田¹⁰⁾、山本¹¹⁾、石田¹²⁾、藤田¹³⁾の静脈壁弾性線維、格子線維、筋量など組織学的研究がみられるが、多数部位にわたり、しかも多数例の年令的变化の追求はなされていない。

ここにおいて著者は、皮静脈 18 個所 (18 部位) 深静脈 20 個所 (40 部位) について内径、壁厚、内・中・外膜 3 層の厚径を計測すると共に、各層の組織学的変化を追求し、先人の研究と比較してやゝ見るべき結果を得たので、こゝに報告し御批判を乞うことにする。

なお、静脈管各部の名称は恩師金子教授の日本人体解剖学による。

I. 研究資料及び研究方法

本研究に使用した資料は、当教室において一定条件下に貯蔵された 19 才より 76 才までの本邦成人屍 45 体 (男 35, 女 10) である。人生期別分類を表 1 に掲げる。

表 1. 研究資料の性別人生期別分布

人生期別 性別	青年期	第一成熟期	第二成熟期	第三成熟期	第四成熟期	第一老年期	第二老年期	合計
男	1	12	5	5	4	4	4	35
女	0	0	1	2	2	1	4	10
計	1	12	6	7	6	5	8	45

死亡診断書により、死因を分類すると、肺結核 9, 心臓疾患 7, 薬物中毒 4, 脳出血 3, 軽死 4, 溺死 5, 気管支肺炎 2, 縊死 3, 胃癌 1, 脳軟化 1, 死因不明 6 である。

資料採取にあたり、静脈は動脈に比し破損しやすいため充分な注意を払い、かつ肉眼上病的変化及び損傷

なきものを剪刀をもつて皮下 18 個所、深部 20 個所、計 38 個所 58 部位において血管走行に対し直角に 3~8mm の長さに環状に切り取り、直ちに 10% ホルマリン液中に 24 時間固定後、24 時間水洗漸強アルコールで脱水、セロイジン包埋を行い 15 μ 切片を作り、ヘマトキシリン、エオジン及びワイゲルト弾性線維染色を施し、かつ無染色標本を補助とした。計測は小血管及び比較的円形に近い静脈はマイクロメーターを用いて内径・壁厚 (内・中・外膜) を計測し、不正形及び比較的大なる血管は引延器により拡大投影後、キルビメーターにより内周囲径を計り換算し、厚計はマイクロメーターにより計測、同時に組織学的微細構造を併せ観察した。各例の集計にあたり、男子の計測値を主とし女子は男子値の下段に併記し参考にするに止めた。しかし組織学的な観察については男女を通じて述べることにする。なお皮下及び深部に分けて記載すべきであるが、今回は両者を併せ抜粋して記載した。

II. 成 績

A. 上肢静脈管内径の計測

1. 内径の平均値

直径の計測にあたり静脈管においては外膜の破損が生じやすく、反之内膜の変化少きため、一方の内膜内縁より対側内膜内縁にいたる内径数個所の平均値をもつてその部位の値とした (大静脈及び不正形の静脈は内周より換算)。日本人上肢皮下及び深静脈内径の平均値及び最大、最小値を表 2 に掲げる。この表により、上肢静脈管の内径は男女両性を通じ皮下深部共 1~2 の例外を除き、末梢より中心に進むにしたがい増大する傾向があり、山下の報告とよく一致している。

2. 年令と上肢静脈管内径との関係

人生期別上肢静脈管内径の平均値を表 3 に掲げる。本表によれば今井¹⁴⁾、田所の報告せる動脈管のその如き確然たる年令的關係を認め得ず。また山下の深静脈は不明なるも皮静脈の周径は 50 才頃まで漸増し以後減ずる傾向にあるとの報告と比較し、著者の数値は一部同様なも全体的には明らかでなく、むしろ深静脈において年令と共に増大する傾向にあるように思わ

表 2. 上肢静脈管の内径・壁厚・厚度率の平均値

上段 ♂ 下段 () ♀

No.	静 脉 名	計 測 部 位	N	内 径 (μ)		壁 厚 (μ)		厚度率
				M	最大値～最小値	M	最大値～最小値	M
1	橈 側 皮 静 脉 (I)	腋窩静脈には いる前 1 cm	31 (7)	1,640.71 (1,786.70)	1,990.34- 663.70 (2,082.76- 154.41)	156.65 (140.71)	302.13- 32.00 (134.40- 60.80)	9.54 (7.87)
2	" (III)	外側上顆の上 3 cm	31 (6)	1,635.63 (1,770.45)	2,156.20- 280.00 (2,669.92-1,031.27)	248.58 (227.11)	430.11- 93.60 (435.32-110.81)	15.19 (12.83)
3	" (IV)	外側上顆の下 3 cm	30 (5)	1,714.41 (1,896.94)	3,673.77- 370.14 (3,216.40-1,372.68)	272.31 (200.14)	554.05-128.00 (237.45- 96.00)	15.09 (16.90)
4	" (VI)	橈骨茎状突起 の上 1 cm	30 (5)	1,331.54 (1,100.99)	2,969.99- 191.47 (1,832.15- 164.33)	278.21 (307.10)	474.90-128.00 (379.92-237.45)	20.89 (26.88)
5	尺 側 皮 静 脉 (I)	上腕静脈には いる前 1 cm	30 (6)	2,162.26 (2,154.80)	4,363.94- 346.85 (3,197.58-1,291.10)	221.71 (228.81)	403.04- 98.52 (324.70- 67.20)	10.25 (10.60)
6	" (II)	上腕筋膜を入 る所	31 (8)	2,366.82 (2,669.32)	5,650.40- 564.56 (4,845.49-1,732.13)	251.16 (237.62)	483.00- 89.60 (306.20- 96.40)	11.03 (8.90)
7	" (III)	外側上顆の下 3 cm	23 (8)	1,778.25 (1,833.98)	3,236.08- 187.14 (6,610.61- 672.12)	272.41 (207.81)	348.96- 80.00 (316.60- 63.60)	15.31 (11.33)
8	" (V)	尺骨茎状突起 の上 1 cm	24 (6)	1,438.82 (666.46)	4,292.25- 417.43 (1,460.80- 166.05)	225.25 (161.20)	395.75- 64.00 (205.79- 94.98)	15.66 (24.18)
9	肘 正 中 皮 静 脉	中 央 部	32 (8)	1,829.62 (2,663.56)	4,416.27- 501.01 (4,482.59- 249.63)	234.96 (271.83)	474.90- 82.69 (362.25- 80.00)	12.84 (10.17)
10	前 腕 正 中 皮 静 脉	中 央 部	28 (5)	1,068.89 (1,022.08)	3,122.54- 182.82 (1,814.01- 295.03)	222.78 (168.57)	443.24- 73.60 (237.45- 70.40)	20.84 (16.48)
11	背 側 中 手 静 脉	(12)との接続 する中央部	24 (5)	928.42 (852.48)	2,338.32- 323.04 (1,329.92- 229.51)	204.89 (186.79)	365.09- 96.00 (237.45-126.64)	22.89 (21.91)
12	固有背側指静脈	(II～III) 一 節の中央部	20 (4)	709.59 (497.11)	1,240.78- 200.73 (863.89- 214.46)	163.10 (133.38)	262.38- 64.00 (237.45- 60.80)	23.67 (26.83)
13	上腕動脈伴行静脈 (上)	腋窩静脈 にはいる 前 1 cm	28 (5)	4,447.16 (3,867.28)	8,973.39-1,944.47 (5,726.83- 891.32)	200.47 (145.61)	395.75- 80.00 (204.47- 83.20)	4.53 (3.77)
14	" (上)	"	16 (0)	2,451.13	4,642.95-1,480.32	181.32	237.45-110.81	9.69
15	" (下)	尺桡合流 部より 1 cm 上	29 (4)	2,282.79 (2,008.16)	4,341.05- 375.89 (3,619.62- 283.53)	161.95 (96.04)	237.45- 79.15 (110.81- 79.15)	7.09 (4.74)
16	" (下)	"	14 (0)	2,231.95	3,468.89- 259.13	148.07	256.48- 70.10	7.46
17	上腕深動脈伴行静脈	上腕静脈 に入る前 1 cm	22 (4)	2,382.78 (1,751.13)	4,730.85- 610.71 (2,612.45- 662.44)	114.01 (51.58)	221.62- 35.20 (63.32- 47.49)	4.82 (3.02)
18	"	"	15 (1)	2,098.98 (491.03)	5,002.49-1,215.68 (491.03)	76.66 (47.49)	139.35- 38.40 (47.49)	3.64 (9.67)
19	橈骨動脈伴行静脈 (上)	上腕静脈 にはいる 前 1 cm	27 (5)	1,191.36 (1,321.79)	2,258.45- 183.59 (2,146.12- 463.33)	143.90 (138.47)	301.62- 35.20 (270.11- 70.40)	12.07 (10.47)
20	" (上)	"	17 (1)	901.26 (773.54)	1,532.58- 273.51 (773.54)	105.68 (73.60)	158.30- 44.20 (73.60)	11.47 (10.50)
21	" (下)	起始部より 1 cm 上	27 (5)	787.75 (883.29)	1,672.64- 218.54 (1,845.15- 535.70)	108.86 (76.16)	332.43- 32.00 (112.00- 41.60)	13.82 (8.62)

22	" (下)	" B 幹	19 (3)	837.86 (662.06)	2,280.13- 168.38 (1,088.94- 345.44)	96.03 (63.40)	189.96- 32.00 (81.20- 35.20)	10.27 (9.57)
23	尺骨動脈伴行静脈 (上)	上腕静脈 にほいる 前 1cm A "	27 (4)	1,696.94 (1,933.39)	3,151.28- 590.25 (2,743.02-1,223.54)	141.92 (82.61)	284.94- 41.60 (150.40- 41.60)	8.36 (4.27)
24	" (上)	" B "	17 (2)	794.94 (720.16)	1,559.20- 190.35 (980.85- 459.47)	110.92 (73.60)	221.62- 57.60 (105.60- 41.60)	13.95 (10.22)
25	" (下)	起始部よ り1cm上 A "	27 (4)	733.69 (538.58)	3,065.20- 191.47 (3,919.18- 433.56)	101.62 (61.10)	158.30- 48.00 (84.40- 51.21)	13.85 (11.32)
26	" (下)	" B "	18 (1)	550.24 (432.05)	944.80- 218.54 (432.05)	75.13 (64.00)	96.00- 44.20 (64.00)	13.65 (14.64)
27	琵琶間動脈伴行静脈	中央部 A "	23 (3)	756.05 (885.71)	1,251.68- 136.82 (1,883.87- 213.51)	81.00 (76.30)	189.96- 38.40 (92.80- 67.20)	10.71 (8.61)
28	"	" B "	19 (3)	551.31 (560.28)	961.80- 348.26 (783.43- 364.29)	87.10 (72.53)	142.48- 38.40 (89.60- 51.20)	15.79 (12.95)
29	浅 掌 静 脉 弓	" A "	23 (2)	435.95 (500.30)	738.80- 246.76 (726.84- 273.65)	87.67 (57.60)	158.30- 35.20 (67.20- 48.00)	20.11 (11.51)
30	"	" B "	17 (2)	306.56 (514.02)	465.22- 162.64 (734.43- 293.61)	61.52 (52.00)	126.64- 28.80 (57.60- 46.40)	20.06 (10.11)
31	深 掌 静 脉 弓	中央部 A "	21 (3)	455.56 (405.71)	717.34- 192.98 (604.67- 252.50)	123.39 (107.00)	189.96- 64.00 (205.79- 35.20)	27.08 (26.31)
32	"	" B "	13 (1)	318.14 (548.61)	498.09- 168.17 (548.61)	112.80 (158.30)	144.00- 51.20 (158.30)	35.45 (28.81)
33	総 掌 指 静 脉	(Ⅱ~Ⅲ) A 中央部 "	16 (3)	268.64 (275.39)	766.29- 100.77 (494.06- 63.32)	64.98 (57.60)	96.00- 38.23 (96.00- 25.60)	24.19 (20.92)
34	"	" B "	15 (2)	157.84 (177.76)	273.60- 92.16 (194.29- 161.22)	46.82 (51.20)	84.80- 25.60 (86.40- 16.00)	29.03 (28.80)
35	固有掌側指静脈	(Ⅲ)第一 節桡側中 央 A "	17 (2)	204.30 (213.19)	509.89- 61.91 (252.09- 174.28)	44.79 (49.60)	110.81- 19.20 (63.40- 35.80)	21.93 (23.26)
36	"	" B "	17 (1)	183.31 (158.86)	721.32- 60.05 (158.86)	41.39 (19.20)	84.20- 25.60 (19.20)	22.57 (12.06)

表3. 上肢静脈管の人生期別内径の平均値(♂)

No.	静 脉 名	青 年 期		第一成熟期		第二成熟期		第三成熟期		第四成熟期		第一老年期		第二老年期	
		N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M
1	桡側皮静脈(I)	1	1,430.97	9	1,615.87	5	1,880.06	4	1,852.73	4	1,681.08	4	1,637.21	4	1,586.63
2	"(Ⅲ)	1	1,192.32	9	1,622.56	4	1,762.56	4	1,700.64	4	1,807.34	4	1,705.59	4	1,653.25
3	"(Ⅳ)	1	903.01	9	1,615.19	4	1,532.04	4	1,541.21	4	1,993.51	4	1,749.46	4	2,184.54
4	"(Ⅵ)	1	1,206.91	9	950.24	4	1,187.88	5	1,034.01	3	1,361.92	4	867.49	4	1,877.47
5	尺側皮静脈(I)	1	2,162.76	9	1,901.85	5	2,471.04	5	1,997.79	3	2,309.50	4	2,432.68	3	2,528.50
6	"(Ⅱ)	1	1,653.08	9	1,807.56	5	2,657.82	5	2,263.48	4	3,594.08	4	2,023.40	3	2,775.31
7	"(Ⅲ)	1	806.62	6	1,986.02	3	1,940.35	5	1,800.49	2	1,728.82	2	1,683.25	4	1,657.29
8	"(Ⅴ)	1	1,216.49	5	1,445.51	4	941.30	4	1,999.57	2	1,347.42	4	1,024.72	4	1,882.01
9	肘正中皮静脈	1	1,050.73	9	1,645.42	5	2,054.92	5	1,919.74	4	1,749.29	4	1,323.75	4	2,223.87
10	前腕正中皮静脈	1	1,068.89	9	949.00	4	1,425.75	4	1,405.41	2	837.44	4	797.29	4	1,032.74
11	背側中手静脈	1	916.08	6	1,088.52	4	689.41	3	949.55	4	826.44	4	934.59	2	1,098.42
12	固有背側指静脈	1	483.98	6	620.27	4	681.54	3	660.29	2	767.73	2	866.21	2	890.89
13	上腕動脈伴行静脈(上)	1	4,918.89	8	4,617.91	5	4,531.75	5	3,472.67	3	3,334.83	4	6,054.83	2	4,206.74

14	"	(上)	1	2,130.13	6	2,289.32	4	2,693.82	1	2,082.57	1	2,329.47	2	2,611.63	1	2,941.36
15	"	(下)	1	2,271.68	8	2,557.10	5	2,707.21	5	2,459.27	4	1,875.36	4	2,140.58	2	2,288.35
16	"	(下)	1	1,815.31	6	2,324.69	4	2,283.03	2	2,460.76	1	2,070.84	2	1,933.23	1	2,188.74
17	上腕深動脈 伴行 静脈		1	1,089.54	6	2,542.90	4	2,036.05	4	2,557.75	3	2,723.67	2	2,390.36	2	2,365.20
18	"		1	1,068.94	4	2,204.84	4	1,963.04	2	1,913.06	2	2,394.32	1	2,111.28	1	2,086.60
19	橈骨動脈伴行静脈(上)		1	693.03	7	915.27	3	1,301.55	5	1,513.21	3	871.45	4	1,174.49	4	1,347.84
20	"	(上)	1	677.28	5	969.46	2	1,199.63	3	956.78	2	761.89	2	772.00	2	856.26
21	"	(下)	1	518.54	7	820.94	3	603.66	5	638.44	3	1,188.89	4	674.62	4	1,009.02
22	"	(下)	1	501.83	6	717.59	3	1,061.37	3	605.60	3	1,392.84	2	735.19	1	804.41
23	尺骨動脈伴行静脈(上)		1	1,552.65	7	1,616.20	3	2,026.98	5	1,961.63	3	1,526.07	4	1,314.67	4	1,806.34
24	"	(上)	1	770.49	5	864.62	2	893.93	3	640.29	2	570.19	2	998.50	2	806.67
25	"	(下)	1	654.65	7	830.21	4	638.61	5	731.18	3	762.01	4	676.77	3	713.72
26	"	(下)	1	537.90	5	587.91	2	544.69	3	467.37	2	537.21	2	593.32	3	558.47
27	総骨間動脈 伴行 静脈		1	501.01	6	779.86	3	795.46	4	728.33	3	833.91	4	716.76	2	770.20
28	"		1	398.88	4	653.94	4	545.47	4	500.58	2	551.31	2	541.02	2	545.76
29	浅 掌 静 脉 弓		1	352.80	6	439.93	3	446.59	4	482.73	3	370.00	4	391.39	2	544.10
30	"		1	183.05	4	333.19	3	210.61	3	318.28	2	307.39	2	328.80	2	345.98
31	深 掌 静 脉 弓		1	512.34	6	455.42	3	491.95	4	381.07	2	399.89	3	506.67	2	500.96
32	"		1	300.87	4	280.65	2	295.30	2	311.79	1	305.80	2	408.11	1	376.15
33	総 掌 指 静 脉		1	200.57	4	278.24	2	382.35	3	189.57	2	325.89	2	237.28	2	262.47
34	"		1	134.73	4	211.79	2	107.00	2	163.40	2	125.00	2	133.62	2	163.84
35	固有 掌 側 指 静 脉		1	81.91	4	235.40	2	360.60	3	204.49	3	176.32	2	198.63	2	192.76
36	"		1	73.72	4	197.91	2	237.16	3	184.04	3	168.68	2	186.44	2	173.48

れる。

B. 上肢静脈管の壁厚の計測

1. 壁厚の平均値

各上肢静脈において 4~5 個所の壁厚を計測し、その平均値をもつて壁厚値とした。

之の全人生期平均値並に最大、最小値を表 2 に掲げる。先人の動脈における報告によれば概して直径に準じ、静脈における報告によれば、橈側皮静脈は上肢上端において最も薄く、周囲径の増大に逆行し、他はすべて平行すると述べている。著者の数値も之とほぼ同

様なるも、橈側皮静脈のみならず尺側皮静脈においても逆行している。

2. 年令と壁厚との関係

先人の報告によれば、動脈管の場合加齢と共に増加の傾向にあり、静脈管の場合、皮静脈においては確然たる年令の関係は認められず、深静脈において僅かにその傾向ありと。表 4 に示す如く皮静脈の結果はほぼ同様なるも、深静脈においては第四成熟期または第一老年期までは漸増し、第二老年期になると減少する傾向が見られた。

表 4. 上肢 静 脈 管 の 人 生 期 別 壁 厚 平 均 値 (δ)

No.	静 脈 名	青 年 期		第一成熟期		第二成熟期		第三成熟期		第四成熟期		第一老年期		第二老年期	
		N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M
1	橈 側 皮 静 脉 (I)	1	177.60	9	200.11	5	141.53	4	154.45	4	162.47	4	142.50	4	132.78
2	" (III)	1	234.94	9	277.37	4	217.66	4	232.76	4	238.51	4	237.59	4	240.03
3	" (IV)	1	254.25	9	269.78	4	281.39	4	288.90	4	261.72	4	217.61	4	290.50
4	" (VI)	1	264.09	9	277.47	4	253.28	5	332.16	4	259.85	4	247.94	4	289.49
5	尺 側 皮 静 脉 (I)	1	236.70	9	211.08	5	225.73	5	233.71	3	197.41	4	258.05	3	192.37
6	" (II)	1	253.24	9	225.89	5	256.13	5	284.42	4	234.86	4	310.37	3	188.28
7	" (III)	1	239.60	6	284.98	3	311.56	5	228.32	2	294.55	2	294.55	4	250.98
8	" (V)	1	226.60	5	241.62	4	226.49	4	191.70	2	207.65	4	219.48	4	251.39
9	肘 正 中 皮 静 脉	1	189.96	9	233.06	5	286.13	5	231.42	4	209.03	4	236.21	4	215.60
10	前 腕 正 中 皮 静 脉	1	250.60	9	244.96	4	228.19	4	216.76	2	209.27	4	198.50	4	216.01
11	背 側 中 手 静 脉	1	171.89	6	201.89	4	174.13	3	269.78	4	199.48	4	207.89	2	230.59
12	固有 背 側 指 静 脉	1	128.00	6	146.23	4	149.61	3	188.19	2	203.70	2	216.61	2	176.53
13	上腕動脈伴行静脈(上)	1	179.15	8	229.16	5	170.96	5	155.13	3	211.59	4	219.42	2	227.38
14	" (上)	1	161.23	6	206.24	4	153.86	1	139.62	1	199.43	2	197.48	1	204.64

15	"	(下)	1	137.60	8	173.14	5	145.64	5	163.56	4	175.96	4	170.54	2	175.96
16	"	(下)	1	124.98	5	132.84	4	115.18	3	192.12	1	208.99	2	145.50	1	190.77
17	上腕深動脈 伴行 静 脉		1	101.62	6	153.74	4	83.38	4	81.81	3	112.16	2	120.76	2	122.61
18	"		1	64.32	4	93.74	4	65.04	2	55.93	2	62.08	1	127.40	1	90.00
19	橈骨動脈伴行静脈(上)		1	114.13	7	128.14	3	120.27	5	148.58	3	159.97	4	168.91	4	141.29
20	"	(上)	1	102.13	5	102.69	2	88.64	3	124.30	2	88.20	2	127.15	2	90.04
21	"	(下)	1	96.00	7	91.93	3	137.68	5	129.39	3	84.82	4	125.67	4	98.13
22	"	(下)	1	76.00	6	85.60	3	84.82	3	109.42	3	83.70	2	122.68	1	82.00
23	尺骨動脈伴行静脈(上)		1	123.45	7	119.06	3	158.08	5	107.26	3	169.14	4	193.65	4	130.46
24	"	(上)	1	98.58	5	97.38	2	112.84	3	116.82	2	131.20	2	150.81	2	117.09
25	"	(下)	1	101.30	7	103.25	4	116.08	5	94.21	3	93.27	4	102.52	3	94.67
26	"	(下)	1	62.79	5	77.44	2	82.30	3	68.27	2	66.78	2	88.00	3	73.80
27	総骨間動脈 伴行 静 脉		1	90.90	6	75.27	3	79.40	4	100.21	3	69.33	4	85.30	2	66.10
28	"		1	72.47	4	91.50	4	81.85	4	94.75	2	85.93	2	88.40	2	88.27
29	浅 掌 静 脉 弓		1	67.20	6	87.32	3	73.85	4	97.18	3	75.82	4	100.25	2	75.84
30	"		1	49.18	4	74.42	3	64.48	3	46.93	2	53.16	2	67.08	2	62.14
31	深 掌 静 脉 弓		1	108.00	6	116.53	3	110.49	4	145.19	2	117.10	2	132.70	2	123.40
32	"		1	89.60	4	103.00	2	106.13	2	128.40	1	114.03	2	126.40	2	120.36
33	総 掌 指 静 脉		1	57.60	4	66.60	2	68.46	3	58.67	2	56.49	2	78.69	2	66.18
34	"		1	36.50	4	47.41	2	42.61	2	39.28	2	44.21	2	65.81	2	47.23
35	固有掌側指静脈		1	19.20	4	30.00	2	79.41	3	53.33	3	40.33	2	54.40	2	36.80
36	"		1	16.00	4	25.60	2	67.99	3	51.20	3	41.60	2	54.40	2	32.00

C. 上肢静脈管の厚度率

一致する。

1. 厚度率の平均値

2. 年齢と厚度率との関係

一部位における内径に対する厚度を知るために壁厚と内径との百分率をもつて厚度率を表し、比較観察を行った。表2に示す如く、皮静脈深静脈を通じ、末梢方において厚度率大にして、中心方に行くにしたがい厚度率小となる。之は動静脈を通じよく先人の報告と

各人生期別の厚度率を表5に掲げる。

動脈管におけるが如き逐年令的增加は見られず、第一老年期までは確然たる傾向はないが、第二老年期以後は幾分小となるように思われる。

表5. 上肢静脈管の人生期別厚度率の平均値(δ)

No.	静 脉 名	青 年 期		第一成熟期		第二成熟期		第三成熟期		第四成熟期		第一老年期		第二老年期	
		N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M
1	橈 側 皮 静 脉 (I)	1	12.41	9	12.38	5	7.53	4	8.34	4	9.66	4	8.71	4	8.37
2	" (III)	1	19.70	9	16.68	4	12.34	4	13.69	4	13.20	4	19.30	4	15.12
3	" (IV)	1	28.16	9	10.61	4	18.30	4	18.75	4	13.13	4	14.15	4	13.25
4	" (VI)	1	21.88	9	39.20	4	21.32	5	32.12	4	19.08	4	28.58	4	15.42
5	尺 側 皮 静 脉 (I)	1	10.94	9	11.10	5	9.14	5	11.70	3	7.70	4	10.61	3	7.61
6	" (II)	1	15.32	9	12.50	5	9.64	5	12.57	4	6.53	4	15.34	3	6.78
7	" (III)	1	29.70	6	14.35	3	16.06	5	12.13	2	17.04	2	17.50	4	15.14
8	" (V)	1	18.63	5	16.72	4	24.06	4	9.59	2	15.41	4	21.42	4	13.35
9	肘 正 中 皮 静 脉	1	18.08	9	14.16	5	13.44	5	12.05	4	11.95	4	17.84	4	9.69
10	前 腕 正 中 皮 静 脉	1	23.44	9	25.81	4	16.00	4	15.42	2	25.00	4	24.90	4	20.92
11	背 側 中 手 静 脉	1	18.76	6	18.55	4	25.26	3	28.37	4	24.11	4	22.24	2	20.99
12	固有背側指静脈	1	26.45	6	23.74	4	21.95	3	28.50	2	26.52	2	25.01	2	19.82
13	上腕動脈伴行静脈(上)	1	3.64	8	4.96	5	3.77	5	4.47	3	6.95	4	3.62	2	5.41
14	" (上)	1	7.57	6	9.01	4	5.71	1	6.70	1	8.56	2	7.56	1	6.96
15	" (下)	1	6.57	8	6.77	5	5.38	5	6.65	4	9.38	4	7.97	2	7.69
16	" (下)	1	6.88	5	5.71	4	5.05	3	7.81	1	10.09	2	7.53	1	8.72
17	上腕深動脈 伴行 静 脉	1	9.33	6	6.05	4	4.10	4	3.20	3	4.12	2	5.05	2	5.18
18	"	1	6.02	4	4.25	4	3.08	2	2.92	2	2.59	1	6.03	1	4.31
19	橈骨動脈伴行静脈(上)	1	16.48	7	14.00	3	9.24	5	10.48	3	18.36	4	14.38	4	10.48

20	"	(上)	1	15.08	5	10.59	2	7.39	3	12.99	2	11.58	2	16.34	2	10.53
21	"	(下)	1	18.51	7	11.08	3	22.79	5	20.27	3	7.13	4	18.63	4	9.72
22	"	(下)	1	15.14	6	11.93	3	7.99	3	18.07	3	6.01	2	16.69	1	3.98
23	尺骨動脈伴行静脈(上)		1	7.94	7	7.37	3	7.80	5	5.46	3	11.08	4	14.73	4	9.24
24	"	(上)	1	12.74	5	11.26	2	12.34	3	18.12	2	23.01	2	15.10	2	14.52
25	"	(下)	1	15.47	7	12.44	4	18.18	5	12.88	3	12.24	4	15.15	3	13.27
26	"	(下)	1	11.67	5	13.17	2	15.11	3	14.61	2	12.24	2	14.83	3	13.21
27	総骨間動脈 伴行 静脈		1	18.16	6	9.65	3	9.98	4	13.76	3	8.31	4	11.90	2	8.58
28	"		1	18.17	4	13.99	4	15.01	4	18.93	2	15.59	2	16.34	2	16.17
29	浅 掌 静 脈 弓		1	19.05	6	19.85	3	16.31	4	20.13	3	20.49	4	25.61	2	13.94
30	"		1	26.87	4	22.43	3	30.66	3	17.74	2	17.29	2	20.40	2	17.96
31	深 掌 静 脈 弓		1	21.08	6	25.81	3	22.46	4	38.10	2	29.28	2	26.39	2	24.63
32	"		1	29.78	4	36.70	2	35.94	2	41.18	1	37.29	2	30.97	2	32.00
33	総 掌 指 静 脈		1	28.72	4	23.94	2	17.90	3	30.95	2	17.33	2	33.12	2	25.21
34	"		1	27.09	4	22.86	2	39.82	2	24.04	2	35.37	2	49.25	2	28.83
35	固有掌側指静脈		1	23.44	4	12.75	2	20.36	3	26.03	3	24.00	2	27.39	2	19.09
36	"		1	21.70	4	12.88	2	28.67	3	27.82	3	24.66	2	28.64	2	18.45

D. 上肢静脈管の年齢別左右比較

今井の報告によれば、動脈管の直径は上腕、前腕ともに右>左であり、手指になると左>右の場合も可成り現われると述べている。山下によれば、静脈管の直径及び壁厚は皮下深部共一定の意義ある側別差を認めると、個体別にはある程度の相違が認められると報

告している。著者は 20 例について左右各部の比較計測を行つた結果、部位別・個体別には側別差を認めたが、全体的には有意性の側別差は認められない。たゞ厚度率のみは左>右のものが非常に多数例に認められた。実側値の一部を抜粋して表 6 に掲げる。

表 6. 上肢静脈管の年齢別左右比較抜粋 上段 右
下段 左

部位	年 令	性 別	内 径	壁 厚	内 膜	中膜及び筋線維数	外 膜	厚 度 率		
橈側皮静脈(三角筋膜に入る所)	28 才	♂	2,048.89	126.64	4.80	57.60	8~9	70.40	6.18	
			1,664.97	187.60	11.60	64.00	7~8	112.00	11.69	
	40 才	♂	2,164.32	164.80	4.80	60.80	8~9	99.20	8.61	
			1,552.24	188.79	6.40	70.40	9~10	112.00	12.16	
	50 才	♂	1,911.91	78.60	4.80	19.20	6~7	54.4	4.11	
			1,803.70	189.96	8.00	80.00	9	96.00	10.47	
	60 才	♂	832.54	179.20	3.20	48.00	9	128.00	21.52	
			560.30	158.30	9.60	55.40	6~7	112.00	26.47	
	71 才	♂	2,465.47	236.28	3.20	57.60	9	76.00	9.54	
			1,846.56	76.80	3.20	32.00	8	44.80	4.16	
76 才	♀	2,818.58	126.64	4.80	38.40	8	112.00	4.49		
		2,326.10	118.40	3.20	51.20	6	64.00	5.09		
上腕動脈伴行	28 才	♂	A	2,410.80	73.30	3.20	28.80	5	38.40	3.04
			B	1,355.23	126.64	3.20	44.40	4~5	63.32	9.37
			A	2,905.87	110.81	3.20	32.00	8	63.32	3.81
			B	2,377.53	94.98	3.20	31.00	7	63.32	3.99
	30 才	♂	A	3,283.97	174.11	7.90	71.23	6	94.98	5.30
			A	4,188.41	174.13	15.83	47.49	10	110.81	4.16
	40 才	♂	A	3,468.89	64.00	3.20	28.80	7	35.20	1.85
			B	2,295.17	79.15	3.20	31.66	6~7	39.20	3.45
			A	3,587.68	94.98	3.20	35.20	8	51.20	2.65
			B	763.27	110.81	7.90	47.49	10	55.40	14.52

静脈 (中央部)	50 才 ♂	A	3,787.10	205.79	8.00	79.15	10	96.00	5.43
		A	1,273.98	183.15	3.20	70.40	7~8	112.00	14.38
	60 才 ♂	A	4,505.96	143.00	3.20	55.40	10	84.40	3.64
		B	1,692.36	44.80	3.20	19.20	7~8	22.40	2.06
	76 才 ♀	A	5,958.94	174.13	7.90	79.15	8	87.06	2.92
		A	3,974.52	80.00	3.20	22.40	7	54.40	2.01
		A	2,713.48	112.00	3.20	44.80	6	64.00	4.13
		B	3,471.01	105.20	3.20	32.00	6	70.40	3.04

E. 橈尺両伴行静脈の形態的比較

静脈管は各々細枝を合流してその太さを増加するが、一見同様に考えられる橈・尺両伴行静脈の動脈管に伴行する枝の数の異なるを認め、分類して報告する。

表7に示す如く、尺側の方が橈側に比べ、性別・側別及び年齢の別なくはるかに伴行する枝数が多くその理由は不明なるも興味あると思われる。

表7. 橈、尺両伴行静脈の形態的比較

部 位	本 数	2本のもの	3本のもの	4本のもの	計
橈骨動脈伴行静脈 (中央部)		31	3	0	34
尺骨動脈伴行静脈 (中央部)		16	8	3	27

部 位	本 数	年 令	性 別	左 右 別
橈骨動脈伴行静脈 (中央部)	2本のもの	省 略		
	3本のもの	26才	♂左,	30才 ♂左, 40才 ♂左
尺骨動脈伴行静脈 (中央部)	2本のもの	省 略		
	3本のもの	25才 ♂右, 60才 ♂右,	27才 ♂右, 61才 ♂右,	28才 ♂右, 49才 ♂右, 61才 ♂左, 62才 ♂右,
	4本のもの	24才 ♂右,	28才 ♂左,	30才 ♂右,

F. 上肢静脈管内・中・外膜壁厚の計測

静脈は動脈同様3層よりなるも、一般に動脈に比し、壁は薄く、筋の発育も劣り、内膜は不規則な形状を呈する場合が少なくなく、3層の境界も動脈ほど明瞭でない。ゆえに計測にあたり、波状部分は最高、最低部の中間を基点として輪走筋の内縁までを内膜とし、それより輪走筋の外縁までを中膜とし、それ以後を外膜として数箇所を計測し、その平均値をもつてその静脈管各層の値とした。

1. 内膜、中膜および外膜の平均値

静脈管内・中・外膜計測の多数例による報告なきため

比較し得るも、上肢動脈に関する先人の報告によれば、内膜は加齢に伴い著しく肥厚し、しかも末梢部ほどその傾向が強いため中心方は外膜>内膜となり、末梢方は逆に内膜>外膜となる。中膜はその両者の和よりはるかに大であるが、静脈管においては表8に示す如く、全く之と異なり各値とも著明な変化は認められず、たゞ各層(特に皮下静脈内膜)において肘、腕関節部附近に値の増大を見る。なお中膜と外膜の比を見るに、

皮静脈においては、中心方約 1:2, 末梢方 2:3

深静脈においては、中心方約 1:2, 末梢方 1:1 となり、明らかな差を示している。

表8. 上肢静脈管の内、中、外膜壁厚の平均値 上段 ♂
下段 () ♀

No.	静 脈 名	N	内 膜		中 膜		外 膜	
			M	最大値~最小値	M	最大値~最小値	M	最大値~最小値
1	橈側皮静脈 (I)	31	3.76	6.40~3.20	58.58	121.60~12.80	94.31	174.13~16.20
		(7)	(4.34)	(9.60~3.20)	(54.94)	(57.60~22.40)	(81.43)	(67.20~35.20)
2	" (III)	31	17.16	39.57~3.20	75.79	189.96~25.60	155.63	322.00~41.60
		(6)	(13.90)	(23.74~3.20)	(70.87)	(94.98~28.80)	(142.34)	(316.60~76.80)

3	" (IV)	30	16.33	31.66~3.20	97.50	158.30~32.00	158.48	270.11~63.32
		(5)	(11.52)	(22.40~3.20)	(70.40)	(96.00~32.00)	(118.20)	(221.62~64.00)
4	" (VI)	30	12.89	25.60~3.20	95.21	158.30~32.00	170.11	300.77~84.00
		(5)	(18.53)	(25.60~3.20)	(87.04)	(128.00~32.00)	(201.53)	(270.11~142.47)
5	尺側皮靜脉 (I)	30	12.86	46.40~3.20	73.82	77.10~32.00	135.05	279.54~63.32
		(6)	(15.40)	(38.40~3.20)	(70.40)	(128.00~32.00)	(143.01)	(158.30~32.00)
6	" (II)	31	18.80	47.49~3.20	91.35	189.96~32.00	141.01	253.28~48.00
		(8)	(22.56)	(36.80~3.20)	(73.07)	(110.81~38.40)	(141.99)	(216.00~57.60)
7	" (III)	23	11.37	31.66~3.20	71.96	126.64~41.60	189.08	284.96~35.20
		(8)	(8.96)	(16.00~3.20)	(60.00)	(112.00~19.20)	(138.85)	(205.79~51.20)
8	" (V)	24	11.06	25.60~3.20	78.83	189.96~22.40	135.36	237.45~48.00
		(6)	(9.04)	(19.20~3.20)	(49.35)	(79.15~19.20)	(102.71)	(132.36~60.80)
9	肘正中皮靜脉	32	14.87	25.60~3.20	83.34	189.96~32.00	136.75	284.94~47.49
		(8)	(10.77)	(16.00~3.20)	(88.52)	(108.80~28.80)	(172.54)	(237.45~51.20)
10	前腕正中皮靜脉	28	7.63	15.83~3.20	65.90	189.96~19.20	149.25	237.45~48.00
		(5)	(6.08)	(12.80~3.20)	(35.76)	(48.00~9.60)	(126.73)	(184.65~57.60)
11	背側中手靜脉	24	9.49	23.70~3.20	89.74	174.13~23.74	108.66	221.62~51.20
		(5)	(13.76)	(22.40~3.20)	(60.68)	(96.00~22.40)	(112.34)	(174.13~71.23)
12	固有背側指靜脉	20	7.51	23.74~3.20	63.08	126.64~14.40	92.51	112.00~32.00
		(4)	(9.60)	(16.00~3.20)	(63.20)	(96.00~22.40)	(60.58)	(128.00~35.20)
13	上腕動脉伴行靜脉(上)	28	5.54	15.83~3.20	65.11	158.30~19.20	129.82	284.94~57.60
		(5)	(4.48)	(9.60~3.20)	(46.11)	(71.23~25.60)	(95.02)	(126.64~54.40)
14	" (上)	16	8.00	12.80~3.20	57.60	96.00~32.00	115.72	128.65~64.00
		(0)						
15	" (下)	29	4.60	16.00~3.20	57.97	126.64~27.40	99.38	205.79~39.50
		(4)	(4.00)	(6.40~3.20)	(33.71)	(39.50~31.66)	(58.33)	(79.15~47.49)
16	" (下)	14	4.80	6.40~3.20	36.10	126.64~16.00	107.17	110.81~48.00
		(0)						
17	上腕深動脉伴行靜脉	22	4.33	16.00~3.20	41.52	79.15~16.00	68.16	142.47~16.00
		(4)	(3.20)	(15.83~3.20)	(20.67)	(55.40~16.00)	(27.71)	(31.66~22.40)
18	"	15	3.43	4.80~3.20	28.96	55.40~12.80	44.27	79.15~22.40
		(1)	(3.20)	(3.20)	(23.70)	(23.70)	(20.59)	(20.59)
19	橈骨動脉伴行靜脉(上)	27	6.06	16.00~3.20	53.21	110.81~12.80	84.63	174.13~19.20
		(5)	(6.37)	(15.83~3.20)	(57.97)	(126.00~25.60)	(74.13)	(142.47~32.00)
20	" (上)	17	4.80	9.60~3.20	42.41	79.15~16.00	58.47	126.64~25.00
		(1)	(3.20)	(3.20)	(32.00)	(32.00)	(38.40)	(38.40)
21	" (下)	27	5.70	15.83~3.20	50.39	158.30~12.80	52.77	189.96~16.00
		(5)	(4.16)	(6.40~3.20)	(32.44)	(48.00~16.00)	(39.56)	(64.00~22.40)

22	" (下)	19	6.13	15.83~3.20	42.42	126.64~12.80	47.48	84.40~16.00
		(3)	(3.20)	(3.20)	(20.88)	(24.00~16.00)	(39.32)	(54.00~19.20)
23	尺骨動脈伴行静脈(上)	27	6.56	15.83~3.20	53.71	126.64~12.80	81.65	189.96~25.60
		(4)	(4.00)	(6.40)~3.20)	(27.20)	(48.00~12.80)	(51.41)	(96.00~25.60)
24	" (上)	17	4.98	9.60~3.20	36.35	80.00~12.80	69.59	142.45~25.60
		(2)	(3.20)	(3.20)	(14.40)	(16.00~12.80)	(56.00)	(86.40~25.60)
25	" (下)	27	4.07	9.60~3.20	42.59	89.00~19.20	54.96	110.81~15.83
		(4)	(4.00)	(6.40)~3.20)	(24.55)	(38.40~28.81)	(32.55)	(41.60~19.20)
26	" (下)	18	3.73	6.40~3.20	36.31	64.00~16.00	35.09	54.00~25.00
		(1)	(3.20)	(3.20)	(28.80)	(28.80)	(32.00)	(32.00)
27	総骨間動脈伴行静脈	23	4.44	9.60~3.20	28.97	63.32~12.80	47.59	142.47~22.40
		(3)	(4.20)	(9.60)~3.20)	(28.80)	(38.40~22.40)	(43.30)	(54.40~41.60)
28	"	19	4.57	6.40~3.20	26.90	47.49~12.80	55.63	96.00~22.40
		(3)	(5.33)	(6.40)~3.20)	(25.60)	(32.00~22.40)	(41.60)	(48.00~25.60)
29	浅 掌 静 脉 弓	23	3.41	6.40~3.20	29.90	63.32~16.00	54.27	104.07~16.00
		(2)	(3.20)	(3.20)	(24.80)	(32.00~17.60)	(29.60)	(32.00~27.20)
30	"	17	3.20	3.20~3.20	21.23	32.00~12.80	37.09	91.44~12.80
		(2)	(3.20)	(3.20~3.20)	(15.20)	(16.00~14.40)	(33.60)	(38.40~28.80)
31	深 掌 静 脉 弓	21	5.16	11.20~3.20	47.20	80.00~16.00	71.03	106.60~28.80
		(3)	(6.27)	(9.60)~3.20)	(33.60)	(64.00~16.00)	(67.13)	(135.59~19.20)
32	"	13	5.60	6.40~3.20	46.40	80.00~25.60	60.80	98.60~25.60
		(1)	(6.40)	(6.40)	(48.80)	(48.80)	(103.10)	(103.10)
33	総 掌 指 静 脉	16	3.42	4.80~3.20	31.43	48.00~19.20	30.13	54.40~15.83
		(3)	(3.20)	(3.20)	(26.67)	(44.80~12.80)	(27.73)	(51.20~12.80)
34	"	15	3.43	4.80~3.20	22.36	38.40~12.00	21.03	41.60~12.80
		(2)	(3.20)	(3.20~3.20)	(24.00)	(41.60~6.40)	(24.00)	(41.60~6.40)
35	固有掌側指静脈	17	3.20	3.20~3.20	16.17	31.66~9.6	25.42	79.15~9.60
		(2)	(4.00)	(4.80~3.20)	(19.70)	(26.60~12.80)	(25.90)	(32.00~19.80)
36	"	17	3.20	3.20~3.20	17.26	25.60~12.80	20.93	55.40~12.80
		(1)	(3.20)	(3.20)	(6.40)	(6.40)	(9.60)	(9.60)

2. 年齢と内・中・外膜各層壁厚との関係

この関係を知るため、人生期別に抜粋せる主要静脈の平均値を表9に掲げる。内膜において一部動脈同様の傾向あるものを認めるも、全体としては著しい差異を認め得ない。中膜においては第四成熟期又は第一老年期まで漸増し、第二老年期にいたりて幾分減少する傾向があるように思われる。外膜においても中膜ほどではないが同様な傾向が認められる。

以上の事より静脈管の基礎は中膜なりと思考する。

iv. 上肢静脈管の組織学的構造

内膜は単層扁平上皮の内皮及び内皮下結合組織の薄層よりなり、まれに内縦走筋及び点状の縦走弾性線維及び、ラセン状の輪走弾性線維（以下弾性線維を EF と記す）を認め内弾性板は一部不完全ながらも認められる。中膜は主として輪走平滑筋よりなり（一部斜走）動脈に比較すれば発育はやゝ不良なるも皮静脈にいたりては、或程度良好である。筋線維間に主として縦走する EF を認める。外膜は主として結合組織よりな

表 9. 上肢静脈管の人生期別内・中・外膜各層壁厚の平均値(μ)

層別	No.	静 脉 名	青 年 期		第一成熟期		第二成熟期		第三成熟期		第四成熟期		第一老年期		第二老年期	
			N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M	N	M
内	1	橈側皮静脈(I)	1	3.20	9	3.37	5	3.20	4	4.60	4	3.62	4	4.28	4	4.28
	3	橈側皮静脈(IV)	1	15.83	9	16.54	4	18.25	4	14.40	4	17.68	4	12.92	4	18.06
	5	尺側皮静脈(I)	1	12.80	9	11.30	5	7.60	5	21.56	3	8.53	4	17.55	3	9.92
	7	尺側皮静脈(III)	1	12.80	6	10.11	3	20.15	5	6.56	2	10.49	2	12.89	4	12.04
	9	肘正中皮静脈	1	7.91	9	18.61	5	14.01	5	12.80	4	14.92	2	12.64	4	14.07
	11	背側中手静脈	1	8.00	6	10.83	4	10.80	3	11.68	4	7.15	4	9.49	2	12.66
	12	固有背側指静脈	1	3.20	6	5.36	4	6.95	3	7.73	2	7.76	2	8.56	2	15.62
	13	上腕動脈伴行静脈(上)	1	3.20	8	6.58	5	4.48	5	5.73	3	4.77	4	7.15	2	7.57
	17	上腕深動脈伴行静脈	1	3.20	6	5.57	4	3.20	4	3.20	3	3.20	2	4.80	2	5.37
	19	橈骨動脈伴行静脈(上)	1	6.40	7	3.20	3	5.34	5	4.52	3	7.47	4	11.03	4	6.61
	23	尺骨動脈伴行静脈(上)	1	12.80	7	6.59	3	4.27	5	4.96	3	4.80	4	10.44	4	6.10
	27	総骨間動脈伴行静脈	1	6.40	6	3.88	3	3.20	4	6.58	3	2.68	4	4.62	2	3.50
膜	29	浅掌静脈弓	1	3.20	6	3.32	3	3.20	4	6.40	3	3.27	4	4.16	2	3.30
	31	深掌静脈弓	1	3.20	6	4.51	3	4.12	4	5.78	2	8.18	2	5.78	2	4.76
	35	固有掌側指静脈	1	3.20	4	3.20	3	3.20	3	3.20	3	3.20	2	3.20	2	3.20
中	1	橈側皮静脈(I)	1	70.00	9	62.09	5	40.51	4	42.13	4	83.51	4	64.49	4	55.44
	3	橈側皮静脈(IV)	1	118.47	9	90.28	4	93.63	4	94.00	4	93.38	4	96.30	4	113.57
	5	尺側皮静脈(I)	1	69.40	9	78.28	5	54.92	5	87.26	3	97.60	4	79.02	3	68.65
	7	尺側皮静脈(III)	1	79.15	6	68.99	3	65.79	5	65.51	2	83.98	2	73.47	4	75.56
	9	肘正中皮静脈	1	61.24	9	78.87	5	86.58	5	87.45	4	84.82	2	108.99	4	76.77
	11	背側中手静脈	1	88.51	6	97.63	4	96.54	3	96.54	4	68.84	4	90.05	2	84.45
	12	固有背側指静脈	1	52.00	6	52.78	4	59.94	3	85.26	2	63.90	2	71.12	2	79.03
	13	上腕動脈伴行静脈(上)	1	32.40	8	76.24	5	46.62	5	48.30	3	89.15	4	72.15	2	75.05
	17	上腕深動脈伴行静脈	1	47.15	6	47.56	4	28.63	4	32.25	3	42.38	2	54.60	2	51.16
	19	橈骨動脈伴行静脈(上)	1	40.00	7	50.00	3	39.47	5	56.59	3	47.55	4	64.42	4	51.24
	23	尺骨動脈伴行静脈(上)	1	40.00	7	46.91	3	47.60	5	45.34	3	49.85	4	78.51	4	52.15
	27	総骨間動脈伴行静脈	1	33.32	6	24.59	3	20.47	4	44.72	3	21.85	4	32.09	2	25.68
	29	浅掌静脈弓	1	32.00	6	28.86	3	25.49	4	37.43	3	25.88	4	30.49	2	29.40
膜	31	深掌静脈弓	1	40.00	6	43.20	3	42.23	4	54.40	2	45.60	2	48.60	2	46.20
	35	固有掌側指静脈	1	9.60	4	11.20	3	20.69	3	20.27	3	16.53	2	19.20	2	12.88
外	1	橈側皮静脈(I)	1	104.40	9	134.65	5	97.82	4	107.72	4	75.34	4	73.73	4	73.06
	3	橈側皮静脈(IV)	1	119.95	9	162.96	4	169.51	4	180.50	4	150.66	4	138.39	4	158.87
	5	尺側皮静脈(I)	1	154.50	9	121.50	5	163.21	5	124.89	3	91.28	4	161.48	3	113.80
	7	尺側皮静脈(III)	1	147.65	6	205.88	3	225.62	5	156.25	2	200.08	2	208.19	4	163.38
	9	肘正中皮静脈	1	120.81	9	135.58	5	185.54	5	131.17	4	109.29	2	114.58	4	124.76
	11	背側中手静脈	1	75.38	6	93.43	4	66.79	3	161.56	4	123.49	4	108.35	2	133.48
	12	固有背側指静脈	1	72.80	6	88.09	4	82.72	3	95.20	2	132.04	2	136.93	2	81.88
	13	上腕動脈伴行静脈(上)	1	143.55	8	146.34	5	119.86	5	101.10	3	117.67	4	140.12	2	144.76
	17	上腕深動脈伴行静脈	1	51.27	6	100.61	4	51.55	4	46.36	3	66.58	2	61.36	2	66.08
	19	橈骨動脈伴行静脈(上)	1	67.73	7	74.94	3	75.46	5	87.47	3	104.95	4	93.46	4	83.44
	23	尺骨動脈伴行静脈(上)	1	70.65	7	65.56	3	106.21	5	56.96	3	114.49	4	104.70	4	72.21
	27	総骨間動脈伴行静脈	1	51.18	6	46.80	3	55.73	4	48.91	3	44.80	4	48.59	2	36.52
	29	浅掌静脈弓	1	32.00	6	55.14	3	45.16	4	53.35	3	46.67	4	65.60	2	43.14
膜	31	深掌静脈弓	1	64.80	6	68.82	3	64.14	4	85.01	2	63.32	2	78.32	2	72.44
	35	固有掌側指静脈	1	6.40	4	15.60	2	55.52	3	29.86	3	20.60	2	32.00	2	20.72

り、縦走筋及び斜走傾向強き縦走筋と血管・神経及び輪走傾向強き EF を認める。(外弾性板は全く認め得ず) 以下上肢静脈の部位的、年令的变化を内・中・外膜の

順に全例中より抜粋、逐次記述することにする。記載にあたり次の略号を使用する。

a) 濃、淡は染色の度合を示し記載無きは中染

b) EF は弾性線維を表わし、EF の形状は線状、綿状、う状（ラセン状）、点状の4種とし、() 内の I II Ⅲはう状の大きさを表わし $I < II < III$ とする。

c) MF は筋線維を表わす。

d) LMF は縦走筋線維を表わす。

A. 内 膜

動脈に関する先人の研究によれば末梢ほど年令的变化（増殖、肥厚、硬変）を生じやすく、しかもその変化は逐年令的に、末梢部より中心部に向うことが知られている。著者も同様な変化をある程度期待しつつ観察を行つたが、確然たるものは認められなかつた。ただ肘、腕関節部（特に肘関節部皮下）附近において多数例の内縦走筋の出現を認めた。

1) 橈側皮静脈—上腕部

内皮細胞に沿つて發育の悪い内弾性板様のう状(I, II) EF を大多数に認める。中膜側密、まれに内皮下に細点状 EF あり、なお LMF は中心方には見当らないが末梢方にて 22才, 25才, 27才, 34才, 40才, 44才, 50才, 60才, 74才に現われる。年令的变化不著明。

3) 橈側皮静脈—前腕部

1) とほぼ同様なるも、内弾性板様 EF の外、内皮下に不規則点状の EF あり。中心方には 22才, 25才, 27才, 30才, 50才, 60才, 61才, 71才に LMF を認め、末梢方には認められない。年令的变化不著明。

5) 尺側皮静脈—上腕部

1), 3) より出現度は少ないが、う状(I まれに II) の内弾性板様 EF あり、60 才位までは不変であるが 70 才頃より幾分薄く弱くなるように思われる。なお 34才, 50才, 61才, 71才に LMF あり。

7) 尺側皮静脈—前腕部

内皮細胞に沿つて弱いう状(I まれに II) EF を 1 ~ 2 条、時として壁厚の大なる部分に疎なる不規則点状の EF あり、22才, 40才, 71才に LMF を認めた。年令的变化は 5) と同様なり。

12) 固有背側指静脈

内皮細胞に沿つて 33 才以外の各年令に濃う状(II) 一部にう状(Ⅲ) の EF あり、LMF 及び年令的变化不著明。

13) 上腕動脈に伴行静脈

内皮細胞に沿つて、線状、う状(I), 及び点状の EF を 46才, 50才, 60才, 74才に断続的に、他の年令に連続して認める。71 才に LMF あり、年令的变化不著明。

19) 橈骨動脈に伴行静脈

19 才では淡う状(I) の弱い EF あり。その他は 26才, 28才, 40才, 49才, 50才, 74才に断続しその他の年令に連続せるやゝ濃う状(Ⅲ) の EF を内弾性板様に認める。71才に LMF あり。年令的变化は不著明。

23) 尺骨動脈に伴行静脈

内皮細胞に沿つて 24才, 27才, 44才, 46才, 49才, 76才に点状、細い濃う状(I) の EF を、その他の年令に濃う状(I, II) の EF を連続して認める。40才, 60才に LMF を認めるも年令的变化は不著明。

29) 浅掌静脈弓

内皮細胞に沿つてやゝ濃染せるう状(I) 及び点状の EF を 24才, 28才, 50才, 60才, 71才, 72才に一部断続して、その他の年令にやゝ濃染せるう状(II, Ⅲ) の EF を連続して認める。LMF, 年令的变化ともに不著明。

(附) 深掌静脈弓の内膜は大部分収縮屈曲が強く一見肥厚のように見える。

35) 固有掌側指静脈

内皮細胞に沿つてやゝ濃染せるう状(I) の EF を 24才, 28才, 44才, 50才, 60才, 72才に認め、25才, 27才, 33才, 34才, 40才, 42才, 46才, 62才, 74才に細う状(I II まれに Ⅲ) の EF を連続して認めた。LMF, 年令的变化ともに不著明。

B. 中 膜

動脈に比較すれば薄弱なるも、中膜の主構成要素たる平滑筋線維及び弾性線維、結合組織線維よりなる、平滑筋は主として輪走す(約 2,000 例中、斜走傾向強いもの 57 例、走行不定のもの 5 例、縦走筋の混在せるもの 1 例、他は全部、輪走す)。個々の筋層の厚さは皮下静脈の方が大なるも、全壁厚との割合より見れば、深静脈の方が皮下静脈より筋量大である。また両者とも末梢ほど脉管の太さに比し筋量大となり、EF の量も之に比例するように思われる。これらの成績は先人の報告とよく一致するところである。EF も MF 間に淡う状(I) のものを主とし之に中染せる点状、線状、う状(I, II まれに Ⅲ) の EF あり。部位的に縦走傾向強く、これを柵状に僅少の輪走 EF が結ぶものと思われる。掌側中手、背側中手では輪走傾向強く、橈側皮、背側指では幾分輪走傾向が強いように思われる。年令的には EF は 30 才位までは質量共に増加、その後は量的変化は少ないが、中に配列の幾分不規則なるものあり。70 才位より質量ともに変化し、EF も幾

表 10. 年 令 別 上 肢 静 脉 管 中 膜 の 変 化

年 令	静脉名 組織	1) 桡 側 皮 静 脉 (I)			3) 桡 側 皮 静 脉 (IV)		
		筋 層	弾 性 線 維 及 び	密 度	筋 層	弾 性 線 維 及 び	密 度
19 才		4~5	点 状	中等, 平均	5	点状, 線状	中等平均
22 才		5~6	点 状	多 数	7~8	ヲ状(I~II), 点状, 線状	多 数
25 才		5~6	主として点状, 線状	比較的多	6	ヲ状(II~III), 点状	中 等
27 才		5	ヲ状(III), 不規則点状	中 等	6~7	ヲ状(I~II), 点状, 線状	比較的多
30 才		5	点状, 線状	幾 分 疎	6~7	ヲ状(I~II), 点状	中 等
34 才		5	ヲ状(I~II), 点状, 線状	中 等	8	ヲ状(II~III), 点状, 線状	比較的多
40 才		4	ヲ状(II), 点状, 線状	中等平均	6~7	ヲ状(I~II), 点状	中 等
42 才		6~7	ヲ状(II), 点状, 線状	中等平均	9~10	点 状	中等平均
46 才		5	ヲ状(I~II), 点状, 線状	中 等	7~8	点状, ヲ状(II~III)	比較的多
50 才		5~6	ヲ状(I~II), 点状, 不規則線状	中 等	5~6	ヲ状(I), 点状, 線状	中 等
56 才		5~6	ヲ状(I), 点状混在	中 等	8	主として点状+ヲ状(I)	中 等
60 才		4	主として点状	中 等	7~8	ヲ状(I), 点状, 線状	幾 分 疎
62 才		4	点状, 線状混在	中 等	4~5	ヲ状(I~II), 点状	幾 分 疎
71 才		5	主として線状+点状	疎	7	ヲ状(I), 点状	疎
74 才		3~4	ヲ状(I~II), 点状	疎	4~5	ヲ状(I), 点状	疎

(その2)

年 令	静脉名 組織	5) 尺 側 皮 静 脉 (I)			7) 尺 側 皮 静 脉 (III)		
		筋 層	弾 性 線 維 及 び	密 度	筋 層	弾 性 線 維 及 び	密 度
19 才		6	点状, ヲ状(I~II)	中等平均	6	点状, 細ヲ状(I)	中等平均
22 才		6	ヲ状(I~II)+点状	比較的多	6	点状, ヲ状(I~II), 線状	中 等
25 才		5~6	ヲ状(I), 点状	比較的多	6	ヲ状(I~II), 点状	比較的多
27 才		4~5	点状, ヲ状(I)	中等平均	6~7	ヲ状(I~II), 点状	比較的多
30 才		5~6	ヲ状(I), 点状	比較的多	5	ヲ状(I~II), 点状	中 等
34 才		6~7	ヲ状(II), 線状, 点状	比較的多	7~8	点状, ヲ状(I~II), 線状	多 数
40 才		6~7	ヲ状(I~II, 稀にIII), 点状	比較的多	7	点状, ヲ状(I~II)	中 等
42 才		7~11	点 状	中 等	7~9	主として点状+ヲ状(I~II)	比較的多
46 才		5	ヲ状(I), 点状	中 等	5~6	ヲ状(I~II)点状, 線状	中 等
50 才		7	ヲ状(I~II), 点状	中 等	6~7	点状, 線状, ヲ状(I~II)	中 等
56 才		6~7	点状, 線状	中 等	8	主として点状, 一部ヲ状(I)	中 等
60 才		7	ヲ状(I~II), 点状, 線状	中 等	6	主として点状, 線状, 一部ヲ状(I~II)	中 等
62 才		6	ヲ状(I~II), 点状, 線状	中 等	6	中線状, ヲ状(I~II)	幾 分 疎
71 才		6	ヲ状(I), 点状	疎	6	ヲ状(I), 点状	幾 分 疎
74 才		5~6	ヲ状(I), 点状, 線状	疎	4	点状, 線状	極 疎

(その3)

年 令	静脈名 組織	12) 固 有 脊 側 指 静 脉			13) 上 腕 動 脉 伴 行 静 脉 (上)		
		筋 層	弾 性 線 維 及 び	密 度	筋 層	弾 性 線 維 及 び	密 度
19 才	6	点状, ラ状(I)	中 等	5	点 状	中等平均	
22 才	4	点状, ラ状(I~II)	中 等	6~7	点 状	中等平均	
25 才	3	ラ状(I~II), 点状	中 等	7~8	主として点状, ラ状(II~III), 線状	比較的多	
27 才	5~6	ラ状(I~II), 点状, 線状	中 等	8	主として点状, ラ状(III), 線状	多 数	
30 才	3	点状+線状	中 等	5	点状, 線状	中 等	
34 才	7	ラ状(I~II), 点状, 線状	中 等	4	点状, 線状混在	中 等	
40 才	5~6	ラ状(I~II), 点状, 線状	中 等	5~6	点状, ラ状(I)	中等平均	
42 才	5~6	ラ状(I~II), 点状, 線状	中 等	4~5	点状, 規則正し	中等平均	
46 才	5~6	ラ状(I~II), 点状, 線状	中 等	5	主として点状	中 等	
50 才	5	点状, ラ状	中 等	4	小, 中, 点状	中 等	
56 才	6	ラ状(I~II), 点状, 線状	中等不規則	8	主として点状	中 等	
60 才	5	ラ状(I), 点状, 線状	中等不規則	5	小, 中, 点状	幾 分 疎	
62 才	6	ラ状(I), 点状	中 等	5~6	小, 中点状, ラ状(I)	疎	
71 才	6	ラ状(I), 点状	疎	6~7	点状, 一部ラ状(I)	疎	
74 才	4	主として点状, 一部短ラ状(I)	疎	3~4	小 点 状	極めて疎	

(その4)

年令	静脈名 組織	19) 桡骨動脈伴行静脈 (上)			23) 尺骨動脈伴行静脈 (上)		
		筋 層	弾 性 線 維 及 び	密 度	筋 層	弾 性 線 維 及 び	密 度
19 才	3	点 状	中等平均	3	線 状	中等平均	
22 才	4~5	中点状, ラ状(I)	比較的多	4~5	主として細線状+小点状	比較的多	
25 才	5~6	小点状, ラ状(I)	中 等	4	ラ状(I), 点状	中 等 整	
27 才	5	小点状, 短線状, ラ状(I~II)	中 等	5	淡ラ状, ラ状(I~II), 点状	比較的多	
30 才	3~4	細点状, 細線状	中 等	3~4	小点状, ラ状(I)	中 等	
34 才	3~4	小点状, 淡ラ状(I)	中 等	5	ラ状(I稀にII), 点状	中 等	
40 才	3~4	小点状, 淡ラ状(I)	中等平均	3	細点状, ラ状(I)	中 等	
42 才	4~5	点状, 規則正し	多 数	3~4	点状, 線状	比較的多	
46 才	5~6	小, 中, 点状	比較的多	4	小点状, 線状	中 等	
50 才	5~6	小点状, ラ状(I~II)	中 等	5	ラ状(I~II), 点状	中 等 整	
56 才	5	小点状, ラ状(I)	幾 分 疎	6~7	淡線状, ラ状(I)	中 等	
60 才	4	小点状, ラ状(I~II)	幾 分 疎	4	小点状, ラ状(I)	中等不整	
62 才	5	小点状, 線状, ラ状(I~II)	中 等, 則	6	小, 中点状, ラ状(I~II)	中 等	
71 才	5	淡ラ状(I), ラ状(I), 点, 線状	幾 分 疎	4	ラ状(I~II), 不規則点状	中 等	
74 才	3~4	ラ状(II), 稀に小点状	極めて疎	5~6	点状, 細ラ状	幾 分 疎	

(その5)

年 令	静脈名 組織	29) 浅 掌 静 脉 弓			35) 固 有 掌 側 指 静 脉		
		筋 層	弾 性 線 維 及 び	密 度	筋 層	弾 性 線 維 及 び	密 度
19 才		3	点 状	中等平均	3	点 状	中 等
22 才		4	線状, 点状, ラ状(I)	中 等 整	3	点状, ラ状(I)	中 等 整
25 才		3~4	点状, ラ状(I)	中 等	3	ラ状(I), 短線状	比較的多
27 才		4	小点状, ラ状(I), 濃ラ状(I)	中 等	3	中点状, 短線状	中 等
30 才		3	ラ 状(I)	中 等 整	3	ラ 状(I)	中 等
34 才		3	ラ 状(I)	中 等	3	ラ 状(I)	中等不整
40 才		4	小点状, ラ状(I)	中 等	3	小点状, ラ状(I)	中 等
42 才		3~4	ラ 状(I)	幾 分 疎	3	小点状, ラ状(I), 短線状	中等不整
46 才		3~4	点状, ラ状(I)	中 等	4	小点状, ラ状(I)	中 等
50 才		3	点状, ラ状(I)	中 等	3	ラ状(I), 小点状	中 等
56 才		3	中点状, ラ状(I)	幾 分 疎	3	ラ状(I), 小点状	中等不整
60 才		3~4	小, 中点状	中等不整	3~4	ラ状(I), 小点状	幾 分 疎
62 才		3	ラ状(I~II), 点状, 短線状	中等不整	4	小点状, 短ラ状(I~II)	幾 分 疎
71 才		4	ラ状(I~II), 点状	疎	3	ラ状(I~II), 点状	幾 分 疎
74 才		3~4	細ラ状(I~II), 点状	幾 分 疎	3	小点状, ラ状(I)	疎

分淡染し細くなり, ラ状も小さく短かく, 不規則または疎となる傾向が認められる。

以下個々の成績につき抜粋せるものを表 10 に掲げる。

C. 外 膜

動脈に比べ発育は良好である。結合組織, 平滑筋よりなり, 血管, 神経を含む。平滑筋は主として縦走し, 小血管を見る。EF は中膜のそれより粗大で不規

表 11. 年 令 別 上 肢 静 脉 管 外 膜 の 変 化 (LMF=縦走筋, G=小血管)

年 令	静脈名 組織	1) 橈 側 皮 静 脉 (I)				3) 橈 側 皮 静 脉 (IV)			
		LMF	G	弾 性 線 維 及 び	主 線 維	LMF	G	弾 性 線 維 及 び	主 線 維
19 才		—	+	点 状	5 ~ 6 条	卅	+	濃 ラ 状	5 ~ 6 条
22 才		+	卅	濃ラ状(II~I), 点, 線状	5 ~ 6 "	+	—	濃ラ状(II~III), 点, 線状	7 ~ 8 "
25 才		—	—	ラ状(I~II~III), 点, 線状	6 "	—	—	濃ラ状(II~III)	6 "
27 才		—	—	濃ラ状(I~II), 不整点状	7 ~ 8 "	+	+	濃ラ状(II~III), 点, 線状	6 "
30 才		±	+	点, 線状, ラ状(I~II)	4 ~ 5 "	±	+	ラ状(I~II), 点, 線状	4 ~ 5 "
34 才		+	+	濃ラ状(II~III), 点, 線状	5 ~ 6 "	+	+	濃ラ状(II~III)	8 "
40 才		—	+	ラ状(II~III), 点状	4 "	+	卅	濃ラ状(II~III), 点, 線状	7 "
42 才		+	—	不整点状	4 "	+	+	濃ラ状, 外弾性板様	5 "
46 才		—	+	濃ラ状(II~III), 不整点状	7 ~ 8 "	+	+	濃ラ状(II~III), 点, 線状	6 ~ 7 "
50 才		+	+	ラ状(II~III), 点, 線状	4 ~ 5 "	卅	+	濃ラ状(II~III), 点, 線状	5 "
56 才		—	—	ラ 状(III)	7 ~ 8 "	—	+	濃ラ状(III), 1 部点状	5 ~ 6 "
60 才		+	—	濃ラ状(I~II)	4 "	+	+	濃ラ状(II~III), 点, 線状	7 "
62 才		—	—	濃ラ状(I~II), 点状	5 ~ 6 "	—	+	濃ラ状(II), 点状, 不整	5 ~ 6 "
71 才		+	+	濃ラ状(III)	3 "	+	卅	濃ラ状(II~III), 点状	3 "
74 才		+	+	ラ状(II~III), 点状	6 ~ 7 "	±	—	濃ラ状(II), 点状, 線状	4 "

(その2)

静脈名 組織		5) 尺側皮静脈 (I)				7) 尺側皮静脈 (III)			
		LM F	G	弾性線維及び	主線維	LM F	G	弾性線維及び	主線維
19 才	才	—	+	濃ラ状(II~III)	5~6条	+	+	濃ラ状(II)	5~6条
22 才	才	+	—	濃ラ状(II~III)	7~8 "	+	+	濃ラ状(II~III), 点, 線状	6~7 "
25 才	才	—	—	濃ラ状(II~III)	6~7 "	+	+	濃ラ状(II~III), 点, 線状	7 "
27 才	才	—	—	濃ラ状(II~III)	6~7 "	+	+	濃ラ状(II~III), 点, 線状	7 "
30 才	才	—	卅	ラ状(II)	2~3 "	—	+	ラ状(II), 点, 線状	3~4 "
34 才	才	+	+	濃ラ状(III), 点状	6~7 "	+	+	濃ラ状(II~III), 点, 線状	5 "
40 才	才	+	+	濃ラ状(II~III), 点状	5~6 "	—	+	濃ラ状(II), 線, 点状	4~5 "
42 才	才	—	+	濃ラ状(II~III)	5~6 " 密	+	+	濃ラ状(II)	4~5 "
46 才	才	+	+	濃ラ状(II~III), 点状	6 "	+	+	濃ラ状(II~III), 点, 線状	5~6 "
50 才	才	+	+	濃ラ状(III), 不整点状	3~4 "	+	+	濃ラ状(II~III), 点, 線状	4~5 "
56 才	才	+	+	濃線状, ラ状(II)	5~6 "	+	+	ラ状(II~III)	5~6 "
60 才	才	+	—	濃ラ状(II~III)	4~5 "	卅	+	ラ状(II~III), 線, 点状	6 " 不整
62 才	才	+	+	濃ラ状(III)	6~7 "	+	+	濃ラ状, (II~III), 点, 線状	5~6 "
71 才	才	+	卅	ラ状(II), 1部断裂	4~5 "	±	+	ラ状(II~III), 点状	3 "
74 才	才	—	—	濃ラ状(II~III), 点状	4 "	±	+	濃ラ状(II~III), 点状	3 "

(その3)

静脈名 組織		12) 固有背側指静脈				13) 上腕動脈伴行静脈 (上)			
		LM F	G	弾性線維及び	主線維	LM F	G	弾性線維及び	主線維
19 才	才	—	—	濃ラ状	4 条	—	—	濃ラ状(I~II)	4~5条疎
22 才	才	—	—	濃ラ状(I~II), 点状	4 "	+	+	ラ状(II), 大点状, 不整	4~5 " 疎
25 才	才	—	—	濃ラ状(I~II), 点, 線状	4 "	+	+	大点状, ラ状(II~III)	7~8 "
27 才	才	—	—	ラ状(I~II), 点, 線状	5 " 不整	+	—	濃ラ状(II~III), 点, 線状	8 "
30 才	才	—	±	濃ラ状(I)	4~5 "	+	—	濃ラ状, 短線, ラ状(I~II)	5~6 "
34 才	才	—	—	濃ラ状(I~II~III), 細点状	4~5 "	+	+	濃大線, 点状, ラ状(I)	6 "
40 才	才	—	—	濃ラ状(I~II~III), 点状	4~5 "	—	—	濃ラ状(I~II), 大線, 点状	5~6 "
42 才	才	+	+	濃ラ状(I~II), 不整	4~5 "	+	—	濃ラ状(II~III), 線, 点状	6 "
46 才	才	+	—	濃ラ状(II~III), 点, 線状	4 "	—	—	濃点, 線状, 不整	5~6 "
50 才	才	—	—	濃ラ状(II~III), 点, 線状	5~6 "	+	+	大点状, 線状	5~6 "
56 才	才	+	—	濃ラ状(II~III), 点, 線状	4~5 "	—	+	濃ラ状(II)	3~4 "
60 才	才	+	—	細濃ラ状(II), 線, 点状	4~5 "	+	—	ラ状(II~III), 点状	3 "
62 才	才	+	—	濃ラ状(II~III), 点, 線状	4~5 "	—	+	濃染中, 大, 点状	7~8 "
71 才	才	+	+	ラ状(II~III), 点状	3 " 疎	+	卅	ラ状(II~III), 点, 線状	4~5 "
74 才	才	—	—	細濃ラ状(I~II), 点状	4~5 "	+	+	濃ラ状(II), 点, 線状, 不整	4 " 疎

(その4)

年 令		組織		19) 桡骨動脈伴行静脈 (上)			23) 尺骨動脈伴行静脈 (上)		
				LM F	G	弾 性 線 維 及 び	主 線 維	LM F	G
19	オ	—	+	濃ヲ状(I〜II)	4 〜 5 条	—	—	濃 ラ 状	4 〜 5 条
22	オ	+	—	濃ヲ状(I〜II), 点状	4 〜 5 "	+	—	濃ヲ状(I〜II), 点状	3 〜 4 "
25	オ	++	+	濃ヲ状(I〜II), 点, 線状	7 "	+	—	濃ヲ状(I〜II), 点状	4 "
27	オ	—	—	濃ヲ状(I〜II), 点, 線状	3 〜 4 "	—	—	濃ヲ状(I〜II〜III), 大点, 線状	6 〜 7 "
30	オ	—	—	濃点, 線状, ラ状(I)	3 〜 4 "	—	—	濃点状, 線状	4 "
34	オ	—	—	濃点, 線状, ラ状(I)	4 "	—	—	濃ヲ状(I〜II〜III), 点, 線状	6 "
40	オ	—	—	濃点, ラ状(I), 線状	4 〜 5 "	—	—	濃ヲ状(I), 点, 線状	3 "
42	オ	++	—	濃ヲ状(II〜III)	7 "	—	—	線状, ラ状	4 〜 5 "
46	オ	—	+	濃短ヲ状(II〜III), 点, 線状	5 "	+	—	点状, 濃ヲ状(I〜II)	4 "
50	オ	+	+	濃ヲ状(I〜II), 中点, 短線	4 〜 5 "	+	—	濃ヲ状(II〜III), 点, 線状	7 〜 8 "
56	オ	+	+	ラ 状(II)	3 "	—	+	濃ヲ状(III), 点状	5 〜 6 "
60	オ	—	—	ヲ状(II), 中点, 短線状	4 "	+	—	濃ヲ状(I〜II〜III), 点, 線状	5 〜 6 "
62	オ	+	—	濃ヲ状(II), 連続	外弾性板様	+	++	濃ヲ状(II〜III), 点, 線状	4 〜 5 "
71	オ	+	++	濃ヲ状(II〜III), 不正点状	5 "	+	+	ヲ状(II〜III), 点状	4 〜 5 "
74	オ	—	—	濃ヲ状(II), 点, 短線状	3 " 不整	—	—	濃点状, 濃ヲ状(I〜II)	3 " 疎

(その5)

年令		静脈名		29) 浅 掌 静 脉 弓				35) 固 有 掌 側 指 静 脉					
		組織	LM	G	弾 性 線 維 及 び	主 線 維	組織	LM	G	弾 性 線 維 及 び	主 線 維		
		F						F					
19	才	—	—	濃ヲ状(I〜II)	3	条	—	—	濃ヲ状(I〜II), 点状	2	条		
22	才	—	—	濃点状, 短ヲ状(II)	3	"	—	—	濃ヲ状(I〜II), 点, 線状	2 ~ 3	"		
25	才	—	—	濃ヲ状(I〜II), 点, 線状	2	"	—	—	濃ヲ状(I〜II), 点, 線状	2	"		
27	才	—	—	ヲ状(I〜II), 濃点, 線状	2 ~ 3	"	—	—	濃ヲ状(I〜II), 点状	2	"		
30	才	—	—	濃ヲ状(I〜II), 点状	2	"	—	—	短濃ヲ状(II〜III), 点状	2 ~ 3	"		
34	才	—	—	濃ヲ状(I〜II)	2	"	—	—	濃ヲ状(I〜II)	2 ~ 3	"		
40	才	—	—	淡ヲ状(II〜III), 濃ヲ状(II〜III)	3	"	—	—	濃ヲ状(II), 点状	2 ~ 3	"		
42	才	—	—	ヲ状(III)	2 ~ 3	"	—	—	短濃ヲ状(II〜III), 点状	2 ~ 3	"		
46	才	—	—	濃短ヲ状(I〜II), 短線状	3 ~ 4	"	—	—	短濃ヲ状(II〜III), 点, 短線状	2 ~ 3	"		
50	才	—	—	濃ヲ状(I〜II), 点状	2 ~ 3	"	—	—	短ヲ状(II〜III), 点状	2 ~ 3	"		
56	才	—	—	濃ヲ状(I〜II), 点状	3 ~ 4	"	—	—	短濃ヲ状(II〜III), 点状	2 ~ 3	"		
60	才	+	—	濃中, 大点状, 短線状	2 ~ 3	"	—	—	短濃ヲ状(II〜III), 点状	2 ~ 3	"		
62	才	—	—	濃ヲ状(I〜II), 短線, 点状	2 ~ 3	"	—	—	短濃ヲ状(II〜III), 短線状	2 ~ 3	"		
71	才	—	—	ヲ状(I〜II), 点状	僅 少	"	—	—	短ヲ状(II〜III), 点状	2 条	位		
74	才	—	—	濃短ヲ状(I〜II), 小点状	3	"	—	—	ヲ状(I〜II), 点状	僅 少			

則かつ強く波行(ラ状III)中膜周辺部に密である(内縦走筋同様特に外縦走筋も腕関節部附近皮下静脈に多く認められる)。

山本, 石田の報告にも見られる通り, 尺側皮・橈骨・背側指。各静脈では輪走傾向が強く, 背側中手ではやや不定, その他はすべて縦走傾向が強いように思わ

れる。縦走筋のある所は筋の周囲に細点状の EF が認められる。なお、年令の変化に関しては動脈管の報告にあるが如き確然たるものは認められざるも中膜同様 EF は、30 才頃までは増加の傾向あり、60 才までは変化を認めがたきも、70 才を過ると線維も短かくラ状も細く、小さく、淡染し疎となる傾向を示している。

以下個々の成績につき抜粋せるものを表 11 に掲げる。

総括並びに結論

著者は一定条件下に固定せる 19 才より 76 才に至る本邦人屍 45 体 (男 35, 女 10) につき、皮下 18, 深静脈 40 部位をセロイジン包埋後、15 μ の切片とし、ヘマトキシリン・エオジン染色及びワイゲルト弾性線維染色並に無染色標本作製し、主としてマイクロメーターにより上肢静脈の内径、壁厚を計測し、併せてその組織学的構造並びに年令的組織的变化を観察した。その成績は、概ね下記の如くである。

1. 上肢静脈管の内径の平均値及び最大、最小値は表 2 に示す如くであり、内径は各静脈とも末梢方より中心方に進むにしたがい増大する傾向がある。

2. 各人生期別上肢静脈管の内径は表 3 に示す如くで、動脈ほど著明ではないが、加齢とともに漸増する傾向の認められるものが多い。

3. 上肢静脈管壁厚の平均値及び最大、最小値は表 2 に示す如くで、壁厚の大小は概して内径の大きさに平行するものが多い。

4. 各人生期別静脈の壁厚は表 4, 表 5 に示す如くである。皮下静脈においては著明な変化を認めないが、深静脈においては、第一老年期まで漸増し第二老年期より減ずる傾向の見られるものが多い。

5. 上肢静脈管の厚度率の平均値は表 2 に示す如くで、末梢方より中心方に向つて厚度率小となり、また皮下静脈より深部静脈の方が厚度率小となる。

6. 各人生期別厚度率は表 2 に示す如くで、第二老年期において小となる傾向の外は著明な変化は認めがたい。

7. 個体別による左右の比較を行えば表 7 に示す如くで、皮静脈においては、内径は右>左、厚径は左 $\approx$ 右と相半ばし、厚度率はむしろ左>右のものが多く、深静脈においては、内径は右 $\leq$ 左、厚径は左 $\approx$ 右、厚度率は左 $\approx$ 右であるものが多い。

8. 腕、尺両動脈に伴行する静脈の数は表 8 に示す如くで、男性において左右の別なく尺側の方が多い。

9. 上肢静脈管の内膜・中膜・外膜の壁厚の平均値

は表 9 に示す如くで、各層とも (特に皮下静脈内膜に著明) 肘・腕関節部附近において数値の増大を示し、深静脈は皮静脈に比較し、各層とも幾分薄く、また中・外膜の比率が中心方は皮下静脈同様 1:2 なるも末梢方は皮下静脈 2:3 に対し 1 に近い。

10. 各人生期別上肢静脈管の内・中・外膜各層の平均値は、表 10 に示す如くで、内膜の傾向は不著明なるも中膜は第四成熟期・第一老年期まで漸増し、第二老年期より減ずる傾向にあり、外膜もほぼこれに準ずる。

11. 上肢静脈管内膜の年令的組織学的変化は、動脈管の如き確然たるものは認められないが、内縦走筋の出現率は、先人の報告より幾分頻度が高いように思われる。

12. 上肢静脈管中膜の年令的組織学的変化を、表 11 に示す。中膜は主として輪走筋よりなり、その間弾性線維が部位により縦走。輪走の割合を異にして走り (主として縦走)、年令的には 30 才頃まで増加し、その後は著変なく、70 才を過ぎると線維も短かく淡染し細くなり、ラ状も小さく疎となるように思われる。

13. 上肢静脈管外膜の年令的組織学的変化を表 12 に示す。弾性線維は 3 膜中最も粗大に波行し、中膜周辺部に特に密である。周囲の結合組織とは疎なる点状の弾性線維となり移行する。年令的变化は中膜に準ずる。

14. 全例を通じ肘・腕関節部附近 (特に肘関節) 静脈にかぎり、内・中・外 3 膜壁厚の増大あり、就中、内外縦走筋の多数出現することは屈曲時の物理的外力に対する血行維持のための補強ならんかと思考される。

15. 上肢動静脈の年令的变化を比較要約すると、動脈の変化は内膜において著しく、而も末梢方より 29 才頃から部分的増殖を来し、40 才以後には大多数肥厚、70 才においては明らかな硬変を全域に認める (今井) に対し、静脈のそれは各層共きわめて緩徐であり、末梢方中心方の差異も認めがたく弾性線維の消長より見れば線維は、30 才頃まで増加しその後は著変なく (幾分下降?) 70 才を過ると比較的明らかに質量共変化を認める。

上記の成績は著者の限られた資料に基づくため、その結果が個人の解剖学的、生理学的関係その他により相違を来すべきことは勿論のことと思惟する。

稿を終るに臨み、終始御懇篤なる御指導、御校閲を賜りたる恩師金子丑之助教授に深甚の謝意を捧げると共に、種々御教示を頂いた清水、高石、吉川 3 博士に深く感謝を捧げ、また一方ならぬ御協力を戴いた寺山医学士に謝意を表する。

佐伯論文附図

1) 19才 合 橈側皮静脈 (VI) ワイゲルト
E. F. 染色 (内. 中. 外膜と
も E. F. 著明)

2) 30才 合 橈側皮静脈 (VI) ワイゲルト
E. F. 染色 (1より増加の
傾向あり)

3) 50才 合 尺側皮静脈 (VI) ワイゲルト
E. F. 染色 (各層濃染し E.
F. なお著明)

4) 74才 合 橈側皮静脈 (VI) ワイゲルト
E. F. 染色 (内. 中. 外膜質
量とも E. F. 変化減少する)

5) 60才 合 尺側皮静脈 (III) H. E.
(染色内, 外縦走筋 (矢印)
を認める)

6) 61才 合 橈側皮静脈 (I) H. E.
染色 (中膜内縦走筋 (矢印)
を認める)

主 要 文 献

- 1) 山下兼澄：九州日本人静尿管壁の計測，四肢皮静脉，熊本医誌，**12**，1123 (1936)
- 2) 山下兼澄：九州日本人静尿管壁の計測，四肢深静脉・熊本医誌，**12**，1179 (1936)
- 3) 松本 清：日本人体皮下静脉（生体），軍医団雑誌，**274**，140 (1934)
- 4) 渡辺俊男：静脉の組織構造の血行について，日本生理誌，**12**，135 (1950)
- 5) 渡辺俊男：静脉の構造と機能，日本生理誌，**13**，93 (1951)
- 6) 渡辺俊男：静脉壁の有する弾力線維，広島医学誌，**3**，136 (1950)
- 7) 渡辺俊男：静脉の構造と分類について，広島医学誌，**2**，234 (1949)
- 8) 渡辺俊男：静脉における筋量分布について，日本生理誌，**11**，249 (1949)
- 9) 渡辺澄男：静脉の伸展性に就いて，日本生理誌，**12**，84 (1950)
- 10) 吉中豊久：血管の受動的収縮性について，広島医学誌，**2**，116 (1949)
- 11) 山本 弘：全身血管系における格子線維，鳥取大学解剖学教室業績集，**1** 85，161 (1954)
- 12) 西田邦彦：成人における静脉壁筋量分布，熊本医学誌，**28**，1184 (1954)
- 13) 藤田為刀：人の諸動脉，静脉壁の成分比較研究，日本組織学記録，**3**，183 (1952)
- 14) 石田 守：人の静脉壁の弾性線維，解剖学雑誌，**35**，127 (1960)
- 15) 金子丑之助：日本人体解剖学，**I, II, III** (1957)
- 16) 金子丑之助：最新組織学，(1957)
- 17) 今井良一：本邦人上肢動脉管についての一，二の計測とその組織学的構造，日医大誌，**20**，277 (1953)
- 18) 海老沢俊彦：上肢筋線維間動脉の年令的变化，日医大誌，**25**，999 (1958)
- 19) 古屋芳雄，宮坂五一郎：医学統計法附小数統計法，(1956)
- 20) 押見賢一：血管弾力線維の性状について，北海道医誌，**12**，1553 (1934)
- 21) Bennighoff, A.: Blutgefäße und Herz. Möllendorffs Handbuch d. mikr. Anatom. d. Menschen, **VI** (133), 150 (1930)
- 22) Franklin, K.J.: A monograph on veins, 35~63 (1937)
- 23) Görttler, K.: Die funktionelle Bedeutung des Baues der Gefäßwand, 170~443 (1953)
- 24) Hochlein, M. u. Singer, B.: Untersuchungen am venösen Teil des Kreislaufes, **II**. Mitteilung; Untersuchungen über den Bau der Venenwand **125**, 301 (1927)
- 25) Kugelgen, A.: Über den Wandbau der Grosvenen, Morphol. Jb., **91**，447 (1951)
- 26) Arnold: Handbuch d. Anatomie d. Menschen, **II** (1851)
- 27) Gegenbaur: Anatomie d. Menschen **II**.
- 28) Henle: Systematische Anatomie d. Menschen.
- 29) Krause: Spezielle u. makroskopische Anatomie (1879)
- 30) Voss, Herman: Grundriss der normalen Histologie u. mikroskopischen Anatomie 8, Verb. Aufl. Leipzig (1955)
- 31) Watzku, Max: Kurzlehrbuch der Histologie u. mikroskopischen Anatomie des Menschen, Stuttgart (1957)

その他