下 腿 三 頭 筋 に つ い て

日本医科大学解剖学教室 (指導 金子丑之助教授)

竹 岡 憲 策

Kensaku Takeoka

緒 言

下腿三頭筋および踵骨腱の肉眼的観察は、Ruge, Glaesmer, Loth らの人種解剖学的研究に散見し、さらに足立、今村、嵯らによる日本人のものについての研究がある。

筋線維の組織学的研究は、Halben, Schiefferdecker, 小橋、半田、稲葉、相沢、飯田らにより行われ、また筋線維束間動脈の年齢的变化については、海老沢、林、相沢らにより報告されている。

腱束間あるいは腱周膜内の動脈については、Dauman, Rau, 金田らによつて研究されているが、それらは血管の走行についてのものであつて、動脈の年齢的变化についての報告は著者の寡聞これを知らない。

著者は下腿三頭筋および踵骨腱について肉眼的および組織学的に一二の観察を行い、併せて筋線維束間ならびに腱束または腱周囲組織内の動脈につき観察し、いさゝかの知見を得たのでこゝに報告し、諸賢のご批判を乞ふことにする。

I. 資料および研究方法

本研究に使用した資料は当教室において一定条件下に貯蔵された 22 才より 80 才に至る本邦成人死体 46 体 (男子 31 体、女子 15 体) より採取した。その年齢および性別を示すと表 1 の如くである。

上記死体中肉眼的に病変または損傷なきものにつき、下腿三頭筋および踵骨腱を足底筋腱とともに一括

表 1. 被検資料の年齢別及び性別

番号	年齢	性	番号	年齢	性	番号	年齢	性	番号	年齢	性
1	22	♂	13	33	♂	25	50	♀	37	70	♀
2	23	♂	14	33	♂	26	50	♂	38	72	♀
3	23	♂	15	34	♂	27	55	♂	39	74	♀
4	23	♀	16	35	♂	28	56	♂	40	75	♀
5	23	♂	17	36	♂	29	56	♂	41	79	♀
6	24	♂	18	37	♀	30	57	♂	42	79	♀
7	25	♂	19	39	♂	31	60	♂	43	80	♀
8	27	♂	20	41	♂	32	61	♂	44	80	♀
9	27	♂	21	45	♂	33	61	♂	45	不明	♂
10	28	♂	22	45	♀	34	62	♂	46	不明	♀
11	29	♂	23	46	♂	35	68	♀			
12	30	♂	24	49	♂	36	70	♀

図 1. 下腿三頭筋の切断位置 (V), II および V の間の距離を 3 等分した高さ (III, IV) において、それぞれ筋および腱の走行に直角に刀をもつて切断し、各々の切断面にトレーシングペーパーをあて鉛筆にて切断面の形態を描写して爾後の計測にそなえた。

次いで各切断面より厚さ 1 cm 内外の切片を採取し、10 倍ホルマリン溶液中に 24 時間固定後 24 時間水洗、漸強アルコールにて脱水後セロイジン包埋、15 μ の切片を作り、ヘマトキシリン・エオジン染色およびワイゲルト弾性線維染色を施し、組織学的に観察するとともにマイクロメーターを用いて筋線維の太さおよび筋線維束間、腱束間、腱周囲結合組織内の動脈の直径および壁厚の計測を行つた。

II. 肉眼的計測

下腿三頭筋は腓腹筋およびヒラメ筋よりなり、両筋の終止腱は合一して踵骨腱を形成し足底筋腱とともに踵骨隆起に附着している。

A. 腓腹筋内側および外側筋腹の最遠位端より踵骨に至る距離

踵骨腱の長さを計測するため内側および外側筋腹の最遠位端より踵骨上縁に至る距離を計測した。

表 2 に示す如く内側筋腹の最遠位端より踵骨上縁に至る距離は、最大 18.3 cm より最小 10.0 cm の間にみられ、男子平均 14.47 ± 0.261 cm、女子平均 12.92

表 2. 腓腹筋内および外側筋腹の最遠位端より踵骨上縁に至る距離

性別	側別	計測値 内 側 (cm)		外 側 (cm)	
		平 均	最大～最小	平 均	最大～最小
男 子	左	14.29±0.303	17.2～11.6	15.75±0.344	19.0～11.8
	右	14.72±0.450	18.3～11.5	15.94±0.459	19.8～12.7
	左+右	14.47±0.261	18.3～11.5	15.83±0.277	19.8～11.8
女 子	左	13.28±0.710	15.1～10.1	14.01±0.571	16.2～12.4
	右	12.67±0.561	14.2～10.0	14.21±0.235	15.2～13.1
	左+右	12.92±0.454	15.1～10.0	14.10±0.287	16.2～12.4
男女合計		14.11±0.242	18.3～10.0	15.39±0.246	19.8～11.8

±0.454 cm で男子は女子より約 1.5 cm 大である。男女合計の平均は 14.11±0.242 cm である。また外側筋腹の最遠位端より踵骨上縁に至る距離は、最大 19.8 cm より最小 11.8 cm の間にあり、男子平均 15.83±0.277 cm、女子平均 14.0±0.287 cm で男子は女子より約 1.8 cm 大である。男女合計の平均は 15.39±0.246 cm である。

これらの値を先人による値と比較すると表 3 の如くである。著者の得た値は他人種のものおよび今村の計測した日本人におけるものより小である。

表 3. 腓腹筋内および外側筋腹の最遠位端より踵骨上縁に至る距離の比較

人 種 (報告者)	内 側 (cm)		外 側 (cm)	
	平 均	最大～最小	平 均	最大～最小
白人 (Chudzinski)	24.7	27.0～19.2	25.2	27.0～18.0
黄色人 (")	23.0	25.8～18.0	23.1	24.0～20.8
白人 (")	22.0	24.7～16.1	22.1	26.0～18.4
オーストラリア人 (Loth)	17.2		19.4	
日本人 (今村)	15.1±2.0	19.4～11.4	16.4±1.6	20.0～13.0
アイヌ人 (椎名)	17.6		18.0	
日本人 (著者)	14.11±0.242	18.3～10.0	15.39±0.246	19.8～11.8

表 2 および表 3 でみられる如く、内側筋腹最遠位端より踵骨に至る距離の平均値は外側筋腹の最遠位端より踵骨に至る距離の平均値よりも小である。すなわち、腓腹筋の筋腹は内側筋腹が外側筋腹より遠位に下つていることを示している。個々の筋についてみると、大多数は内側筋腹が外側筋腹より遠位に下つているが、また之に相反するものも見受けられる。54 例中 6 例において外側筋腹が内側筋腹より遠位に下つているの

がみられ、これは全体の 11% に当る。内・外両側筋腹最遠位端より踵骨に至る距離の差の平均値は表 4 にみる如くで、内側が外側より遠位に下つたものゝ距離の差は之に相反するものゝ距離の差のほぼ 2 倍である。また 1 例に内・外両側筋腹最遠位端より踵骨までの距離の等しいものがみられた。

表 4. 腓腹筋内・外側筋腹の高さの差

	例数 (%)	両筋腹の踵骨よりの距離の差 (cm)
内側筋腹が外側筋腹より下方に下れるもの	48(89%)	15.2±0.093
外側筋腹が内側筋腹より下方に下れるもの	6(11%)	0.77±0.302

内・外両側筋腹の高さについては、黒人においては外側筋腹が内側筋腹より下方に下つており、ヨーロッパ人は之に反するものもあつたが、Loth はこれを否定し人種間に差異はないとしている。椎名はアイヌ人の 10 例中、外側筋腹が内側筋腹より下方に下つているものは 4 例、その踵骨までの距離の差は 5～9 mm、之に反するものは 6 例、その距離の差は 2～3 mm と報告している。今村の日本人における計測平均も内側筋腹が外側筋腹より下方に下つた値を得ており、碇の日本人胎児における計測も 9 カ月の胎児における値を除いてはすべて内側が外遠より遠位に下つた平均値を得ている。

B. 腓腹筋内外両側筋腹の結合部より踵骨上縁に至る距離

腓腹筋内外両側筋腹は下方凸の弧状をなし腓腹筋巾のほぼ中央において結合している。この結合の最遠位点より踵骨上縁に至る距離を計測して表 5 に示した。

最大 21.8 cm より最小 14.3 cm の間にあり、男子平均 18.0±0.258 cm、女子平均 16.09±0.301 cm で男子は女子より約 1 cm 大である。男女合計の平均は 17.74±0.291 cm である。この距離については碇の日

表 5. 腓腹筋両側筋腹の結合部最遠位端より踵骨上縁に至る距離

性別	側 別	計測値 cm	
		平 均	最大～最小
男 子	左	17.83±0.336	21.0～14.5
	右	18.23±0.395	21.8～15.9
	左+右	18.00±0.258	21.8～14.5
女 子	左	16.33±0.304	16.7～14.3
	右	16.20±0.523	15.6～14.5
	左+右	16.09±0.301	16.7～14.3
男 女 合 計		17.74±0.291	21.8～14.3

本人胎児における報告のほか直接比較すべき文献を見出し得ないが、今村の日本人についての報告の数値より計算して得た 17 cm と大体近似する。Glaesmer によると、腓腹筋の内外両側筋腹は系統発生学的には各々独立した筋で、哺乳動物では融合するという。しかし、その結合部位が下方であるほど原始的であるとし、猿では人間に比しはるかに下方で結合するという。Chudzinski はネグロ人においてはその結合状態は原始的な点がみられるとしている。今村は日本人の両側筋腹合は他人種に比し上方であるとし、椎名はアイヌ人につき、黒人・ヨーロッパ人よりも上方において結合しているが、之よりしてアイヌ人の腓腹筋の進化を断定することは出来ないとしている。

C. 腓腹筋終止腱の最大幅および最小幅

腓腹筋終止腱の最大巾は内側または外側筋腹のうち遠位に下つたものゝ高さ (図 1, II) における終止腱の巾径をもつて表わし、最小巾は踵骨腱の最も細い部分で計測した。その値は表 6 にみる如く、最大巾は男子では最大 6.5 cm、最小 3.2 cm の間にあり、平均は 4.67 ± 0.123 cm であり、女子は最大 5.5 cm、最小 3.2 cm の間にあり、平均は 4.07 ± 0.201 cm である。平均値では男子は女子より 0.6 cm 大である。男女合

表 6. 腓腹筋終止腱の最大幅及び最小幅

性別	側別	計測値		最大幅 (cm)		最小幅 (cm)	
		平均	最大～最小	平均	最大～最小	平均	最大～最小
男子	左	4.61±0.161	6.4～3.2	1.33±0.045	2.0～0.7		
	右	4.81±0.197	6.5～3.2	1.27±0.037	1.7～0.6		
	左+右	4.67±0.123	6.5～3.2	1.32±0.028	2.0～0.6		
女子	左	4.19±0.237	5.5～3.4	1.16±0.071	1.8～0.9		
	右	3.86±0.343	5.3～3.2	1.22±0.081	1.8～1.0		
	左+右	4.07±0.201	5.5～3.2	1.18±0.056	1.8～0.9		
男女合計		4.59±0.114	6.5～3.2	1.25±0.023	2.0～0.6		

表 7 腓腹筋終止腱の最大幅及び最小幅の比較

人種 (報告者)	最大幅 (cm)		最小幅 (cm)	
	平均	最大～最小	平均	最大～最小
ヨーロッパ人	5.9		1.3	
黒人 (Chudzinski)	5.4		1.2	
黒人 (Loth)	6.1		1.7	
アイヌ人 (椎名)	4.1	5.0～3.2	1.3	2.0～0.9
日本人 (今村)	4.0±0.8	7.0～2.3	1.2±0.1	1.8～0.9
日本人 (著者)	4.59±0.114	6.5～3.2	1.25±0.023	2.0～0.6

計の平均値は 4.59 ± 0.114 cm である。

最小巾は男子では最大 2.0 cm、最小 0.6 cm の間にみられ、平均は 1.32 ± 0.028 cm、女子は最大 1.8 cm、最小 0.9 cm で平均 1.18 ± 0.056 cm である。平均値は男子が女子よりやや大であるが大差はない。男女合計の平均は 1.25 ± 0.023 cm である。

上記計測値を先人の報告と比較して表 7 に示す。著者の例の最大巾はヨーロッパ人および黒人におけるよりも小であるが、椎名によるアイヌ人、今村による日本人よりは大である。最小巾は Loth の黒人における値を除き大体他人種のものゝ近似し、椎名のアイヌ人、今村の日本人におけるものゝとも大体同じである。

D. 踵骨腱の厚さ

踵骨上縁より近位点 1 cm の部 (図 1, V) の踵骨腱の厚さを計測して表 8 を得た。最大 0.8 cm、最小 0.4 cm の間にあり、男子平均 0.50 ± 0.017 cm、女子平均 0.46 ± 0.018 cm である。平均値では男女とも大差はない。男女合計の平均は 0.48 ± 0.015 cm である。

表 8. 踵骨腱の厚さ

性別	側別	計測値		cm	
		平均	最大～最小	平均	最大～最小
男子	左	0.50±0.017	0.8～0.4		
	右	0.49±0.018	0.6～0.4		
	左+右	0.50±0.017	0.8～0.4		
女子	左	0.44±0.016	0.5～0.4		
	右	0.49±0.031	0.6～0.4		
	左+右	0.46±0.018	0.6～0.4		
男女合計		0.48±0.015	0.8～0.4		

E. ヒラメ筋の筋腹最遠位端より踵骨に至る距離

ヒラメ筋の筋腹最遠位端より踵骨上縁に至る距離を計測して表 9 に示す。最大 6.3 cm、最小 2.3 cm の間にあり、男子平均 4.55 ± 0.106 cm、女子平均 4.03 ± 0.200 cm で、男子は女子より約 0.5 cm 大である。男

表 9. ヒラメ筋々腹の最遠位端より踵骨に至る距離

性別	側別	計測値		cm	
		平均	最大～最小	平均	最大～最小
男子	左	4.59±0.166	6.3～2.9		
	右	4.50±0.146	6.1～2.9		
	左+右	4.55±0.106	6.3～2.9		
女子	左	4.03±0.776	5.5～2.3		
	右	4.02±0.251	5.3～3.1		
	左+右	4.03±0.200	5.5～2.3		
男女合計		4.42±0.105	6.3～2.3		

表 10. ヒラメ筋々腹最遠位端より踵骨に至る距離の比較

人 種 (報告者)	cm	
	平 均	最大～最小
ネ グ ロ 人	5.0	6.5～1.7
日 本 人 (今村)	4.8±1.6	9.1～2.0
日 本 人 (著者)	4.42±0.105	6.3～2.3

女合計の平均は 4.42±0.105 cm である。この値を先人の得た値と比較すると表 10 に示す如く、ネグロ人および今村の報告した日本人における値よりも小である。ヒラメ筋の筋腹が中心より遠去かるほど原始的な状態であるとされ、Loth はネグロ人ではヨーロッパ人より下方に延びているとし、Bankart, Pye-Smith および Phillips はネグロ人においてヒラメ筋が踵骨にまで達している例を報告し、Anthony および Hazard は白人においても同様の報告をしている。著者はかかる例は認めなかつた。

F. 足底筋の欠損

足底筋の存在の有無を調べて先人の得た欠損率と比較すれば表 11 の如くである。被検数 77 中欠損例は 8 であり、10.4% に相当する。欠損率は他人種におけるよりは大きく、足立の日本人における欠損率および碓の日本人胎児におけるものに近似する。

G. 下腿三頭筋並びに踵骨腱の幅および厚さの年齢的变化

下腿三頭筋および踵骨腱を次の 5 か所、すなわち

I. 腓腹筋内外両側筋腹の結合部最遠位点

II. 内側または外側筋腹のうち遠位に下つたものゝ筋腱移行部

III. II の部と、踵骨腱の踵骨附着部より近位点 1 cm の部との間の距離を三等分した点の上 1/3 の部

表 12. 各人生期別の下腿三頭筋及び踵骨腱の幅と厚さ (cm)

人生期別 部位		第一成熟期	第二成熟期	第三成熟期	第四成熟期	第一老年期	第二老年期
I	幅	9.30±0.313	8.93±0.471	6.80±0.609	8.42±0.207	7.38±0.407	5.64±0.279
	厚	2.73±0.119	3.03±0.222	2.40±0.165	2.75±0.091	1.92±0.207	1.91±0.192
II	幅	7.79±0.167	7.67±0.543	5.79±0.415	7.13±0.304	5.97±0.274	5.16±0.266
	厚	2.09±0.071	2.22±0.192	1.46±0.168	1.99±0.138	1.60±0.095	1.62±0.120
III	幅	5.29±0.267	5.38±0.539	3.46±0.177	5.00±0.439	3.68±0.113	3.46±0.182
	厚	1.46±0.087	1.50±0.109	1.09±0.083	1.51±0.106	1.08±0.114	1.24±0.073
IV	幅	2.10±0.032	1.93±0.133	2.03±0.133	2.93±0.137	2.72±0.077	1.82±0.179
	厚	0.90±0.083	0.96±0.056	0.73±0.086	1.12±0.112	1.10±0.134	1.01±0.079
V	巾	1.25±0.041	1.21±0.028	1.13±0.072	1.29±0.265	1.33±0.034	1.18±0.073
	厚	0.48±0.024	0.49±0.027	0.46±0.032	0.59±0.035	0.54±0.359	0.52±0.022

表 11. 足底筋欠損率の比較

人 種 (報告者)	観 察 下肢数	欠損例数	欠損率 (%)
黒 人 (Loth)	114	6	5.3
ヨーロッパ人 (足立)	1,920	137	7.1
支 那 人 (中野)	82	8	9.8
日 本 人 (足立)	960	106	11.0
ア イヌ 人 (椎名)	10	1	10.0
日 本 人 (今村)			4.0
日本人 (小金井・新井・敷波)	♂ 214 ♀ 92	26 3	12.2 9.2
日 本 人 (松島)	154	12	7.8
日本人胎児 (碓)	50	3	10.0
日 本 人 (著者)	77	8	10.4

IV. 同様下 1/3 の部

V. 踵骨腱の踵骨附着部より近位点 1 cm の部 (図 1) にて水平に横断しその各々の部における筋ならびに腱の巾および厚さを計測して、各人生期別に平均を求めて表 12 を得た。

なお、筋、腱移行部の組織学的所見を見るために IV の部およびヒラメ筋腱移行部の縦断切片を作つた (VI)。煩雑を避けるため上記 5 か所を近位側より順次 I, II, III, IV, V として以下記載する。

I における巾は第一成熟期に最大で以後第三成熟期を除き人生期の進むにしたがい減少の傾向がある。第二老年期では著明に減少している。

II における巾は第一成熟期に最大で、以後人生期の進むにしたがい減少の傾向がある。第二老年期では著明に減少する。

III における巾は第二成熟期に最大で第三成熟期を除き人生期の進むにしたがい減少している。

IV における巾は第一成熟期ないし第三成熟期には大

差なく、第四成熟期に増大して最大値を示し、以後減少して第二老年期には著明に減少している。

Vにおける巾は第一老年期に最大で他の人生期には大差は認められない。

Iにおける厚さは第三成熟期を最大として人生期の進むにつれ減少の傾向がある。

IIにおける厚さは第二成熟期に最大であり、第三成熟期に減少して第四成熟期に多少増加しているが、大体人生期の進むにしたがい減少の傾向がある。

IIIにおける厚さは第四成熟期に最大値を示すが、これを除いては人生期の進むにしたがい減少の傾向がある。

IVにおける厚さは第三成熟期に最大であり、大体人生期の進むにしたがい増加の傾向がある。

Vにおける厚さはIVと同様人生期の進むにしたがい増加の傾向がある。

いま、上述の下腿三頭筋のIないしVの各部における厚さと巾の比を求めて%であらわし、かりに厚度率と名付けてその値を表 13 に示した。各部についてみると

表 13. 各人生期における下腿三頭筋及び踵骨腱の厚さと幅の比 (厚度率) (%)

人生期別	部 位	I	II	III	IV	V
第一成熟期		29.3	18.9	27.7	42.4	38.4
第二成熟期		33.6	29.4	29.1	42.7	37.4
第三成熟期		32.4	24.4	31.4	40.1	41.0
第四成熟期		32.6	27.6	27.9	37.8	41.4
第一老年期		24.9	26.6	28.8	40.7	39.1
第二老年期		33.1	31.4	34.5	51.7	39.8

Iでは厚度率は第一成熟期より第二成熟期が大であり、以後は第一老年期を除きほぼ同様の値を示す。

IIでは第一成熟期に最小の厚度率を示し、人生期の進むにしたがい増加の傾向がある。

IIIでは厚度率は人生期の進むにしたがい増加の傾向があり、第二老年期に特に増加する。

IVでは厚度率は人生期の進むにしたがい減少の傾向があるが、第二老年期には著明の増加を示すことは被検例の少ないことによるかと思われる。

Vでは厚度率は人生期の進むにしたがい増加の傾向があるが、その割合は少い。

以上を要するにIVの部を除いては、厚度率は人生期の進むにつれ増加の傾向がある。

III. 組織学的検索

II. 下腿三頭筋々線維の太さ

本筋は一般骨格筋と同様筋線維は集合して筋線維束をなし内筋鞘に包まれ、さらに集つて外筋鞘に包まれている。

著者は筋線維の横断面積を計測算出してみた。小橋、稲葉、林はそれぞれ呼吸筋、肛門括約筋、眼筋につき、また富永らは哺乳動物につき筋線維の面積計測を行つている。これらの諸氏は筋線維横断面の形を一定倍に拡大描写し、プランメーターを用て面積を測定している。

著者は筋線維横断面積の計測には相沢の方式に従つた。すなわち、一定方向の筋線維直径をマイクロメーターを用いて計測し、多角形をなす筋線維横断面をこの直径を有する正円形をなすとみなして面積を算出し、その100ケについての平均値をその筋の筋線維横断面積の平均値とした。之を $\mu^2/100$ を単位として表わした。

下腿三頭筋線維横断面積を腓腹筋およびヒラメ筋について各人生期別に表示すれば表 14 の如くである。これらの値は小橋の44才の男子における腓腹筋々線維の太さ $25.5 \pm 1.04 \mu^2/100$ 、ヒラメ筋 $15.6 \pm 0.66 \mu^2/100$ に比べると腓腹筋では小、ヒラメ筋では大である。

各人生期別にみると、腓腹筋、ヒラメ筋とも年令的な変化は著明でないが、第二老年期には減少している。著者の例では第二老年期は女子のみであるので、第二老年期における筋線維の太さは減少は性別による変化も考えられる。Brown は女性の筋線維の直径は男性より約 1/4 だけ細いとしている。Halben は女性の筋線維が男性のそれより細いのは、一般に女性は男性より筋力を用いることが少なく、また身長、体重共に劣つてゐるからであるとし、半田は筋線維の太さには性による規則正しい差異はなく、栄養状態、職業が大いに関係するとしている。

腓腹筋とヒラメ筋との筋線維の太さは各人生期とも腓腹筋の方がヒラメ筋より大である。

小橋は太い筋線維よりなる筋はその収縮にあたり強

表 14. 各人生期における下腿三頭筋横断筋線維の面積平均値 ($\mu^2/100$)

	第一成熟期	第二成熟期	第三成熟期	第四成熟期	第一老年期	第二老年期
腓 腹 筋	23.2 ± 0.57	22.5 ± 0.35	22.4 ± 0.35	23.2 ± 0.08	22.9 ± 0.22	21.7 ± 0.54
ヒラメ筋	21.3 ± 0.51	20.8 ± 0.74	20.8 ± 0.91	20.7 ± 0.98	21.4 ± 0.61	20.7 ± 0.26

い力を出し、持続的に働く筋は細い筋線維を有するとしている。いま、持続的に働く筋の代表として相沢の呼吸筋についての計測をみると、最大は第二成熟期における内肋間筋胸骨側の $15.7 \pm 0.72 \mu^2/100$ 、最小は第二老年期における内肋骨筋背椎側の $7.6 \pm 0.67 \mu^2/100$ で、下腿三頭筋における値はこれらに比べて大である。

I. 下腿三頭筋線維の形状および周囲組織の年令的变化

下腿三頭筋々線維の横断面の形は若年期には三角形ないし五角形のものが多く、整然と排列しているが、第三成熟期にはその形が不正形をなすものがあり、第四成熟期には不正形のものが多くなり、扁平に圧平された状態のものがみられ、また膨化した如き不正円形を呈するものもある。

筋鞘は第一、第二成熟期には巾が狭いが、第三成熟期以後には巾広くなり、筋鞘を形成する結合組織が増量している。また筋線維間に存する強染性の核を有する結合組織は第一、第二成熟期には均一の巾を有して薄く、相隣れる筋線維間に一線を描くようにみえる。すなわち、若年期には筋線維の排列は密で、各筋線維間の間隙は少ない。第三成熟期以後この結合組織は増殖し筋線維を分離したようにみえる。すなわち筋線維の排列は疎となる。

個々の筋線維の境界は若年期には明瞭であるが、第三成熟期以後には境界不鮮明なものがみられ、相隣れる筋線維が融合したようにみられるものがある。第四成熟期以後には殆んどすべての例に筋線維の融合像が散在しているのがみられた。

筋鞘には微細な弾性線維が認められ、特に外筋鞘に多い。この弾性線維は若年期にはその波形がゆるやかで比較的太いが、人生期の進むにしたがい細くなり、かつこまかく迂曲しているものをみるようになる。老年期には弾性線維は細くかつ迂曲度を増すとともに所々に断裂を示すようになり、若年期に比べて脆弱な観を呈する。

J. 踵骨腱の組織学的構造

踵骨腱の腱線維は平行して走り、太い線維よりなる腱束と細い線維よりなる腱束とが混在している。若年期には細い線維と太い線維とがほぼ同量にみられるが、人生期の進むにしたがい細い線維により構成される腱束が比較的多くみられるようになる。また、若年期には腱線維の染色は良好であるが、第一老年期には細い腱線維の染色の不良なものがあり、また部分的に

腱線維の断裂したものがみられる。

腱細胞は若年期にはその染色状態は良好であるが老年期には染色状態の悪いものがみられ、かつ腱細胞が細くみえるものが増加している。腱細胞数は一般に人生期別に著変はないようであるが老年期には少ないものもある。平均腱細胞数は一辺 13.5μ の正方形中に 25 ± 0.3 である。

腱束間の内腱周膜および腱をつむむ外腱周膜の結合組織は、若年期には少ないが人生期の進むにしたがい増量して巾が広くなる。なお、第一老年期以後には結合組織内の脂肪組織を多くみるようになる。

内・外腱周膜にも弾性線維をみるが、筋鞘におけると同様に若年期には比較的太くかつ波形がゆるやかであるが、人生期の進むにしたがい細くかつ迂曲の波形がこまかくなり、老年期には所々に断裂がみられる。

K. 下腿三頭筋々線維束間動脈直径

動脈直径の計測には、相対する外膜周縁の距離を数ヶ所において計測し、その平均値をもつて直径の平均値とした。

下腿筋内の動脈については、泉は死体の下肢動脈内に血管造影剤を注入してレントゲン検査を行ない、筋内動脈分布につき報告している。腓腹筋上部は膝動脈、中央部以下では主に腓腹動脈が毛根状分岐をなし広く筋下半に分布し、下部では内側より後脛骨動脈筋枝、外側より腓骨動脈筋枝の細小なものが入り斜上方に向つて分布している。また、ヒラメ筋では上部は内・外側下膝動脈の分枝、中央部にては内側に後脛骨動脈、外側に腓骨動脈の筋枝が分布し、下部では腓骨動脈が分布しているという。その分布図より推してみると、著者の作製せる下腿三頭筋の5カ所における横断組織標本にあらわれる筋線維束間動脈は、上記諸動脈の混在していることが考えられるが、著者は同一標本における筋線維束間動脈は動脈名により分類することなく一括して直径の平均値を求めた。壁厚についても同様である。

腓腹筋およびヒラメ筋の筋線維束間動脈の直径の平均値を表15に示す。腓腹筋 $145.0 \pm 1.21 \mu$ 、ヒラメ筋 $143.7 \pm 2.56 \mu$ は林の報告中にみられる値よりも小である。

表 15. 下腿三頭筋線維束間動脈の直径、壁厚、厚度率の平均値

筋 肉 筋	直 径 (μ)	壁 厚 (μ)	厚度率 (%)
腓 腹 筋	145.0 ± 1.21	47.3 ± 2.11	31.5 ± 2.02
ヒラメ筋	143.7 ± 2.56	45.0 ± 1.40	34.7 ± 1.48

L. 直径と年齢との関係

各人生期別に下腿三頭筋々線維束間動脈の直径平均値を求めて表 16 に示す。小林, 田所, 今井, 青井らはそれぞれ大なる動脈直径につき計測し, いずれも年齢とともに直径は増大すると述べ, 林は下腿諸筋々線維

束間動脈について全般的に第一成熟期以後大なる直径を有する動脈が多いとしているが, 著者の計測においては各人生期別に大なる差異はみとめられない。この点海老沢の四肢筋における報告の小動脈では加令的に直径の増大はみとめがたいとしているのと一致する。

表 16. 表各人生期における筋線維束間動脈の直径平均値 (μ)

筋 肉 名	第一成熟期	第二成熟期	第三成熟期	第四成熟期	第一老年期	第二老年期
腓 腹 筋	144.8 $\pm$ 1.63	147.0 $\pm$ 2.23	139.6 $\pm$ 4.14	148.7 $\pm$ 0.86	144.0 $\pm$ 1.41	148.0 $\pm$ 1.87
ヒラメ筋	132.7 $\pm$ 7.77	148.5 $\pm$ 1.77	145.0 $\pm$ 3.35	151.7 $\pm$ 1.65	150.1 $\pm$ 3.50	144.0 $\pm$ 1.41

M. 同一筋内における筋線維束間動脈直径の比較

ヒラメ筋をI, II, III (図 1) において横断し, その各々における筋線維束間動脈の直径の平均値を各人生

期別に求めて表 17 に示した。これによれば直径は部位的な差異はなく, また加令的に増加の傾向も認められない。

第 17. ヒラメ筋線維束間動脈の各切断部位における直径 (μ)

人生期別 部位	第一成熟期	第二成熟期	第三成熟期	第四成熟期	第一老年期	第二老年期
I	134.6 $\pm$ 3.66	143.5 $\pm$ 5.47	153.0 $\pm$ 2.87	152.8 $\pm$ 2.35	146.4 $\pm$ 1.44	145.3 $\pm$ 2.86
II	125.0 $\pm$ 5.25	157.5 $\pm$ 7.38	134.3 $\pm$ 3.84	149.8 $\pm$ 2.35	150.3 $\pm$ 1.76	130.4 $\pm$ 6.65
III	138.3 $\pm$ 4.94	142.5 $\pm$ 0.42	147.2 $\pm$ 7.13	146.7 $\pm$ 1.70	137.0 $\pm$ 1.76	145.4 $\pm$ 4.76

N. 下腿三頭筋々線維束間動脈の壁厚

壁厚の計測には一動脈につき 4 カ所の壁厚を計測しその平均値をもつてその動脈壁厚とした。下腿三頭筋々線維束間動脈壁厚の平均値は表 15 に示す如くで, 腓腹筋 47.3 $\pm$ 2.11 μ , ヒラメ筋 45.0 $\pm$ 1.40 μ である。この値は林の報告中にみられる値より小である。

O. 下腿三頭筋々線維束間動脈の壁厚と

年齢との関係

壁厚の平均値を各人生期別に求めて表 19 に示す。これによつてみれば, 第一成熟期には腓腹筋 40.5 $\pm$ 1.

02 μ , ヒラメ筋 41.5 $\pm$ 0.56 μ であるが, 以後加令とともに増加し, 第四成熟期には急激な増加を示し, 第一老年期にはそれぞれ 56.0 $\pm$ 1.41 μ , 55.7 $\pm$ 0.22 μ と最大値を示している。今井, 青井はそれぞれ上肢ないしは下肢の筋動脈について, また海老沢, 林, 相沢はそれぞれ上肢, 下肢または呼吸筋の筋線維束間動脈につき報告しているが, いずれも動脈の壁厚は加令的な増加を示すとしている。著者の下腿三頭筋についても同様加令的な壁厚の増加がみとめられる。

表 18. 各人生期における筋線維束間動脈の壁厚平均値 (μ)

人生期別 筋肉名	第一成熟期	第二成熟期	第三成熟期	第四成熟期	第一老年期	第二老年期
腓 腹 筋	40.5 $\pm$ 10.2	43.8 $\pm$ 0.93	42.0 $\pm$ 1.01	49.4 $\pm$ 2.35	56.0 $\pm$ 1.41	55.7 $\pm$ 1.65
ヒラメ筋	41.5 $\pm$ 0.56	41.8 $\pm$ 0.89	42.0 $\pm$ 0.74	51.0 $\pm$ 1.70	55.7 $\pm$ 0.22	55.2 $\pm$ 0.71

P. 同一筋における筋線維束動脈壁厚の比較

ヒラメ筋の I ないし III の部における筋線維束間動脈壁厚の平均値を各人生期別に表 18 に示す。壁厚は部

位的な差異は認めがたいが, 年齢的变化は各部位とも第四成熟期以後著明に増大する。

表 19. ヒラメ筋線維束間動脈の各切断部位における壁厚 (μ)

人生期別 部位	第一成熟期	第二成熟期	第三成熟期	第四成熟期	第一老年期	第二老年期
I	42.7 $\pm$ 0.95	45.0 $\pm$ 1.27	42.8 $\pm$ 1.42	50.7 $\pm$ 0.54	58.5 $\pm$ 1.06	57.4 $\pm$ 0.46
II	41.3 $\pm$ 1.68	38.0 $\pm$ 1.82	39.6 $\pm$ 2.62	52.0 $\pm$ 0.48	52.4 $\pm$ 0.89	53.7 $\pm$ 0.84
III	42.0 $\pm$ 1.02	43.3 $\pm$ 0.55	43.4 $\pm$ 1.37	53.7 $\pm$ 0.54	56.3 $\pm$ 0.89	57.5 $\pm$ 1.52

Q. 下腿三頭筋々線維束間動脈の直径と

壁厚との関係

上記により下腿三頭筋々線維束間動脈の直径および壁厚の大体を察知し得るが, さらにその壁厚と直径の

比を百分率をもつてあらわし, これを厚度率として各人生期別に比較して表 20 を得た。厚度率は壁厚の加令的增加に比例して増加している。すなわち, 第一成熟期には腓腹筋においては 28.6 $\pm$ 0.74%, ヒラメ筋

では $31.3 \pm 0.53\%$ であるが、以後大体人生期の進むにしたがい増加し、第一老年期にはそれぞれ、 $39.1 \pm 0.71\%$ 、 $37.2 \pm 0.63\%$ となつている。

下腿三頭筋々線維束間動脈にあつては、直径の加令

的增加は著明でなく、壁厚の加令的增加が著明であることがわかり、この点、海老沢、林、相沢の筋線維束間動脈の直径、壁厚の年令的変化と同様である。

表 20. 各人生期における筋線維束間動脈の厚度率平均値 (%)

筋肉名	人生期別	第一成熟期	第二成熟期	第三成熟期	第四成熟期	第一老年期	第二老年期
腓腹筋		28.6 ± 0.74	29.1 ± 1.58	30.1 ± 0.46	33.0 ± 0.66	39.1 ± 0.71	37.0 ± 1.72
ヒラメ筋		31.3 ± 0.53	29.0 ± 0.77	29.2 ± 0.64	33.7 ± 0.52	37.2 ± 0.63	38.2 ± 0.49

R. 腓腹筋およびヒラメ筋の筋線維束間動脈の比較

表 15, 表 16, 表 19, 表 20 により各々を比較すれば、直径は第二成熟期、第三成熟期を除き腓腹筋がヒラメ筋より大である。壁厚は第二成熟期、第三成熟期および第一老年期にはヒラメ筋が大であるが、他の人生期には逆の関係にある。厚度率は第一成熟期、第四成熟期および第二老年期にはヒラメ筋が大で、他の人生期には逆の関係にある。これらの結果は林の報告と多少異なつている。

以上から腓腹筋およびヒラメ筋の筋線維束間動脈の直径、壁厚、厚度率には、判然とした差異はないといふ得よう。

S. 踵骨腱の動脈

一般には腱は血管は少なく白色を呈するが、外腱周膜は比較的血管に富むとされている。Rau は新産児から 45 才に至る 6 死体の四肢腱を検査し、腱は幼若なものでは腱内を縦走する動脈と外腱周膜の血管網から血流をうけているが、30 才以上になると腱内部の血管は閉鎖して少なくなり主として外腱周膜から血流をうけるとしている。Dychno は腱の血管に造影剤を注入してレントゲン検査を行い、外腱周膜には多数

の血管網があり、之より微細な分枝が腱内に入ると述べている。また、金田は家兎、猫、人の腱につき組織学的に検査し、踵骨腱は他の腱よりも内・外腱周膜は血管に富むとしている。

著者の例では、腱束間には内腱周膜とともに血管がみられるが、その数はきわめて少なく、また動脈の直径は小で平均 $81.2 \pm 2.33 \mu$ である。これに反し、外腱周膜には動脈の数は比較的多く、かつその直径も大である。外腱周膜の動脈の直径、壁厚、厚度率を表 21 に示す。これによつてみると外腱周膜の動脈は年令の増加とともに直径、壁厚の増大を示している。すなわち直径は第一成熟期には $162.9 \pm 5.02 \mu$ であるが、年令とともに増大し第一老年期には $201.6 \pm 0.35 \mu$ となつており、また壁厚は第一成熟期には $58.9 \pm 1.03 \mu$ であるが年令とともに増大して第二老年期には $74.0 \pm 2.34 \mu$ となつている。厚度率も大体加令的に増大しているが、その増大の割合は著しくない。第四成熟期にむしろ減少しているのは被検例の少いことによるかと思われる。

踵骨腱の外腱周膜の動脈は腱の後面には少なく、腱の前面に多く集合している。

表 21. 踵骨腱外腱周膜の動脈の直径、壁厚、厚度率の平均値

諸計測	人生期	第一成熟期	第二成熟期	第三成熟期	第四成熟期	第一老年期	第二老年期
直径 (μ)		162.9 ± 5.02	170.4 ± 3.45	175.4 ± 7.12	188.3 ± 4.90	201.6 ± 0.35	192.9 ± 4.90
壁厚 (μ)		58.9 ± 1.03	57.4 ± 1.36	62.1 ± 3.30	63.3 ± 2.93	73.2 ± 5.76	74.0 ± 2.34
厚度率 (%)		35.1 ± 1.82	34.5 ± 0.94	42.5 ± 4.01	33.6 ± 0.53	36.4 ± 0.35	39.4 ± 1.60

T. 下腿三頭筋々線維束間動脈および踵骨腱の動脈の組織学的変化

下腿三頭筋々線維束間動脈および踵骨腱の動脈は細小動脈に属し、内・中・外膜の 3 層よりなつている。内膜は内皮細胞、内皮下組織および内弾性板よりなり、中膜は輪走平滑筋線維よりなり、外膜は線維な結合組織線維よりなつている。

動脈は年令の増加とともに生理的または病理的变化をきたす。以下各層の変化につき記述する。

a) 内膜：内膜の年令的变化は、主としてその肥厚および硬化であると考えられる。いま便宜上、内膜の変化を次の 5 型に分類した。ただし、移行型とみられるものは最も近似した型に入れることにした。

- i) 結合組織の増殖のみとめられないもの (—)
- ii) 内膜肥厚がきわめて軽度のみみられるもの (±)
- iii) 部分的に肥厚のみみられるもの (+)
- iv) 肥厚の明かにみとめられるもの (++)
- v) 内膜肥厚に加うるに硬化像のみとめられるもの

(卅)

この分類に従い、下腿三頭筋々線維束間動脈および踵骨腱の動脈の内膜変化を、各例につき表示すると表 22 の如くである。これをみるに 25 才において外腿周膜の動脈にきわめて軽度以内膜結合組織の増殖をみるものがあり、29 才にて部分的に内膜肥厚をみ、41 才にて内膜肥厚著明なるものあり、第四成熟期には大多数に内膜肥厚の著明なものあり、第一老年期以後大

表 22. 年令別下腿三頭筋線維束間動脈及び外腿周膜内動脈の内膜変化

筋名 年令	腓腹筋	ヒラメ筋	外腿周膜	筋名 年令	腓腹筋	ヒラメ筋	外腿周膜
22	—	—	—	49	++	++	++
23	—	—	—	50	+	++	++
23	—	—	—	55	++	++	++
23	—	—	—	56	++	++	++
25	—	—	±	56	++	+	++
27	—	—	—	57	++	++	++
27	—	—	—	60	++	++	++
29	+	—	+	61	++	++	++
33	±	—	—	61	++	++	++
33	—	+	+	62	++	++	++
33	—	—	—	68	++	++	++
34	—	+	+	70	++	++	++
35	—	—	+	72	++	++	++
36	+	+	+	74	++	++	++
41	—	+	+	75	++	++	++
41	—	++	+	79	++	++	++
45	+	+	+	79	++	++	++
45	+	+	++	80	++	++	++
46	+	++	+	80	++	++	++

多数に硬化像をみとめた。青井は下肢主要動脈において、19 才に部分的な内膜肥厚をみ、20 才ですでに内膜肥厚の著明なものをみている。林は下腿筋々線維束間動脈について、27 才で部分的な内膜肥厚をみとめたという。今井は上肢主要動脈において、29 才に部分的な内膜肥厚をみとめ、32 才で著明な内膜肥厚をみている。海老沢は上肢筋々線維束間動脈について、部分的な肥厚が 39 才であられたのをみている。かゝる先人の報告および著者の例から考察すると、下肢においては上肢におけるよりも内膜変化の発現が早期であることがうかがわれる。

b) 中膜：細小動脈の中膜は、主として輪走の平滑筋線維よりなり、弾性線維はきわめて少ないといわれている。老年期に至ると平滑筋線維は萎縮し、部分的断裂・硝子様変性をみとめるようになるとされているが、著者の例では明らかな硝子様変性はみとめられなかつた。また、弾性線維はきわめて僅かにみとめるも

のとみとめないものとあり、その形状は線状あるいは螺旋状をなすが、この形状は年令的な変化とは思われない。

c) 外膜：外膜は縦走線維性結合組織よりなり、周囲の疎性結合組織に移行しているが、その境界は明瞭ではない。その移行の状態は点状、綿糸状、綿糸点状をなすとされているが、これらの状態は同一標本でも混在してみられ、年令的な変化とは思われない。

総括並に結論

本邦人屍 46 体 (22~80 才、男子 31、女子 15)

の下腿三頭筋および踵骨腱につき肉眼的ならびに組織学的検索を行い、概ねつぎの如き結果を得た。

1. 腓腹筋内・外両側筋腹の最遠位端より踵骨上縁までの距離は表 2 の如くで、他人種のものおよび先人の報告による日本人のものより小である。
2. 腓腹筋内側筋腹は外側筋腹よりも遠位に下るものが多い。
3. 腓腹筋の内・外両側筋腹の結合最遠位点より踵骨にいたる距離は表 5 の如くで、先人の報告した日本人のものはほぼ等しい。
4. 腓腹筋終止腱の最大巾は表 6 の如くで、他人種のものより小であるが、先人の報告による日本人のものよりは太である。
5. 踵骨腱の最小巾は表 6 の如くで、他人種のものおよび先人の日本人についての値とはほぼ同じである。
6. 踵骨腱の厚さは表 8 の如くで、男女間に著差をみとめない。

7. ヒラメ筋の筋腹最遠位端より踵骨に至る距離は表 9 に示す如くで、他人種のものおよび先人の報告による日本人のものよりも小である。

8. 足底筋の欠損率は 10.4% で、他人種におけるより大であり、他の報告による日本人のものとはほぼ等しい。

9. 下腿三頭筋および踵骨腱を所定の 5 カ所で水平に横断して、その各々の部における筋および腱の巾・厚さを人生期別に示すと、表 12 の如くである。巾は各部とも加令とともに減少の傾向を示すが、また例外もある。厚さは加令とともに増加の傾向がみとめられる。また、その厚度率は加令とともに増加の傾向がある。

10. 下腿三頭筋線維の太さの計測には相沢の方式に従った。その面積は加令的な傾向はみとめられない。また、腓腹筋の筋線維はヒラメ筋のものよりも太い。

11. 筋線維横断面の形は三角形ないし五角形で若年

期には密に排列しているが、加齢とともに筋線維の排列は疎となり、かつその形は不正形をなすものが多い。

12. 筋鞘は加齢とともに巾広くなり、結合組織は増量する。筋線維間の結合組織も加齢と共に増殖する。

13. 個々の筋線維の境界は若年期には明瞭であるが、第三成熟期以後になると境界の不鮮明なもの、融合像がみられる。なお、筋腱移行部（縦断）は老年のものでは腱線維は萎縮し筋線維は膨化して恰も同部の温湯資料による所見を呈するものもみられる。

14. 筋鞘の弾性線維は老年期には細くかつ迂曲がこまくなり、所々に断裂をみるようになる。

15. 踵骨腱線維は加齢とともに細い線維のものが多くなり、その染色不良のもの、断裂を示すものもある。

16. 腱細胞は老年期には染色不良のもの、細くみえるものが増す。腱細胞数は一般に年令的な変化は少ない。

17. 内・外腱周膜の結合組織は加齢とともに増量する。弾性線維は老年期には細くかつこまかく迂曲し、所々に断裂をみる。

18. 下腿三頭筋々線維束間動脈の直径平均値は表15の如くである。

19. 下腿三頭筋々線維束間動脈直径の加齢的増加は著明でない。

20. ヒラメ筋を所定部位別に筋線維束間動脈の直径を比較するに、加齢的にも部分的別にも変化を認めがたい。

21. 下腿三頭筋々線維束間動脈の壁厚は表 15 に示す如くである。

22. 各人生期別の筋線維束間動脈の壁厚は表 19 の如くで、加齢的増加が認められる。

23. ヒラメ筋の所定部位における筋線維束間動脈壁厚の部位的差異は少ないが、加齢的増大は著明である。

24. 下腿三頭筋々線維束間動脈の厚度率は表 20 の如くで、加齢的増加が認められる。

25. 腓腹筋およびヒラメ筋の筋線維束間動脈の直径、壁厚、厚度率には判然とした差異を認めがたい。

26. 踵骨腱々束間の動脈は数少なく、直径も小である。外腱周膜には動脈比較的多く、かつその直径も大である。その直径、壁厚ともに加齢的増加を示す。

27. 踵骨腱外腱周膜の動脈は腱の前面に多い。

28. 下腿三頭筋および踵骨腱の動脈は内膜変化の発現時期が早いようである。すなわち

a) 25 才において軽度の内皮下結合組織の増殖を

みるものがある。

b) 29 才に部分的な内膜肥厚をみる。

c) 第四成熟期には内膜肥厚の著しいものが多い。

d) 第一老年期には殆んどすべてに硬化像をみる。

29. 中膜の平滑筋線維に硝子様変性の明かなものは認められなかつた。弾性線維は僅量に線状・螺旋状のものがあるが、年令的な変化とは思われない。

30. 外膜結合組織の周囲への移行は明瞭な境界を認めがたく、また結合組織線維走行の年令的な変化は顕著でない。

以上の成績は限られた範囲の資料に基づくもので、個人の体格、職業など生理学的或は環境の諸条件による差異を来すであろうことは想像に難くない。

稿を終るにあたり、ご懇篤なるご指導ご校閲を賜つた恩師金子丑之助教授に深甚の謝意を表わし、さらに資料採取にご協力を頂いた教室吉川講師並びに一方ならぬご指示を戴いた海老沢、相沢両学兄、標本作製にご協力をいただいた教室田村氏に衷心より感謝申上げる。

文 献

- 1) 相沢昌：主要なる呼吸筋線維束間動脈及び同筋線維の年令的变化，日医大誌，**27**，1805 (1960)
- 2) 青井文男：日本人下肢動脈管についての一二の計測とその組織学的構造，日医大誌，**22**，996 (1955)
- 3) 青井文男：日本人胎児の下肢動脈，日医大誌，**22**，848 (1955)
- 4) 泉隆夫：邦人下肢に於ける筋動脈，名古屋医学会誌，**53**，443 (1941)
- 5) 今村貞勝：日本人下腿筋の研究，医学研究，**20** 813 (1950)
- 6) 稲葉義春：呼吸筋の比較組織学的研究，解剖学誌，**20** 181 (1942)
- 7) 今井良一：本邦人上肢動脈管に就ての一二の計測と其組織学的構造，日医大誌，**20**，277 (1953)
- 8) 碓泰輔：人胎児の下肢筋の研究，医学研究，**20**，1277 (1950)
- 9) 海老沢俊彦：上肢筋線維束間動脈の年令的变化，日医大誌，**25**，999 (1958)
- 10) 押見賢一：血管壁弾力繊維の性状，北海道医誌，**17**，966 (1939)
- 11) 金子丑之助：日本人体解剖学，I，II，III 卷
- 12) 金子丑之助：最新組織学
- 13) 金田靖：生後発育中の家兎、猫、人の腱組織の構造の変化，日本組織学記録，**2**，115 (1951)
- 14) 久藤実：年令と橈骨動脈の組織学的変化に就て，台湾医学会誌，**253**，352 (1926)
- 15) 小橋成：骨格筋の弾力繊維：解剖学誌，**10**，94 (1937)
- 16) 佐藤俱正：筋性型動脈の外弾性膜の構造及中膜との結合並に一般動脈壁に於ける弾力線維の分布に就て，岡山医学会誌，**444**，30 (1927)
- 17) 椎名順二：アイヌ人の下肢筋に就て，福岡医大誌，**24**，363 (1931)
- 18) 下総高次：筋組織と腱と筋膜，そのつながり方と発生，解剖学誌，**26**，77 (1951)

- 19) 下総高次：筋膜の発生，日本組織学記録，**3**，347 (1952)
- 20) 下総高次：筋線維と腱線維との接続関係，解剖学誌，**29**，197 (1954)
- 21) 田所豊：邦人動脈管についての一二の計測，解剖学誌，**2**，718 (1929)
- 22) 高石敏：日本人の腹直筋及び上下腹壁動脈について，日医大誌，**24**，711 (1957)
- 23) 富永忠人：哺乳類の四肢筋の比較組織学的研究，解剖学誌，**21**，114 (1943)
- 24) 中台元治：筋線維と腱線維の連接に就て，熊本医学会誌，**8**，238 (1932)
- 25) 半田稔：人の肋間筋の組織学的研究，解剖学誌，**23**，14 (1948)
- 26) 半田稔：人の頸筋の線維の太さ，解剖学誌，**23**，42 (1948)
- 27) 半田稔：人の背柱及胸壁と肩部との間の諸筋の筋線維の太さに就て，日本組織学記録，**1**，307 (1951)
- 28) 平井達二：よく運動する動物としない動物の横紋筋の比較組織学的研究，解剖学誌，**21**，(1943)
- 29) 林昭三：下肢筋線維束間動脈の年令的变化，日医大誌，**26**，305 (1959)
- 30) 福場友重：動脈の正常構造に関する考察，広島医学，**4**，120 (1951)
- 31) 真鍋茂良：微細血管分布構造に就ての二三の考察，広島医学，**4**，203 (1951)
- 32) 真鍋茂良：筋の微細血管分布構造，広島医学，**4**，132 (1951)
- 33) 宮地徹：臨床組織病理学
- 34) 森進：血管弾力線維の発生並に内被細胞の内弾性膜造生，長崎医学会誌，**13**，1049 (1953)
- 35) 飯田善雄：上胎筋々線維について日医大誌，**28**，1961 (1961)
- 36) Adachi, Buntaro : Beiträge zur Anatomie der Japaner. XII. Die Statistik der Muskelvariätäten, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, **12**, 261 (1910)
- 37) Agrippine Nakonetschny : Vergleichende Untersuchungen über die Struktur einiger Arterien in kontrahierten und ausgedehnten Zustände, Virchows Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medizin, **243**, 39 (1923)
- 38) Benninghoff A. : Über die Beziehungen zwischen elastischen Gerüst und glatten Muskulatur in der Arterienwand und ihre funktionelle Bedeutung, Zelforschung **6**, 348
- 39) Erna Glaesmer : Die Beugenmuskeln am Unterschenkel und Fuß bei den Marsupialia, Insectivora, Edentata, Prosimiae und Simiae, Morphologisches Jahrbuch, **41**, 149 (1910)
- 40) E.K. Wolff : Über die Elastica der grossen Arterien, II. Mitteilung, Virchows Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medizin, **275**, 516 (1929)
- 41) Georg Ruge : Beiträge zur Gefässlehre des Menschen, Morphologisches Jahrbuch, **9**, 329 (1884)
- 42) Handa, Minoru : Histologische Untersuchung des Musculus omohyoideus des Menschen, 日本組織学記録, **1**, 231 (1950)
- 43) Hans Hermann Loetzk : Über die Achillessehne mit Fascienverhältnisse beim Menschen und den Subkutanraum in Bereich der Wadenmuskulaturen, Anatomischer Anzeiger, **103**, 287 (1956)
- 44) Hedwig Frey : Musculus gastrocnemius tertius, Morphologisches Jahrbuch, **50**, 517 (1919)
- 45) Hedwig Frey : Der Musculus triceps surae in der Primatenreiche, Morphologische Jahrbuch, **47**, 1 (1913)
- 46) Hirai Tatuji : Vergleichende histologische Untersuchungen der Skelettmuskeln des Haus- und Wildkaninchens, Folia anatomica japonica, **22**, 41 (1942)
- 47) Hirai, Tatuji : Planimetrische Untersuchung der Skelettmuskeln der weissen Ratte, Folia anatomica japonica, **22**, 147 (1942)
- 48) Inaba, Yoshiharu : Vergleichende Histologie der Atemmuskeln, Folia anatomica japonica, **22**, 1 (1942)
- 49) Josef Halben : Die Dicke der quergestreiften Muskelfasern und ihre Bedeutung, Anatomische Hefte, **3**, 269 (1894)
- 50) Kohashi, Yoshi : Histologische Untersuchungen der verschiedenen Skelettmuskeln beim Menschen [I], Folia anatomica japonica, **15**, 175 (1937)
- 51) Kohashi, Yoshi : Histologische Untersuchungen der verschiedenen Skelettmuskeln beim Menschen [II], Folia anatomica japonica, **15**, 263 (1937)
- 52) Kohashi, Yoshi : Über histologische Untersuchungen der einzelnen Skelettmuskeln beim Neugeborenen, Folia anatomica japonica, **15**, 411 (1937)
- 53) Kohashi, Yoshi : Masse und Verteilung der Fibrillen in der Fasern verschiedenen Skelettmuskels, Folia anatomica japonica, **20**, 215 (1941)
- 54) Kohashi, Yoshi : Histologische Untersuchungen über die Atemmuskeln des Menschen, Folia anatomica japonica, **20**, 201 (1941)
- 55) Masuda, Masatoshi : Feingewebliche Veränderungen der Sehnenfasern in der ersten Entwicklung beim Kaninchenembryo; 日本組織学記録, **3**, 53 (1951)
- 56) Margarete Hesse : Über die pathologischen Veränderungen der Arterien der oberen Extremität, Virchows Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medizin, **261**, 225 (1926)
- 57) Inaba, Yoshiharu : Über die Altersveränderungen des Sphincter ani externus des Menschen, Folia anatomica japonica, **22**, 13 (1942)
- 58) Inaba, Yoshiharu : Vergleichende Histologie des Sphincter ani externus, Folia anatomica japonica, **22**, 67 (1942)
- 59) Hayashi, Akira : Histobiometrical study of the ocular muscles of Japanese fetuses, Folia anatomica japonica, **21**, 259 (1941)

竹岡論文附图（1）

1) ヒラメ筋 25才, ♀
(筋線維は多角形を呈し, 各筋線維間結合組織は僅少にして密在す)

2) ヒラメ筋 49才, ♀
(筋線維間の結合組織はやゝ増量す)

3) ヒラメ筋 62才, ♀
(筋線維は疎に排列し, その形も不正となり, 部分的に融合像を認める)

4) ヒラメ筋 79才, ♀
(筋線維の排列はきわめて疎となり, その間の結合組織増量す。不正形のもの圧平されたもの, 融合せるものなどを認める)

5) 踵骨髄 25才, ♀
(髄細胞は可染し, 髄線維は発育可良)

6) 踵骨髄 60才, ♀
(髄細胞の染色はやや不良, 髄線維は萎縮する)

竹岡論文附図（2）

7) ヒラメ筋線維束間動脈 23才, 合
(内膜下結合組織の増量を認めがたい)

8) 腓腹筋線維束間動脈 33才, 合
(内膜下結合組織の増量は不著明)

9) ヒラメ筋線維束間動脈 33才, 合
(内膜下結合組織の増量は不著明)

10) ヒラメ筋線維束間動脈 62才, 合
(内膜の肥厚著明)

11) 腓腹筋線維束間動脈 79才, 女
(内膜硬化を認める)