実験的 Nocardiosis の病理組織学的研究

日本医科大学病理学教室 (指導 河野 林教授)

平 賀 浩 三

Kōzō Hiraga

目 次

第 1 章 緒 言

第 2 章 Nocardia 接種実験

第 1 節 実験材料及び方法

第 2 節 Nocardia asteroides 血管内接種群

第 1 項 N. asteroides 血管内接種初期病変像

第 2 項 N. asteroides 血管内接種中期病変像

第 3 項 N. asteroides 血管内接種末期病変像

第 3 節 Nocardia asteroides 腹腔内接種群

第 1 項 N. asteroides 腹腔内接種初期病変像

第 2 項 N. asteroides 腹腔内接種中期病変像

第 4 節 Nocardia madurae 血管内接種群

第 1 項 N. madurae 血管内接種初期病変像

第 2 項 N. madurae 血管内接種中期病変像

第 3 項 N. madurae 血管内接種末期病変像

第 5 節 Nocardia madurae 腹腔内接種群

第 1 項 N. madurae 腹腔内接種初期病変像

第 2 項 N. madurae 腹腔内接種中期病変像

第 3 項 N. madurae 腹腔内接種末期病変像

第 6 節 Nocardia の感作例

第 1 項 N. asteroides の腹腔感作例

第 2 項 N. madurae の血管及び腹腔感作例

第 3 項 N. madurae の腹腔感作例

第 3 章 総括ならびに考案

第 1 節 Nocardia の歴史・頻度及び好発臓器について

第 2 節 Nocardia 病変の組織像について

第 4 章 結 論

第 1 章 緒 言

Nocardia 症は 1888 年 Nocard¹⁾ が牛の症例を始めて報告し, 1889 年 Trevisan²⁾ はこの病原菌に対して Nocardia asteroides と命名し, 1891 年 Eppinger³⁾ は人の脳・肺に於ける第 1 例を発見し Cladothrix asteroides と命名, この疾患を Pseudotuberculosis cladothrica と称した。以后この疾患に対して種々の名称が附され, 本菌に対し Streptothrix, Cladothrix, Actinomyces, Dyscomycetes 及び Nocardia 等と称していたが, 1943 年 Waksman⁴⁾ 等が桿菌又は球菌様に断裂するところの栄養菌糸網を形成するものを放線菌科とし, その中で好気性のものを Nocardia (属) と呼ぶべきであるとし, 以来この疾患は Nocardiosis と呼ばれる様になった。一方我が国に於ては Strepto-

thrix 症或いは毛状菌症と云われ, 青山・宮本⁵⁾ (1900) の詳細な報告以来, Nocardia 症の剖検例は数例を見るに過ぎない。Nocardia は 33 種⁶⁾ に分類され, 何れも Gram 陽性⁷⁾⁸⁾ で, 抗酸性あるいは非抗酸性であり, Actinomycetes⁹⁾ に属する菌類である。

近年抗生物質の発達は極めて著しく, 種々の抗生物質の出現に伴い治療の効果は目ざましいものがあるに反し, 交代菌現象等の副作用も又見逃せない事実である。即ち最近に至り Streptomycin 等の抗結核剤に対して全く無効の抗酸菌の出現を吾々は経験する所であるが, 吾々はその菌の鑑別及び組織像の判別に困難を感じるに至つた。著者はその点に着目して Nocardia の組織反応, 菌の形態・配置・出現並びに消失等について時間的経過による差異を確かめるべく実験を行つた。

第 2 章 Nocardia 接種実験

第 1 節 実験材料及び方法

1) 使用した菌株は Nocardia asteroides, Nocardia madurae の 2 種で, Duke 株及び順天堂ビルツセンターより御恵与にあずかつたものを使用した。

2) 接種には Sabouraud dextrose 寒天培地に 25°C, 1 箇月間培養したものを滅菌試験管にとり, 生理的食塩水で 10 mg/cc 及び 5 mg/cc の菌液を作成した。

3) 実験動物としては市販雑系白鼠 (体重 100~250 g) 42 匹を用意し, 5 群に分けて, 次の如く処置した。

第 1 群: N. asteroides 10 mg/cc 及び 5 mg/cc の菌液を 0.3 乃至 0.6 cc 尾静脈内接種

第 2 群: N. asteroides 10 mg/cc 及び 5 mg/cc の菌液を 0.3 乃至 0.6 cc 腹腔内接種

第 3 群: N. madurae 10 mg/cc 及び 5 mg/cc の菌液を 0.4 乃至 0.5 cc 尾静脈内接種

第 4 群: N. madurae 10 mg/cc 及び 5 mg/cc の菌液を 0.5 乃至 1.0 cc 腹腔内接種

第 5 群: (1) 第 1 回に N. asteroides 10 mg/cc の菌液 0.6 cc 腹腔内接種, 第 2 回に同菌 5 mg/cc の菌

第1表 *Nocardia asteroides* 接種実験に於ける各臓器の病変所見の概括

接種 方法	菌種番号 重 (グラム)	日 数	接 種 量	脳	心	肺	肝	脾	腎	副腎	リンパ 腺 {腸間膜 そけい窩}	骨髄	睾丸	卵巣	皮 膚 筋組織	腸	大網
血	Na 1 ♂ 130	初 2 死	10 mg/cc 0.6	—	卅 TAN	卅 ⁺ TAN	卅 ⁺ N	卅 ⁺ TAN	卅 ⁺ A	—	—	—	—	—	—	—	—
血	Na 2 ♀ 100	初 4 死	10 mg/cc 0.6	—	卅 ⁺ TAN	卅 ⁺ TAN	卅 ⁺ TA	卅 ⁺ TN	卅 ⁺ T	卅 ⁺ TANG	—	卅 ⁺ T	—	卅 ⁺ AT	卅 ⁺ TANG	—	卅 ⁺ T
血	Na 3 ♂ 130	初 4 死	10 mg/cc 0.3	卅 ⁺ A	卅 ⁺ AN	卅 ⁺ TN	卅 ⁺ TA	卅 ⁺ TA	卅 ⁺ A	卅 ⁺ A	—	卅 ⁺ A	—	—	—	—	—
血	Na 4 ♀ 180	初 4 死	10 mg/cc 0.3	卅 ⁺ A	卅 ⁺ A	卅 ⁺ AN	卅 ⁺ A	卅 ⁺ TA	卅 ⁺ A	卅 ⁺ A	—	卅 ⁺ A	—	卅 ⁺ AT	卅 ⁺ A	—	—
血	Na 5 ♂ 200	初 5 死	10 mg/cc 0.3	卅 ⁺ AN	卅 ⁺ AN	卅 ⁺ AN	卅 ⁺ AN	卅 ⁺ TAN	卅 ⁺ AN	卅 ⁺ AN	卅 ⁺ AN	卅 ⁺ AN	—	—	卅 ⁺ AN	—	—
血	Na 6 ♀ 110	初 6 死	10 mg/cc 0.3	卅 ⁺ A	卅 ⁺ A	卅 ⁺ AG	卅 ⁺ AG	卅 ⁺ TAG	—	卅 ⁺ A	卅 ⁺ AN	卅 ⁺ TA	—	—	—	—	卅 ⁺ AG
血	Na 7 ♀ 140	中 13 死	5 mg/cc 0.3	卅 ⁺ A	卅 ⁺ G	卅 ⁺ TA	—	卅 ⁺ TA	—	卅 ⁺ TAN	卅 ⁺ A	卅 ⁺ A	—	—	—	—	—
血	Na 8 ♀ 145	中 15 殺	5 mg/cc 0.3	—	—	卅 ⁺ T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
血	Na 9 ♀ 95	中 16 死	10 mg/cc 0.6	—	—	卅 ⁺ TAG	卅 ⁺ TG	卅 ⁺ TN	卅 ⁺ N	卅 ⁺ N	卅 ⁺ TN	卅 ⁺ TN	—	卅 ⁺ TG	—	卅 ⁺ TN	卅 ⁺ T
血	Na 10 ♂ 190	中 29 殺	5 mg/cc 0.3	卅 ⁺ A	—	卅 ⁺ T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
血	Na 11 ♀ 130	中 30 殺	5 mg/cc 0.3	—	—	卅 ⁺ T	—	—	—	—	卅 ⁺ A	—	—	—	—	—	—
血	Na 12 ♂ 150	中 34 殺	5 mg/cc 0.3	—	—	卅 ⁺ TG	—	—	卅 ⁺ T	—	卅 ⁺ AG	卅 ⁺ A	—	—	—	—	—
血	Na 13 ♂ 95	中 43 殺	5 mg/cc 0.3	卅 ⁺ A	—	卅 ⁺ T	—	—	—	卅 ⁺ TA	—	—	—	—	—	—	—
血	Na 14 ♂ 250	末 1年 殺	10 mg/cc 0.2	—	—	±	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
腹	Na 15 ♂ 120	初 2 死	10 mg/cc 0.6	—	卅 ⁺ T	卅 ⁺ T	卅 ⁺ T	卅 ⁺ T	卅 ⁺ TN	卅 ⁺ N	—	卅 ⁺ T	—	—	卅 ⁺ AN	—	卅 ⁺ T
腹	Na 16 ♂ 130	初 7 死	5 mg/cc 0.5	—	—	卅 ⁺ TN	卅 ⁺ TN	卅 ⁺ TN	—	—	—	卅 ⁺ TG	—	—	—	—	—
腹	Na 17 ♀ 120	初 10 死	10 mg/cc 0.6	—	—	卅 ⁺ A	卅 ⁺ A	卅 ⁺ AN	卅 ⁺ N	卅 ⁺ N	—	卅 ⁺ AG	卅 ⁺ A	卅 ⁺ A	卅 ⁺ A	—	卅 ⁺ A
腹	Na 18 ♂ 130	中 18 死	10 mg/cc 0.6	—	卅 ⁺ T	—	卅 ⁺ TN	—	—	—	—	—	—	—	卅 ⁺ A	—	—
腹	Na 19 ♂ 130	中 34 死	5 mg/cc 0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
腹	Na 20 ♂ 110	中 36 殺	10 mg/cc 0.6	—	—	—	—	—	卅 ⁺ T	—	卅 ⁺ T	—	卅 ⁺ T	—	—	—	卅 ⁺ T
腹	Na 21 ♂ 160	中 37 殺	5 mg/cc 0.3	—	—	卅 ⁺ TG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
腹	Na 22 ♂ 195	中 37 殺	5 mg/cc 0.3	—	—	卅 ⁺ T	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	卅 ⁺ A

註1：表中の —, +, 卅, 卅⁺, 卅⁺ は病変の有無多寡を示し、所見により判定した。

註2：Tは結節、Aは膿瘍、Nは壊死、Gは肉芽を示す。

註3：血は血管内接種、腹は腹腔内接種；初は初期群、中は中期群、末は末期群を示す。

註4：Na は *Nocardia asteroides* を示す。

液 1.0 cc 腹腔内再接種。(2) 第 1 回に *N. madurae* 5 mg/cc の菌液 0.1 cc 尾静脈内接種。第 2 回に同菌 5 mg/cc の菌液 0.3 cc 腹腔内再接種。(3) 第 1 回に *N. madurae* 5 mg/cc の菌液 0.5 cc 腹腔内接種。第 2 回に同菌 5 mg/cc の菌液 0.5 cc 腹腔内再接種。

4) 病理組織学的検査：飼育斃死例，中間屠殺例について全例剖検を行い，10% Formalin 固定を施して病理組織学的検査を行った。臓器は脳，心，胸腺，肺，肝，脾，膵，腎，副腎，腸管，辜丸，卵巣，皮膚・筋層及び腹膜，リンパ腺（腸間膜，腋窩，鼠径部），骨髓等について検索した。各臓器はパラフィン包埋，6 μ 切片，HE 染色，グラム染色，ロダミン・オーラミン染色，隈部氏結核菌染色，及びパス染色等を施行した。

第 2 節 *Nocardia asteroides* 血管内接種群 (第 1 表)

第 1 項 *Nocardia asteroides* 血管内接種后 2～6 日以内の初期病変像

イ) 肉眼的所見

肺，肝，腎，脾に何れも鬱血高度，結節は粟粒大乃至 1/2 粟粒大で灰白色明界状のものが肺，肝に於ては 6 例中 5 例に，脾，腎に於ては 6 例中 3 例に，何れも多数見られた。又腋窩リンパ腺を中心に血管に沿って多数の 1/2 粟粒大結節が見られたもの 1 例，心に軽度に見られたもの 1 例である。

ロ) 各臓器の病理組織学的所見

1) 脳：6 例中 4 例に大脳・小脳共に粟粒大の小膿瘍を認めた。数として多数ではないが，皮質・髄質の何れにも認められた。

2) 心：全例に小膿瘍の発生を見た。1/4 粟粒大乃至は粟粒大で，筋層内に 6 例中 5 例認めた。即ち心筋の融解壊死，核崩壊物を囲んで好中球の集合あり，所によつては中心部は好中球集合し，周囲に細網細胞の増生の強い小結節の形成があり，全例に少数の菌糸を見た。

3) 肺：最も病変が著明で，鬱血出血高度であり，肺泡 3～4 個を単位とする小さい融解壊死巣及びこの部を囲んで好中球が集合し小膿瘍となり，更に小膿瘍が数個宛融合してかなり大きい膿瘍を形成する。4 日目頃より壊死巣の中心部迄好中球が集合し，その周囲を類上皮細胞，細網細胞で囲み結節形成の像が見られる。巨細胞はないが，細網細胞 2～3 個集合して巨細胞になりかゝつたものを 1 例見た。又肺胞内や血管腔等に線維素析出の高度なもの 6 例中 4 例を数えた。全例に

膿瘍及び結節内に中等数の断節した菌糸を見た。

4) 肝：高度の鬱血，肝細胞の萎縮が全例に著明で，中心静脈壁，静脈洞を中心に小膿瘍が全例に見られた。膿瘍は好中球の 20 数個集合した小膿瘍から，1/2 粟粒大のものまであり，比較的大きな膿瘍は周囲に類上皮細胞及び細網細胞の出現があり，又全く類上皮細胞結節を形成するものも見られた。菌は類上皮細胞結節中には見られなかつたが，膿瘍周辺に中等数の菌糸を認めた。

5) 脾：全例に鬱血・出血が著明に見られ，リンパ濾胞を中心とした小膿瘍が多発し，外周を細網細胞及び類上皮細胞で取り囲んだものが多く，周囲とはかなり明界状である。又 1 例にラ氏型巨細胞の出現があつた。菌糸は膿瘍の周辺に近く中等数認めた。

6) 膵：小膿瘍の多発せるもの 6 例中 5 例あり，好中球及び核崩壊物を中心に，周囲を類上皮細胞で囲む結節もあつた。膿瘍部には菌糸を多数認めた。

7) 腎：全例に著明な変化が見られた。即ち各例とも鬱血は高度で，糸球体及び皮質内小血管を中心に小膿瘍が多発し，特に糸球体は接種菌の栓塞のため係蹄全体の急性壊死或いは限局性壊死を認め，周囲に少数の好中球浸潤を伴うものから全く膿瘍化したもの迄種々多彩な像を示している。髄質部には 1 例に小膿瘍少数を見た。壊死を伴うもの多く 5 例に見られ，線維素の析出著明なもの 3 例であつた。菌は 4 例に見られ，膿瘍中心よりも膿瘍周辺に近く細い桿菌様の菌糸を多量にみとめた。膿瘍周囲に細網細胞，類上皮細胞の増生を中等度に見た。

8) 副腎：6 例中 3 例に小膿瘍形成があり，膿瘍周辺に近く細い桿菌様の菌糸を多量に認めるものが 2 例あつた。部位は皮質に見られるもの 2 例，髄質 1 例で，その周辺に類上皮細胞の出現は 1 例あつた。

9) リンパ腺（腸間膜，腋窩，鼠径）：6 例中 4 例に小膿瘍を主変化とするものあり，壊死を伴うものは 2 例あり，周囲に類上皮細胞の出現高度で，菌は 4 日死亡の 1 例に著明に見られた。その他は洞カタルの像であつた。

10) 骨髓：1 例に小膿瘍が中等数見られ，単球の増生が見られたのみである。

11) 卵巣：6 例中 2 例に膿瘍を主とする結節が卵巣皮質に見られた。周辺には類上皮細胞，線維芽細胞の増生が何れにも見られた。

12) 注射部の皮膚・筋層：6 例中 3 例に皮下脂肪より筋層にかけて小膿瘍が見られ，中心は壊死に陥

り、周辺に核崩壊物が多数あつて、更にその周囲を類上皮細胞、線維芽細胞で取り囲んでいる。こゝには3例とも菌糸が見られた。

13) 大網：6例中2例に病変あり、類上皮細胞結節及び肉芽が1例宛見られた。

第2項 *Nocardia asteroides* 血管内接種后

13~43 日の中期病変像

イ) 肉眼的所見

肺・肝・腎・副腎・脾及び睪に軽度の鬱血並びに灰白色明界状の粟粒大乃至は1/2粟粒大の小結節を中等数認めた。他に特に所見はなかつた。

ロ) 各臓器の病理組織学的所見

1) 脳：大脳及び小脳に粟粒大乃至米粒大のかなり大きい膿瘍が7例中3例に認められ、その中2例に中等数認められた。中心部は好中球及び多量の核崩壊物があり、周囲の反応は少く、毛細管周囲のリンパ球浸潤が軽度に見られたのみである。菌糸は1例に於て膿瘍内に中等量に見られた。

2) 心：1例に心筋間質中に1/2粟粒大の小肉芽を少数認めた。之はリンパ球、線維芽細胞、細網細胞より成る。周囲の筋組織は変性に陥っている。菌は各例共陰性であつた。

3) 肺：結節及び膿瘍を多発するもの7例中2例、肉芽を形成するもの2例。結節は全例にあり中心部は核崩壊物を入れる汚穢な壊死で、その周囲を類上皮細胞及び線維芽細胞で囲み、更に外周を線維性結合織が囲み、幾分古い像を示す。又、膿瘍は粟粒大乃至1/2粟粒大の小膿瘍が融合し、小葉性の大きい膿瘍となり、周辺は類上皮細胞及び線維芽細胞が薄く被包する。肉芽の形成は気管支を中心とし、周囲は細網細胞、単球、類上皮細胞及び新生毛細血管等より成り、好中球は少数混入する。又、極く少数の巨細胞出現も見る。その他の所見としては各例共単球の小集合巣が肺胞壁に見られる。菌は壊死部の周辺に近く細長の菌糸を多量に認めた。

4) 肝：病変を見るものは1例で、全体に鬱血及び肝細胞萎縮が高度で、粟粒大以下の結節が多発している。中心は好中球、核崩壊物で、その周辺は類上皮細胞、線維芽細胞で薄く被包されている。ラ氏型巨細胞が少見られる。結節と周囲組織とは鋭界で、周囲組織には好中球、単球が多数浸潤している。菌は膿瘍、壊死周辺に近く菌糸中等数が見られた。

5) 脾：小結節の多発するもの2例があつた。結節はリンパ濾胞中心に生じ、粟粒大或いは一部融合して

粟粒大以上となり、中心部に好中球及び核崩壊物を入れ、周囲を類上皮細胞、線維芽細胞で囲み、その外周を線維性の結合織で囲んでいるものである。他の1例では結節中心は壊死に陥っているものが大多数であつた。膿瘍壊死部には菌がかなり多量であつた。その外各例共鬱血は中等度、リンパ濾胞の肥大2例、萎縮が2例に認められた。又、洞カタルは各例共中等度であつた。

6) 睪：粟粒大結節少数のもの2例であつた。中心は壊死に陥り、周囲に類上皮細胞、線維芽細胞が多数に出ている。菌は陰性であつた。

7) 腎：結節、膿瘍を形成するもの3例を見る。結節は糸球体を中心としたもの1例あり、粟粒大で、中心は好中球、核崩壊物を入れ、周辺は類上皮細胞、線維芽細胞で囲まれている。腎被膜附近に出来た結節では中心にDruseを形成し、周辺には類上皮細胞、線維芽細胞、新生毛細血管が出て肉芽を形成するものがあつた。又、他の例では中心部に壊死の残つた中古の線維化の進んだ結節と、類上皮細胞結節様のもの各1例宛が認められた。その他の所見としては、尿管の混濁腫脹高度なるもの3例、鬱血は各例に中等度に見られた。

8) 副腎：膿瘍の多発せるもの3例、壊死を伴つた結節1例を認めた。膿瘍例では、副腎の大部分が膿瘍化し、中心部は好中球、核崩壊物が充満し、周辺に線維芽細胞、細網細胞、類上皮細胞及び毛細管新生より成る肉芽を形成するものがあつた。壊死を伴つた結節では、皮質に小結節が10個位融合して粟粒大になつたものがあり、中心部は壊死に陥り、外周には少数の類上皮細胞が出現している。各例に菌が多数に見られた。

9) リンパ腺（腸間膜、腋窩、鼠径）：膿瘍を形成するもの2例、結節形成は1例あつた。膿瘍は各例とも皮質に多く、中心に好中球、核崩壊物を入れ、周辺は類上皮細胞、線維芽細胞、細網細胞等で薄く被包されている。結節形成例は、小結節が多数融合して粟粒大或いは粟粒大以上の結節を形成し、中心は壊死で核崩壊物多く、周囲は類上皮細胞、線維芽細胞で囲まれ、更に外周は硝子様化した結合織で被包され、やゝ古い像を呈する。以上の病変は腸間膜リンパ腺に見られた。その他各例とも洞カタル中等度乃至高度で、又1例には結核の大細胞性増生と同一所見を呈するものがあつた。菌は膿瘍及び壊死部のやや周辺部に中等数見られた。

10) 大網：全体が病巣となつているものが1例あつた。融合性の粟粒大或いは粟粒大以上の結節があり、中心部は壊死に陥り、核崩壊物充滿し、菌の集塊をみる。周辺は線維芽細胞、類上皮細胞で被包し、所々に異物型及びラ氏型巨細胞の出現がある。結節以外の場所では大喰細胞、好中球の高度の浸潤が見られた。

第3項 *Nocardia asteroides* 血管内接種后

1年の末期病変像

イ) 肉眼的所見

長期の変化を剖検し得たのは1例に過ぎなかつた。経過1年のもので、肺に軽度の鬱血、左鼠径リンパ腺の腫大を見るのみで、結節その他の著変を認めなかつた。*Nocardia asteroides* は他菌種に較べて毒性が強く、完全に血管内接種が行われた時には菌量の多少に拘らず既述の如く各臓器に高度の膿瘍を形成して死亡する例が多いためである。

ロ) 各臓器の病理組織学的所見

1) 脳：高度の鬱血を認めたのみである。

2) 心：中等度の鬱血が見られたのみ。

3) 肺：気管支拡張症、気管支炎及び気管支周囲炎が高度に認められた。即ち気管支拡張症は、気管支の拡張及び粘膜上皮の増生が高度で、又、気管支血管周囲に単球及びリンパ球の浸潤を中等度に認めた。気管支炎及び気管支周囲炎では、気管支内に好中球が多量に充滿し、気管支壁及び血管周囲にリンパ球、単球及び毛細管の新生を伴う小肉芽の形成があり、血鉄素細胞の出現が軽度に見られた。肺胞は全般に高度の気腫状を呈し、肺胞壁の線維性増厚がみられた。以上の変化は治癒した病変像と思われる。

4) 肝：鬱血高度、肝細胞萎縮高度の他に著変はない。

5) 脾：鬱血高度、リンパ濾胞の肥大、髄質細胞の中等度増生、洞カタル等の脾炎像を認めたが、膿瘍其の他の治癒したと思われる様な個所はない。

6) 脾：高度の鬱血の他著変を認めない。

7) 腎：鬱血高度で、尿細管の変性及び萎縮と、皮質の血管壁及び糸球体周囲の細胞浸潤が軽度に見られたのみであつた。

8) リンパ腺(腸間膜、腋窩、鼠径)：腋窩リンパ腺に少数の類上皮細胞の集合巣、軽度の洞カタルをみたにすぎない。

第3節 *Nocardia asteroides* 腹腔内接種群

第1項 *Nocardia asteroides* 腹腔内接種后

2~10日以内の初期病変像

イ) 肉眼的所見

1例に腹腔接種部の筋肉内及び腹腔に小出血斑が見られた。又、肺・肝・腎・脾に多数の結節が各例とも認められ、1例にはこの外、心・脾・卵巣・腸管・両腋窩及び鼠径リンパ腺の各表面に極めて多数の灰白色明界状の粟粒大乃至は1/2粟粒大の結節の形成があつた。

ロ) 各臓器の病理組織学的所見

1) 心：結節を認めたものは3例中1例で、粟粒大以下の極めて小さい結節が多数に認められ、中心部は好中球及び核崩壊物で、周辺にはリンパ球、線維芽細胞等が見られるが、類上皮細胞の出現はない。その外に心筋間質内細胞浸潤、心筋浮腫、心筋混濁腫脹等が見られた。

2) 肺：各例とも鬱血が高度で、結節を認めたものは3例中2例あり、膿瘍を生じたものは1例あつた。前者は主として肺胞壁に見られ粟粒大以下の極めて多数の小結節があり、中心部は多量的好中球及び核崩壊物で、周辺に類上皮細胞が薄く囲んだものと、中心は乾酪様壊死に陥り、周囲を類上皮細胞及び線維芽細胞で囲んだもののがあつた。又、血管壁を中心として小結節が多数融合して小葉状となるものもあつた。後者に於ては粟粒大の小膿瘍が多数融合して小葉状の大きな膿瘍を形成している。線維素の析出強く、線維素性肺炎像を呈するもの1例をみた。菌は2例に於て壊死中心部に菌塊となつたもの及び膿瘍外周に菌糸が増生し始めているものが見られた。

3) 肝：多数の結節及び膿瘍を認めたもの各1例宛であつた。結節は1/2粟粒大及び米粒大のものが多発し、小結節中心部には少量の核崩壊物を入れる壊死巣があり、周辺は線維芽細胞及びリンパ球で取り囲まれ、大結節は極く少量の核崩壊物を入れ、エオジンに均一に染まる壊死を中心とし、周辺は極く薄い類上皮細胞、線維芽細胞の層が見られる。巨細胞の出現はない。又、他の部分ではGlisson氏鞘に接して肝細胞の網状壊死が認められた。膿瘍は主に小葉中心部に1/2粟粒大の小膿瘍が多数見られた。一部では静脈壁に単球の集合巣がみられ、小結節形成途上のものも認められた。尚お肝細胞萎縮は1例に高度であつた。菌は2例に見られ、1例では菌糸が増生していた。

4) 脾：全例に鬱血及び出血が比較的高度に認められ、壊死を伴つた結節が3例中2例、膿瘍形成が1例にみられた。結節はリンパ濾胞を中心として中心部壊死或いは類壊死状で、周囲は線維芽細胞、類上皮細胞

で囲まれたものがみられ、膿瘍ではやはり濾胞中心に粟粒大のものが融合して大膿瘍となつたものが極めて多数見られ、外周は類上皮細胞、線維芽細胞で被包されている。これ等の結節は、結核の乾酪化した結節に類似している。巨細胞出現は1例に見られ、やゝラ氏型に近いものである。尚お洞内皮の剥脱、腫大、変性等高度なもの2例を見た。菌は膿瘍及び壊死部共にやゝ長い菌糸を多数認めた。

5) 脾：3例中壊死2例で、腺小葉中に1/2 粟粒大の小壊死巣があり、中心は好中球及び核崩壊物、外周は類上皮細胞、線維芽細胞で被包されている。膿瘍中心に Druse の形成があり、又、その他の部分でも菌糸が壊死周辺部に中等数認められる。

6) 腎：鬱血、壊死巣が全例に見られ、1/4 粟粒大乃至粟粒大の結節が皮質及び髄質に多数あり、中心は核崩壊物を入れる汚穢な壊死で、周囲を線維芽細胞、リンパ球で囲んでいる。又、糸球体中心に膿瘍が見られ、その中に糸球体係蹄が崩壊残存しているのが認められた。又一部に皮質の被膜下、髄質に血管中心性に1/2 粟粒大の結節が少数見られた。中心部は小膿瘍を形成し、周囲は線維芽細胞、リンパ球で被包する。尿細管の変性が2例に見られた。菌は壊死部に菌糸を少数認めた。

7) リンパ腺（腸間膜、腋窩、鼠径）：腸間膜リンパ腺では膿瘍が主で、皮質に融合した大きい膿瘍を形成し、中心は核崩壊物、1例に乾酪化様壊死を認めた。周囲は類上皮細胞、線維芽細胞が整然と並んでいた。洞カタルが各例に見られた。菌は菌糸少量を認めたもの1例、膿瘍中心部の Druse 形成1例であつた。

8) 骨髓：1例に骨髓中に大単球が増生し、粟粒大の膿瘍が少数認められ、外周に類上皮細胞が少数見られた。尚お線維素性血栓で充たされた毛細血管も少数認められた。

9) 卵巣：1例に卵巣周囲の脂肪組織中に粟粒大の膿瘍を多数認めた。周囲は類上皮細胞及び線維芽細胞で被包され、中心に Druse を認め、外周近く菌糸の増生を認めた。

10) 注射部の皮膚・筋層：皮下深部の筋肉内に膿瘍を認めたもの1例であつた。中心は核崩壊物多量で Druse を認めた。周辺は単球の増生が中等度、類上皮細胞が少数出現し、周囲組織とは明界状である。その他皮下脂肪組織中に限局性に1/5 粟粒大の小膿瘍形成1例を見た。

11) 大網：2例に結節多数、高度の細胞浸潤及び高度の血管拡張等を認めた。結節は中心部に小膿瘍形成があり、外周には類上皮細胞少数を認め、一部巨細胞になりかゝつたものがあつた。菌は Druse 形成1例、膿瘍の周辺に近く菌糸少量を認めた。

脳、副腎、睪丸等には著変を認めなかつた。

第2項 *Nocardia asteroides* 腹腔内接種后 18～37 日の中期病変像

イ) 肉眼的所見

1例に注射部腹筋の膿瘍を認めた。大網及び腹膜に結節を認めたもの3例、腋窩及び鼠径リンパ腺の腫大したもの2例、肺に充血及び結節を認めたもの3例、脾の腫大並びに結節を見たもの各1例である。結節は何れも灰白色明界状、1/2 粟粒大で、1例に小葉状明界状の灰白色結節を認め、中に出血斑の散在するのを見た。

ロ) 各臓器の病理組織学的所見

1) 心：結節は5例中1例にあり、心筋線維間に限局性の網内皮増生があり、所々類上皮細胞結節に進展している。各例とも鬱血中等度で、1例に大動脈周囲リンパ腺の大細胞増生が見られた。

2) 肺：結節及び肉芽等を1例に見る。結節は肺実質内で1/5 粟粒大、中心は好中球、単球の集合で、周囲はリンパ球、類上皮細胞及び小型の巨細胞より形成されたものである。肉芽は気管支周囲にあり、比較的大きく、中心は好中球の集塊で、周囲には単球、線維芽細胞、リンパ球及び少数の毛細管新生が認められた。その他5例中3例に細網細胞の限局性増生巣が見られ、気管支肺炎を3例に、気管支周囲リンパ腺の肥大増生が3例に見られた。菌は結節内の膿瘍部に少量見られた。

3) 肝：結節形成は1例で、粟粒大、やゝ多数にみる。結節の中心は核崩壊物を混じた汚穢な小壊死巣で、周囲は薄い類上皮細胞、結合組織で囲まれたやゝ古い結節を認めた。その他肝細胞の中等度萎縮1例、各例とも鬱血は著明であつた。又、この壊死巣内に菌糸を極めて多数認めた。

4) 腎：皮質に1/4 粟粒大の類上皮細胞結節を形成するもの1例あり、尿細管の混濁腫脹は何れも中等度で4例にみられ、菌は認められなかつた。

5) 睪丸：実質内に病変は何れも認められなかつた。唯1例被膜外側の脂肪織内に結節を認めた。小結節の融合した粟粒大のもので細網細胞、類上皮細胞から成り、中心に極く少数の好中球を混ずる。ラ氏型巨

第2表 *Nocardia madurae* 接種実験に於ける各臓器の病変所見の概括

接種 方法	菌種番号 体 重	日 数	接 種 量	脳	心	肺	肝	脾	膵	腎	腎副	リンパ腺 (腸間膜 そけい 腋 窩)	骨髓	睪丸	卵巣	皮膚 筋	腸	大網
血	Nm 23 ♀ 160	初 2 殺	5 mg/cc 0.5	+ T	-	+ T	-	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
血	Nm 24 ♂ 210	初 2 殺	5 mg/cc 0.5	-	-	-	-	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
血	Nm 25 ♂ 240	初 6 殺	5 mg/cc 0.5	-	-	++ T	-	±	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
血	Nm 26 ♀ 145	初 6 殺	5 mg/cc 0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
血	Nm 27 ♀ 200	中 15 殺	5 mg/cc 0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
血	Nm 28 ♂ 230	中 28 殺	5 mg/cc 0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
血	Nm 29 ♀ 170	中 28 殺	5 mg/cc 0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
血	Nm 30 ♂ 250	末 84 殺	5 mg/cc 0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腹	Nm 31 ♀ 160	初 4 殺	5 mg/cc 0.6	-	-	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	±
腹	Nm 32 ♂ 240	初 4 殺	5 mg/cc 0.5	-	-	±	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	±
腹	Nm 33 ♀ 160	中 13 殺	5 mg/cc 0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
腹	Nm 34 ♂ 100	中 36 殺	10 mg/cc 1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
腹	Nm 35 ♂ 130	末 60 殺	10 mg/cc 1.0	-	-	++ T	-	-	-	-	-	++ T	-	-	-	-	-	++ T

註1：表中の-，+，++，+++は病変の有無多寡を示し，所見により判定した。

註2：Tは結節を示す。

註3：血は血管内接種，腹は腹腔内接種；初は初期群，中は中期群，末は末期群を示す。

註4：Nm は *Nocardia madurae* を示す。

細胞も少数出現している。菌は証明されない。

6) 大網：結節形成を2例めた。即ち中心に極く少数の好中球と Druse を有し，その周囲を細網細胞及び線維芽細胞で囲む小結節が融合し粟粒大の結節を作り，又大網，所属のリンパ腺皮質にも小結節を認めた。中心に好中球を混ざる類上皮細胞結節で，ラ氏型巨細胞を認め，外周は細網細胞，リンパ球で被包されている。

脳，脾，膵，副腎，骨髓等には著変を認めなかつた。

第4節 *Nocardia madurae* 血管内接種群

(第2表)

第1項 *Nocardia madurae* の血管内接種后

2～6 日の初期病変像

イ) 肉眼的所見

初期群は4例で，その中肺に鬱血並びに出血あるもの1例，肺に鬱血のみ認めるもの1例，鼠径及び腋窩リンパ腺の腫大を認めるもの1例，他の1例は特に所見がなかつた。

ロ) 各臓器の病理組織学的所見

1) 脳：脳膜に単球，リンパ球の細胞浸潤あり，こゝに細い桿菌様を呈する菌糸を少量認めた。以上の1例の外，各例に鬱血を軽度認め，その他の著変はなかつた。

2) 肺：肺胞壁に類上皮細胞 5～6 個及びリンパ球が集合した小結節を散在性に見たもの2例，肺胞壁の所々に限局性肥厚を認めるもの2例あり，又，出血を見るもの2例であつた。菌は陰性であつた。

3) 肝：肝細胞萎縮の高度なもの1例，脂肪変性の高度なもの2例で，その他著変はなかつた。菌は陰性

であつた。

4) 脾：リンパ濾胞の肥大・増生は各例に見られ、細網細胞の腫大・増生は3例に認められた。多数の血鉄素細胞の出現したもの1例であつた。菌は陰性であつた。

5) 腎：尿細管混濁腫脹が全例に見られた外著変はなく、菌は陰性であつた。

6) リンパ腺（腸間膜，腋窩，鼠径）：洞カタルは全例に著明に見られた外，線維素析出が1例に認められた。

以上の如くで *Nocardia asteroides* と異なり病原性は弱く，僅かに脳，肺に小病巣の発現を見たに過ぎないが，弱毒性の反応として脾の細網細胞腫大増生，リンパ腺の洞カタル等を数える事が出来る。

第2項 *Nocardia madurae* 血管内注射后 12～28 日の中期病変像

イ) 肉眼的所見

各臓器の鬱血が著明であつた外に結節等の形成を見なかつた。

ロ) 各臓器の病理組織学的所見

1) 肺：肺胞壁に限局性肥厚が各例に認められ，出血を1例に見る外著変はなかつた。

2) 肝：2例に肝細胞の脂肪変性が見られるのみで，他に著変はなかつた。

3) 脾：全例にリンパ濾胞の肥大増生が軽度に見られる外，洞内に血鉄素細胞の出現を見るもの1例で，その他著変はなかつた。

4) 腎：皮質に限局性のリンパ球集合像を見るのみで，他に著変はなかつた。

5) リンパ腺（腸間膜，腋窩，鼠径）：洞内に軽度線維化が見られるもの1例，全例に洞カタルを認めた。その他の著変はなく，全部位に菌は陰性であつた。

第3項 *Nocardia madurae* 血管内接種后 84 日の末期病変像

イ) 肉眼的所見

この例は1例のみで，腋窩リンパ腺の腫大と，肺の軽度の鬱血が認められた。その他に著変はなかつた。

ロ) 各臓器の病理組織学的所見

1) 肺：肺気腫が中等度にあり，気管支炎又は気管支周囲炎も中等度に見られた。即ち気管支周囲の肺胞には肺胞上皮が剝脱，融解してつまっている部分が認められた。その他肺胞壁の軽度線維性増厚，血鉄素細胞の出現が見られた。

2) 腎：鬱血高度で，軽度の尿細管の混濁腫脹あり，一部尿細管の萎縮が認められた。その他腎門部腎盂粘膜下にリンパ球の細胞浸潤が高度であつた。その他に著変はない。

3) 脾及びリンパ腺（腸間膜，腋窩，鼠径）：洞カタル，即ち洞拡大し，網内皮が高度に腫大膨化したもの，リンパ球及び多数の赤血球喰細胞等が洞内を充たしていた。又軽度線維化が見られた。各臓器何れも菌は陰性である。

末期も中期と同様何等特記すべき所見はないが，強いて取上げれば肺気腫，気管支周囲炎，肺胞壁増厚，脾・リンパ腺の洞カタル，網内皮系の腫大・増生等の所見であるが，之も決して *N. madurae* の特有所見ではない。血管内接種の影響として赤血球崩壊による血鉄素細胞出現の増加はあるが，之もかなり高度でなければ問題にならない。

第5節 *Nocardia madurae* 腹腔内接種群

第1項 *Nocardia madurae* 腹腔内接種后4日 の初期病変像

イ) 肉眼的所見

初期例は2例で，各例とも肺に鬱血が軽度に見られ，1例に注射部位の筋層に充血が軽度に認められた。その他に著変を見ない。

ロ) 各臓器の病理組織学的所見

1) 肺：2例に気管支周囲のリンパ腺肥大が軽度に見られ，又，肺胞壁に単球の集合像が見られた。之は結節形成への初期像と思われる。

2) 肝：各例共鬱血高度で，1例に軽度の肝細胞萎縮が見られた。

3) 脾：リンパ濾胞の肥大を認めるもの1例，萎縮を認めるもの1例であつた。

4) 腎：各例共尿細管の混濁腫脹が中等度であつた。

5) リンパ腺（腸間膜，腋窩，鼠径）：洞内皮，大単球及び赤血球喰細胞が拡張した洞内に充満し，高度のカタル像を各例に見た。

6) 大網：脂肪織内及び血管周囲，漿膜面に軽度の単球，リンパ球，少数の好中球浸潤を見るが，特に類上皮細胞の出現や，明確な結節形成はない。

第2項 *Nocardia madurae* 腹腔内接種后 13～36 日の中期病変像

イ) 肉眼的所見

中期の2例に於ては，鼠径リンパ腺の腫大するもの1例，脾がやゝ腫大するもの1例で，大網及腸間膜等には著変はなかつた。

ロ) 各臓器の病理組織学的所見

1) 肺：鬱血中等度で肺気腫高度なもの1例あり、各例共肺胞壁の肥厚した部が散在し、軽度の気管支炎と気管支周囲リンパ腺の肥大が見られる。このリンパ腺には細網細胞の増生が強い。菌は証明しない。

2) 脾：何れも鬱血高度でリンパ濾胞の肥大が著明であつた。1例に著明な洞カタルを見た。

3) リンパ腺（腸間膜、腋窩、鼠径）：各例共著明な洞カタル、網内皮系の腫大増生を見た。

4) 大網及び腸間膜等に著変を認めなかつた。

第3項 *Nocardia madurae* 腹腔内接種后
60日の末期病変像

イ) 肉眼的所見

末期例は1例で、大網、腸間膜に粟粒大以下の結節を3~4個認めた外、各臓器に著変を見なかつた。

ロ) 各臓器の病理組織学的所見

1) 肺：肺胞の大部分に肺気腫が高度であつた。又、限局性に肺胞壁及び血管周囲に大型の細網細胞より成る小結節が散発し、この結節の外周には類上皮細胞が多数に出ている。その一部に少数のラ氏型巨細胞の出現を見た。その他気管支周囲リンパ腺の肥大増生が見られた。

2) 肝：肝細胞の高度の萎縮が見られ、その他に著変はない。

3) 脾：脾自身に著変は無く、脾周囲の脂肪織中に

類上皮細胞、線維芽細胞及び異物型乃至ラ氏型巨細胞等より成る数個の結節があり、外周は硝子化した線維で被包されている。

4) 腸間膜リンパ腺：洞の拡張高度で、皮質及び髓質に類上皮細胞数個の集合より成る極く小さい結節が多数見られた。この部分に菌糸が少量出現していた。又、結節の一部には中心にやゝ大きい Druse があり、外周は硝子様化した線維で囲まれているものもあつた。

5) 大網：大網脂肪織中に類上皮細胞、線維芽細胞及び好中球の浸潤より成る小結節が多数認められ、この部分には大単球が集つて巨細胞を形成しかゝつてい

第6節 *Nocardia* の感作例（第3表）

第1項 *Nocardia asteroides* 腹腔感作例の
病変像

腹腔内に第1回に 10 mg/cc 菌液 0.6 cc 接種后、1年3ヵ月経過の後、5 mg/cc 菌液 1.0 cc を腹腔内に再接種、4日后に死亡した例である。

イ) 肉眼的所見

注射部筋層及び腹膜に充血著明、肝は鬱血高度で灰白色明界状の2倍粟粒大の結節多数を認めた。他臓器に著変はなかつた。

ロ) 各臓器に於ける病理組織学的所見

1) 脳：脳膜は鬱・充血強く、高度の好中球浸潤が

第3表 *Nocardia* 感作例接種実験に於ける各臓器の病変所見の概括

接種 方法	菌種番号 体 重	日 数	接 種 量	脳	心	肺	肝	脾	脾	腎	副腎	リンパ腺 (腸間膜、 それ、 腋 窩)	骨髄	睾丸	卵巣	皮膚 筋	腸	大網
腹腔	Na 36 ♂ 230	1年3ヵ月 4日死	10 mg/cc 5 mg/cc	0.6 1.0	++ A	+++ A	+++ T	+++ TN	+++ T	-	+++ TN	+++ TN	-	-	-	-	-	-
血腹	Nm 37 ♀ 170	1ヵ月 15日殺	5 mg/cc 5 mg/cc	0.1 0.3	+	-	++ A	-	-	-	-	+	T	-	-	-	-	-
血腹	Nm 38 ♂ 200	3ヵ月 4日殺	5 mg/cc 5 mg/cc	0.1 0.3	-	-	++ NAT	-	-	-	-	+	T	-	-	-	-	-
血腹	Nm 39 ♂ 250	3ヵ月 14日殺	5 mg/cc 5 mg/cc	0.1 0.3	-	-	++ NG	-	-	-	-	+	G	-	-	-	-	-
血腹	Nm 40 ♂ 230	3ヵ月 30日殺	5 mg/cc 5 mg/cc	0.1 0.3	-	-	++ T	-	-	-	-	+	TG	-	-	-	-	-
腹腔	Nm 41 ♀ 160	1ヵ月 5日殺	5 mg/cc 5 mg/cc	0.5 0.5	-	-	-	-	+	T	-	+	T	-	-	-	-	+
腹腔	Nm 42 ♀ 180	1ヵ月 7日殺	5 mg/cc 5 mg/cc	0.5 0.5	-	-	+	T	-	+	T	+	T	-	-	-	-	++ GT

註1：表中の -，+，++，+++ は病変の有無多寡を示し、所見により判定した。

註2：Tは結節，Aは膿瘍，Nは壊死，Gは肉芽を示す。

註3：血腹は第1回，第2回何れも腹腔内接種したもの，血腹は第1回血管内接種，第2回腹腔内接種を示す。

註4：Na は *Nocardia asteroides*，Nm は *Nocardia madurae* を示す。

あり、化膿性脳膜炎の像を呈する。又、大脳実質はやゝ浮腫状で、髄質に 1/4 粟粒大の小膿瘍があつた。

2) 心：心筋間質には極めて多数の 1/4 粟粒大の好中球を混ざる細網細胞の集合巣があり、好中球混入のないものは Sarcoidosis 類似の類上皮細胞結節を形成している。周囲の筋線維は変性に陥っている。

3) 肺：鬱・充血高度で、腫大した細網細胞及び類上皮細胞より成る結節が極めて多数見られ、所によつては好中球の浸潤がある。結節の中心部から周辺寄りに細長の菌糸が細胞間隙に入り乱れて極めて多数認められた。又、小血管には線維素性血栓の形成が著明である。気管支にも強い気管支炎像があり、上皮の剝離したものが多数あつた。

4) 肝：星細胞乃至は類上皮細胞より成る小結節が多数見られる。又、その周囲にラ氏型巨細胞になりかゝっているものが見られた。

5) 脾：類上皮細胞結節が多数生じ、中心部に好中球の混入しているものも見られた。リンパ濾胞はやゝ萎縮性であつた。

6) 腎：全体に他と同様の小結節及び多少好中球の混入した結節が極めて多数見られ、糸球体係蹄に一致して出来たものは係蹄の壊死を来しているのが認められた。

7) 副腎：全体が壊死巣となつている。この中心部は核崩壊物を入れ、ヘマトキシリンに染まる非常に汚穢なもので、その周囲はエオジンに淡赤染する。更にその外周は硝子化結合織で囲まれている。その周囲に娘結節が少数認められた。菌は壊死部のやゝ周辺に近く多数の菌糸を見た。

8) 大網及び腸間膜に特記すべき所見はなかつた。

第 2 項 *Nocardia madurae* の血管及び腹腔感作例の病変像

第 3 表の如く血管内第 1 回接種后 1 箇月目に腹腔内に接種、15 日后に剖検したもの 1 例、血管及腹腔内に第 1 回接種后 3 箇月目に腹腔内接種、4, 14, 30 日后剖検したもの 3 例、計 4 例である。

イ) 肉眼的所見

全例共鼠径、腋窩リンパ腺の腫大を見た。その他肺に結節を見たもの 3 例、壊死・出血を見たもの 2 例である。1 例に肺表面の粟粒大灰白色明界状の結節が極めて多数で、小豆大乾酪化巣を見た。

ロ) 各臓器の病理組織学的所見

1) 脳：1 例に脳膜充血高度で、皮質に近く 1/2 粟粒大の小膿瘍を認めた。周囲組織はやゝ浮腫状であつ

た。その他に著変はない。

2) 肺：全例に鬱・充血強く、肺胞壁の肥厚も著明であつた。結節形成は全例に見られたが、乾酪化病巣が 2 例にあつた事は特異な所見である。即ちその 1 例に於ては気管支周囲に小豆大乃至大豆大で明界状の乾酪化病巣数個があり、中心部はエオジン淡赤染の乾酪化様物質で充たされ、周囲は多数の好中球及び核崩壊物で覆われ、更に、その外周は扁平上皮を以て被包されている。之は乾酪性気管支炎像と思われる。この結節の周囲は線維芽細胞、毛細血管新生等より成る薄い肉芽組織で、所々中心部膿塊状、周囲線維芽細胞、類上皮細胞及びリンパ球の浸潤より成る娘結節が見られた。こゝには又、多核巨細胞が少数出現している。結節周囲の肺組織は充血が強く、肺胞上皮の剝脱腫大膨化したものが多数見られた。菌は乾酪化様物質の周辺に中等数認められた。他の 1 例も所見はほぼ同様であつた。他の 2 例では、多く血管周囲にリンパ球、類上皮細胞或いは細網細胞が集合して粟粒大乃至 1/2 粟粒大の小結節を多数形成していた。1 例に巨細胞も相当数出現していた。

3) リンパ腺（腸間膜、腋窩、鼠径）：洞内に単球、洞内皮、細網細胞等が多数増生した洞カタルを認めた。一部のリンパ腺では単球、リンパ球、形質細胞、血鉄素細胞並びに血管新生を伴う肉芽形成が見られ、他の一部のリンパ腺ではリンパ腺の構造は大いに乱れ、類上皮細胞、リンパ球、単球より成る肉芽が中等度に見られた。腸間膜リンパ腺では一部限局性に洞内に洞内皮細胞、類上皮細胞が集合して結節を形成しているものが見られた。洞内には線維素析出がかなり認められた。菌は陰性であつた。

4) 大網、腸間膜は著変を認めない。

第 3 項 *Nocardia madurae* の腹腔内感作例の病変像

この例は第 3 表の如く腹腔内に第 1 回接種を行ない、1 箇月後再び腹腔内に接種し、5 乃至 7 日目に剖検した 2 例である。

イ) 肉眼的所見

何れも諸部リンパ腺の腫大があり、1 例に於ては肺、大網に粟粒大灰白明界状の結節を少数認めた。他臓器に著変はなかつた。

ロ) 各臓器の病理組織学的所見

1) 肺：2 例共鬱・出血が高度で、限局性に肺胞壁の肥厚あり、気管支周囲のリンパ腺の肥大が著明に見られた。1 例に気管支周囲及び血管周囲のリンパ球浸

潤が高度であつた。

2) 脾：両例共鬱・出血著明で、リンパ濾胞の萎縮が見られた。1例には洞中に細網細胞、類上皮細胞及び単球より成る小結節を認め、又、高度の洞カタルがあつた。他の例に於てもリンパ濾胞周囲に細網細胞の増生が高度であつた。

3) 腎：何れも鬱血及び尿細管の混濁腫脹が高度で、1例では限局性にリンパ球浸潤巣が所々に見られた。

4) リンパ腺（腸間膜、腋窩、鼠径）：何れも洞内皮の増生及び洞カタルが著明である。1例に於ては特に辺縁洞に腫大した洞内皮細胞の増生が高度で、一部1/2粟粒大の類上皮細胞結節がやゝ多数見られた。線維化は一般に著明であつた。

5) 大網：1例に1/2粟粒大の結節形成が多数見られた。中心部に好中球が集合し、中央に菌巣がある。周囲は細網細胞、線維芽細胞、リンパ球、好酸球及び新生毛細血管等より成る。之が数個融合して大きな肉芽を形成するものが認められた。又やゝ古い肉芽に多核巨細胞の出現が相当数見られた。

要するに *Nocardia asteroides* は再接種で更に強いアレルギー性と考えられる壊死性病変を併発し、*Nocardia madurae* では1回接種では見られなかつた甚だ高度の、*Nocardia asteroides* に匹敵する病巣を形成し、特に血管内・腹腔の場合に著明であつた。腹腔・腹腔では類上皮細胞結節や、巨細胞出現を伴つた厚層の肉芽形成を見たが、乾酪化は惹起しなかつた。

第3章 総括ならびに考案

第1節 *Nocardia* の歴史、頻度及び好発臓器について

Nocardia 症は人体剖検例の報告では肺に於ける病変例が最も多い。即ち Cruz¹⁰⁾ は人体例40例を集録し、中31例に肺病変を報じ、培養によつて何れも菌を認めたが、その中17例に *Nocardia asteroides* を証明している。又、Wichelhausen¹¹⁾ は人体例62例を集録し、40例肺病変を報じている。*Nocardia* の種類については詳細な分類はされていない。Weed⁶⁾ は剖検例を病理組織学的に、Glover¹⁵⁾ は臨床的に培養により何れも *Nocardia asteroides* の肺病変例を報じている。その外 Arndt¹²⁾、Bobbitt¹³⁾、Stadler¹⁴⁾、Hager¹⁶⁾、及び Dobson¹⁷⁾ 等は肺に於ける病変を報じているが、何れも *Nocardia* についての詳細な分類的記載がない。更に McQuown¹⁸⁾ は本症は最初に肺を侵して急性の、次いで慢性の肺炎を惹起し、更に他の

臓器に拡がると云い、又本邦例では青山等⁵⁾、長与等¹⁹⁾、及び石川²⁰⁾は何れも培養によつて *Streptothrix* を認めた人体剖検例を報じ、尾島等²¹⁾は病理組織学的に *Nocardia* を証明した肺病変例を報告している。斯様に人体例に於ては肺に病変が最も多く見られるが、著者は白鼠の血管内及び腹腔内接種でも菌種の如何を問わず肺に病変が最も多く、且つ高度に見られることを確認し得た。

人体剖検例で次に多いのは脳であり、Cruz¹⁰⁾ は40例中13例に、Wichelhausen¹¹⁾ は62例中9例に脳膿瘍、脳膜炎を起している例を報じ、その外 Kaufman²²⁾ は人体剖検例で脳より *Nocardia asteroides* を培養により証明した例を報じ、Weed⁶⁾、Bobbitt¹³⁾、Stadler¹⁴⁾、Dobson¹⁷⁾、Erchul²³⁾、Jacobson²⁴⁾、及び Tucker²⁵⁾ 等も脳病変について報告しているが、菌種の詳細な分類については記載がない。著者の白鼠実験例は39例中8例に脳病変があり、特に多く見られたのは *Nocardia asteroides* の血管内接種例であつた。その他人体例では肝については三田村²⁶⁾が培養により *Streptothrix* を認めた1例、腎では Cruz¹⁰⁾ が培養により *Nocardia asteroides* を認めた1例を報じ、皮下では Wichelhausen¹¹⁾ が62例中21例の多数を報じているが菌の分類について詳細な記載はない。著者の白鼠の実験例では肺に次いで肝・腎・脾等がほぼ同程度に多い。皮下では39例中5例において膿瘍及び結節形成が見られている。その外リンパ腺・大網・副腎・脾・心等に病変が多数に見られた。

第2節 *Nocardia* 病変の組織像について (第4表)

1) *Nocardia asteroides*

第4表 白鼠の *Nocardia* 接種実験に於ける組織像総括

菌種	所見 病期	所見								
		膿瘍	壊死	好中球	線維素	細網細胞	類上皮細胞	巨細胞	線維化	菌
<i>Nocardia asteroides</i>	初期	卅	卅	卅	卅	卅	+	—	—	卅
	中期	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	+	卅
	末期	±	±	—	—	卅	+	+	卅	—
<i>Nocardia madurae</i>	初期	—	—	—	+	+	+	—	±	+
	中期	—	—	—	—	卅	—	—	+	—
	末期	—	—	+	—	卅	卅	卅	卅	+
N. ast.	感作例	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅
N. mad.	感作例	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅	卅

註1：—，＋，卅，卅 は夫々病変の有無多寡を示す。之は所見により判定した。

註2：N. ast. は *Nocardia asteroides*，N. mad. は *Nocardia madurae* を示す。

Nocardia asteroides の血管内接種の初期には各臓器に高度の多発性急性融解小壊死巣が現われ、次で之に好中球多数の浸潤、多量の核崩壊物、線維素の析出等が起り、小膿瘍を形成する。菌は中等数で、膿瘍又は壊死部の中心よりもやや邊緣に近く見られる。

Nocardia asteroides 腹腔内接種の初期では同様の急性壊死並びに膿瘍を主病変とし、中心部に菌を認める。多少日時を経過すると Druse 及び菌糸の増生が初まる。好中球浸潤、核崩壊壊死もかなり高度であるが、線維素析出は少量、又、類上皮細胞、細網細胞の増生は中等度で、大喰細胞の出現もある。

河野等⁷⁾は Duke 株の *Nocardia asteroides* 及び *Nocardia madurae* を使用して、サブロー培養 1 箇月目、10 mg/cc 生理的食塩水浮游液 0.3~1.0 cc を白鼠の尾静脈及び腹腔内に接種して病理組織学的に検索した実験を行い、その *Nocardia asteroides* 初期病変について、主変化は膿瘍形成であり、好中球少数の浸潤、中心に急性壊死あり、線維素析出は著明であつたと云い、尾島等²¹⁾は人体剖検例に於て病理組織学的に非抗酸性の *Nocardia* を証明し、この報告に於て、*Nocardia* 症は初期に多量の好中球浸潤、著明な線維素の析出、及び菌集塊を伴う中心壊死が見られたと云う。著者は初期例に於て殆ど同様の結果を認め得た。

Nocardia asteroides 血管内接種中期に於ては、各臓器とも膿瘍を主変化とすることは初期例と同様であるが、壊死像はやや少くなっている。菌は膿瘍の中心部から邊緣寄りに中等度認められ、好中球、核崩壊物は多量、周囲に類上皮細胞、細網細胞が高度に増生して来ている。線維素析出は少量、巨細胞は異物型及びラ氏型が少数出現している。

Nocardia asteroides 腹腔内接種中期像では、膿瘍は主病変であるが急性壊死像は少数である。菌は中等数に見られ、好中球、核崩壊物は少量、周囲に類上皮細胞、細網細胞増生が高度になつて来てる。線維素析出は中等度で、異物型、ラ氏型巨細胞が中等数出現している。

河野等⁷⁾は *Nocardia asteroides* 中期像は膿瘍中心部に白血球集合が極めて高度で、核崩壊物、喰細胞が多量に出で、その中に菌も甚だ多量に見られ、更に外周には腫大した細網細胞が多数浸潤する、と云っているが、著者の例では、接種後 13—43 日の経過の長い症例のため、類上皮細胞及び異物型、ラ氏型巨細胞出現が河野等の報告よりも著明である。

Nocardia asteroides 血管内接種末期では、初・中

期の様な膿瘍その他の特有な病変像は見られなかつた。唯、肺に於て治癒した病変像と思われる気管支周囲の肉芽形成と、それに伴う気管支拡張症が見られたのであつた。

河野等⁷⁾は *Nocardia asteroides* 末期像では、喰菌細胞層へ細網細胞の侵入が高度に見られ、少数の多核巨細胞、外周では細網線維の膠原化及びリンパ球少数の浸潤、古いものでは全く線維化した結節をつくる。細網細胞の反応は極めて強いが類上皮細胞の出現は結核性病変に比べて少ない。又肉芽内に血管新生像が少い事等を挙げている。又尾島等²¹⁾は、慢性期にはいわゆる肉芽性炎に移行するが、その内部の軟化巣や、小空洞の周囲に結合織の増生が弱い、と云っている。

2) *Nocardia madurae*

Nocardia madurae の血管内接種初期では、著者の例では膿瘍等の変化はなく、脳膜に単球、リンパ球の細胞浸潤あり、こゝに菌糸を少量認めたこと、及び肺胞壁に細網細胞、リンパ球より成る結節状のものを認めたこと、その外類上皮細胞の出現は少量で、巨細胞の出現はなく、リンパ腺に線維素析出が 1 例認められたこと等の病変像をみた。

同腹腔内接種初期では、1 例に肺胞壁に単球の少数の集合巣あり、之は結節形成への初期像と思われた。又、各例の諸リンパ腺に高度の洞カタルがあり、腫大した細網細胞がこゝに多数出現していた外、類上皮細胞、巨細胞等の出現或いは線維化等の病変は見られなかつた。

河野等⁷⁾はこの期には膿瘍や乾酪化は見られず、結節の中心に好中球集合が中等度で、菌は多量に見られる、と云っているが、著者の例でも膿瘍は無く、菌は少量であつたが認められた。好中球集合はなく、リンパ球、細網細胞、類上皮細胞が認められた。

Nocardia madurae 血管内接種中期では、初期像に比して病変が非常に軽度である。腎皮質のリンパ球集合像、腋窩リンパ腺洞内の軽度の線維化等の所見であつた。

同腹腔内接種中期では、やはり病変を見ること少く、リンパ組織中に細網細胞の増生及び腫大が強いのみである。河野等⁷⁾は結節の中心に好中球少量集合、核崩壊物多量、喰細胞を極めて多数認め、外周に細網細胞が腫大増生し、次第に類上皮細胞に移行し、菌を多量に認めた、と云うが、細網細胞増生の強い事等は認められたが、他の病変は認められなかつた。

Nocardia madurae 血管内接種末期では、病変は非

常に少く、リンパ腺の高度の洞カタル及び軽度の線維化が見られたのみである。

同腹腔内接種末期では、肺に大型細網細胞より成る結節あり、外周に類上皮細胞が多数であつたこと。腹膜部では類上皮細胞結節が多数で、外周に硝子様線維化の強いこと。菌糸を少量に見るもの。結節内に Druse を形成するものがあり、又、異物型及びラ氏型巨細胞のやゝ著明な出現等の所見であつた。

河野等⁷⁾によれば結節中心迄細網細胞が侵入し、核崩壊物少量、菌は中等度で、外周に類上皮細胞が多数出て、線維化は軽度であると云う。著者の例では似た所見が見られた。

3) 感 作 例

Nocardia asteroides 腹腔感作例では、心・肺・肝・脾・腎に細網細胞及び類上皮細胞多数が集合して Sarcoidosis 様結節を形成していた。脳及び心では小膿瘍があり、副腎では周囲が硝子化結合組織で被包された壊死巣を認め、腎では糸球体係蹄の壊死多数があつた。菌は肺組織中に細長の菌糸が多量に認められ、又肝では類上皮細胞が巨細胞になりかゝつていゝものがあつた。河野等⁷⁾は *Nocardia madurae* ではサルコイド様の類上皮細胞結節を作ると云つてゐるが、著者例では *Nocardia asteroides* で之を見た。田倉等²⁷⁾は筋注感作した家兎に気管内に挿入した管を通じて *Nocardia asteroides* 菌液を注入する実験で、肺に著明な乾酪化病変を起さしめた。そしてあらかじめ感作しておくに壊死ならびに空洞化が促進される、と云つてゐる。この実験では選択的に肺に病変を起さしめてゐるが、著者の例では腹腔内接種で肺にも尚著明な病変を起さしめる事が出来た。

Nocardia madurae 血管及び腹腔内感作例では、血管内接種 1 箇月後腹腔内再接種し、15 日後剖検例では脳に小膿瘍少数、肺の小血管周囲に小結節が多発し、リンパ球、細網細胞の集合像が見られる。又、血管内接種 3 箇月後腹腔内再接種し、4 日乃至 14 日後の剖検例では、何れも肺に乾酪化巣が多発し、中心部膿瘍化した結節も多発している。菌も多数見られる。血管内接種 3 箇月後腹腔内再接種し、30 日後の剖検例では肺に巨細胞、リンパ球、類上皮細胞等の集合した小結節多数が見られた。一般にこの感作例は腹腔内再接種例よりも高度に病変が認められ、特に肺に於て顯著であつた。

Nocardia madurae 腹腔内感作例では、大網及びリンパ腺の病変が著明で、大網では中心に菌塊を入れた

肉芽の集合が見られ、又、鼠径リンパ腺の類上皮細胞結節が見られた。一般に細網細胞、類上皮細胞が多数出て、巨細胞出現もあり、又菌もかなり多数見られている。腹腔内接種初期或いは中期と比較し顯著な病変像が得られている。*Nocardia* は単独接種或は再接種においても時間の経過と共に類上皮細胞、ラ氏型巨細胞等が出現し、更に陳旧化すれば線維化をおこし、極めて結核類似である事は注意すべきで、菌体の証明が最も重要な鑑別点である。

第 4 章 結 論

1) *Nocardia asteroides*, *Nocardia madurae* の 2 種の 10 mg/cc 乃至 5 mg/cc 菌液 0.3~1.0 cc を血管内及腹腔内に接種し、その初期・中期・末期に於ける病変像を病理組織学的に追究し更に血管内及び腹腔内接種の各々に腹腔内再接種を行い、その病変像を観察した。

2) *Nocardia asteroides* は弱抗酸又は非抗酸性、*Nocardia madurae* は非抗酸性である。

3) *Nocardia asteroides* は各臓器に対し毒性が強度であるが、*Nocardia madurae* の毒性は軽度で *Nocardia asteroides* と同一菌量では壊死、膿瘍形成は起らない。

4) *Nocardia asteroides* では融解壊死、膿瘍形成が主で、線維素析出は極めて高度であるが、次第に周囲に腫大した細網細胞、及び類上皮細胞が出現し、接種後 10 日以降ではラ氏型巨細胞も出現し、更に時期を経るに及び肉芽形成に移行する。肉芽は血管の新生が少い。

5) *Nocardia madurae* は膿瘍及び壊死は極めて少く、細網細胞及び類上皮細胞よりなる結節の形成が主で、結節は次第に線維化する。

6) 感作例では *Nocardia asteroides*, *Nocardia madurae* 共に単一接種例に比して極めて高度の反応を示し、壊死、膿瘍、乾酪化が極めて高度であつた。

7) 白鼠に於ては菌の接種方法に関係なく、*Nocardia asteroides* では肺に最も病変が強く、次で肝・脾・腎・膵・各部のリンパ腺・脳・副腎・心筋・大網及び腸間膜等である。血管内接種でも卵巣、睪丸等に病変を惹起する事はやゝ少い。

8) 白鼠に於ては菌の接種方法に関係なく、*Nocardia madurae* でも肺に病変が好発し、次で脳・諸部リンパ腺・脾等で、腹腔内接種時のみ腹膜、大網・腸間膜等に病変を見る。肝・腎・副腎・心筋・睪丸・卵巣等には殆ど変化を認めない。

9) Nocardiosis の中期後期病変像は結核症に類似する。結核症との判別は菌体の証明が最も重要である。

掲筆するに当り終始御懇篤な御指導御校閲を賜はつた恩師河野林教授に対して深甚の謝意を表し、また絶大な御援助を戴いた吉田博士並びに教室員各位に衷心より厚く御礼申し上げます。

文 献

- 1) Nocard, M.E. : Note sur la maladie des boeufs de la Guadeloupe connue sous le nom de Farcin. Ann. Inst. Pasteur, **2**, 293~302 (1888)
- 2) Trevisan. : I. generi e le specie delle Batteriacee. (1889)
- 3) Eppinger, H. : Über eine neue pathogene Cladothrix und eine durch sie hervorgerufene Pseudotuberculosis (Cladothrix). Beitr. z. path. Anat. u. z. allg. Path. **9**, 287~328 (1891)
- 4) Waksman, S.A. and A.T. Henrici : The Nomenclature and Classification of the Actinomycetes. J. Bact. **46**, 337~341 (1943)
- 5) Aoyama, T. und S. Miyamoto : Über die menschenpathogene Streptothrix. Mitt. a. d. med. Fakult. d. k. Univ. Zu Tokio, **4**, 231~276 (1900)
- 6) Weed, L.A., H.A., Anderson, C.A. Good. and A.H. Bagenstoss : Nocardiosis (Clinical, Bacteriologic and Pathological Aspects). N. England J.M. **253**, 1137~1143 (1955)
- 7) 河野 林, 高橋 篤 : 実験的 Nocardiosis の組織像について, 日病会誌, **45**, 363~364 (1956)
- 8) 岩田和夫, 梁井方策, 和田敏郎, 望月友子 : Nocardia 属の病原性と生物学的性状との関係 (会), 日新医学, **46**, 298 (1959)
- 9) 正古良夫 : 臨床真菌検査手ほどき (II), 真菌と真菌症, **1**, 186~191 (1960)
- 10) Cruz, P.T. and C.F. Clancy : Nocardiosis (Nocardial Osteomyelitis and Septicemia). Am. J. of Path. **28**, 607~627 (1952)
- 11) Wichelhausen, R.H., L.B. Robinson, J.R. Mazzara and C.J. Everding : Nocardiosis (Report of a Fatal Case). Am. J. Medicine, **16**, 295~303 (1954)
- 12) Arndt, H.J. : Streptothrichose der Lunge und des Brustfells. Handbuch der Speziellen Pathologischen Anatomie und Histologie. III Band. 3 Teil. 460~480 (1931)
- 13) Bobbit, O.B., I.H. Friedman and C. Lupton : Nocardiosis (Report of Three Cases). N. England J.M. **252**, 893~897, (1955)
- 14) Stadler, H.E., B. Kraft, L.A. Weed and H.M. Keith : Chronic Pulmonary Disease due to Nocardia. Am. J. Dis. Child. **88**, 485~491 (1954)
- 15) Glover, R.P., W.E. Herrell, F.R. Heilman and K. Puetze : Nocardiosis (Nocardia asteroides infection simulating pulmonary tuberculosis). J.A.M.A. **136**, 172~175 (1948)
- 16) Hager, H.F., A.V. Migliaccio and R.M. Young : Nocardiosis (Pneumonia and empyema due to N. asteroides). N. England J.M. **241**, 226~231 (1949)

- 17) Dobson, L. and W.C. Cutting : Penicillin and Sulfonamides in the Therapy of Actinomycosis. J.A.M.A. **128**, 856~863 (1945)
- 18) McQuown, A.L. : Actinomycosis and Nocardiosis. Am. J. Clin. Path. **25**, 2~13 (1955)
- 19) 長与又郎, 鈴木 達 : ストレプトトリコージスの1例追加, 東京医学会雑誌, **47**, 1185~1191 (1933)
- 20) Ishikawa, I. : Drei Sektionsfälle von Streptothricosis. Tr. Soc. Path. Jap. **25**, 168~173 (1935)
- 21) 尾島昭次, 佐伯慎也, 河野 剛 : 高度の尿路結石症, 気管骨新生症および上皮小体好酸性細胞腺腫を合併せる肺 Nocardia 症の1剖検例, 日病会誌, **47**, 50~60 (1957)
- 22) Kaufman, N. and L.C. Drieto Jr. : Cerebral Nocardiosis. (Report of a case with Necropsy) Arch. Path. **53**, 379~384 (1952)
- 23) Erchul, J.W. and M.L. Koch : Cerebral Nocardiosis with coexistent pulmonary Tuberculosis. Am. J. Clin. Path. **25**, 775~781 (1955)
- 24) Jacobson, J.R. and R.B. Cloward : Aktinomycosis of the Central Nervoussystem (A case of Meningitis with Recovery). J.A.M.A. **137**, 769~771 (1948)
- 25) Tucker, F.C. and E.F. Firsch : Nocardiosis, with a report of three cases of actinomycosis due to nocardia asteroides. J. Infect. Dis. **85**, 72~86 (1949)
- 26) Mitamura, T. : Beitrag zur Kenntnis der Streptothricosis der Leber. Tr. Soc. Path. Jap. **4**, 61~64 (1914)
- 27) 田倉 弘, 川畑徳幸 : 肺 Nocardia 症の発生に関する実験的研究 (会). 真菌誌, **1**, 89 (1960)
- 28) 市川武雄, 田中 昇 : 肺転移を来せる頸ストレプトトリックス症の1例, 日病会誌, **32**, 486~490 (1942)

附 図 説 明

- 附図 1 Nocardia asteroides の血管内接種例の初期像である。肺の極めて多数の小膿瘍形成。
- 附図 2 同じく心筋内的小膿瘍形成。
- 附図 3 同じく腎臓系球体の小膿瘍及び膀胱の壊死。
- 附図 4 同じく肝臓の好中球浸潤をとまなう小類上皮細胞結節。
- 附図 5 同じく大動脈周囲のリンパ腺の小膿瘍形成。
- 附図 6 同じく大脳に於ける粟粒大膿瘍の多発。
- 附図 7 同じく副腎の多数の核崩壊物を入れる壊死巣。
- 附図 8 附図 7 のグラム染色で多数の菌糸がみえる。
- 附図 9 Nocardia asteroides の血管内接種例の中期像である。肺の粟粒大の膿瘍。
- 附図 10 同じく脾臓の膿瘍で、周囲は細網細胞及び類上皮で取り囲む。
- 附図 11 同じく腎臓小膿瘍で周囲を細網細胞及び類上皮で取り囲んでいる。
- 附図 12 同じく腎臓の小結節で線維化が起つている。
- 附図 13 同じく副腎皮質の膿瘍。
- 附図 14 附図 13 のグラム染色で多数の菌糸がみえる。
- 附図 15 同じく腎臓の小膿瘍で中心部に菌塊が見える。
- 附図 16 同じく腎臓の類上皮細胞結節。
- 附図 17 Nocardia asteroides の腹腔内接種例の初期像である。肺の壊死巣。
- 附図 18 同じく肝臓の壊死巣。
- 附図 19 附図 18 のグラム染色で多数の菌糸をみる。

平賀論文附図（1）

平賀論文附図（2）

平賀論文附図(3)

平賀論文附図（4）

平賀論文附図(5)

平賀論文附図(6)

附図20 同じく腸間膜リンパ腺で、周囲を類上皮細胞、細網細胞で取り囲む壊死巣。

附図21 同じく腎臓の膿瘍。

附図22 *Nocardia asteroides* の腹腔内接種例の中期像である。脾臓の小膿瘍形成と、中心部の菌塊。

附図23 同じく睾丸周囲の細網細胞よりなる小結節の集合像。

附図24 同じく大網の小膿瘍とその周囲に線維細胞の増生著明、又ラ氏型乃至は異物型巨細胞の出現がある。

附図25 同じく大網の類上皮細胞結節で、中心に膿塊がある。

附図26 *Nocardia madurae* の血管内接種例の初期像である。肺の *Nocardia* 性肺炎。

附図27 同じく肺炎像。

附図28 同じく肺胞壁の小類上皮細胞結節。

附図29 *Nocardia madurae* の血管内接種例の末期のもの。

腸間膜リンパ腺に腫大した細網細胞の増生が著明である。

附図30 *Nocardia madurae* の腹腔内接種例の中期像で、単径リンパ腺の細網細胞の高度の増生がある。

附図31 *Nocardia madurae* 腹腔内接種例の末期のもので、脾臓周囲組織内の類上皮細胞結節。

附図32 同じくやや線維化した結節。

附図33 同じく腸間膜リンパ腺内の小さな類上皮細胞結節が

多数みえる。

参考例 附図34～37 迄は *Nocardia intracellularis* の症例である。

附図34 *Nocardia intracellularis* の腹腔内接種例の中期のもので、大網の膿瘍と肉芽の形成。

附図35 同じく腎臓周囲の脂肪組織内のやや線維化した肉芽。

附図36 同じく腸漿膜面のリンパ腺の膿瘍の形成。

附図37 同じく肝臓のリンパ球様細胞の集合よりなる結節の形成。

附図38 *Nocardia asteroides* の感作例で大脳皮質の小膿瘍の形成と小血管内の線維素血栓。

附図39 同じく肺の極めて多数の類上皮細胞結節と多量の線維素の析出。

附図40 附図39 のグラム染色で多数の菌糸がみえる。

附図41 同じく肝臓の結節の形成。

附図42 同じく副腎の大壊死巣。

附図43 附図42 のグラム染色で多数の菌糸がみえる。

附図44 同じく皮下の小結節の形成。

附図45 *Nocardia madurae* の感作例で、乾酪性気管支炎像を呈す。

附図46 同じく大網の小膿瘍と菌集塊。