Vitamin E による抗癌剤副作用抑制に関する 実験病理学的研究 (第1報)

近添 拓世

日本医科大学第2外科学教室 (主任: 片岡一朗教授)

日本医科大学第2病理学教室 (指導: 福士勝成教授)

緒言

完全な癌治療法がない現在, 癌化学療法は不可欠で各種の抗癌剤が使用されているが, 抗癌剤の欠点として, 癌細胞に対する感受性の相違, 癌細胞のいわゆる薬剤耐性の獲得や免疫能を含めた宿主抵抗能の低下があげられているが, とくに使用上強く注意すべきことはいずれの抗癌剤も癌組織のみを選択的に破壊することは不可能で, 癌のみならず正常組織までも同様に破壊するほか, 造血障害, 消化器障害など致命的な全身的副作用があるため, 長期にわたる使用がきわめて困難で, 化学療法の一大隘路となっている。

そこで著者は, vitamin E (以下 VE と略す) が CCl₄ 中毒性肝障害の抑制ないし予防¹⁻³⁾, 放射線照射障害の抑制・予防^{4,5)} に有効であり, また細胞分裂必需ビタミンとする報告⁶⁾ などから, 抗癌剤の副作用として強く障害される臓器が一般に骨髓, 消化管上皮, 精巣などの細胞分裂の盛んな臓器であることから VE の細胞分裂増強作用による再生的修復能の促進化と, さらに VE の各種物質代謝亢進作用⁷⁻¹⁰⁾ と抗酸化作用^{7,11-13)} などが抗癌剤による細胞障害の抑制・軽減化に有効であろうと考えたので, VE による抗癌剤副作用抑制・防止実験を試みた。

なお, 対象とした抗癌剤は, 副作用がもっとも激しく, 持続性が長く, 臨床的には一般的に使用されている mitomycin C (以下 MMC と略す) を用いた¹⁴⁻²⁰⁾。

実験方法

(1) 第1実験: マウスにおける MMC の LD₅₀ の決定, および MMC 投与マウスの VE による延命効

果実験

dd/Y マウス (20~25 g) を 151 匹を下記 2 群に分けて飼育した。

i) VE 過剰群 (以下 H 群と略す, 58 匹): オリエンタル普通粉末飼料 (VE 1.6 mg/100 g 含有) に VE 顆粒 (dl- α -Toc acetate) 50 mg/100 g 体重を 1 日量として添加飼育した。

ii) 対照群 (以下 C 群と略す, 93 匹): オリエンタル普通粉末飼料にて飼育した。

飼育 1 カ月後の両群に, MMC 各種量 (8.5, 12.5, 15.0, 17.0, 20.0, 27.0, 33.0 mg/kg) を 1 群 4~10 匹に皮下注射し, 3 週間の死亡率より MMC の LD₅₀ を決定し, かつ VE による延命効果をも検討した。

(2) 第2実験: ラットにおける MMC の LD₅₀ の決定実験

Wistar 系ラット (200~220 g) 58 匹をオリエンタル普通固型飼料にて 1 カ月飼育し, 大腿部皮下に MMC 各種量 (4.5, 4.0, 3.5, 3.0, 2.5 mg/kg) を投与し, 15 日までの死亡率よりラットでの LD₅₀ を決定した。

(3) 第3実験: MMC 投与ラットにおける VE の病理組織学的効果実験

Wistar 系ラット (60 匹) を離乳期より VE 投与量の差により下記 3 群に分けて飼育した。

i) VE 欠乏群 (以下 A 群と略す, 20 匹): オリエンタル VE 欠乏食*にて飼育した。

ii) VE 正常対照群 (以下 C 群と略す, 20 匹): VE 欠乏食に VE 1.6 mg/100 g 体重を 1 日量として添加飼育した。

iii) VE 過剰群 (以下 H 群と略す, 20 匹): VE

CHIKAZOE, TAKUSEI: Experimental pathological study of inhibitory effect by vitamin E against side-effects of anticarcinogenic drug (1).

* コーンスターチ 38%, ビタミンフリーカゼイン 25%, α -澱粉 10%, 粉末戸紙 8%, ラード 6%, 無機塩類 6%, グラニュー糖 5%, VE 以外のビタミン類 2%。

欠乏食に VE 50 mg/100 g 体重を 1 日量として添加飼育した。

なお、全実験を通じて食餌量は任意摂取させ、水道水を与えて室温にて飼育した。飼育 7 カ月後、第 2 実験にてえられた LD₅₀ を各群 15 匹ずつの左側腰部に 1 回皮下注射し、経日的に観察する一方、注射後 3, 5, 7, 9, 15 日にホルマリン固定液の左胸腔内注射法にて致死せしめただちに剖検した。

経過中の MMC による中毒死例は発見次第剖検した。剖検直後に 1 側の腎周囲脂肪組織（一般脂肪組織を代表して同部を使用した。以下これを脂肪組織と略す）、精巣および肝臓の一部の VE を Emmerie-Engel-勝井の変法^{7,30)}により定量した。

また、注射局所皮膚（左腰部）、骨髓（左右大腿骨）、腸管（回腸、盲腸および上行結腸）、精巣と肝臓を 6 倍ホルマリン液にて固定し、パラフィン切片として、HE, Alcian blue PAS, Elastica-van Gieson, PAP, Sudan III, および Giemsa（骨髓）の各染色を施して病理組織学的に比較検索し、VE 含有量との関連性をも検討した。

MMC 投与法は、MMC の直接的組織障害作用と二次的障害とを比較する目的で皮下注射法を選んだ。

実験結果

1. 第 1 実験

MMC 皮下注射による投与後 3 週間の死亡率は、8.5 mg/kg で 10% (1/10)、12.5 mg/kg で 25% (1/4)、15.0 mg/kg では 50% (5/10) と 55% (6/10) がえられ、17.0 mg/kg で 58% (14/24)、20.0 mg/kg で 80% (16/20)、27.0 mg/kg で 100% (10/10)、33.0 mg/kg で 100% (5/5) であり、LD₅₀ は 15.0 mg/kg と決定した。

MMC の各投与量別における VE 過剰の延命効果は図 1 のごとく、15, 17 mg/kg では、VE 正常対照群の 61~64% に対して、VE 過剰群で 82~81% と高い生存率（延命率）を示し、有意の差をもって延命効果が認められた。

MMC 15 mg/kg 皮下注射の延命効果（図 2）は、対照群 5 日に多数（7/20）死亡し、21 日までに死亡率 55% (11/20)、死亡日数を加味した生存率は 61% に対し、VE 過剰群は 7 日に多数（3/20）死亡し、全死亡率は 25% (5/20) で、生存率は 82% であり、延命効果率は「+21%」を、また 17 mg/kg でも同一傾向を示し、著明な延命効果があり、VE による MMC 性障害の比較的顕著な抑制効果が認められた。

図 1 マウス (dd/Y8) における MMC の LD₅₀ 値および VE 投与による延命効果

図 2 MMC LD₅₀ 量投与マウス (dd/Y8) の VE による延命効果

2. 第 2 実験 (表 1)

Wistar 系成熟ラットの MMC 皮下注射 LD₅₀ は表 1 のごとく 3.0 mg/kg であった。

表 1 ラット (Wistar 系成熟) における MMC LD₅₀ 値

MMC 皮下注射量	死亡数/総数	死亡率
4.5 mg/kg	6/7 (6, 7, 7, 8, 8, 8)	85.6%
4.0	8/10 (6, 6, 6, 6, 7, 8, 10)	80.0
3.5	5/7 (4, 5, 5, 5, 6)	70.1
3.0	11/22 (5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 12)	50.0
2.5	2/6 (7, 9)	33.3

注) ( ) 内死亡日数

3. 第 3 実験

(1) 経過観察

ラットでは VE 欠乏食飼育群（離乳期より、7 カ月）にて、6 カ月前後から体毛の艶の衰えと黄色化および運動遅鈍がみられた。しかし、他の 2 群には特記すべ

き所見は認められなかった。

MMC 投与により 3 群とも投与後 3 日から食餌量の減少・立毛・下痢と鼻出血をみ、4 日から下痢は血液を混じて激しく、持続性で、5 日以降はさらに衰弱し、死亡例が散発した。9 日まで上記諸所見が続行し、生存例は 10 日以降徐々に回復に向い、15 日にはほぼ正常な状態に復帰した。なお、これらの経過所見は第 1・第 2 実験のマウスとラットでも同様であった。

また、A 群は C 群・H 群に比較して、MMC 中毒症状は常に強く回復は遅延したが、15 日生存例には 3 群での差はみられなかった。

(2) 死亡率

15 日観察にて A 群 60% (9/15 匹)、C 群 53% (8/15 匹)、H 群 33% (5/15 匹) で、VE の多量な群ほど死亡率の低下が認められた (A 群>C 群>H 群)。

(3) VE 定量

1) MMC 投与前の 3 群の VE 含有量は H 群>C 群>A 群であった。

2) MMC 投与動物の VE 含有量の消長

i) 脂肪組織 (腎周囲脂肪組織): 図 3 のごとく A 群は MMC 投与後 7, 8 日までに減少して、最低値を示し徐々に漸増したが、15 日では MMC 投与前値より低値であった。

C 群は MMC 投与後 5 日には前値の 2 倍に急増し、以後 5mg/100g 前後で 15 日までほとんど横ばいを示した。

H 群は 5 日に急増したが、7 日より減少し、15 日には前値に復帰した。したがって、脂肪組織中の VE の消長は、H 群>C 群>A 群であり、VE 飼育量の多い程脂肪組織内の VE 含有量が高く著明な差を示した。

ii) 精巣: A, C 両群は MMC 投与後 7, 8 日まで減少し、最低値を示し、9 日以降漸増したが、いずれも低値にとどまった。H 群は 3 日に減少し、以後 8 日まで横ばいを、9 日に他群に遅れてやや減少するが 15 日には回復した。したがって H 群>C 群>A 群を示し、精巣中の VE が少ないほど最低値が早期化する傾向がみられた。

iii) 肝臓: 肝臓でも精巣と同様の平行的傾向が認められ、3 群の曲線は精巣にみられた曲線とほぼ平行したが、実数値は C・H 群で 2 倍、A 群で 6 倍と精巣より高値を示し、臓器の特異性が認められた。

これらの総合して VE の消長は MMC 投与により H・C 群の脂肪組織内の VE 含有量のみ特異的に上昇を示すほかは低下し、15 日生存例で MMC 投与前にほ

図 3 精巣、肝臓、腎周囲脂肪組織内 VE 含有量の推移

ぼ復帰する。さらに MMC 投与に関係なく常に H 群>C 群>A 群であった。

(3) 病理組織学的所見

1) 皮膚

MMC 3.0 mg/kg 皮下注射による皮膚ならびに皮下筋層の障害像はこれら全組織のびまん性凝固壊死を主体とし、さらに表皮壊爛、皮膚付属器・皮膚筋板の変性・壊死・消失、結合組織の膨化ないし硝化、脂肪細胞の変性壊死、血管壁の膨化・外層よりの壊死 (写真 3) およびそれによる出血・浮腫、皮膚直下筋層の変性・萎縮、筋層間質の浮腫・出血・わずかな炎症性細胞浸潤などで、MMC 皮下注射 3 日にはすでに強度にびまん性凝固壊死が出現し、15 日までの 3 群には障害程度の差はなく、またいずれも軽減することなく持続し強度であった (写真 1)。しかし、血管壁の変性壊死による出血は、深部の筋膜と筋層を中心に主としてみられ、その程度は A 群>C 群>H 群の傾向が認められたにすぎない。修復像として、壊爛辺縁の表

皮膚増生肥厚は3日より軽度で、15日ではA群で平均8層、C群で10層、H群11層とH群にやや強く、肉芽形成ならびに線維化は凝固壊死巣周辺部の真皮深層および脂肪織にA群15日、C群5日、H群3日と、H群に早期に出現し、とくに筋層間質にわずかに肉芽形成の初期像として、幼若型の巨大な線維芽細胞の増加が9日ではH群のみに、15日ではC群に軽度

に、H群で中等度となり、VEの含有量の多い群ほど表皮再生と周辺肉芽形成などの修復機転の旺盛化が認められた(写真2)。

なお、凝固壊死は比較的境界が鮮明であり(写真1)、周辺の充血ならびに細胞浸潤は軽微に経過し、炎症性浸潤細胞の内骨髄系細胞の出現程度はH群(+) > C群(+) > A群(±)であった。その他、真皮、皮膚筋

表2 盲腸のMMC性障害に対するVEの影響

経過日 群別			MMC投与後3日			5日			(6)~7日		
			A群	C群	H群	A群	C群	H群	A群	C群	H群
盲腸粘膜	既存上皮	杯細胞	—	—	—						
		萎縮	+	—	—						
		膨化	+	+	—						
		変性	+	+	—						
	糜爛	剝離	+++	+++	+++						
		壊死物質	+	+	—	+	+	—	+++	+++	+
		フィブリン網	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	出血	—	±	—	+	+	+	+++	+++	+	
		小囊胞	±	±	+	±	+	+	—	—	+
	*再生上皮	再生	±	+	+	±	+	+++	—	—	+
幼若型		—	±	—	—	+	+++			±	
分化型		—	±	—	—	—	+			—	
変性		—	+	—	+	+	—			±	
粘膜固有層	肉芽*	線維化*	—	+	—	+	±	+++	+	+	+
			+	—	—	—	+	+	+	+	+
	細胞浸潤*	{	L+E+ P+N+ Ru+	L+E P±	L±E± P±N—	L±E+ P±N+	L±E N±	L+E N+	L+ N+	L+ N+	L+ N+
			うっ血	—	+	+	+	+	+	+	+
	浮腫	+	±	±	+	—	—	+	+	+	
	出血	+	±	±	+	+	—	+++	+++	+	
	粘膜下層	血管充盈	+	+	+	+	+	+	+++	+	+
		血管壁変性	—	±	—	—	—	—	—	—	—
		浮腫	+	+	+	+	+	+	+++	+	+++
		線維化*	+	—	—	±	+++	+	+++	+	±
細胞浸潤*		{	E+ P+	E+ N+ M±	—	E+P+ N±Ru+	L+ E+	L+E+ H+N— M±	L+ N+	L+ N+	L+E+ H+
			—	—	—	—	+	±	+	±	+
神経叢変性・萎縮	マインネル	±	±	—	±	±	—	+	±	—	
	アウエルバッハ	±	±	—	±	±	—	+	±	±	
筋層(間質浮腫)			+	+	—	+	±	—	±	—	
漿膜下層・漿膜			著変なし								
腸内腔			R+ N+ Nz±	Nz±	Nz±	Nz+ R+ R+	N+ R+ L+	N+ R+ L+	N+ NM+ R+ Nz+	NM+ N+ R+ Nz+	N+ R+ NM+
総合病変	障害度		+++	++	++	+++	++	++	+++	++	++
	修復度		±	+	+	±	+	+++	±	+	+

*修復所見 L:リンパ球, E:好酸球, P:プラズマ球, R:赤血球, N:好中球, H:組織球, Ru:ラッセル小体
M:肥胖細胞, Nz:壊死物質, NM:壊死物質

板, 皮下脂肪織, 筋肉実質, 皮膚付属器などには再生修復像はまったくみられなかった。

2) 盲腸 (表 2, 図 4)

腸管の MMC 性病変は, 盲腸を中心としたびまん性糜爛出血性腸炎が主病変で, 表 2 に示すごとく, その障害は 7~9 日に強度で強い出血を伴い, 以後軽減し死亡率とよく一致した。

(8)~9 日			15 日		
A 群	C 群	H 群	A 群	C 群	H 群
+++	++	-	+	+	±
-	+	+	-	-	-
++	++	-	±	-	-
-	-	±	-	-	-
-	-	++	+	++	++
		+	+	+	++
		-	+	+	++
		±	-	-	-
+++	++	±	-	-	-
+	+	+	+	-	+
++	++	++	+	+	+
L+N- N± P+	L+N- N- P++	L+N- E±H+	L+E- N++	E+L- N++	L+E- N++
+	+	+	+	+	-
++	+	++	++	+	+
++	++	++	-	-	-
++	++	±	+	+	+
-	±	-	-	-	-
++	±	+	+	±	++
++	++	+	+	+	+
L+P- N±	L+P- H+N-	L±E± N±	L±E± N±	-	L+E- N+
+	+	+	-	-	-
+	±	+	+	+	±
+	++	+	+	+	±
++	++	-	+	+	+
NC++ R++ N++ NM++	R++ N++ NM++	R++ NM++	Nz±	Nz±	Nz±
+++	++	++	++	++	+
±	+	++	+	++	++

MMC 投与 3 日後では, 一般に盲腸粘膜はわずかの既存粘膜上皮細胞および再生上皮細胞でおおわれていたが, 杯細胞 (被覆上皮と腺上皮ともに) は消失し, 粘液産生能はまったく消退していた。また, 被覆上皮は既存上皮, 再生上皮ともに空胞変性, 水腫様変性, 核濃縮を伴う好酸性変性, 膨化, 細胞質染色性低下などの変性を示した。

盲腸粘膜の既存上皮は, ほとんど剝離し, MMC 投与 3 日には上記のごとく変性化し, わずかに残存するにすぎず, 5 日以後はすべて再生上皮でしめられている。3 日での既存上皮は, A 群では萎縮, 膨化, 変性などの退行性病変を伴うが, H 群ではほぼ正常で, VE の有無の差が認められた。

再生上皮の再生能と分化能とは H 群に強かった (H 群 > C 群 > A 群)。7~9 日では, 再生上皮の再剝離は C, A 群にきわめて強くみられ, H 群ではきわめて軽度で, かつ粘膜からの出血も A 群 > C 群 > H 群であった (写真 4~8)。

図 4 MMC, VE 群別による盲腸の障害, 修復曲線

H群の再生上皮の幼若型細胞は、5日に強くみられ、15日には成熟型の再生上皮で被覆され、この一部は深部に向って円柱形の腺細胞に分化し、管状配列をとり、さらに一部は、癌細胞類似の異型性ならびに不規則な島状ないし小嚢胞状の排列異常を呈していた（写真9～12）。

糜爛に伴う粘膜下の肉芽形成、線維化、細胞浸潤などの修復所見は、5日でH・C群にとくに顕著にあらわれ、全般的にH群>C群>A群であった。炎症性浸潤細胞の内骨髓系細胞の出現の程度は、骨髓の造血所見とほぼ一致する傾向を示し、H群>C群>A群であった。

A群では3～5日の早期に粘膜固有層ないし粘膜下層にラッセル小体を伴うプラズマ球の強い浸潤がみられたのは興味ある所見であった。

腸管神経叢の変性、萎縮はH群に軽度であった（A群>C群>H群）。

腸管腔内容物は多量の赤血球、好中球、剥離細胞ならびに壊死物質でしめられ、盲腸粘膜の退行性病变に平行して激甚であった。

図5 MMC障害時におけるVE群別骨髓造血機能の消長

MMC性障害度はA群>C群>H群で、修復度はH群>C群>A群であり、その消長は図4のごとくである。盲腸と同種の病变が盲腸と連結して上行結腸、回腸にも時に出現したが、病变境界は比較的鮮明であり、その程度は盲腸>結腸>回腸であった（写真13）。

3) 骨髓 (図5)

VE欠乏のみによる骨髓病变は、骨髓性顆粒球系、赤血球系ならびに巨核球系細胞の減少と脂肪細胞の増加による漸進的造血機能障害が認められた。

一方、MMC性骨髓障害は、上記骨髓諸種細胞の萎縮・核の濃縮・崩壊および変性と、これらのいちじるしい減数消失、脂肪細胞の増加などの造血機能の急激な減退であった。そこで著者は、造血機能の形態学的判定の一指標として、1視野220×330μの10視野より巨核球および脂肪細胞数の平均値を算定し、3群の経日的推移を検討した（図5）。すなわち、MMC投与前のH群は巨核球数が多く、脂肪細胞数が少なく、正常群（写真14）ないしそれ以上の造血機能亢進が認められ、反対にA群では低下を示した（写真15）。これらにMMCを投与すると、C・A両群の造血機能は急激に低下し、7～9日で最低値を示し（写真16, 17）、死亡率の増加と一致したが、15日生存した少数例では回復はいちじるしかった（写真19）。

一方、H群はMMC投与3日に若干造血機能が亢進し、以下漸減し、8～9日に最低値を示した（写真18）が、造血機能は他2群よりはるかに高く維持され、15日にはMMC投与前以上の機能亢進がみられた（写真20, 21）ことは特異的であり、VEのMMC性障害に対する強い抑制作用を認めざるをえない所見であった。したがって骨髓でのMMC性障害抑制効果はH群>C群>A群であった。

4) 精巣 (図6)

VE欠乏性精巣（7カ月）の病变は、精巣外層の精細管に顕著にみられ、造精系細胞の変性、萎縮、減少、巨細胞化、精細管内での精栓石灰化などの退行性病变が主体で、造精機能の低下をきたしたが、セルトリ細胞は変性、再生像が軽度であった。また、間質はほとんど障害されず、水腫、線維化が軽度のみられたが、精巣上体、造精細胞には影響なく、この結果、精巣上体小葉輸尿管内に産出された精子の集合状態ならびに退行性病变に陥った造精細胞の流出があり、①精子の減少、②精子の頭部消失、③精母・精娘細胞の腫大、変性剥離ならびに④精母・精娘細胞の多核巨細胞などがみられ、精巣上体輸尿管の内容物を検索するこ

とは精巣の諸病変および機能の総合的判定に適確な方法である。

一方、精巣の MMC 性障害の結果として、精巣上体輸尿管の内容物は程度の差はあっても精巣の VE 欠乏性病変と同様の所見であった。

図 6 MMC による精巣の障害曲線
(精巣上体輸尿管内容物よりの判定)

精巣上体輸尿管の上記①②③④の各病変を指標として、VE 欠乏、MMC 投与による障害像を判定すると図 6 のごとく全経過を通じて造精機能障害は A 群 > C 群 > H 群で、常に H 群において少なく、造精機能もほぼ正常であり、VE の有効性が認められる所見であった (写真 22~24)。

図 7 MMC による肝臓の障害曲線

表 3 肝臓の MMC 性障害に対する VE の影響

経過日 E 含有量 mg % 病変	群別	MMC 投与後 3 日			5 日			(6)~7 日			(8)~9 日			15 日		
		A 群	C 群	H 群	A 群	C 群	H 群	A 群	C 群	H 群	A 群	C 群	H 群	A 群	C 群	H 群
		1.38	2.07	2.61	1.22	1.37	5.03	0.22	0.68	1.99	0.83	0.96	2.07	1.21	2.69	5.74
肝細胞	脂肪変性	±	心	—	±	心	±	±	±	±	±	心	±	±	—	—
	暗細胞	±	±	—	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±
	混濁腫脹	±	±	—	±	±	—	±	±	±	±	±	±	±	±	±
	萎縮(中心性)	—	—	—	—	—	—	±	±	—	±	±	+	+	—	±
	空胞変性	+	(風船±間)	—	—	—	—	—	—	—	(風船+間)	+	—	—	(風船±心)	—
	配列不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	±	±	—	—	±	—
	細胞質染色性亢進	—	—	—	—	—	+	—	—	+	—	—	±	—	±	±
	巨大核	±	—	—	—	—	—	—	—	—	±	—	—	±	±	—
	核濃縮	±	—	—	—	—	—	—	—	—	±	—	—	—	—	—
	核小体増加	—	—	—	—	—	+	—	—	+	—	—	±	—	—	±
星細胞	動員像	—	—	—	—	—	+	—	—	—	(膨化+)	+	+	+	+	+
	セロイド様色素萎縮	—	—	—	+	—	—	+	—	—	±	—	—	±	—	—
	萎縮	—	—	—	—	—	—	±	±	—	±	—	—	—	—	—
内皮細胞萎縮		—	—	—	—	—	—	±	±	—	—	—	—	—	—	—
うっ血		±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	+	+	—
総合障害度		±	±	—	+	±	±	±	±	±	±	±	+	±	±	—

注) 心：中心帯，間：中間帯，周：周辺帯，風船：風船様細胞

なお、C・A 群で5日にやや機能回復がみられた。これは盲腸の修復曲線と同一の所見であった。15日生存例では、3群ともほぼ正常所見を呈した。これらのMMCによる精巣の障害曲線(図6)と精巣内VE含有量(図3)の推移はよく一致し、H群(VE平均2.21 mg/100 g) > C群(VE平均0.65 mg/100 g) > A群(VE平均0.17 mg/100 g)のごとく、VEの含有量が多いほどMMC性障害の抑制を示した。

5) 肝臓(図7, 表3)

肝臓のVE欠乏性(7カ月)病変は、肝細胞の萎縮とこれによる肝細胞索の狭細化、中心静脈に接する一層の肝細胞の軽度空胞化、周辺帯および被膜直下の肝細胞の暗細胞化、肝細胞細胞質内好塩基性顆粒の減少(ミトコンドリアの減少)、巨核化、核濃縮、核内空胞形成などによる核の大小不同、星細胞内のセロイド様

色素の出現があった。また、MMC性肝障害は、肝細胞の脂肪変性(一般に中間帯より周辺帯に及び、いちじるしい場合は中心帯にもみられる)、核濃縮の著明な暗細胞、混濁腫脹や風船様細胞などが周辺帯に多く、時には中心帯にも及び、また肝細胞の中心性萎縮、星細胞の萎縮ないし濃縮、洞内皮細胞の萎縮、びまん性うっ血であった。

以上VE欠乏性病変とMMC障害性病変との組合せが出現し、主要所見は表3のごとくであった(写真25~31)。

これらの肝障害曲線(図7)は、3群とも9日まで漸次増悪し、15日生存例では軽減した(写真32)。これらの障害度に応じて死亡が多発し、肝のVE含有量の推移(図3)と同様の傾向を示し、MMC性障害は常にA群 > C群 > H群で、VE含有量はH群

表4 MMC性障害像と修復像とのVE群別による推移

臓器		経過日 死亡数 群別 各群 15日	3日			5日			(6)~7日			(8)~9日			15日		
			A	C	H	A	C	H	A	C	H	A	C	H	A	C	H
			0	0	0	0	0	0	2	3	1	7	5	2	0	0	2
皮膚	A	↓	+++			+++			+++			+++			+++		
	C	↓	+++			+++			+++			+++			+++		
	H	↓	+++			+++			+++			+++			+++		
盲腸	A	↓	+++			+++			+++			+++			+++		
	C	↓	+++			+++			+++			+++			+++		
	H	↓	+++			+++			+++			+++			+++		
骨髓	A	↓	+			+			+			+			+		
	C	↓	+			+			+			+			+		
	H	↓	+			+			+			+			+		
精巣	A	↓	+			+			+			+			+		
	C	↓	+			+			+			+			+		
	H	↓	+			+			+			+			+		
肝臓	A	↓	+			+			+			+			+		
	C	↓	+			+			+			+			+		
	H	↓	+			+			+			+			+		

↓障害度, ↑修復度

(3.89 mg/100 g) > C 群 (2.03 mg/100 g) > A 群 (1.07 mg/100 g) となり、VE 含有量の多い群ほど MMC 性障害を抑制していることを示していた。

その他各群とも肝の出血、壊死、肉芽形成、線維化などは認められず、炎症性細胞は7日頃よりリンパ球浸潤が出現するが強くなく、顆粒球系細胞浸潤は骨髓機能に平行する傾向を示すが特記すべき所見はなかった。

6) 腎周囲脂肪組織、精巣周囲脂肪組織、腸間膜脂肪組織、ならびに注射局所以外の皮膚脂肪組織などには、組織学的に特記すべき所見は、認められなかった。

考察

マウスおよびラットに対する MMC の皮下注射による LD₅₀ の報告はきわめて少なく、本実験では Wistar 系ラット 3.0 mg/kg をえて他の報告¹⁴⁾と一致

表 5 精巣、肝臓、腎周囲脂肪組織内 VE 含有量の推移

群*	MMC 投与後 経過	蓄積ビタミン		細胞機能維持ビタミン		平均値 (mg/100 g)
		脂肪組織 (mg/100 g)	肝臓 (mg/100 g)	精巣 (mg/100 g)		
H 群 (VE 過剰群)	0 日	9.21	5.63	3.35		6.06
	3	13.14	2.61	1.76		5.84
	5	18.43	5.03	1.85		8.44
	7	11.38	1.99	1.86	M	5.08
	8	11.28	4.15	2.36		5.93
	9	10.24	2.07	1.32		4.54
	15	9.12	5.74	2.96		5.94
	平均値	11.83	3.89	2.21		5.98
C 群 (VE 正常群)	0 日	2.18	5.90	1.52		3.20
	3	3.80	2.07	0.56		2.14
	5	5.13	1.37	0.99		2.50
	7	4.17	0.68	0.34	M	1.73
	8	5.60	0.53	0.13		2.09
	9	5.44	0.96	0.26		2.22
	15	4.04	2.69	0.74		2.49
	平均値	4.34	2.03	0.65		2.34
A 群 (VE 欠乏群)	0 日	3.51	2.32	0.16		2.00
	3	1.45	1.38	0.07		0.97
	5	1.73	1.22	0.00		0.98
	7	0.16	0.22	0.26	M	0.21
	8	0.17	0.30	0.12		0.20
	9	0.60	0.83	0.22		0.55
	15	1.71	1.21	0.38		1.10
	平均値	1.39	1.01	0.17		0.86

注) * 離乳期より VE 食飼育 7 カ月、** MMC 3.0 mm/kg 皮下注射後の経過日数、M: MMC 投与後 3~15 日の VE 平均含有量

したが、成熟 dd/Y 系マウスについては 15 mg/kg 皮下注射では、山田¹⁴⁾の 8.5 mg/kg (マウス純系の記載なし)といちじるしく相違した。この相違はマウスの純系、個体差、季節、薬剤ロット別の差や注入液量などによるものと思われるので、実験のつど相当数の動物で予備実験が必要であろう。なお、死因については剖検と検鏡により合併症・併発症を削除する必要がある。

毒性実験における死亡率の決定は、一定期間内での死亡総数のみにより一般に検討されているが、毒性の強弱、個体差、投与方法、直接ならびに間接的死因などを考慮する必要がある。したがって死亡総数に加え各個体の生存日数を重要因子として統計的に処理することは当然であろう。著者は、観察期間を一応 21 日として、21 日生存例を 1 匹ごとに 100% とし、21 日以内の死亡例はおのおのから (生存日数/21 日) × 100% を求め、総動物数の平均 (%) を 1 群の延命率とし、対照群と条件群との差から延命効果率を算出した。したがって、図 2 において従来の死亡率では 21 日までに対照群 55%、VE 過剰群 25% であったが、著者の上記の方法で処理すると延命効果率は「+21%」(82—61%) となり、延命効果が総合的に示され、きわめて適切な方法と考える。

MMC 投与後の鼻出血、下血などの激しい持続性の出血や、5~9 日の死亡散発 (9 日に最高値を示す) は、山田¹⁴⁾、Philips ら¹⁵⁾とおおむね一致し、また MMC の副作用が他の抗癌剤より遅発性・持続的であるという報告^{15,16)}とも一致した。これについては、MMC が組織に吸着され、低濃度ながら長期蓄積作用があると田坂ら¹⁷⁾は報告している。この激しい腸管出血は組織所見に示すごとく盲腸を中心とした 15 日以上に及ぶ激しいびまん性壊爛性出血性腸炎に起因し、造血機能の顕著な低下が死因の一つをなしている。すなわち、骨髓巨核球の著明な減少^{14,18)}、それに伴う血小板の減少^{19,20,21)}、凝固能の低下、赤血球の減少による貧血・酸素欠乏性病変としての血管壁内膜細胞の障害や透過性亢進、VE 欠乏による透過性促進、その他複雑な因子により出血傾向^{17,20,21)}を強め、剖検上でも腸管出血のほか胸膜出血と鼻粘膜出血¹⁵⁾、全身性貧血などがあり、これらは出血死としての所見であった。

皮膚の MMC 性障害 (表 4) は注射局所を中心とした凝固壊死で、その成因には薬理学的、生化学的障害因子が直接凝固壊死を惹起せしめたほか、組織学的には血管壁の外側からの凝固壊死、硝子化などの器質

的障害による循環障害が生じ、二次的に血栓形成、出血を伴った虚血性壊死病変が加わっている。したがって、MMC による皮膚壊死の範囲は、薬剤の浸潤範囲と障害された血管系の灌流域との総和が考えられ、これは DNA 合成阻害剤として癌細胞を変性壊死せしめる作用を含めた強力な毒性として認められた。

消化管の MMC 性障害 (表 2, 4) は、盲腸の激しいびまん性壊爛性出血性腸炎で皮膚の MMC 注射局所の一次性病変におとらず激甚さを呈したが、その侵襲像は粘膜上皮の変性、剝離すなわち壊爛に随伴した滲出性一変性炎で、強い出血を伴い、皮膚と異なり粘膜下血管の炎症・壊死はごく一部で軽度すぎず、腸粘膜破壊が主体であるため、血行性の侵襲ではなく腸管内腔よりの侵襲と考えざるをえない。

皮下注射による MMC の排泄過程からみて、血管を中心とした循環系、胃腸道系、呼吸器系、泌尿器系などに強い障害は認められず、肝に軽度ないし中等度、および盲腸を中心とした腸管系に激しい障害像が認められたことから、MMC が Cycasin ないし methylazoxymethanol (以下 MAM と略す)³²⁾ で認められるごとく肝臓ならびに胆道より排泄後腸管内の細菌による活性化が考えられるが、一方 MMC が大腸内腔に認められないとする説²²⁾や、大腸壁組織に長く蓄積するとする説²³⁾などもあり、盲腸侵襲の起序については今後の問題であるが、何れにしても特異的であった。なお、動物純系による臓器特異性³³⁾についての記載もあるが、ヒトの副作用症状に類似した結果が本実験でもえられたことから動物種・純系別により程度の差があってもその特異性は否定したい。ただ本実験からいえることは、腸内細菌、肝、その他により MMC ないし、その誘導体が活性化され細胞障害性を獲得して腸内容物に混在し、その腸内容物が盲腸ないし大腸で比較的長時間停滞して、被害部の粘膜上皮細胞を化学的に障害せしめて、粘膜上皮の変性剝離がくり返され、びまん性壊爛性出血性腸炎を惹起せしめたものであろう。この際 VE が CCl₄ 性肝障害を軽減したように¹²⁾、MMC の薬理学的障害因子に抑制的に作用するとか、粘膜細胞の代謝を亢進せしめるとか、未知ではあるがある程度腸粘膜に保護的に作用し MMC 性障害を軽減せしめ、他方では被害部の再生性修復を亢進せしめるので VE の一定量の有無が重要因子となり、VE 欠乏動物では変性性腸炎が強く、VE 過剰動物では軽症にとどまるものと推定される。

本実験で VE 欠乏群 (A 群) の MMC 投与 3~5

日の早期に腸粘膜固有層ならびに下層に比較的多くのラッセル小体を伴うプラズマ球と好酸球の浸潤ならびに線維化が認められたことは、MMC 投与前にすでに慢性滲出性腸炎が同部に先行していたことを物語っており、VE 欠乏が腸の抵抗性を弱めることも考えられる。また、盲腸の激しい変性炎が回腸に波及し炎症部と正常部との境界が鮮明であったことは前記の含 MMC 腸内容物による粘膜障害説で説明できるであろう。

腸管病巣内の炎症性細胞浸潤のうち、骨髓系細胞は A 群に少なく、H 群に豊富で骨髓の造血機能との関連性が考えられたが、リンパ球、プラズマ球は 3 群に比較して相違がなく、また腸管リンパ球の障害像もなく、MMC のリンパ系への障害は 15 日までには骨髓系に比しきわめて少ないことを示している。

被害盲腸粘膜上皮細胞の再生は、A 群に弱く H 群に旺盛であったが、一般胃粘膜上皮細胞の再生と同様に陰窩部のいわゆる頸部細胞の再生増殖により、一方は被覆上皮細胞に、他方では腺上皮細胞に分化するのがみられ、とくに深部の腺細胞の microcyst 化や異型化傾向が目立った。上皮再生に関しては、autoradiography により検討中である。

VE 欠乏による骨髓の障害は、前記骨髓顆粒球系、赤血球系、巨核球系の漸減的減少と脂肪細胞の増加 (いわゆる脂肪髄) との数的変動にとどまり、著明な貧血は認められず、赤血球の脆弱化、易溶血性を伴うとされている^{11,34)}。

一方、MMC 性障害は、脂肪細胞の増加、その他の骨髓系細胞の減少との数的変動に加え、退行性病変などの急変、消失を主体とし、血小板減少^{19,20,31)}、貧血、出血傾向^{17,20,21,24,35)}をきたし、本実験でも同一結果であった。また、少なくとも骨髓では、諸細胞が退行性病変を呈するにもかかわらず、骨髓脂肪細胞は増殖のみが認められ、MMC に対し、抵抗性に富み、VE 欠乏でも同様であったことから、一般に骨髓系細胞の減少時の補空性増殖に任ずる細胞と考えたい。

著者は、精巢上体輸尿管内容物による造精機能の判定 (図 6, 表 4) という新観察法のみによったし、岩瀬³⁰⁾は精巢のみの観察のため、岩瀬と十分な比較検討はできないが、本実験の VE 欠乏性精巢病変はおおむね岩瀬分類の代償Ⅱ型に属し、荒廃Ⅱ型の完全無精子症には到らなかった。これは、岩瀬が従来の Olcott VE 欠乏食により、本実験ではオリエンタル精製 VE 欠乏食飼育の差はあるにしても、精巢内 VE 含有量は岩瀬の 6 カ月と本実験 7 カ月において大差はなかっ

た。

MMC の皮下注射による皮膚の凝固壊死は、MMC の一次性障害が激しすぎるために 15 日までは表 4, 5 のごとく、VE 含有量の差による障害差は認められず (冊〜冊)，修復像は、表皮再生、凝固壊死周辺および筋層間質の肉芽形成ないし、線維化が H 群に強く (+〜++)、15 日で H 群>C 群>A 群であった。したがって VE の効果は、MMC の強激な注射局所における一次性病変には各群とも防禦の効果としては認められなかったが、表皮再生、肉芽形成の修復像に細胞分裂必需ビタミンとして有効であった。

一方、MMC の二次性病変として、肝を除く盲腸、骨髓、精巣においては表 4 に示すごとく各臓器とも 3 日以内に障害を受け、7~9 日で最強となり 15 日に軽度となるが、この所見は死亡率と一致しており、死因が骨髓の細胞変性・減少と腸管出血による出血死であることを裏付けるものであり、事実他の主要臓器に死因となる重要所見は認められなかった。同経日では MMC による障害は常に A 群>C 群>H 群である。なお、盲腸、精巣の 5 日 (図 4, 6) に修復機転が出現したことは、臓器内にいまだ VE が保有されているため、障害を抑制する一方、修復作用が営まれているものと考えられ、その後は保有の VE が多量に消耗しつつされ、あるいは極度不足のためか、修復度の減退をきたしたもので、この証明には VE 多量補給による回復実験によらねばならないが、いずれにしろ H 群の修復像の亢進は VE 保有量と関連が密であることを示している。また、精巣における VE 含有量は表 5 に示すごとく、H 群 (平均値 2.21 mg/100 g)>C 群 (0.65 mg/100 g)>A 群 (0.17 mg/100 g) であったが、精巣 VE の細胞機能維持量は 0.5~1.5 mg/100 g⁴⁾ のため、精巣の MMC 性障害が激甚でない場合には形態学的に大きな差異の認めがたいのは当然である。しかし、MMC 投与後の VE 含有量の推移 (図 3) は障害度と相関し、VE が障害抑制ならびに修復に関与していることを示している。さらに肝臓内における VE (図 3, 表 5) の推移は、MMC 投与 3 日より急激に減少 (H 群 5.63→2.61 mg/100 g, C 群 5.90→2.07 mg/100 g, A 群 2.32→1.38 mg/100 g) し、7 日に各群ほぼ最低値 (H 群 1.99 mg/100 g, C 群 0.68 mg/100 g, A 群 0.22 mg/100 g) を示す。一方、組織障害はこれに遅れて 5 日よりあらわれ、7~9 日と強く、肝臓内 VE 含有量の減少にしたがって障害の強さを増すが、組織像において細胞分裂 (肝細胞の 2 核性など) はあまり

目立たず、VE が肝細胞の再生性修復よりも細胞機能維持作用ならびに障害抑制に積極的に関与していることが考えられ、障害像は A 群>C 群>H 群であるが、他臓器に比較して障害が軽度であることから、MMC の肝臓内における酵素学的不活化^{22, 37, 38)}と相まって、肝臓が脂肪組織と同様 VE の大きな貯蔵臓器であり^{39, 40)}、VE の蛋白代謝、糖代謝、脂質代謝など種々の物質代謝を亢進させる作用^{7~10)}が障害を防禦していると考えられる。森山ら^{1~3, 11)}の CCl₄ 肝障害に VE が有効であるとする報告と一致している。

以上、MMC の一次性病変は皮膚に、二次性病変は盲腸>骨髓>精巣>肝臓の順に強く、皮膚では即時性で、盲腸、骨髓、精巣では 3 日以内に相当度の障害をきたし、これらの臓器はともに life cycle の短い臓器であることが共通している。さらに肝臓では 5 日に障害像を呈して遅発性であり、検索した範囲での脂肪細胞ではほとんど障害は認められない (皮膚>盲腸=骨髓=精巣>肝臓>脂肪細胞)。

VE 含有量は図 3, 表 5 に示すごとく、脂肪組織>肝臓>精巣であり、VE 含有量の多いほど MMC 性障害は軽度であり、また修復の強いことを示している。したがって life cycle の短い組織ほど、細胞の消失・再生が盛んで、VE の消耗が大であり、MMC による DNA 崩壊、他の障害抑制のための VE の不足により、MMC が life cycle の短い組織に特異的に障害をもたらすためであろうか。これらのことから悪性腫瘍のうち、life cycle の短い腫瘍には、MMC 性障害は抗癌的に作用し、一方 VE による修復のうち、肉芽性線維性-間葉系反応性-修復が旺盛化するので、この修復反応が抗癌的に作用し、むしろ MMC 性抗癌作用に協力する結果となり、抗癌効果を高めることが予想される。しかし、life cycle の長い腫瘍の場合には、MMC 性効果も少なく、VE が抗腫瘍性間質反応を高める一方腫瘍自身の再生・増殖に促進的に作用することも否定しえない。したがって対腫瘍性効果については基礎的問題として検討中である。

脂肪組織 H・C 両群における VE は、MMC の障害作用に対して余力を有し、次の侵襲に備えて蓄積されている蓄積型ビタミンであるが、図 3, 表 5 から A 群脂肪組織は VE 保有量少なく MMC 性障害のために全身への補給に消費しつくされている感がある。

肝臓、精巣における VE の組織内消長は、その組織像とあわせ検討すると、障害度と修復度との総和の消長と同じ傾向を示していることから、VE が MMC 投

与とともに消耗され、障害抑制にあずかる VE は細胞機能維持ビタミンであり、障害部の再生性修復にあずかる VE は細胞分裂必需ビタミンと考えられる。なお、VE 過剰投与による重篤な障害は認められなかった^{8,41)}。したがって全経過を通じて H 群に障害が少なく、再生性修復が強いことは、VE の抗酸化作用による正常細胞の安定化^{7,11~13,42)}、血管壁強化⁴³⁾および血管内膜保護、ならびに蛋白代謝・糖代謝・脂質代謝など種々の物質代謝の亢進により細胞レベルで MMC 性障害を予防する細胞機能維持ビタミンとしての作用であり、また一方障害部の再生性修復に微小循環改善作用^{44,45)}による抗炎症作用⁴⁶⁾、血栓予防ないし融解作用⁴⁷⁾、抗不妊作用^{48,49)}、体組織の老化防止作用、成長促進作用^{6,36,49)}などの細胞増殖を促す細胞分裂必需ビタミンとしての作用がその修復に関わるものと考えられる。また、本実験におけるマウス、ラットの MMC 性障害がヒトの骨髄における造血障害^{18,21,25~27)}と出血傾向、大腸における出血性腸炎^{27,28,50)}、精巣における造精機能障害⁵¹⁾、肝臓障害^{31,52)}および皮膚注射局所の凝固壊死による潰瘍などの MMC 性副作用に強い類似性を示し、それらの障害および再生性修復に VE が有効であったことは、MMC の副作用が放射線の作用と類似しており^{53,54)}、その放射線障害にも VE が有効であるとする報告とも一致しており、VE が MMC 性副作用抑制に有効であることが本実験でも十分に認められた。なお、VE による抗癌剤副作用抑制に関する実験的報告はこれまでみべきものはなかったが、VE が MMC 性副作用抑制に効果があることが本実験で示されたことは、抗癌剤障害のうちで MMC がもっとも強激であるので^{14~16,19,24~29)}、他の抗癌剤の副作用抑制にも十分効果があることが考えられる。

結論

dd/Y 8 成熟マウスを VE 正常対照群、VE 過剰群の 2 群に分け、1 か月間飼育して、MMC の LD₅₀ および MMC 性障害に対する VE の延命効果を検討し、同時に Wistar 系 3 成熟ラットで LD₅₀ を求め、さらに Wistar 系 3 ラットを離乳期より 7 か月間まで VE 欠乏群、VE 正常対照群、VE 過剰群の 3 群に分けて飼育し、MMC の LD₅₀ を皮下注射後 3~15 日まで経目的に経過観察ならびに剖検し、注射局所皮膚、骨髄、腸管、精巣、肝臓を病理組織学的に検索、あわせて腎周脂肪組織、精巣と肝臓につき VE 含有量を測定して、比較検討し、次の結果をえた。

1) MMC 皮下注射による LD₅₀ は dd/Y 8 マウスで 15.0 mg/kg、Wistar 系 3 ラットで 3.0 mg/kg である。

2) 成熟 dd/Y 8 マウスへの MMC の LD₅₀ (15.0 mg/kg) 皮下注射により、生存率は VE 正常群で 45%、VE 過剰群で 75% で延命効果率は +21% となり有意の差を示したことより、VE による延命効果が認められる。

3) 死因は骨髄機能の低下と激しい消化管出血による出血死である。

4) MMC 注射による一次性病変として、注射局所皮膚に高度の凝固壊死が持続し、二次性病変として、盲腸を中心とした腸管のびまん性糜爛性出血性腸炎、変性減数を伴った骨髄造血機能の低下、精巣の造精系細胞の萎縮・変性・減数による造精機能低下、肝細胞の変性を主体とした退行性病変などであったが、脂肪組織には二次性病変はまったく認められない。これらの二次性病変は、life cycle の短い組織ほど強い。

5) 上記病変は VE 含有量の少ない VE 欠乏動物に激しく、反対に VE 含有量の多い VE 過剰動物に軽少で、VE の MMC 性障害に対する抑制作用が顕著であり、これらの障害度ならびに修復度は VE の含有量と密接な関連性を有することが認められる。

6) MMC 注射局所皮膚のごとく、一次性の激甚な侵襲に対しては VE の障害抑制作用に差は認められないが、表皮再生、肉芽形成などの修復度は VE 含有量の多いほど旺盛である。しかし、MMC の二次性病変にみられた盲腸、骨髄、精巣、肝臓での障害像(変性を主体)は、VE 含有量の多いほど強く抑制され、組織欠損は再生と肉芽形成により修復され、VE 含有量の多いほど旺盛である。

7) これらの VE による MMC 障害の抑制ならびに修復の旺盛化は、それぞれ組織細胞内の細胞機能維持ビタミンと細胞分裂必需ビタミンの作用にもとづき、そのビタミンは脂肪組織内の蓄積ビタミンによって補給される。

以上 VE が抗癌剤中もっとも副作用の強い MMC 性障害に対し、VE の抗酸化作用、血管壁強化作用、微小循環改善作用、抗炎症作用および蛋白代謝・糖代謝・脂質代謝などの各種物質代謝の亢進などの既知の作用のほかに生化学的、薬理学的、生物学的など未知の作用によるためか、顕著な有効性を示したことから、他の抗癌剤の副作用抑制への有効性が示唆された。

稿を終るに臨み、VE 定量につきご助言、ご指導を賜った第2生化学教室吉野芳夫教授、統計学につきご教示いただいた第1生化学教室加藤漸講師に深く感謝いたします。また、本実験に際しご協力いただいた第2病理学教室ならびに第2生化学教室の各位に感謝いたします。ビタミンE特殊飼料およびビタミンEはエーザイ株式会社より提供された。

文献

- 1) 木谷威男, 田村珍彦, 酒井幸男: Vitamin E の基礎と臨床. 総合臨床, 7, 147, 1958.
- 2) 森山昌樹: 急性四塩化炭素肝障害に対する α -Tocopherol の影響. 日医大誌, 39, 146, 1972.
- 3) Takada, A., Hasumura, Y., Matsuda, Y., and Ikegami, F.: The role of lipid peroxidation in the pathogenesis of CCl_4 -or alcohol-induced liver injury. International Symposium on Vitamin E, Hakone, 1970.
- 4) Sakamoto, K., and Sakka, M.: Reduced effect of irradiation on normal and malignant cells irradiated in vivo in mice pretreated with vitamin E. Br. J. Radiology, 46, 538, 1973.
- 5) 篠田雅人, 高木良成, 玉置文一, 赤星三弥: 放射線障害防護薬剤に関する研究 (第4報), ビタミンEおよびその誘導体の放射線障害防護効力について. 薬学雑誌, 88, 278, 1968.
- 6) 岩瀬教子: ビタミンEに関する実験病理学的研究(II), ビタミンEのラット発育成長に及ぼす影響. ビタミン, 50, 169, 1976.
- 7) 島園順雄, 勝井五一郎: ビタミン E. p. 40, 朝倉書店, 東京, 1973.
- 8) 真杉文紀, 中村哲也: ビタミンE欠乏動物の代謝変動. 栄養と食糧, 29, 361, 1976.
- 9) 若狭謙吉, 逢坂受児, 渋谷公一, 今村光男: α -トコフェリルニコチネートのコレステロール代謝におよぼす影響にかんする臨床的ならびに実験的研究. ビタミン, 34, 1, 1966.
- 10) 森下宗司: ビタミンE概説. 産婦人科, 18, 901, 1962.
- 11) 美濃真: ビタミンE研究の流れ. 臨床栄養, 49, 153, 1976.
- 12) 黒川一郎, 木村寿之, 榎野佳子, 長浜系子, 鈴木五禾, 永井竜夫, 神村瑞夫: ビタミンEの血球保存効果にかんする研究. ビタミン, 40, 206, 1969.
- 13) Ghoshal, A.K., and Kebabciyan, A.L.: Distribution and antioxidant action of α -Tocopherol in the hepatic subcellular material of rats. Gastroenterology, 64, 187, 1973.
- 14) 山田光雄: Mitomycin C の薬理学的研究. Chemotherapy, 8, 305, 1960.
- 15) Philips, F.S., Schwartz, H.S., and Sternberg, S.S.: Pharmacology of mitomycin C. I. Toxicity and pathologic effects. Cancer. Res., 20, 1354, 1960.
- 16) 戸木田菊次, 山田光雄, 登坂邦雄, 宮崎祥子: Mitomycin C のラット生体反応. 日薬理誌, 58, 398, 1962.
- 17) 田坂定孝, 真下啓明, 黒田善雄, 原田敏雄: Mitomycin の生体内動態および臨床効果について. 最新医学, 14, 1845, 1959.
- 18) 島田信勝, 石井良治: 制癌剤と白血球減少. Chemotherapy, 10, 1, 1962.
- 19) 服部孝雄, 藤井源七郎, 岡田清資, 関口守正, 芦川和高, 元谷喜久夫, 市川洋一: 骨髄移植を併用したマイトマイシン大量療法の臨床経験について—とくに投与法の検討について—. 治療, 45, 568, 1963.
- 20) 中川自夫: 制癌剤と出血傾向に関する臨床的ならびに実験的研究. Chemotherapy, 14, 43, 1966.
- 21) 斎藤達雄, 桧森興, 菅原一布, 金丸竜之介, 氏家重紀: 癌化学療法における造血系への副作用について. 抗酸菌病研誌, 20, 322, 1968.
- 22) 藤田浩: Bioassay 法による抗癌剤の体内分布, 排泄, 不活性化の特性について. 総合臨床, 20, 1350, 1971.
- 23) 赤尾建夫: 制癌剤の消化管障害に関する基礎的検討. 癌の臨床, 21, 334, 1975.
- 24) 菅野晴夫, 青木幹雄, 森田豊彦: 癌の化学療法と組織像. 癌の臨床別冊, 128, 1966.
- 25) 副島清治: 癌化学療法での骨髄造血機能に及ぼす影響. 弘前医学, 15, 621, 1963.
- 26) 久保明良: 抗癌剤の副作用. 内科, 22, 616, 1968.
- 27) Rousselot, L.M.: Gastrointestinal bleeding as a sequel to cancer chemotherapy. Am. J. Gastroenterol., 43, 311, 1965.
- 28) 久保明良, 古江尚, 古川一介, 小泉博人, 中尾功, 横山正: 制癌剤による副作用, 特に消化器障害について. 診断と治療, 55, 1158, 1967.
- 29) 神前五郎, 青木行俊, 天方義邦, 高井新一郎, 土井修: 制癌剤の副作用とその対策. 最新医学, 19, 2419, 1964.
- 30) 勝井五一郎: ビタミンE定量法. ビタミン, 28, 439, 1963.
- 31) 石井良治, 武石輝夫: 抗腫瘍薬の副作用とその対策. 総合医学, 20, 437, 1963.
- 32) 柚木一雄, 林敏雄: サイカシンによる実験大腸癌. 医学のあゆみ, 88, 685, 1973.
- 33) 天方義邦: マイトマイシンCとラッセ小腸吸収能に及ぼす影響の実験的研究. 阪大医誌, 14, 117, 1962.
- 34) 寺尾清, 副島恒男, 副島秀夫, 丸山幸太郎, 滝沢延次郎: Vitamin E が老年性変化に及ぼす影響に就いての実験的研究 (第2報). 日病理会誌, 52, 158, 1963.
- 35) 服部孝雄, 岡田清資, 関口守正, 芦川和高, 遠藤幸夫: マイトマイシン大量投与時の出血傾向に対するC.V.P. (Citrus Vitamin P) の応用について. 新薬と臨床, 11, 641, 1962.
- 36) 岩瀬教子: ビタミンEに関する実験病理学的研究(I), ラットのビタミンE欠乏性精巢の病理組織学的知見補遺. ビタミン, 50, 143, 1976.
- 37) Schwartz, H.S.: Pharmacology of Mitomycin C; III. in vitro metabolism by rat liver. J. Pharmacol. Exp. Ther., 138, 250, 1962.
- 38) Schwartz, H.S., and Philips, F.S.: Pharmacology of Mitomycin C; II. renal excretion and metabolism by tissue homogenates. J. Pharmacol. Exp. Ther., 133, 335, 1961.
- 39) 宮崎浩: ビタミンEの組織化学的研究. ビタミン, 19, 279, 1960.
- 40) 松尾正城: 産婦人科領域におけるビタミンEの研究, ビタミンE— ^{14}C 投与時における各臓器のビタミンE摂取状態. ビタミン, 30, 1, 1969.
- 41) 森下宗司, 佐原金吾: ビタミンE大量投与時の各臓器におよぼす影響について. ビタミン, 34, 146, 1966.

- 42) 真杉文紀, 中村哲也: ビタミンEの生理作用と生体膜・蛋白質・核酸・酵素, **21**, 855, 1976.
- 43) 王才蔭: 実験的動脈硬化症におよぼすビタミンEの影響. ビタミン, **17**, 365, 1959.
- 44) 神村瑞夫: ビタミンEと皮膚微循環機能. ビタミン, **33**, 166, 1966.
- 45) 神村瑞夫, 佐藤昌三, 辺見泉, 佐々木恒臣: ヒトの皮膚毛細管透過性に及ぼすビタミンEの影響. ビタミン, **28**, 129, 1961.
- 46) 神村瑞夫: ビタミンEの抗炎症作用. ビタミン, **46**, 326, 1972.
- 47) 友田豊: ビタミンEの血液凝固におよぼす影響(II)動物実験. ビタミン, **27**, 442, 1965.
- 48) 平井俊策: ビタミンE欠乏症. 代謝, **10**, 933, 1973.
- 49) 堤晴朗: 老化現象とVitamin Eとの相関関係に関する知見補遺(第1報). 日医大誌, **38**, 138, 1971.
- 50) 服部孝雄, 藤井源七郎, 岡田清資, 関口守正, 芦川和壽, 元谷喜久夫: 骨髓移植を併用したマイトマイシン短期大量療法の臨床経験について. 癌の臨床, **6**, 346, 1960.
- 51) Yamamoto, I.: Effect of Nitromin, Mitomycin C and Chromomycin A on the testis and hematopoietic organ in mice and rats. Jap. J. Pharmacol., **10**, 64, 1960.
- 52) 島田信勝: 抗癌剤の副作用. 第16回日本医学会総会会誌, p. 39, 1964.
- 53) 下里幸雄: 放射線治療の病理. 癌の臨床別冊, **22**, 1966.
- 54) 原田輝一: 制癌剤の家庭用末梢白血球数並びに造血臓器に及ぼす影響について. Chemotherapy, **9**, 173, 1961. (受付: 1977年3月31日)

写真説明

写真1, 2 VE過剰群(H群)のMMC注射局所腰部皮膚(投与後15日). 写真1は, 左外側の表皮より右側筋層の1/3まで強い凝固壊死を呈し, 深部筋層との境界は鮮明である. この凝固壊死は, 3群とも投与後3~15日でもほとんど同程度である. HE染色, ×20

写真2は, 凝固壊死におちいった筋層の間質に出現した幼若肉芽織で, 幼若線維芽細胞, 毛細血管, リンパ球, プラズマ球浸潤などが比較的旺盛に認められる(C群ではこの肉芽形成は軽度で, A群では出現せず). HE染色, ×200

写真3 VE正常群(C群)のMMC注射局所皮膚(投与後9日)の辺縁部筋層. 筋組織は強い凝固壊死を呈し, 間質の小動脈(写真中央)は外膜より中膜まで壊死となり, 静脈壁(写真左下)は破綻出血し, 静脈の一部(写真右上)内には血栓形成がみられる. HE染色, ×100

写真4 VE欠乏群(A群)のMMC投与後9日の盲腸. 粘膜は粘膜筋板まですべて剥離し, 粘膜筋板の軽度の肥厚, 粘膜下層のうっ血を伴う強い滲出性炎(薬毒性出血性腸炎)で, 写真上半の粘膜表面に強い出血がみられ, 腸内腔には変性, 剥離した粘膜上皮細胞が充満している. HE染色, ×40

写真5, 6 VE正常群(C群)のMMC投与後9日の盲腸. 写真5は, 既存の粘膜上皮細胞はすべて剥離消失し, 粘膜固有層は中等度の肉芽, 線維化がみられ, 粘膜筋板の萎縮と粘膜下層の激しい滲出性炎を伴い, 強く肥厚している. なお, 腸内腔には変性剥離した上皮組織と赤血球が中等度にみられる. HE染色, ×40

写真6は, 写真5の中拡大, 粘膜固有層表面には, 壊死

物質が薄く付着し, まだ粘膜上皮細胞の再生は認められない. 萎縮した粘膜筋板を基盤に肉芽化と線維化が進行し, その一部に硝子化をみる. また, 炎症性細胞浸潤は中等度である. HE染色, ×100

写真7, 8 VE過剰群(H群)のMMC投与後9日の盲腸. 写真7は, 既存の粘膜上皮細胞は, 再生上皮細胞に全面が置換され, 粘膜固有層の肉芽化も少なく, 粘膜筋板はほぼ正常, 粘膜下層の炎症も軽微で, 腸内腔には食粥を主とし壊死物質と赤血球はほとんど認められない. HE染色, ×100

写真8は, 写真7の強拡大, 粘膜表層に一層の幼若被覆細胞が再生しており, 壊死物質と出血などは認められず, 炎症性細胞浸潤は比較的強い. HE染色, ×200

写真9, 10 VE欠乏群(A群)のMMC投与後15日の盲腸. 写真9は, 粘膜表層の壊死物質はほとんど消失し, 幼若粘膜上皮細胞は1~2層に再生被覆しているが, 一部では, これがさらに変性ないし剥離をみる. 粘膜筋板は萎縮, 一部消失し, 粘膜固有層と粘膜下層に強い滲出性出血性炎がみられ, さらに筋層に波及し, そのために筋層は粗鬆解離している. HE染色, ×40

写真10は, 写真9左側びらん面の中拡大で, 再生幼若細胞先端部の2~3層の肥厚と一部変性をみる. 粘膜固有層には, リンパ球・好酸球・好中球の浸潤が軽度で, 線維芽細胞も少なく, 肉芽形成は軽度である. HE染色, ×200

写真11, 12 VE過剰群(H群)のMMC投与後15日の盲腸. 写真11は, 盲腸粘膜表皮は再生性成熟被覆細胞で, すべて覆れ, 一部には腺上皮細胞の再生も盛んとなり, 固有層の炎症は軽度に鎮静し, 粘膜筋板正常, 粘膜下層には軽度の炎症と中等度の浮腫が残存している. HE染色, ×40

写真12は, 写真11の強拡大, 成熟した被覆上皮のほか, 腺組織の再生が強く, 一部に異型幼若細胞の増生も旺盛である. HE染色, ×100

写真13 VE欠乏群(A群)のMMC投与後7日の回腸末端部. 盲腸のびまん性薬爛出血性炎が回腸末端部に波及し(写真右側の絨毛がまったく消失している), 正常な回腸(写真左側)と比較的鮮明に境され, 腸内容物による侵襲を思わせる根拠のひとつでもある. HE染色, ×20

写真14 VE正常群(C群)7ヵ月飼育時の骨髓(大腿骨). 骨髓性脂肪細胞数, 巨核球(11個)など他の骨髓性細胞などが正常に保たれている. HE染色, ×100

写真15 VE欠乏群(A群)7ヵ月飼育時の骨髓(大腿骨). 脂肪細胞の軽度の増加と各種骨髓性細胞の軽度減少がみられ, VE欠乏性貧血を示す. HE染色, ×100

写真16 VE欠乏群(A群)のMMC投与後9日の骨髓(大腿骨). 各種骨髓性細胞はすべて減し, さらに変性に加え, 脂肪細胞の増加が著明で, 写真15に比し造血機能の強い低下がみられる. HE染色, ×100

写真17 VE正常群(C群)のMMC投与後9日の骨髓(大腿骨). 写真16に比し造血機能の低下は著明でないが, MMC投与前の正常群(写真14)に比し強い造血障害を受け, 巨核球(7個)は減少し, 細胞質変性と核濃縮がみられる. HE染色, ×100

写真18 VE過剰群(H群)のMMC投与後9日の骨髓(大腿骨). 正常群9日(写真17)に比し骨髓性細胞の数とMMC性障害, 脂肪細胞数も少なく, ほぼ正常(写真14)に近いが, 骨髓性細胞の変性と核濃縮がわずかに認められるにすぎない. HE染色, ×100

写真19 VE正常群(C群)のMMC投与後15日の骨髓(大腿骨). 脂肪細胞も少なく, 各種骨髓細胞は正常にほぼ

近添論文付図(1)

近添論文付図(2)

近添論文付図 (3)

近添論文付図(4)

回復した。なお、巨核球では増加傾向 (12 個) にあるが、わずかな萎縮・変性を伴っている。HE 染色, $\times 100$

写真 20, 21 VE 過剰群 (H 群) の MMC 投与後 15 日の骨髓 (大腿骨)。写真 20 は、脂肪細胞は著明に減少して、骨髓性細胞のいちじるしい過形成があり、巨核球 (19 個) は著明に増加している。HE 染色, $\times 100$

写真 21 は、写真 20 の強拡大。巨核球の増数はいちじるしいが、細胞質の軽度変性、核濃縮がわずかに残存し、MMC 性障害の回復像が著明である。HE 染色, $\times 400$

写真 22, 23 VE 欠乏群 (A 群) の MMC 投与後 9 日の精巢上体輸尿管。写真 22 は、内腔に精子流出はほとんどみられず、そのために輸尿管は狭細で、強い造精機能障害を呈する。HE 染色, $\times 40$

写真 23 は、写真 22 の強拡大。輸尿管内にわずかにみられる細胞は、膨化変性した精母・精娘細胞ときわめて少数の無頭精子の流出があり、強い造精機能障害を証明している。HE 染色, $\times 200$

写真 24 VE 過剰群 (H 群) の MMC 投与後 9 日の精巢上体輸尿管。精子の流出がほとんど正常で、VE 欠乏群 (写真 22) に比し顕著な造精機能亢進を示している。HE 染色, $\times 40$

写真 25, 26, 27 VE 欠乏群 (A 群) の MMC 投与後 9 日の肝臓。写真 25 は、肝細胞の中心性萎縮、うっ血、周辺帯の暗細胞化と混濁腫脹がみられ、肝細胞索は狭小化して

いる。HE 染色, $\times 40$

写真 26 は、写真 25 の中拡大。肝細胞の脂肪変性が中間を中心に周辺帯および中心帯にまで多数認められ、核濃縮の著明な暗細胞が周辺帯に索状に連り、中間帯にも個々の肝細胞の暗細胞化がみられる。HE 染色, $\times 100$

写真 27 は、肝細胞の風船細胞化が中間帯にみられ (写真左)、また核濃縮の著明な個々の暗細胞も散見され、脂肪変性も強い。HE 染色, $\times 200$

写真 28, 29 VE 正常群 (C 群) の MMC 投与後 9 日の肝臓。写真 28 は、VE 欠乏群 (写真 25) に比し周辺帯の暗細胞化は軽度で、中心帯の肝細胞の萎縮はなく、周辺帯の混濁腫脹も軽度である。なお、うっ血は認められる。HE 染色, $\times 40$

写真 29 は、写真 28 の強拡大。個々の肝細胞の暗細胞化および脂肪変性が軽度に周辺帯および中間帯にみられる。HE 染色, $\times 200$

写真 30, 31 VE 過剰群 (H 群) の MMC 投与後 9 日の肝臓。うっ血は VE 正常群 (写真 28, 29) と同様に認められるが、周辺帯の暗細胞化および脂肪変性は認められず、障害度はきわめて軽度である。HE 染色, $\times 40, 100$

写真 32 VE 過剰群 (H 群) の MMC 投与後 15 日の肝臓。15 日では肝臓はほぼ正常に回復し、MMC 性障害像はほとんど見受けられない。HE 染色, $\times 40$