精囊撮影の臨床的研究

高橋 厚

日本医科大学泌尿器科学教室 (主任: 川井 博教授)

Clinical studies on seminal vesiculography

Atsushi Takahashi

Department of Urology Nippon Medical School

On this seminal vesiculography, we reformed so that it can be performed easily and simply from a technical viewpoint. Further, the method and conditions for vesiculography were also studied to make a reformation so that clearer X-ray picture be obtained.

Clinically, seminal vesiculography was performed on diseases of accessory genital organs hitherto hardly reported on literature other than prostatic carcinoma and prostatic hypertrophy and results were studies in comparison with the normal control.

Jode natrium solution 80% was selected as the contrast medium and injecting it in doses of 1.1 to 1.2 ml in about one minute time was found appropriate. In injecting the contrast medium, we used a needle of special design and found it effective for preventing injury to the spermatic duct.

Characteristic vesiculogram was obtained for each disease and some cases gave results which showed a significant difference on statistics.

緒言

精囊X線診断法の臨床的意義は高く評価されているにもかかわらず、現在では、なお、下部尿路疾患における vesiculography による診断では、必ずしも諸家の意見は一致しない所が多い。その理由としては、精囊自体の解剖学的、形態的個体差の開きがあり、あるいは下部尿路を中心とした尿路炎症からくる精囊、前立腺の機能的・形態的变化、肥厚、線維化などの影響がX線像に微妙な変化を与えて、X線所見の判読、および診断を複雑にしていることがあげられる。そこで、著者は、従来、実施されている経精管法について、極力、技術的に容易、かつ簡略に外来患者に実施できる方法を再検討し、しかも撮影方法、条件なども検討して、精細鮮明なX線像をえるべく改良を加えた。そして、従来、ほとんどみられていない前立腺癌・肥大症以外の副性器各種疾患にみられる精囊像を、正常者のそれと比較検討し、その成績から、各種副性器疾患における精囊像の病態像の特徴的所見について

知見を報告する。

検査対象および方法

(1) 検査対象

日本医科大学付属第一病院泌尿器科外来、および入院患者から下部尿路・副性器に疾患のない正常者 18

表 1 検討症例一覧

検 討 症 例 名	例 数
正 常	18
前 立 腺 肥 大 症	33
前 立 腺 癌	10
慢 性 前 立 腺 炎	12
前 立 腺 結 石	5
前立腺肥大症術後	8
血 精 液 症	6
男 性 不 妊 症	8
尿 路 感 染 症	12
計	112

Present address : Department of Urology, First Hospital of Nippon Medical School, 3-5-5, Tidabashi Chiyodaku, Tokyo 102, Japan.

名と前立腺を中心とした副性器疾患患者 94 名、計 112 例を検査対象とした。被検者については、いずれも、泌尿器科疾患の有無とその診断に関して、臨床所見、前立腺生検術、または手術などで臨床診断が確定された症例である。その内訳は、正常と思われる症例（対照）18 例、前立腺肥大症 33 例、前立腺癌 10 例、前立腺炎 12 例、前立腺結石 5 例、前立腺肥大術後症例 8 例、血精液症 6 例、男性不妊症 8 例、尿路感染症 12 例である。但し、正常の対照群は、副性器疾患の既往なく、他の泌尿器科疾患をまったく認めない症例を選択し施行した（表 1）。

また、撮影方法に関する検討症例は、上記症例に加えて約 30 例に施行した。

（2）精囊撮影方法

1) 患者の準備

患者に対する前処置として、患者に検査の意義や目的、方法について説明し、理解してもらうことが重要である。次に、患者の全身状態を把握したうえで、造影剤などのショックがないよう配慮する。前処置として、排尿させるか、または導尿により膀胱を空虚にし、陰囊部、および陰茎根部の剃毛をする。次いで、被検者を仰臥位にし、陰茎を腹部に倒し絆創膏で固定し、0.1% マーゾニンにて局所を十分消毒する。

2) 本撮影に必要な手術器具

器具として、尖刃刀 1 本、小コッヘル 3 本、小ペアン 2 本、精管鉤（金子式）、有鉤摂子、無鉤摂子各 1 本、クーパー鉗 1 本、絹糸 1~4 号、麻酔用の注射器 5 ml 用 1 本、注射針 1 本、造影剤注入用針 2 本、80% ヨードナトリウム溶液 1 本、および 1%, ポカイン 5 ml が必要である。

3) 精管露出法

まず、精巣（睾丸）近位で精管を求め、できる限り陰囊皮膚前面、または側面に移動させ、左拇指と示指、および中指とで前後より摘みながら示指を上へ押し上げると、固定された精管が皮膚直下に索状として確認できる。そこで、精管周囲に 1% ノボカイン 2~3 ml にて局所麻酔を行い、尖刃刀で約 5 mm の皮膚切開を加え、ペアンにて創部を拡げ、総鞘膜を切開し精管を露出する。精管鉤にて精管を確保し、精管の下方に絹糸（4 号）を通し固定する。精管に走行している栄養血管をなるべく損傷しないよう気をつけながら、周囲の軟部組織を剝離すると、精管が 2~3 cm 露出される。露出された精管に尖刃先で約 2 mm の縦切開を加え、造影剤注入用の注射針を挿入する。

4) 注入造影剤と注入量について

造影剤として造影力のもっとも良い 80% ヨードナトリウム溶液を使用した。

造影剤の注入量は、精囊に充満し、かつ射精管より溢流しない量を理想とするもので、体重、身長が同程度のものを対象として選び種々の量について施行した。

5) 精囊の X 線撮影

i) 撮影方法：原則として、前後 および 垂直に對し頭位 30° の二方向撮影を行い、射精管陰影ができるだけ明瞭に描出されるよう工夫した。

ii) 撮影条件：患者を撮影台に背臥位とし、前後撮影の場合は、管球をフィルム上 100 cm、焦点を恥骨上 2 横指に定め、管球電圧 68 kV、管球電流 100 mA、露出時間 1 sec にて、ブッキーを使用して撮影する。また、30° 頭位撮影の場合は、管球をフィルム上 120 cm、焦点を恥骨上 3 横指に定め、管球電圧 78 kV、管球電流 200 mA、露出時間 0.5 sec にて、リスフォルムを使用して撮影する。両者とも、フジフィルム KN、増感紙 FS を使用した。

（3）精囊像の計測法、および描出 X 線像の観察項目

1) 精囊撮影像の計測法

i) 射精管像について、射精管の長さ (cm) は、射精管口から精囊移行部までの長さを直線的に測定し、その幅 (mm) は、長さの中間位置にて測定した。両射精管の間隔 (mm) は、左右射精管の中間部で垂直に測定した。

ii) 精囊像に関しては、その大きさをそれぞれ精囊射精管移行部から両葉尖端部までの長さとし、その長さの中間位置にて、その幅を測定した。また、両恥骨上縁を結ぶ線を水平基準とし、両精囊射精管移行部の中間より水平位へ垂直に下した線を垂直基準として分度器を合わせ、左右精囊と水平位との成す角度を測定し、水平型、または V 型の度合を決定した。

iii) 精囊膨大部については、膨大部起始部より膨大部精囊移行部に至る長さ (cm) を測定し、その長さの中間部にて幅 (mm) を測定した。

2) その他の異常所見観察項目

i) 射精管像に関して、変位、欠損の有無、Normal circular folds の有無、および末端部の形態についての観察。

ii) 精囊像に関して、欠損、または萎縮の有無、辺縁の整、不整の状態を観察。

iii) 精管膨大部に関して、狭窄、または嚢状形態の有無、辺縁の整、不整の状態、走行の融合、あるいは解離の有無を観察。

iv) その他、直腸診による前立腺の大きさ、摘出前立腺の重量(g)、性病の既往の有無、前立腺癌症例については、浸潤、転移の有無などと精囊撮影像の関連につき検討した。

以上の計測法により、精囊角度、精囊の大きさ、精管膨大部の長径、横径、膨大部角度、射精管の長さ、幅、射精管間隔を計測し、正常人の上記各計測値の平均値を求めるとともに、年令差による数値の検討を加えた。また、各種下部尿路、副性器疾患の計測値、X線上異常所見について数値の比較、および所見の対比検討を行った。

検査成績

1. 精囊造影法の検討

1) 造影剤注入用針：筋注針(22G 1 $\frac{1}{2}$)の切先部を切断し、断面をヤスリで鈍化したものを使用した。これを使用することで、造影剤注入操作を容易にし、かつ術中、精管腔内の損傷と検査後の副作用を少なくすることができた。

2) 造影剤の選択：造影剤の各種(80% ヨードナトリウム溶液、60% コンレイ、60% ウログラフィン、ピラセトンなど)について検討したが、ピラセトンは油性で造影力は強いが排泄が悪く、60% コンレイや60% ウログラフィンは、造影力が低下し判読しがたく、排泄が速い。これらに対し、80% ヨードナトリウム溶液は、造影力や、精囊内での停滞もよく、満足な像をえることができるため、これを使用した。

3) 造影剤の注入量：注入量には個人差があり、症例により差異を認めるが、一側において1.1~1.2 mlが適量であった。すなわち、1.3 ml以上ならば溢流現象が認められ、読影困難となることがしばしばあり、膀胱洗浄を必要とする。1.0 以下の場合、射精管や精囊の造影力が低下するようである。なお、造影剤の注入速度は、1.1~1.2 mlを約30秒で注入するのが理想的であり、ゆっくり、静かに注入することにより、精囊から射精管まで造影剤が充滿し、かつ溢流現象が防げ、判読しやすい像をえることができた。

4) 撮影方法：従来行われている前後撮影では、射精管像が恥骨像と重って、しばしば不明瞭となる。この場合、頭位撮影を加えることにより、射精管が恥骨の上部に影像され、補助的観察に役立ち、かつ精囊の

各小室、精囊膨大部、および射精管の立体的観察に参考となる。また、造影剤注入後、1分以内で撮影するのが理想であるが、実際には、術者が1人で行う場合が多いので、著者は、1人で全検討例を施行してみた結果、2~3分以内で撮影しうるならば、造影剤の排泄、停滞について問題はなかった。

2. 各種副性器疾患の精囊像の計測

(1) 正常群における検査結果

i) 正常群として検査対照としたものは18例であり、その年令分布は、17~58才で大部分は20才代であった。上述の計測方法により計測された正常人の射精管の長さ、幅、射精管間隔、精囊の水平位との成す角度、精囊の大きさ、精囊膨大部の長さと幅、走行角度などの平均値は表2のごとくである。

なお、正常人の精囊の水平位と成す角度は、30°前後のものが正常と考えられ、大多数が水平型、または多少角度のついた水平型とみてよい。極端なV型を呈するもの、または異常型を呈するものはなかった。精囊像では、小室形成を認め、均等に造影され、辺縁は整、かつ平滑であった。精管膨大部の形態では、とくに異常な形態による融合、または解離が認められず、一定間隔にて隣接した走行を保っていた。膨大部の辺縁は、整、かつ平滑であった(写真1, 2)。

ii) 正常群の精囊角度と年令との関係(表3): 17~58才の年令範囲の18例について、それぞれの精囊

表2 各疾患における計測平均値

疾患	計測項目	精 囊		精管膨大部		射 精 管		
		長さ(mm) (長さ×巾)	角度	長さ(mm) (長さ×巾)	角度	長さ(mm)	巾(mm)	間隔(mm)
止 精	右	3.5×1.3	27.8	5.4×0.5	29.7	1.1	2.1	2.4
	左	3.3×1.3	32.8	4.5×0.4	33.0	1.2	1.8	
前立腺肥大症	右	3.6×1.4	31.5	5.3×0.3	30.9	1.2	2.6	3.0
	左	3.3×1.3	35.2	5.0×0.3	34.8	1.3	2.5	
両立腺腫	右	2.6×1.2	37.2	4.2×0.4	36.0	1.4	3.0	2.1
	左	3.0×1.1	41.0	3.7×0.3	40.5	1.1	2.5	
慢性前立腺炎	右	3.4×1.5	28.3	5.2×0.4	35.8	1.2	2.0	4.0
	左	3.3×1.4	34.2	5.1×0.5	30.4	1.2	1.7	
前立腺結石	右	3.0×1.6	36.0	5.4×0.4	32.0	1.2	1.8	4.1
	左	3.2×1.3	42.0	5.3×0.3	37.0	1.1	1.7	
前立腺肥大症併術	右	3.1×1.4	35.8	4.5×0.4	41.9	1.2	1.7	1.2
	左	2.6×1.3	33.3	4.3×0.3	36.3	1.2	1.7	
血精症	右	3.5×1.6	27.5	5.6×0.4	24.2	1.4	1.6	3.3
	左	3.2×1.5	29.0	5.3×0.4	30.0	1.4	1.6	
男性不妊性	右	3.4×1.5	37.1	6.6×0.4	33.8	1.1	1.0	3.2
	左	3.5×1.5	33.3	5.6×0.4	24.2	1.0	1.5	
尿路感染症	右	3.6×1.6	23.8	5.4×0.4	23.3	1.2	2.0	3.5
	左	3.0×1.5	32.9	5.6×0.4	28.3	1.2	2.0	

角度を分類し検討した結果、石神ら^{1,2)}のいう幼若型とみられるもの1例(28才)、成人型とみられるもの7例、老人型とみられるもの10例であった。

次に、正常群と各疾患群のX線上でえられた測定値を比較検討し、統計的有位差を求めた結果は、次のとおりである。

(2) 前立腺肥大症群について

検討例数は33例で、全例、下部尿路X線撮影と生検術とで肥大症と診断された症例である。その年齢分布は、52～84才(平均72.8才)であった。前立腺摘除標本の重量は、5～53gの範囲であり、また性病の既往のあるもの11例であるが、慢性前立腺炎の所見は認められなかった。

X線所見上、射精管の長さには左右とも有位差はないが、幅には有位差を認め、その拡大を認めた。射精管間隔には有位差がなかった。射精管像の normal circular folds (以下 n. c. f. と略す) が認められるもの28例、まったく認められないもの2例、不明瞭なもの3例であった。射精管の変位を認めるものは2例に過ぎず、その末端部が鈍であるもの14例、細小であるもの19例であった。精管膨大部の長さ、およ

び水平位との成す角度には有位差を認めないが、その幅では左右とも有位差が生じ、その狭小を認めた。精管膨大部では、辺縁不整像を約半数の17例に、また狭小化を14例に認めた。精囊では、萎縮4例、辺縁不整3例、変位2例、左精囊造影不能1例を認めたが、角度や大きさの点では、とくに有位差はなかった(表4～7)。

以上の結果より、前立腺肥大症では、X線上、精囊像には特徴的な所見を認めないが、射精管像では n. c. f. がほとんど正常で、射精管の幅が正常より拡張し、精管膨大部の幅が正常より狭小の傾向にある点が注目される(写真3, 4)。

(3) 前立腺癌群について

検査例数は10例で、年齢分布は64～76才(平均71.2才)である。症例の診断は、直腸診上の硬度、および生検術を施行して確認した。なお、性病の既往は、すべての症例になかった。

表3b) 正常例における精囊角度と年齢との対比
(石神、森の測定法)

症例 No.	年齢 (才)	石神・森の 測定法による角度	精囊年齢角度の分類		
			幼若型 (85以下)	成人型 (85～115)	老人型 (115以上)
1	29	135			○
2	35	140			○
3	28	65			
4	58	90			
5	19	125			○
6	36	130			○
7	19	135			○
8	29	125			○
9	21	115		○	
10	23	105		○	
11	34	145			○
12	26	100		○	
13	18	145			○
14	38	115		○	
15	28	130			○
16	32	105		○	
17	17	140			○
18	22	105		○	
計			1例	7例	10例

表3a) 正常例における精囊角度と年齢との対比(著者の測定法)

症例 (No.)	年齢(才)	精囊の角度	
		右	左
1	29	20	25
2	35	20	20
3	28	55	60
4	58	40	50
5	19	20	35
6	36	20	30
7	19	20	25
8	29	25	30
9	21	35	30
10	23	30	45
11	34	20	15
12	26	35	45
13	18	20	15
14	38	30	35
15	28	25	25
16	32	35	40
17	17	20	20
18	22	30	45
平均	28.44	27.78	32.78

注) (i) 石神・森の測定法は精囊の両葉間を測定したものである。

(ii) ○印は、石神・森による精囊年齢角度の分類に該当する症例を表わす。

X線所見上、射精管像では、変位の認められるものはなく、n. c. f. は全例において消失していた。射精管末端部に関して、その像が細小であるもの6例、鈍であるもの4例であった(表7)。射精管の幅、長さには有位差が生じ、それぞれその幅の拡大、および長さの延長を示す(表4)。精囊像では、萎縮像、および辺縁不整を呈するものが多く、小室の一部膨大、

または欠損、あるいは完全欠損像を認める(表7)。精囊の大きさについて、測定可能な範囲で、有位差が生じ、その縮小を認めた。また、精囊の水平位と成す角度には変動がみられ、有位差を認めた(表6)。精管膨大部では、萎縮、狭小化、辺縁不整、一部狭窄、一部膨大、一部欠損、完全欠損と癌の浸潤程度により、多種多様の所見が認められる(表7)。その長さ

表4 各疾患の射精管計測比較

疾患名	長さ (mm)				巾 (mm)				開 隔 (mm)	
	右	正常との比較	左	正常との比較	右	正常との比較	左	正常との比較		正常との比較
正 常	11.4±0.30		11.7±0.27		2.12±0.85		1.81±0.67		2.36±0.98	
前立腺肥大症	12.4±0.43	n.s	12.5±0.19	n.s	2.58±0.81	P<0.10	2.53±0.92	P<0.01	2.97±1.45	n.s
前立腺癌	13.5±0.26	P<0.10	10.7±0.41	n.s	3.00±2.15	n.s	2.15±0.72	P<0.05	2.38±1.58	n.s
慢性前立腺炎	12.4±0.31	n.s	11.8±0.12	n.s	1.80±0.70	n.s	1.71±0.54	n.s	3.96±2.43	P<0.05
前立腺結石	12.0±0.51	n.s	11.4±0.44	n.s	1.80±0.70	n.s	1.70±0.84	n.s	4.10±2.16	P<0.05
前立腺肥大症	12.0±0.41	n.s	12.2±0.20	n.s	1.70±0.57	n.s	1.70±0.10	n.s	1.22±0.82	P<0.05
血精症	13.8±0.17	P<0.10	14.2±0.19	P<0.10	1.64±0.45	n.s	1.60±0.55	n.s	3.30±1.30	P<0.10
男性不妊症	11.4±0.48	n.s	0.98±0.15	n.s	1.50±0.41	P<0.10	1.50±0.45	n.s	3.17±1.57	n.s
尿路感染症	12.4±0.32	n.s	11.7±0.29	n.s	2.00±0.60	n.s	2.01±0.66	n.s	3.16±2.25	P<0.10

表5 各疾患の精管膨大部計測比較

疾患名	長さ (mm)				巾 (mm)				角 度			
	右	正常との比較	左	正常との比較	右	正常との比較	左	正常との比較	右	正常との比較	左	正常との比較
正 常	5.42±10.9		4.18±0.74		0.17±0.22		0.44±0.15		297.2±152.9		330.6±141.6	
前立腺肥大症	5.33±1.28	n.s	5.01±1.16	n.s	0.31±0.13	P<0.05	0.32±0.13	P<0.01	309.4±130.4	n.s	348.4±188.2	n.s
前立腺癌	4.18±1.56	P<0.05	3.68±1.02	P<0.01	0.36±0.16	n.s	0.27±0.16	P<0.05	360.0±166.3	n.s	405.0±217.9	n.s
慢性前立腺炎	5.16±10.9	n.s	5.09±1.13	n.s	0.13±0.15	n.s	0.29±0.20	n.s	358.3±112.5	n.s	304.2±165.8	n.s
前立腺結石	5.40±0.46	n.s	5.31±0.67	n.s	0.38±0.04	n.s	0.40±0.07	n.s	320.0±152.5	n.s	370.0±144.0	n.s
前立腺肥大症	4.15±1.34	P<0.10	4.30±1.04	n.s	0.44±0.19	n.s	0.29±0.20	P<0.05	418.8±220.3	n.s	362.5±191	n.s
血精症	5.58±0.82	n.s	5.26±0.55	n.s	0.37±0.14	n.s	0.16±0.09	n.s	243.7±128.1	n.s	300.0±162	n.s
男性不妊症	6.04±1.95	P<0.10	5.58±0.92	P<0.10	0.39±0.14	n.s	0.10±0.06	n.s	337.5±241.6	n.s	241.7±146.3	n.s
尿路感染症	5.41±1.37	n.s	5.56±1.37	P<0.10	0.38±0.13	n.s	0.10±0.10	n.s	233.3±123.1	n.s	283.3±123.1	n.s

表6 各疾患の精囊計測比較

疾患名	長さ (mm)				巾 (mm)				角 度			
	右	正常との比較	左	正常との比較	右	正常との比較	左	正常との比較	右	正常との比較	左	正常との比較
正 常	3.49±0.47		3.31±0.51		1.32±0.32		1.31±0.30		277.8±95.8		327.8±126.3	
前立腺肥大症	3.60±0.97	n.s	3.34±0.78	n.s	1.43±0.45	n.s	1.32±0.37	n.s	314.5±120.9	n.s	351.5±181.4	n.s
前立腺癌	2.61±0.93	P<0.01	3.02±0.60	n.s	1.18±0.29	n.s	1.08±0.52	n.s	372.2±114.9	P<0.05	410.0±166.3	n.s
慢性前立腺炎	3.16±0.42	n.s	3.28±0.58	n.s	1.51±0.51	n.s	1.39±0.25	n.s	283.3±137.1	n.s	341.7±162.1	n.s
前立腺結石	3.02±0.56	P<0.10	3.16±0.61	n.s	1.60±0.38	n.s	1.30±0.11	n.s	360.0±138.7	n.s	420.0±103.7	n.s
前立腺肥大症	3.07±0.82	n.s	2.63±0.34	P<0.01	1.10±0.11	n.s	1.25±0.14	n.s	358.3±106.8	P<0.10	333.3±40.8	n.s
血精症	3.52±0.40	n.s	3.23±0.35	n.s	1.62±0.10	P<0.10	1.54±0.27	n.s	275.0±103.7	n.s	290.0±89.4	n.s
男性不妊症	3.40±0.82	n.s	3.47±0.43	n.s	1.17±0.35	n.s	1.53±0.55	n.s	371.4±146.8	P<0.10	333.3±157.1	n.s
尿路感染症	3.60±0.74	n.s	2.98±0.61	n.s	1.59±0.48	P<0.10	1.47±0.35	n.s	237.5±168.0	n.s	329.2±152.9	n.s

には、有位差が生じ、その短縮を認め、幅では、わずかの有位差をもって縮小を認めた(表 5)。

前立腺癌では、射精管像における n. c. f. の消失など、精囊像における辺縁不整、萎縮、欠損など、精管膨大部における辺縁不整、狭小化が特徴といえる。しかし、癌の進行度により、その程度がいろいろであるのも特徴的である(写真 5, 6)。

(4) 慢性前立腺炎群について

検査例数は 12 例で、その年齢分布は、21~73 才

(平均 41.9 才)である。前立腺炎の診断としては、尿所見、直腸診、前立腺分泌物の検鏡所見、および尿道撮影による膀胱頸部所見から診断された症例である。なお、全例に性病の既往を認めた。

射精管像の所見として、n. c. f. の消失が全例に認められ、いずれにも変位なく、末端部の細小であるものの 10 例、鈍であるもの 2 例であった(表 7)。長さや幅の上では、とくに有位差はないが、射精管間隔において、有位差が生じ、その増大を認めた(表 4)。

表 7 a) 射精管 X 線像病変頻度

病 変 別	病 変 部 位	病 変 部 位	病 変 部 位	病 変 部 位	病 変 部 位	病 変 部 位	病 変 部 位	病 変 部 位	病 変 部 位
精 管 膨 大 部	出 口	* 19 (31.0%)	* 2 (3.3%)	有 位 差	有 位 差	有 位 差	有 位 差	* 1 (1.7%)	有 位 差
	精 管	有 位 差	* 6 (10.0%)	有 位 差	有 位 差	有 位 差	有 位 差	* 6 (10.0%)	有 位 差
	精 管	有 位 差	有 位 差	* 6 (10.0%)	* 2 (3.3%)	* 1 (1.7%)	有 位 差	有 位 差	有 位 差
	精 管	2.33	* 10 (16.7%)	* 3 (5.0%)	2.5	* 5 (8.3%)	1.6	1.8	2.12
	精 管	2.833	0.40	0.12	3.5	0.6	5.6	7.8	10.12
	精 管	3.33	0.10	0.12	0.5	2.8	0.6	0.78	0.12
	精 管	1.33	1.10	2.12	2.5	1.8	0.6	0.8	2.12
精 管 間 隔	精 管	10.33	6.10	10.12	1.5	1.8	6.6	8.8	10.12
	精 管	* 0.33	* 2.10	0.1	0.5	* 1.8 (3.0%)	1.6	* 2.8 (4.7%)	0.12
平 均 (12)		2.33	0.10	0.12	0.5	1.8	0.6	1.8	

注 * 印は 1 例未満を示す。

表 7 b) 精管膨大部 X 線像病変頻度

病 変 別	病 変 部 位	病 変 部 位	病 変 部 位	病 変 部 位	病 変 部 位	病 変 部 位	病 変 部 位	病 変 部 位	病 変 部 位
精 管 膨 大 部	辺 縁 不 整	* 17 (33.3%)	* 9 (16.7%)	* 11 (21.2%)	* 5 (9.5%)	* 8 (15.4%)	* 4 (7.7%)	4.8	3.12
	萎 縮	* 14 (33.3%)	* 5 (10.0%)	* 11 (21.2%)	0.5	* 8 (15.4%)	0.6	0.8	2.12
	精 管	0.33	1.10	0.12	0.5	* 8 (15.4%)	0.6	0.8	0.12
	精 管	0.33	* 3 (10.0%)	0.12	0.5	0.6	1.6	* 2.8 (5.6%)	0.12
	精 管	0.33	2.10	0.12	0.5	* 8 (15.4%)	0.6	0.8	0.12
	精 管	1.33	0.10	1.12	2.5	2.8	2.6	0.8	0.12
	精 管								

注 * 印は 1 例未満を示す。

表 7 c) 精囊 X 線像病変頻度

病 変 別	病 変 部 位	病 変 部 位	病 変 部 位	病 変 部 位	病 変 部 位	病 変 部 位	病 変 部 位	病 変 部 位	病 変 部 位
精 囊	辺 縁 不 整	3.33	* 9 (10.0%)	* 9 (10.0%)	2.5	* 8 (8.0%)	* 3 (3.0%)	* 4 (4.0%)	3.12
	萎 縮	4.33	* 6 (6.0%)	* 7 (7.0%)	2.5	* 8 (8.0%)	0.6	2.8	3.12
	精 管	0.33	* 1 (1.0%)	0.12	0.5	2.8 (2.8%)	1.6	* 2.8 (2.8%)	0.12
	精 管	2.33	1.10	0.12	0.5	0.8	0.6	0.8	0.12
	精 管	1.33	1.10	0.12	3.5	3.8	5.6	3.8	9.12
	精 管	1.33	* 5 (5.0%)	0.12	2.5	1.8 (1.8%)	0.6	1.8 (1.8%)	3.12
	精 管								

注 * 印は 1 例未満を示す。

精囊像では、萎縮 7 例、辺縁不整 9 例、嚢状化 1 例あるが、形態、大きさの上では、とくに有位差はない。精管膨大部像では、狭小 11 例、嚢状 3 例、辺縁不整 11 例で、これは性病性尿道炎の既往と大体一致する(表 7)。しかし、計測上では、とくに有位差は認められなかった(表 5)。

慢性前立腺炎群における所見としては、射精管の間隔がわずかに広がり、n. c. f. の消失もみられ、精囊、精管膨大部の萎縮、辺縁不整、狭小化などが高頻度に見られるのが特徴で、癌の所見と似ているといえる(写真 7)。

(5) 前立腺結石群について

検査対象例は 5 例で、年齢分布は、38~65 才(平均 52.2 才)である。主訴は、排尿困難、血精液症、排尿痛などである。直腸診上、前立腺は、正常大、または小鶏卵大、硬で、結節ないし結石の感触を認めた。なお、3 例に性病の既往があった。

射精管像では、n. c. f. の有するもの 3 例、消失しているもの 2 例で、いずれにも変位なく、その末端部が細小であるもの 3 例、鈍であるもの 2 例であった(表 7)。長さや幅では、正常群と較べて有位差を認めないが、射精管間隔にわずかの有位差をもって、その拡大を認めた(表 4)。精囊像では、辺縁不整、萎縮、小室拡大などの所見がみられた(表 7)。また、その大きさで、右葉にのみ有位差がみられ、小さいという結果をえた(表 6)。精囊の角度には、とくに有位差はなく、精管膨大部像では、全例に軽度の辺縁不整を認めたが、狭小、嚢状化はなかった(表 7)。この辺縁不整像は、結石の存在による二次炎症性変化の所見と考えられる。しかし、計測上では、とくに有位差は認められなかった。

前立腺結石群は、精管膨大部・精囊像の上で、慢性前立腺炎群と類似の所見を呈すると考えられる(写真 8)。

(6) 前立腺肥大症術後群について

検査症例は 8 例で、年齢分布は 60~79 才の範囲である。手術方法は、恥骨後式 6 例、恥骨上式 2 例であり、手術により摘出した腺腫の重量は、4~48 g の範囲であった。

X線所見では、射精管像の消失、または不明が 3 例あり、射精管像の明確であるものでも、n. c. f. はすべて消失していた。計測上、射精管像の長さ、および幅には変化をみないが、射精管間隔において、その狭小に有位差を認めた(表 4, 7)。精囊像は、全体に

萎縮著明で、一部欠損像もみられる。とくに左葉が正常と比較し小さく、有位差を認めた。その角度では、右葉に有位差が生じ、わずかに大きい結果をえた(表 6, 7)。精管膨大部像では、種々の変化をきたし、狭小、一部膨大、狭窄、または不整像が全例に認められた(表 7)。その長さは右側にのみ有位差が認められ、短かく、その幅は、狭く、有位差を認めた(表 5)。

前立腺肥大症術後の精囊所見は、腺腫摘出時に、前立腺床や膀胱頸部に加えられた手術的操作により、射精管・精囊の欠損、萎縮、狭窄などの変化が強くみられるのが特徴的である(写真 9, 10)。

(7) 血精液症群について

検査症例は 6 例で、年齢分布は 22~49 才(平均 38.6 才)である。主訴は血精液症で、直腸診上、前立腺はすべて正常であり、3 例に性病の既往があった。

X線所見では、射精管像において、6 例中 1 例に n. c. f. の消失を認め、全例に変位なく、すべての症例の末端部が細小であった(表 7)。射精管の長さでは、左右とも正常群より長く、有位差を認めた。また、射精管間隔でも、正常群より幾分広く、有位差を認めた(表 4)。精囊像では、3 例に一部不整を認め(表 7)、その大きさで、右葉の幅において有位差を認め、広く、それ以外、特別な差はみられなかった(表 6)。精管膨大部像では、4 例に辺縁不整像を認めるが、嚢状、狭小はなく、計測上、とくに有位差は認められなかった(表 5, 7)。

血精液症は、X線上、とくに強い変化はみないが、射精管の長さの延長と精囊、および精管膨大部の辺縁不整所見が注目される(写真 11)。

(8) 男性不妊症群について

検査症例は 8 例で、年齢分布は 24~36 才の範囲である。主訴は不妊で、直腸診上、前立腺は正常、性病の既往を有するものは 3 例であった。

X線所見上、まず特異的なことに、8 例中 2 例に左側精管膨大部、精囊、および射精管の欠損という奇形を伴っていた。射精管像では、n. c. f. が 7 例に保存されており、1 例に消失を認めた。また、1 例に変位を認め、末端部は全例とも細小であった(表 7)。射精管の長さには異常なく、幅はわずかに狭く有位差を認めた(表 4)。精囊像では、辺縁不整 4 例、萎縮 2 例が認められる。しかし、その大きさに有位差はなかった。精囊の角度では、右葉に有位差を認め、正常に較

べ、わずかに大きく (表 6, 7), 精管膨大部像では、4 例に辺縁不整を認められるが、嚢状、狭小は認められなかった (表 7)。その長さでは、左右とも有位差が生じ、その延長を認めるが、その角度については、左右とも差はなかった (表 5)。

この群は、男性不妊という訴えの症例であり、精囊撮影による診断的価値は高く、形態上、精囊・精管膨大部などの偏側欠損の奇形、または精囊の著明な發育不全、および射精管幅の狭小、末端部の細小などが特徴といえる (写真 12)。

(9) 尿路感染症群について

腎および膀胱に感染を認める症例 12 例で、年齢分布は 21~70 才にわたる。感染の基礎疾患としては、尿路結石、尿路腫瘍、神経因性排尿障害が主なものである。なお、性病の既往のあるものは 2 例であった。

X線所見では、射精管像において、n. c. f. の消失を 2 例に認め、末端部は細小 10 例、鈍 2 例であり (表 7)、長さや幅に特徴はないが、射精管間隔において有位差があり、その増大を認めた (表 4)。精囊像では、萎縮 3 例、辺縁不整 3 例を認め (表 7)、大きさの上で、右葉の幅に有位差を認めた (表 6)。精管膨大部像では、狭小 2 例、辺縁不整 3 例であり (表 7)、その長さでは、左側に有位差を認めた (表 5)。

この群は、正常症例群と比較検討して、とくに強調される異常所見はない。

考案

著者は、経精管法による精囊撮影法を施行するに当って、Belfield^{3,4)}の原法の撮影手技、撮影条件などに改良を加えるとともに、精囊像について正常例と下部尿路各種疾患別の精囊像病的变化を比較観察し、各計測値を統計的に処理し、比較検討した。

1. 精囊撮影法の改良点

精囊撮影 (経精管的撮影法) におけるその方法について、精管露出法は、各人各様で、とくに問題はないと思うが、精管に挿入する針について、著者は、精管に約 2 mm の縦切開を加え、筋注針 (22 G 1¹/₂) の尖端部を切断し、断面をヤスリで鈍化したものを使用して、精管の損傷による術後閉塞発生の防止を行った。今日まで報告された文献には、これらの点について工夫を試みた報告が見当たらない。

造影剤について、久保ら⁵⁾は、70% エンドグラフィンを 1.0~1.5 ml、森⁶⁾は 2.0~3.0 ml 宛注入し、

Vestby^{7,8)} は 2.0 ml、Fetter ら⁹⁾ は 1.5~2.0 ml を使用し、それ以上の量では、射精管から造影剤が漏出して尿道・膀胱へ溢流し、射精管の像を見苦しくすると述べている。著者は、造影力が良く、精囊、その他にある時間停滞し、満足される像をえることのできる造影剤として、80% ヨードナトリウム溶液を選択した。注入量は 1.1~1.2 ml が適量であることを予備検査で確認した。また、注入量については、本邦においても、久保らの 1.0~1.5 ml、森の 2.0~3.0 ml と幅があり、欧米の Vestby^{7,8)} や Fetter ら⁹⁾ の注入量についても、適量に関して定められていない。これは、精囊・射精管の容量による差異と考えられるが、本邦成人では、必要にして十分な量として、著者は、1.1~1.2 ml が妥当であるという結果をえた。

著者が、本撮影法として、前後像と頭位 30° の二方向撮影を施行した理由は、前後像では、射精管像が恥骨と重って、しばしば、不鮮明像となることがあり、この場合、頭位像にて補助的観察が可能となり、かつ精囊の各小室、精管膨大部、および射精管の立体的観察に有効な撮影手段と考えるからである。

2. 正常精囊像の観察

撮影所見に関する結果についてみると、まず正常群の 18 例について、本邦人の精囊の基本的計測値を検討した。その結果、射精管の長さは、平均右 1.1 cm、左 1.2 cm であった。射精管の幅は、平均 2.4 mm、精囊の水平線と成す角度は、30° 前後のものが正常と考えられ、大多数のものが、水平型、または多少、角度のついた水平型とみてよい。しかし、石神¹⁰⁾は精囊 X線像をその發育過程にもとづいて、主管、憩室の大小から四型に分類した。I 型は、健康成人型で、IV 型は、単純な主管のみで、憩室の發育が乏しく幼若型とし、II~III 型は、前二者の移行型で、精囊が顕著な發育をとげる思春期の初期、および中期にみられる形態であり、正常成人の精囊は、大部分が I 型を呈している。また、両側精囊の主軸と成す角度は、思春期前までは狭く鋭角を示すが、加齢とともに、漸次、拡大し、老年期になると、大部分の症例は水平位をとり、これを精囊の年令角度と表現した。この年令角度を幼若型、成人型、老人型に分類し、それぞれ出生年令との比較を行っている。

著者は、正常例 18 例の精囊角度を石神・森²⁾の測定法に換算し、幼若型、成人型、老人型に分類してみた。幼若型とみられるものは 7 例で 20~50 才代の

年令分布であった。しかし、老人型とみなされるものが10例で、10~40才代の年令分布に認められる結果となった(表3-b)。以上の成績から、精囊の發育過程にもとづいて年令角度を分類することは適当でないと思われたので、著者は精囊角度の正常値を17~58才の正常例より平均値を求め、30°から水平位を正常と考えている(表3-a)。60才以上の症例(前立腺肥大症など)でも、精囊の角度は、平均して水平位より30°以上の結果をえたので、石神ら²⁾の計測値とは異なり、今後検討を要する課題である。

正常成人の射精管の幅について、著者の測定平均は、左右に多少の差はあるが、1.8~2.1mmの範囲であった。

次に精管膨大部について、計測値による平均値を出した結果、右5.4×0.5cm、左4.9×0.4cmと平均した長さ、および幅をもっていた。走行の平均角度は、右30°、左33°で、とくに異常な形態による融合、または解離は認められず、一定間隔にて隣接した走行を保っており、膨大部の辺縁は、整、かつ平滑であった。

上記のごとく、著者は正常(対照)を計測による平均値と精囊・射精管の形態的变化の二面より表現した。

3. 前立腺肥大症における観察

前立腺肥大症における精囊撮影所見については、従来、肥大腺腫による射精管像に関して、その長さ、幅などについて述べられているが、必ずしも意見は一致していない(Vestbyは、その長さの延長と幅の拡張、百瀬ら¹¹⁾、および長谷川ら¹²⁾は、長さの短縮と幅の拡張、久保ら⁵⁾は、幅の拡張のみは認めるものの、長さについては特徴なしとするものなど)。著者の扱った症例では、射精管の幅が正常より拡張しているが、長さに延長がみられず、久保らの意見と一致した。しかし、長さに関しては、その正常値の基準のおき方に問題があるようである。精管膨大部の幅は、正常より狭小の傾向がみられた。射精管の幅に拡張をきたす原因として、Vestbyは次の二因子をあげている。その一つは、初期の前立腺肥大症は、側葉に多く、前立腺部尿道が両側方より圧迫され、精阜の変形をきたし、射精管通過障害の原因を成すこと。他の一つは、後部尿道と膀胱頸部に通過障害のある例では、膀胱三角部筋に肥厚が生じ、この筋繊維の緊張により、膀胱、および尿道の表面を下方に牽引し、射精管の開口部周囲を

押し曲げるため、二次的に拡張が起こるものであると述べている。久保らも、前立腺腺腫の増大によって、尿道と前立腺との間に位置的なずれが生じることは十分考えてよいと述べているように、このような変化は、当然の結果として射精管末端部の走行に影響を与えるであろう。前立腺肥大症における射精管の幅の拡張、n. c. f. の存在については、諸家^{5,7-9,12)}の意見と一致する。射精管の辺縁像は、全例において平滑であり、Vestbyのいうnormal circular foldsの認められないものではなく、前立腺癌との鑑別診断上、注目すべき所見と思われる。しかし、前立腺肥大症の患者の場合は、形態上、個人差があり、さらに前立腺炎や尿道炎の既往による炎症性変化を合併するものがあるため、それらを考慮して判読診断するよう注意しなければならない。

4. 前立腺癌の精囊像

前立腺癌の精囊撮影像に関しては、意見の多いところであるが、前立腺癌の大部分は、本来の前立腺組織である外腺より発生し、とくにその原発巣で95%は周辺部、すなわち前立腺後面、あるいは後側面の被膜下に始まり、射精管に沿って周囲に浸潤増生を示すので、初期癌(stage II)においては、射精管像の変形、一部欠損、n. c. f. の消失など(Boreau¹³⁾、Vestby^{7,8)}、長谷川)を示すことが多く、癌の進行とともに、精囊の非対称性(Wilhelm¹⁴⁾、精囊の充満欠損(Puiguer¹⁵⁾)、レリーフ像の出現(Heise¹⁶⁾)などの所見があげられている。

著者の症例でも、癌の發育浸潤の程度によって、多種多様の所見が認められた。すなわち、stage II以上の癌では、射精管末端部像の狭小化や一部欠損、また全例にn. c. f. の消失がみられ、精囊の縮小、精管膨大部の変化などが特徴といえる。しかし、早期癌、例えば、潜在癌やstage Iの癌では、著者の経験では、射精管の変化や精囊の病変を認めることが少なく、むしろstage II以上の癌において診断的意義が高い所見をえた。

5. 慢性前立腺炎、前立腺結石における観察

慢性前立腺炎における場合は、従来、文獻的にこの問題に触れられたものはきわめて少ない。著者の12例では、X線写真上、射精管間隔の拡大が認められるが、末端部の変化はきわめて少ない。精囊の萎縮、辺

縁不整像をみる以外、特別の所見は認められなかった。Vestby^{7,8)}, Mc Carthy¹⁷⁾, Romanus¹⁸⁾も、慢性前立腺炎の精囊撮影像でもっとも多くみられる所見は、射精管の間隔に軽度の変化が生じ、前立腺炎の炎症が精囊へ波及すると精囊壁の変化が著明となるとしている。著者の例でも、診断は前立腺炎であるが、精囊の萎縮、辺縁不整像は、精囊炎の存在を疑わせるものである。

前立腺結石の場合は、慢性前立腺炎のX線所見と類似した所見がみられた。これは、結石自体は腺腔内の小結石であり、結石が異物として存在することにより、当然、炎症性変化が生じ、その結果、X線所見に前立腺炎の所見とほぼ同様の所見がえられたと考える。

6. 前立腺肥大症術後の観察

前立腺肥大症術後の精囊X線像については、手術方法による差異というより、尿道粘膜下腺より発生した腺腫を摘出した結果、腺腫下に接する精囊、精丘に開口する射精管などに形態上変化をきたしたことになる。肥大腺腫の摘出では、外尿道括約筋に近接する精丘に対して手術操作を加えないが、精丘に接する前立腺尿道部は、腺腫とともに摘出されることもあるので、著者の症例では、8例中3例に射精管の消失を認めた。しかし、これらの症例では、術後、臨床的に異常はなかった。しかし、精囊像より理解されることは、手術操作を加えた結果、精囊像の形態的变化が起こることが示されており、前立腺腺腫術後、臨床的に頻尿が残る症例があり、その原因を術後の精囊の変化にあるとしている人もあるが、この点は、今後の検討課題と考えられる。

7. 血精液症における観察

血精液症の場合は、精囊X線上、特異的な所見を見出すことは困難であった。これは、血精液症の原因が精囊の軽い炎症によることが多く、また出血の部位が不明なことがしばしばある。著者も、射精管の長さの延長と精囊、および精管膨大部の辺縁不整を認めたに止まった。この点より、血精液症には、特徴的な所見はえられなかった。

8. 男性不妊症、その他における観察

男性不妊症の場合は、精囊自体が内分泌機能を鋭敏

に反映するもので、その形態的变化は、男性不妊症の内分泌的障害の有無を知るために精囊撮影の必要性は高いといえる。また、奇形の発見のため、欠くべからざる検査法であることはいうまでもない。著者の8例中2例に奇形が存在し、精囊の發育不全などの発見には欠かせない検査方法であることを強調したい。

尿路感染症群の場合は、前項で触れたごとく、直接、精囊に影響を与える因子がなかったためか、精囊撮影による特異的な変化は認めなかった。

結論

著者は健康成人30例について、精囊撮影方法の改良について検討するとともに、下部尿路、副性器疾患患者82名に精囊撮影を施行し、次の結果をえた。

1) 精囊撮影に使用する造影剤注入針は、先端を鈍円化した22G¹⁾針が精管損傷防止に有効である。

2) 注入造影剤は、80%ヨードナトリウム溶液1.1~1.2mlを1分前後の速さで注入すると鮮明な影像がえられる。

3) 膀胱を空虚にして、前後撮影と頭位30°にて撮影し、後者は、影像判読の補助手段に有効である。

4) 日本人正常成人の精囊撮影像では、平均値として、射精管の長さは、右1.1cm、左1.2cm、幅は、右2.1mm、左1.8mm、間隔は2.4mm、精囊の水平線と成す角度は、30°前後のものが正常と考えられた。精囊の大きさは、平均、右3.5×1.3cm、左3.3×1.3cmで、小室形成を認め、辺縁は整、かつ平滑である。精管膨大部の長さとは幅は、右5.4×0.5cm、左4.9×0.4cm、走行の平均角度は30°前後、膨大部の辺縁は整、かつ平滑であった。

5) 前立腺肥大症群では、射精管において幅の拡張とn. c. f.の保存、精管膨大部において、幅の狭小と辺縁不整を認めた。

6) 前立腺癌群では、射精管のn. c. f.が消失し、幅の拡張、長さの延長、一部欠損などが特徴所見である。精囊は、萎縮、辺縁不整、一部狭窄、一部膨大、一部欠損、完全欠損と癌の浸潤程度により多種多様である。

7) 慢性前立腺炎群では、射精管像の所見として、n. c. f.の消失、射精管間隔の増大がみられ、精囊の萎縮、辺縁不整、精管膨大部では、狭小、辺縁不整像が認められた。

8) 前立腺結石群では、慢性前立腺炎群と類似した所見が認められた。

9) 前立腺肥大術後群では、射精管像の不明、または消失、n. c. f. の消失、射精管間隔の狭小化が特徴的である。精嚢は、辺縁不整、萎縮著明、精管膨大部は、辺縁不整、狭小、一部膨大、萎縮などを認めた。

10) 血精液症群では、射精管の延長、精嚢、および膨大部の辺縁不整像が認められるものの、本症に特異的な所見は認められない。

11) 男性不妊症群では、少数例の検索ではあるが、不妊症に合併しやすい精嚢の奇形の発見には欠かすことのできない検査法である。事実、8例中2例に偏側の精管膨大部、精嚢、射精管の欠損という奇形を認めた。

12) 尿路感染症群では、特異的な所見は認められない。

稿を終るにあたり、ご懇篤なご指導、ならびにご校閲を賜りました恩師、川井博教授に深甚なる謝意を表するとともに、泌尿器科学教室の陳洋水助教授、中村義三講師ならびに諸学兄各位のご協力を心から感謝いたします。

本論文の要旨は、第59回、および第60回日本泌尿器科学会総会、第35回日本泌尿器科学会東部連合地方会、ならびに第38回日本医科大学医学会総会において発表した。

文献

- 1) 石神襄次、安原稔、森昭：男子不妊症における精嚢腺X線像及び嚢丸組織像について。日泌会誌，**47**，756，1956。
- 2) 石神襄次、森昭：男子性機能障害者の精嚢腺像について。日泌会誌，**48**，432，1957。
- 3) Belfield, W.T. : Vasotomy-radiography of seminal ducts. Surg. Gynecol. Obstet., **18**, 569, 1913.
- 4) Belfield, W.T. : Vasotomy; radiography of seminal ducts. J. Am. Med. Ass., **61**, 1867~1869, 1913.
- 5) 久保隆、渡辺決、加藤弘彰、加藤哲郎：前立腺疾患の

精管精嚢腺射精管造影像に対する検討。日泌会誌，**35**，1062~1070，1964。

- 6) 森昭：男子性腺機能失調症の研究。第1編。精嚢腺X線像の考察。泌紀，**3**，543~554，1957。
- 7) Vestby, G.W. : Vasoseminal vesiculography in hypertrophy and carcinoma of the prostate. Acta Radiol., **50**, 273~284, 1958.
- 8) Vestby, G.W. : Vasoseminal vesiculography in hypertrophy and carcinoma of the prostate with special reference to the ejaculatory ducts. p. 2~3, Oslo Univ. Press, 1960.
- 9) Fetter, T.R., Yunen, J.R., Greening, R.R., and Benjamin, A. : Seminal vesiculography; diagnostic aid in prostatic carcinoma. J. Urol., **87**, 718~725, 1962.
- 10) 石神襄次：精嚢腺線診断の意義。臨泌，**28**，13~21，1974。
- 11) 百瀬剛一、片山喬、遠藤博志、山口崇夫、深谷邦男：前立腺疾患における精嚢線像について。日泌会誌，**54**，451，1963。
- 12) 長谷川真常、柳瀬功一、稲葉穂、松浦一：前立腺腫瘍における精嚢X線撮影所見、特に射精管像について。日泌会誌，**55**，915~927，1964。
- 13) Boreau, J. : Epididymography. J. Urol., Paris, **58**，416~423，1953。
- 14) Wilhelm, S.F. : Vaso-seminal vesiculography clinical and experimental application. J. Urol., **41**，751~757，1939。
- 15) Puigvert A. : 長谷川真常ら，日泌会誌，**55**，915~927，1964より引用。
- 16) Heise, G.W., and Kullessa, A. : Mitteilung über eine verbesserte Röntgendiagnostik der Samenblasenkrankungen. Z. Schr. Urol., **48**，295~315，1955。
- 17) Mc Carthy, J.F. : Anatomical and histological study of the verumontanum with special reference to the ejaculatory ducts. J. Urol., **17**，1~16，1927。
- 18) Romanus, R. : The prostate and seminal vesicles as focus of infection. Nord. Med., **48**，1503，1952。

(受付：1978年6月12日)

高橋論文付図(1)

写真1 正常例(垂直撮影)

写真2 正常例(頭位30°撮影)

写真3 前立腺肥大症例：垂直撮影で精管・精嚢像は、ほぼ対称的であることは判るが、射精管像が恥骨と重なり、読影を妨げている。

写真4 前立腺肥大症例：頭位30°撮影で垂直撮影と比較し射精管が読影し易い。射精管の幅の拡張、n.c.f.の保存、精嚢嚢大部の不整像が特徴的である。

高橋論文付図(2)

写真5 前立腺癌例：垂直撮影で右精管膨大部の一部狭窄とそれに伴う膨大化，右精囊および右射精管の完全欠損，左精管膨大部の狭小化，左精囊の萎縮，一部欠損，一部膨大化と左射精管の延長を示す。

写真6 前立腺癌例：頭位30°撮影で右精管膨大部の一部に狭窄が著明で，そのため膨大部より造影剤の溢流を示す。写真5,6は膀胱気体造影を併用し，コントラストをつけてみたもの。

高橋論文付図(3)

写真7 慢性前立腺炎例：垂直撮影で精管腫大部および精囊の辺縁不整像，精囊の一部嚢状化や射精管間隔の増大を示す。

写真8 前立腺結石例：垂直撮影で恥骨結合部に小結石陰影と右射精管の変位および射精管間隔の増大を示す。

写真9 前立腺肥大症術後例(a)：垂直撮影で手術は恥骨下式に施行。腺腫の剝離が円滑で、摘出後出血も多くなく、止血結紮も少くすんだためか全体的に術前に近い像を示す。恥骨結合部の陰影は摘出後の空洞を示す。

写真10 前立腺肥大症術後例(b)：垂直撮影で手術は恥骨下式に施行。腺腫は円滑に剝離されず、摘出後、出血多く、止血結紮を多く施行。そのためか全体的に萎縮、辺縁不整像を示す。射精管像は不明、全体的に萎縮をきたしたため膀胱へ造影剤の逆流を認めた。

高橋論文付図(4)

写真11 血精液症例：垂直撮影で射精管の延長，および精管膨大部，精囊，射精管のそれぞれ一部に辺縁不整像を認める。

写真12 男性不妊症例：頭位30°撮影で左精管膨大部より先の陰影欠損，すなわち左精囊，および左射精管の完全欠損を示す。