— 原 著 —

レンサ球菌細胞壁より抽出した peptidoglycan の 毛細血管透過性亢進作用に関する検討

太田 みどり

日本医科大学微生物学免疫学教室 (主任: 木村義民教授)

Studies on the increased capillary permeability by the intracutaneous
administration of peptidoglycan fraction extracted
from group A streptococcal cell walls

Midori Ohta

Department of Microbiology and Immunology, Nippon Medical School

The increased capillary permeability in the skin of the guinea pig and the rat was investigated by using peptidoglycan (PG) fraction extracted from cell walls of group A *Streptococci*.

The following results were obtained:

1) The pattern of the reaction in the increased capillary permeability consists of two phases: the leakage of the dye which appeared immediately after the intracutaneous injection of PG fraction in the first phase, and vasculitis observed in the second phase.

2) From the microscopic examination in the first phase, edema was observed in the extravascular spaces of the dermis and subcutaneous tissues; in the second phase, degeneration of the vascular wall and a remarkable number of polymorphonuclear leukocytes and monocytes in the extravascular spaces were observed.

3) From the electromicroscopic examination in the first phase, swelling and vacuolation of the endothelial cells and the appearance of mast cell-like cells in the extravascular space were observed; in the second phase, cytolysis and necrosis of endothelial cells were observed and the basement membrane was irregularly thick and disintegrated into many fragments.

4) By pretreatment of an anti-histamine or anti-serotonin drug, the inhibitory effect against the increased capillary permeability in the first phase was observed. The inhibitory effect against the leakage of dye in the second phase was observed not only by the pretreatment of steroid hormone but also by the anti-histamine or anti-serotonin drug.

These results suggest that increased activity of capillary permeability by PG fraction may play an important role in inducing an initial change of tissue injury by streptococcal cell walls.

Key words: streptococcal cell wall, peptidoglycan, increased capillary permeability, guinea pig and rat

緒言

一般に、細菌細胞の剛直性に関与する細菌細胞壁ペプチドグリカン (以下 PG と略す) は、多彩な生物学的ないしは免疫学的活性を有し、感染の成立、病変の発現ないしは免疫学的応答性の上で直接あるいは間

接にこれが関与しているものと想定される。

すでに明らかにされているように、PG はそれ自身抗原性を有する¹⁻⁴⁾ばかりでなく、抗体産生ならびに細胞性免疫成立の際にアジュバント活性を発揮し^{5,6)}、またリンパ球に対しマイトーゲン活性を持ち⁷⁾、マクロファージに対してもこれを活性化し⁸⁾、食食能の亢進、抗腫瘍活性を発揮させる⁹⁾。さらに PG 投与により、細菌感染に対し非特異的抵抗性を賦与することなども明らかにされている¹⁰⁾。

Present address: Department of Dermatology, Tokyo Teishin Hospital, 2-14-23, Fuzimi, Chiyoda-ku, Tokyo, 102 Japan

一方、本物質は発熱原性を持ち^{11,12)}、これを生体に投与することにより様々な病変を惹起する。特に PG とその菌体成分との複合体を投与することにより、マウス心臓にリウマチ性心炎を¹³⁻¹⁵⁾、ウサギ、ラットにリウマチ様関節炎を¹⁶⁾、またウサギ皮膚に慢性の再発性多結節性病変を生起せしめることが報告されている¹⁷⁻¹⁹⁾。

われわれは細菌感染における PG の意義を明らかにする目的をもって、すでにレンサ球菌細胞壁 PG の持つ毛細血管透過性亢進作用につき報告したが²⁰⁾、本稿ではその機構を主に病理組織学的に検討し、併せてこの透過性亢進作用に関与する mediator に対する各種薬剤を使用しての抑制実験から若干の検討を試みたので報告する。

実験材料および方法

(1) 使用動物

日本生物材料センター（東京）から購入した体重 250~300 g の Hartley 系モルモット（雄）ならびに Wister 系ラット（雌）を使用した。

(2) 細菌細胞壁 PG の抽出

予研永瀬博士より分与された A 群レンサ球菌 3 型 (B 930/24/3 株) を Todd-Hewitt broth (Difco) で 37°C, 20 時間培養遠心し菌体を集め、pH 7.2 の 1/15 M 磷酸緩衝食塩水（以下 PBS と略す）で十分に洗浄後、Bleiweis らの方法²¹⁾に準拠し、Braun の cell homogenizer (Model MSK) を用いて細胞壁画分をえた。本画分はさらに per ml 500 µg の pronase (Calbiochem-Behring Co.), per ml 100 µg の DNase (Miles Lab.) ならびに per ml 100 µg の RNase (Miles Lab.) で処理後、Krause らの方法²²⁾に従い Fuller の hot formamide 法²³⁾で PG を抽出し、凍結乾燥して保存した。本物質は不溶性であるため、20 KC で 30 分間超音波（トミー精工, Model UR-200 P）で処理し、それを可溶性 PG 画分として実験に供した。また一部の実験においては、Histamine（以下 H と略す, 和光純薬）や Serotonin（以下 5-HT と略す, 和光純薬）も使用した。

(3) 毛細血管透過性亢進作用の定量的検討

モルモットないしはラットの皮内に per ml 1 mg 濃度の PG 溶液を 0.1 ml 注射し、0, 30 分, 1, 2, 3 時間および 4 時間後に 2% Evans Blue（和光純薬）1 ml を静注し、さらに 20 分後に心臓穿刺により屠殺し、注射局所に漏出した色素を定量することにより

透過性亢進作用を検討した。色素の定量は Katayama らの方法²⁴⁾に従い、色素の漏出した皮膚を切り取り、これを細片し、一晩 1 N KOH 中で 37°C で保温し、0.6 N 磷酸とアセトン（5:13）の混合液を加え、遠心後その上清を 620 nm で比色した。なお対照には生理食塩水を注射した。

(4) 薬剤による毛細血管透過性亢進作用の抑制

いわゆる抗アレルギー剤である Ethylenediamine monohydrochloride（1 バイアル 25 mg, Chiba Geigy）は、モルモットおよびラットに 60 mg/kg を、Promethadine hydrochloride（1 バイアル 25 mg, 塩野義製薬）はモルモットに 142 mg/kg, ラットに 120 mg/kg を、Methysergide hydrogenmaleinate（Dr. von Orelli, Sandoz, Swiss より恵与）は、pH 7.2 PBS に溶解後モルモットならびにラットに 0.5 mg/kg の割合で、それぞれ腹腔内に投与し、これら薬剤投与 30 分後に PG を皮内注射し、その透過性亢進作用に対する抑制効果を検討した。また Hydrocortisone（Upjohn）は、各動物当たり 10 mg を 3 日間連日筋注し、さらに PG 投与 30 分前に 10 mg を腹腔投与し、同様にその抑制効果を検討した。この抑制効果は、PG 画分単独皮内注射した時の抽出色素量と薬剤前処置した時の抽出色素量との比から、パーセントで表現した。なおこれら薬剤濃度は、あらかじめ行った予備実験から決定された。

(5) 病理組織学的検討

PG 皮内注射後、注射部位の組織学的検討を行った。すなわち、皮膚組織片は型どおりにホルマリンで固定後 Hematoxylin-Eosin (HE) 染色を施し、また矢島らの方法²⁵⁾に従い Periodic acid methenamine silver (PAM) 染色を実施し、光顕的に観察するとともに、一部は組織化学的に Alkaline phosphatase 活性²⁶⁾も検討した。さらに皮膚組織片は約 1 mm² の大きさに細片後、2% Glutaraldehyde に前固定後、2% Osmic acid で本固定し、Epone 812 に包埋後超薄切片を作製し、電顕的にも検討した。

成績

1. PG のモルモットおよびラットにおける血管透過性亢進作用の検討

レンサ球菌細胞壁より抽出した PG 画分のモルモットにおける血管透過性亢進作用は、すでに報告されているように²⁰⁾ PG 画分投与後直ちに発来し、その後一旦低下したあと、1 時間後に再び強い色素の漏出が

Fig. 1 Time course of the increased capillary permeability in the skin of the guinea pig after the intracutaneous injection of PG

At 0, 30 min, 1 hr and 4 hr after intracutaneous injection of PG (100 μ g) extracted from streptococcal cell wall to the skin of the guinea pig, 1 ml of evans blue was injected intravenously.

The animals were sacrificed at 20 min after the injection of dye and the amount of which leaked at the sites of injection was measured.

Fig. 2 Time course of the increased capillary permeability in the skin of the rat after the intracutaneous injection of PG

At 0, 30 min, 1 hr and 4 hr after intracutaneous injection of PG (100 μ g) extracted from streptococcal cell wall to the skin of the rat, 1 ml of evans blue was injected intravenously.

The animals were sacrificed at 20 min after the injection of dye and the amount of which leaked at the sites of injection was measured.

生起してくる (Fig. 1).

ラットの場合は、モルモットのそれに比べ第1相における透過性亢進はより顕著に認められたが、2相性の反応は必ずしも明確ではなかった (Fig. 2).

2. PGの血管透過性亢進作用に対する各種薬剤の抑制効果の検討

PG画分投与により起こる透過性亢進作用に対し各種薬剤の影響を検討した。すなわちモルモットにおい

ては、PG画分投与により起こる第1相と2相の色素の漏出は、主に抗ヒスタミン剤 Ethylendiamine monohydrochloride の前処置により 50~60%、Promethadine では平均 65~75% の抑制効果が認められた。一方、5-HT に対し特異的な拮抗剤であるといわれる Methysergide²⁷⁾ は、第1相の反応を 60% 程度抑制したが、第2相の反応は約 30% 程度の抑制を示すにすぎなかった。また Hydrocortisone の効果は、第1相に対してよりも (49%) 第2相の反応を強く抑制した (71%)。なお対照として、モルモットに H (5 μ g) ないしは 5-HT (300 μ g) を皮内注射直後に起こる血管透過性亢進作用に対し、Promethadine ないしは Methysergide の効果を検討すると、前者は H ならびに 5-HT の透過性亢進作用をともに抑制し、後者は 5-HT の作用を抑制したにもかかわらず、H のそれに対してほとんど抑制効果を示さなかった (Fig. 3)。ラットにおいては、PG画分投与により惹起する血管透過性亢進作用は、Ethylendiamine あるいは Promethadine 投与により第1相の反応を強く抑制したが (87~90%)、第2相の反応も 55~60% 抑制した。これに対し Methysergide は、第1相の反応を 80% 以上も抑制したが、第2相の反応は 30% 程度しか抑制しなかった。一方 Hydrocortisone はモルモットの場合と同様に、第1相の反応よりも第2相の反応を強く抑制した。なおラットに H の 10 μ g、ないしは 5-HT の 0.5 μ g 投与により生起する透過性亢進作用は、Promethadine によりきわめてよく抑制されたが、Methysergide は 5-HT の作用を強く抑制するにもかかわらず、H の作用を必ずしも十分には抑制しなかった (Fig. 4)。また図には示していないが、Hydrocortisone は H、5-HT の血管透過性亢進作用をいずれも抑制する効果を示さなかった。

3. PG皮内投与後の組織変化についての光顕的ならびに電顕的検討

PG画分をモルモットに皮内注射し、20分後(第1相)の組織変化を光顕レベルで観察すると、Fig. 5に示すように真皮全層および皮下組織の間質の浮腫を主体とする変化があり、細胞性反応はほとんど認める

Fig. 3 The effect of drugs against the increased capillary permeability in the skin of the guinea pig induced by the intracutaneous injection of PG, H or 5-HT

Remarks: (1) The effect of the drugs was indicated as the inhibition percent calculated by the following formula:

$$\frac{A-B}{A} \times 100\%$$

A = conc. of dye induced by the injection of PG, H or 5-HT to the normal guinea pig

B = conc. of dye induced by the injection of PG, H or 5-HT to the guinea pig pretreated with the drug

(2) PG 5-HT H

group a. ethylenediamine monohydrochloride
b. promethadine hydrochloride
c. methysergide hydrogenmaleinate
d. hydrocortisone

(3) Time 0 or 60 means the cases that Evans blue was injected immediately after or at 60 min after intracutaneous injection of PG, H or 5-HT

ことができなかった。

Fig. 6 は、投与1時間 20 分(第2相)の変化であるが、血管壁の変性、血行の停止像、さらには血管外において著明な単核球、多核白血球の浸潤があり、強い細胞性反応が観察され著明な血管炎の像を呈した。

なお図には示していないが、ラットの場合の第1相ならびに2相の組織変化もモルモットとほぼ同様であったが、その組織像はモルモットほど強くはなかった。

Fig. 7 は、モルモットにおける第2相の組織変化を PAM 染色でみたものであるが、毛細血管基底膜

Fig. 4 The effect of drugs against the increased capillary permeability in the skin of the rat induced by the intracutaneous injection of PG, H or 5-HT

Remarks: (1) The effect of the drugs was indicated as the inhibition percent calculated by the following formula:

$$\frac{A-B}{A} \times 100\%$$

A = conc. of dye induced by the injection of PG, H or 5-HT to the normal guinea pig

B = conc. of dye induced by the injection of PG, H or 5-HT to the guinea pig pretreated with the drug

(2) PG 5-HT H

group a. ethylenediamine monohydrochloride
b. promethadine hydrochloride
c. methysergide hydrogenmaleinate
d. hydrocortisone

(3) Time 0 or 60 means the cases that Evans blue was injected immediately after or at 60 min after intracutaneous injection of PG, H or 5-HT

の浮腫状変化ないしは断裂が認められ、血管炎が惹起されていることは明らかである。内皮細胞の膨化、血管周囲の好中球を主体とする強い細胞反応なども同時に観察される。

Fig. 8~11 は、モルモットの第1相における電顕像を示すが、血管内皮細胞の腫大、細胞質内の大小不同の空胞形成が認められ (Fig. 8)、血管内腔には多数の多核白血球の集合像も観察され (Fig. 9)、またミトコンドリアの増加とともに血管外周には肥満細胞と思われる細胞質内に中等度の電子密度の顆粒を豊富

にもつ細胞の出現が注目された (Fig. 10). なお第1相における Alkaline phosphatase 活性をみると、細胞質にみられる vesicle の外膜に沿ってその活性が認められた (Fig. 11).

Fig. 12 は、第2相における電顕像であるが、血管内皮細胞の融解、壊死が顕著であり、基底膜は不規則な肥厚を示し、その直下には電子密度の高いリピッド様粒子が多数観察される。

Fig. 13 も同じく第2相の変化を示したものであるが、矢印1に示すように、フェリチンと思われる顆粒を有する赤血球細胞質の断片を内皮細胞が補足している像が認められ、erythrophagocytosis の像を反映しているのではないと思われる。矢印2に示すように、基底膜には別に、顆粒をもった不規則な陥凹を有する細胞質が認められ、血管外腔に漏出する遊走細胞の細胞質の一部とも考えられる。また基底膜は離断し、矢印3に示すように血管外に崩壊した赤血球の断片なども観察される。

なお PG 皮内注射前に抗アレルギー剤を投与することにより、これら組織変化がどのように変わるかを検討したが、第1相では軽度ながら間質の浮腫が惹起されており、第2相でも軽度ながら血管周囲への細胞浸潤も認められ、抗アレルギー剤が PG の反応を完全に抑制する所見を、組織学的には明確に実証しえなかった。

考察

すでに Cromartie, Schwab 等¹⁷⁻¹⁹⁾により、超音波処理したA群レンサ球菌細胞壁画分をウサギ皮内に投与することにより、急性の炎症とそれに引き続く消退と再発を繰り返す多結節性病変を特徴とする慢性的の炎症が生起することが報告された。その後この急性炎症は、細胞壁 PG 画分により起こり、同様なことはモルモットでも認められ、肉眼的には3~4時間以内に注射部位に腫脹、発赤が出現し、24時間で反応は最大に達し、中心部に壊死が認められ、その後消退していくことが明らかにされた。病理組織学的には多核白血球の浸潤、コラーゲン線維の断裂など、主に細胞性反応を主体とする病変を認め、血管の損傷や血栓などはそれほど強いものではないことが報告された²⁰⁾。また同様にラットでも注射4~6時間以内に発赤、腫脹が出現し、24時間で反応は最大となり、白血球の浸潤、毛細血管の充血ないしは出血、表皮、筋組織の壊死などの起こることが報告された²⁰⁾。著者は、これら

PG 画分投与により生起する急性炎症の、特にその初期変化を中心に検討を試みた。その結果、PG 画分投与と同時に色素を静注することにより、その注射部位に著明な色素の漏出が起こり、その際の組織変化を光顕レベルで観察すると間質の浮腫が主体で、ほとんど細胞性反応を認めることはできなかった。したがってこの色素の漏出ないし浮腫の生起は、PG 画分投与による血管の透過性亢進に基づき惹起されたものと思われる。そしてこの色素の漏出は一旦低下するが、1時間後には再び出現し、その際の組織変化をみると白血球ないしは単核球の浸潤を主体とする細胞反応が認められ、一部には血管壁の変性、血行の停止像なども観察された。肉眼的にも強い出血斑が出現し、Schwab の報告¹⁷⁻¹⁹⁾と少しく異なり、PG 画分投与約1時間後に、すでに強い血管炎の像が示された。したがって1時間後に再び出現した色素の漏出は、恐らく血管炎に基づくものであり、早期の漏出(第1相)とはその機構が異なるものと思われる。なおラットの場合も、程度はやや軽いけれどもほぼ同様な組織変化を示した。

一方この第1相における組織変化を電顕的に観察すると、内皮細胞の腫大や空胞形成が認められ、また透過性亢進作用にいかなる役割を演じたかは具体的には明らかでないが、血管外周に肥脾細胞と思われる細胞の出現しているのが注目された。PG 画分投与約1時間後の、いわゆる第2相の電顕像では、血管内皮細胞の融解、壊死、基底膜の不規則な肥厚あるいは離断などの変化が認められた。

このように、PG 画分投与により起こる組織変化がいかなる機作を介して惹起されるかはなお明らかでないが、この組織変化と動物のもつ PG に対する自然抗体価との間に相関が認められないこと、少なくとも第2相の反応は、受身アルサス反応におけるそれと時間的にかなりのずれのあること²⁰⁾、能動免疫された動物においてはこの反応はむしろ抑制されること²⁰⁾などから、上記の組織変化は PG 画分のもつ生物活性を基盤として起こる直接的な組織障害作用に基づくものであることを強く示唆している。また著者の用いた PG 画分標品にはラムノースの少量の混入があり²⁰⁾、したがってこれら組織変化がすべて PG にのみ基づくものか、PG と C-多糖体との複合体の形で反応に関与したかは必ずしも明らかでない。周知のように PG にはアジュバント活性があり^{6,40)}、その有効最少構造単位が N-acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutamine (MDP) であることが明らかにされている⁴¹⁾が、

著者も合成 MDP を用い実験した結果では、上記の組織変化を全く認めることができず (阪大歯・小谷教授らとの共同実験、未発表データ)、その意味では組織変化を起こすためには PG がある一定以上の粒子サイズをもつ必要があるのか、あるいは特殊構造との複合体である必要があるのかさらに検討しなければならない。

アルサス反応や、さらに一般的に炎症における血管透過性の亢進は、ほかの炎症反応に先立って起こり、その反応は 2 相性のパターンを示し、第 1 相は処置後直ちに起こり 4~5 時間後に第 2 のピークがみられるといわれている^{43~45)}。しかし PG 画分投与による反応では、少なくとも第 2 相のピークは時間的に早く、しかも強い血管炎を伴う点で少し趣きを異にしているようで、林のいう第 2 相の血管透過性とはやや意味を異にする。恐らく用いる標品の質的な違い、動物種の相違などにより反応の強さ、反応の出現、持続時間などに相違があり、血管透過の反応機構に多少の相違があるのかもわからない。事実アルサス反応の第 1 相の血管透過は、抗ヒスタミン剤で完全に抑制されるにもかかわらず、PG 画分投与でのそれは必ずしも十分でなかった。

モルモットにおける第 1 相の血管の透過は、いわゆる抗ヒスタミン剤である ethylenediamine monohydrochloride や promethadine により 50~65% の抑制がみられ、また 5-HT に特異的に拮抗するといわれる methysergide によっても約 60% の抑制が認められた。以上の事実は、この透過に H や 5-HT などの mediator が関与していることを示すものであるが、しかしこれら薬剤で完全に抑制されないことからほかの mediator の関与も考慮しなければならない。例えば、カラゲニンによるラット後趾浮腫の mediator としてブラジキニンやプロスタグランジンの関与⁴⁶⁾が注目されているからである。一方、ステロイド性抗炎症剤の血管透過の亢進に対する抑制作用については必ずしも明らかにされていないが、大量に用いることにより、ある程度 H やブラジキニンの作用を抑制するともいわれている⁴⁷⁾。したがって、第 1 相の透過がハイドロコチゾンによりある程度抑制されたことは比較的大量を投与したからとも考えられるが、また本剤がプロスタグランジンなどほかの mediator の遊離を阻止することにより抑制されたという可能性⁴⁸⁾もあろう。一方、第 2 相の血管炎に基づく色素の漏出が、抗炎症剤により抑制されるばかりでなく、抗アレルギー剤に

よっても抑制されたことは、むしろ第 2 相の変化に先立って起こる第 1 相の反応を抑制することにより、第 2 相の反応を間接的に抑制したのかもしれない。

ラットの第 1 相における透過もまた抗アレルギー剤により良く抑制された。一般にラットの場合は、モルモットに比し H に対するよりも 5-HT に対して感受性が高い⁴⁹⁾といわれており、したがって本反応においては、mediator として H に比し 5-HT のほうがより働いているものと思われる。事実、特異的な抗セロトニン作用を持つ methysergide により第 1 相の反応はよく抑制されており、また同様に、抗ヒスタミン作用とともに抗セロトニン作用も合わせ持つ ethylenediamine monohydrochloride や promethadine によっても強い抑制が認められた。一方、第 2 相の各種薬剤による抑制パターンはモルモットのそれと類似しているが、抗アレルギー剤による第 2 相の反応はモルモットのそれに比し多少低い傾向にあった。

細菌細胞壁 PG がどのような機構を介して、いわゆる chemical mediator を遊離するかはなお明らかでないが、Rotta ら⁴⁹⁾は in vitro で PG によりウサギ血小板から 5-HT が遊離されることを、また最近 Schwab ら⁴¹⁾は PG が補体の alternate pathway を活性化することを報告しており、このことは補体系を介して mediator が遊離する可能性のあることを示唆している。また著者の電顕所見における肥胖細胞の存在も注目されよう。血管透過に関与する mediator は、H や 5-HT ばかりでなく、その他いくつかの物質が存在するものと思われるが、この点に関しては、それぞれに対する特異的拮抗剤を用いてさらに検討しなければならない。モルモットとラットでは、遊離してくる mediator の相違、ないしはそれに対する感受性の相違があり、したがって薬剤による抑制パターンの相違も出現してこよう。

いずれにせよ、細菌細胞壁 PG の作用が感染症の成立ないしは発症の成因として、あるいは続発症発症の上でいかなる役割を演ずるかを明らかにしていくことは、きわめて意味があろう。

結論

レンサ球菌感染症の発症における PG の作用機序を明らかにする目的で、PG のもつ血管透過性亢進作用の機構を病理組織学的に検討した。また各種薬剤を使用して、その血管透過性抑制効果から、この機構に関与する mediator について検討した。

1) レンサ球菌細胞壁より抽出した PG 画分をモルモット、ラットに皮内注射した後の血管透過性亢進は、すでに報告されたように 2 相性の反応を示した。

2) 光顕では、第 1 相は真皮、皮下組織における間質の浮腫を主体とする変化を示し、第 2 相は著明な血管炎の像を呈した。

3) 電顕では、第 1 相は血管内皮細胞の腫大、空胞形成、血管外に肥胖細胞と思われる細胞の出現、第 2 相は血管内皮細胞の融解、壊死、基底膜の不規則な肥厚、離断を認めた。

4) 抗ヒスタミン剤、抗セロトニン剤による第 1 相の血管透過性抑制効果から、H, 5-HT とともに、ほかの mediator の関与も示唆された。

5) 第 2 相の反応は、抗炎症剤によって 55~60% 抑制された。

6) モルモットとラットにおける第 1 相の血管透過性亢進作用に関与する mediator に多少の差があることが示唆された。

稿を終るにあたり、本研究にご懇切なるご指導を賜った微生物学免疫学教室大国寿士助教授、ならびにご協力いただいた微生物学免疫学教室各位に深謝するとともに、組織学的なご教示を賜った本学第 1 病理学教室相原薫助教授に深く感謝いたします。

なお、本論文の要旨は 1978 年 9 月、第 46 回日本医科大学医学学会総会において発表した。

文献

- 1) Abdulla, E.M., and Schwab, J.H.: Immunological properties of bacterial cell wall mucopeptides. *Proc. Soc. Exp. Biol. Med.*, **118**, 359~362, 1965.
- 2) Hughes, R.C., Thurman, P.F., and Salaman, M.R.: Antigenic properties, of *Bacillus licheniformis* cell wall components. *Eur. J. Biochem.*, **19**, 1~8, 1971.
- 3) Schleifer, K.H., and Krause, R.M.: The immunchemistry of peptidoglycan. Separation and characterization of antibodies to the glycan and to the peptide subunit. *Eur. J. Biochem.*, **19**, 471~478, 1971.
- 4) Schleifer, K.H., and Krause, R.M.: The immunchemistry of peptidoglycan. *J. Biol. Chem.*, **246**, 986~993, 1971.
- 5) Adam, A., Ciorbaru, R., Ellouz, F., Petit, J.F., and Lederer, E.: Adjuvant activity of monomeric bacterial cell wall peptidoglycans. *Biochem. Biophys. Res. Commun.*, **50**, 561~567, 1974.
- 6) Holton, J.B., and Schwab, J.H.: Adjuvant properties of bacterial cell wall mucopeptides. *J. Immunol.*, **90**, 134~138, 1966.
- 7) Takada, H., Tsujimoto, M., Kotani, S., Kusumoto, S., Inage, M., Shiba, T., Nagao, S., Yano, I., Kawata, S., and Yokogawa, K.: Mitogenic effects of bacterial cell walls, their fragments, and related synthetic compounds on thymocytes and splenocytes of guinea pigs. *Infect. Immun.*, **25**, 645~652, 1979.
- 8) Tanaka, A., Nagao, S., Nagao, R., Kotani, S., Shiba, T., and Kusumoto, S.: Stimulation of the reticuloendothelial system of mice by muramyl dipeptide. *Infect. Immun.*, **24**, 302~307, 1979.
- 9) Chedid, L., Lamensans, A., Parant, F., Parant, M., Adam, A., Petit, J.F., and Lederer, E.: Protective effect of delipidated mycobacterial cells and purified cell walls against Ehrlich carcinoma and a syngeneic lymphoid leukemia in mice. *Cancer Res.*, **33**, 2187~2195, 1973.
- 10) Rotta, J., Predergast, T.J., Karakawa, W.W., Harmon, C.K., and Krause, R.M.: Enhanced resistance to streptococcal infection induced in mice by cell wall mucopeptide. *J. Exp. Med.*, **122**, 877~890, 1965.
- 11) Hamada, S., Narita, T., Kotani, S., and Kato, K.: Studies on cell walls of group A streptococcus pyogenes, type 12. II. Pyrogenic and related biological activities of the higher molecular weight fraction of an enzymatic digest of the cell walls. *Biken J.*, **14**, 217~231, 1971.
- 12) Rotta, J., and Bendar, B.: Biological properties of cell wall mucopeptide of hemolytic streptococci. *J. Exp. Med.*, **130**, 31~47, 1969.
- 13) Narita, T., Hanada, S., and Kotani, S.: Studies on cell walls of group A streptococcus pyogenes, type 12. III. Induction of cardiac lesions in mice by higher molecular weight fraction from a digest of cell walls with the L-11 enzyme. *Biken J.*, **14**, 233~245, 1971.
- 14) 大国寿士, 紺野洋, 清水絃明, 木村義民, 馬杉洋三: レンサ球菌感染とその統廃症の研究. II. レンサ球菌菌体成分のマウス生体内における局在持続性と組織変化. *日細菌誌*, **27**, 59~64, 1972.
- 15) Ohanian, S.H., Schwab, J.H., and Cromartie, W.J.: Relation of rheumatic-like cardiac lesions of the mouse to localization of group A streptococcal cell walls. *J. Exp. Med.*, **129**, 37~49, 1969.
- 16) Schwab, J.H., Cromartie, W.J., Ohanian, S.H., and Graddock, J.G.: Association of experimental chronic arthritis with the persistence of group A streptococcal cell wall in the articular tissue. *J. Bacteriol.*, **94**, 1728~1735, 1967.
- 17) Cromartie, W.J., Schwab, J.H., and Craddock, J.G.: The effect of a toxic cellular component of group A streptococci on connective tissue. *Am. J. Pathol.*, **37**, 79~99, 1960.
- 18) Schwab, J.H., and Cromartie, W.J.: Studies on a toxic cellular component of group A streptococci. *J. Bacteriol.*, **74**, 673~679, 1957.
- 19) Schwab, J.H., Cromartie, W.J., and Roberson, B.S.: Identification of toxic cellular component of group A streptococci as a complex of group specific C polysaccharide and a protein. *J. Exp. Med.*,

太田論文付図（1）

太田論文付図(2)

太田論文付図(3)

Fig. 5 The microscopic findings of the first phase in the guinea pig
Edema is observed in the intercellular space of the subcutaneous tissue.

Fig. 6 The microscopic findings of the second phase in the guinea pig
The finding of vasculitis is remarkably observed in the subcutaneous tissue.

Fig. 7 The PAM stain of the second phase in the guinea pig
Swelling of endothelial cells and perivascular infiltration are observed.

Fig. 8 The electromicroscopic findings of the first phase in the guinea pig

Fig. 9 The electromicroscopic findings of the first phase in the guinea pig
A number of polymorphonuclear leukocytes aggregate in the lumen of the small vessel.

Fig. 10 The electromicroscopic findings of the first phase in the guinea pig
The cell which seems to be like a mast cell is observed at the extravascular space.

Fig. 11 The electromicroscopic findings of the first phase in the guinea pig
Alkaline phosphatase activities are observed at the vesicles in the endothelial cells.

Fig. 12 Electromicroscopic findings of the second phase
Cytolysis and necrosis of endothelial cells are remarkable. The basement membrane is irregularly thickening and disintegrated into many fragments. Lipid like deposits are observed under the basement membrane.

Fig. 13 Electromicroscopic findings of the second phase
Arrow 1 seems to show the erythrophagocytosis.
Arrow 2 shows a part of cytoplasm of the wandering cells.
Arrow 3 shows the fragments of red blood cells at the extravascular space.

- 109, 43~54, 1959.
- 20) Ohkuni, H., and Kimura, Y. : Increased capillary permeability in guinea pigs and rats by peptidoglycan fraction extracted from group A streptococcal cell walls. *Exp. Cell. Biol.*, **44**, 83~94, 1976.
 - 21) Bleiweis, A.S., Karakawa, W.W., and Krause, R.M. : Improve technique for the preparation of streptococcal cell walls. *J. Bacteriol.*, **88**, 1198~1200, 1964.
 - 22) Krause, R.M., and McCarty, M. : Studies on the chemical structure of the streptococcal cell wall. I. The identification of a mucopeptide in the cell walls of group A and A-variant streptococci. *J. Exp. Med.*, **114**, 127~140, 1961.
 - 23) Fuller, A.T. : The formamide method for the extraction of polysaccharides from haemolytic streptococci. *Br. J. Exp. Med.*, **19**, 130~139, 1938.
 - 24) Katayama, S., Shionoya, H., and Ohtake, S. : A new method for extraction of extravasated dye in the skin and the influence of fasting stress on passive cutaneous anaphylaxis in guinea pigs and rats. *Microbiol. Immunol.*, **22**, 89~101, 1978.
 - 25) 影山圭三 : 病理組織標本の作り方 (慶応義塾大学医学部病理学教室編), 矢島氏変法. p. 110~111, 医学書院, 1973.
 - 26) 相原薫, 金杉義衛 : 肺の表面活性物質をめぐる病理. *日医師会誌*, **88**, 30~52, 1971.
 - 27) Graham, J.R. : Methysergide. *Practitioner*, **198**, 302~311, 1967.
 - 28) Heymer, B. : Biological properties of the peptidoglycan. *Z. Immun. Forsch.*, **149**, 245~257, 1975.
 - 29) Heymer, B., Bültmann, B., and Haferkamp, O. : Toxicity of streptococcal mucopeptides in vivo and in vitro. *J. Immunol.*, **108**, 858~861, 1971.
 - 30) Abdulla, E.M., and Schwab, J.H. : Biological properties of streptococcal cell-wall particles. III. Dermonecrotic reaction to cell-wall mucopeptide. *J. Bacteriol.*, **91**, 374~383, 1966.
 - 31) Chedid, L., Audibert, F., and Arthur, G.J. : Biological activities of muramyl dipeptide, a synthetic glycopeptide analogous to bacterial immunoregulating agents. *Prog. Allergy*, **25**, 63~105, 1978.
 - 32) 林秀男 : 炎症. その発生と抑制の機構について. *日病会誌*, **58**, 37~63, 1967.
 - 33) Hayashi, H., Yoshinaga, M., Koono, M., Miyoshi, H., and Matsumura, M. : Endogeneous permeability factors and their inhibitors affecting vascular permeability in cutaneous arthus reactions and thermal injury. *Br. J. Exp. Pathol.*, **45**, 419~435, 1964.
 - 34) 林秀男, 石丸精二, 古賀裕 : 炎症性血管透過因子. 病理の立場から. *感染症*, **8**, 50~56, 1978.
 - 35) 林秀男 : 炎症性血管透過因子 vasoexin の作用特異性. その意義について. 第 18 回医学会総会誌, 567~569, 1972.
 - 36) Di Rosa, M., Giroud, J.P., and Willoughby, D.A. : Studies of the mediators of the acute inflammatory response induced in rats in different sites by carrageenan and turpentine. *J. Pathol.*, **104**, 15~29, 1971.
 - 37) 鹿取信 : 炎症と血管透過性因子. 薬理の立場から. *感染症*, **8**, 57~61, 1978.
 - 38) 山本尚三, 鹿取信, 佐藤和雄 : プロスタグランジン. 講談社サイエンティフィック, 1978.
 - 39) 木村義民 : アミン類 (ヒスタミン, セロトニンなど) とキニン系. 第 18 回医学会総会誌, 564~567, 1972.
 - 40) Ryc, M., and Rotta, J. : The thrombocytolytic activity of bacterial peptidoglycans. *Z. Immun. Forsch.*, **149**, 265~272, 1975.
 - 41) Greenblatt, J., Boackle, R.J., and Schwab, J.H. : Activation of the alternate complement pathway by peptidoglycan from streptococcal cell wall. *Infect. Immunol.*, **19**, 296~303, 1978.

(受付 : 1981 年 1 月 5 日)