— 原 著 —

心脳卒中および虚血性心脳症の病理学的研究

池庭 衛

日本医科大学第1病理学教室 (主任: 矢島権八教授)

A pathological study of cardiocerebral apoplexy and ischemic cardio cerebral disease

Mamoru Ikeniwa

The First Department of Pathology, Nippon Medical School

Cardiocerebral apoplexy (CCA) is known to occur as apoplexy-like symptom after myocardial infarction. However, no detailed histopathological studies of this disease entity have ever been made.

To clarify the definition of CCA, the brains and hearts of 35 acute myocardial infarction cases and 20 control cases (control group) from autopsy materials were pathomorphologically examined.

The clinical neurologic signs were also encountered.

Macroscopic brain disorders observed in 14 acute myocardial infarction cases (brain disorder group) consisted of either acute or old infarction changes. Besides, cases with no macroscopic brain disorders (no brain disorder group) were also seen. The degree of macroscopic changes in cardiocerebrovascular systems of examined cases became slighter in order from brain disorder group, no disorder group and to control group. Microscopic observation of brain parenchyma of no brain disorder group and control group were compared with those of cerebral bleeding cases.

As the result, although various changes (ischemic, pre-infarctive, softening) were seen in the brains of both no disorder group and control group, no disorder group revealed more or less striking change than control group.

These changes were justified as not specific for myocardial infarction, and seen to be slighter than those of cerebral bleeding cases. The reason was explained on the bases of assumption that the brain circulatory derangement in cases of myocardial infarction is resulted from the indirect effect of the ischemic process, why the circulatory derangement in cerebral bleeding is directly resulted from the ischemic process involve in brain tissue.

The pathomorphological observation of brain and heart in examined acute myocardial infarction cases was summarized as follows and might be classified with 3 types.

1) Acute disorders in brain and heart which occurs simultaneously: Pathomorphologic CCA in a narrow sense (3 cases).

2) Acute disorder in heart and old disorder in brain: Pathomorphologic CCA in a broad sense (11 cases).

3) Acute disorder in heart without macroscopic change in brain, in spite of the clinical neurologic manifestations: Clinical CCA (5 cases).

In conclusion, pathomorphologic CCA could be justified as a extreme type of acute ischemic disorder which occurs simultaneously in various organs particularly in heart and brain.

Key words: cardiocerebral apoplexy, acute myocardial infarction, cerebral infarction, cerebral circulatory disturbance, microscopic ischemic change

緒 言

脳卒中は、昭和 26 年以来わが国の死亡原因の第 1 位を占め¹⁾、腫瘍性病変による死亡率がそれにとって変わろうとする昨今の情勢においても、臨床医学的、病理学的に重要な疾患として現在も多くの研究がなされているのは周知の事実である。

沖中ら^{2,3)}は、脳卒中を検索していくうちに、脳卒中様症状を呈しながら、剖検上脳に肉眼的変化を認めない症例が存在し、同時に心血管系の急性障害と密接な関係を持つことが多いところから、これを心脳卒中という概念で総括することを提唱した。心脳卒中は以後、藤井ら^{4,5)}により脳卒中様症状を呈する急性心筋梗塞であると定義され、肉眼的解剖所見上、脳に認識できる病変が認められる場合と、認められない場合があることを明らかにした。

心脳卒中に関する報告²⁻⁶⁾は少なく、その本態を解明する詳細な病理組織学的検索は行われていない。そこでその基礎的研究として、脳卒中例における心病変と心筋梗塞例における脳病変の検索の必要性が考えられる。飯田⁷⁾、加藤⁸⁾らは脳卒中例の心、腎、脾、副腎を検索し、脳梗塞では脳出血、クモ膜下出血に比較し、心虚血性病変をはじめとする各臓器の虚血性病変が高率にみられ、多臓器性の虚血性病変の存在を明らかにした。この結果から虚血性心病変例での脳虚血性障害の発現の可能性が考えられるが、これに關しての報告⁹⁻¹¹⁾は少なく、病理学的詳細な検索が待たれている。

著者は、虚血性心病変の最も高度な心筋梗塞例についてその脳病変を検索し、心脳卒中解明の手がかりとなりえるいささかの所見を得ることができたので報告する。

なお、陳旧性心筋梗塞群は他の死亡原因となる基礎疾患があり、心筋梗塞症が死亡の原因となっている急性期死亡心筋梗塞症（以下急性心筋梗塞症と略す）とは区別しなければならないので、本研究報告では参考にするにとどめ詳しい記載を省略した。

研究対象および方法

日本医科大学病理学教室における昭和 47～56 年までの 2,500 例の剖検例のうちから、脳の検索が可能であった急性心筋梗塞症 35 例を対象群とし、また非高血圧、非糖尿病、非脳血管障害、非心筋梗塞性の各種疾患で死亡した対象群とほぼ同じ年齢層で脳の検索

可能な 20 例を対照群として検索した。

この対象群 35 例の脳について、肉眼的脳変化を認める群と認めない群に分け、前者では主として肉眼的に詳細に検索し、後者ではさらに顕微鏡的に詳細な検索を加えた。対照群 20 例についても同様に検索を行った。

対象群、対照群の性、年齢分布は Table 1 のとおりである。

検索項目は、臨床所見として、神経症状、高血圧、糖尿病を、肉眼所見としては、冠動脈の硬化度・血栓、壁在血栓、脳動脈硬化度・血栓を、また顕微鏡所見として、神経細胞虚血性変化、血管周囲性出血、血鉄色素貪食細胞、白質粗鬆化・多孔化、PAM 斑¹²⁾、類澱粉小体、血管周囲性軟化、微小嚢胞、小脳歯状核および Purkinje 細胞変性・脱落、神経膠細胞増生の検索を行い、それぞれについて、変化なし(－)～高度(Ⅲ)までの 5 段階に分けた。

肉眼所見のうち冠動脈硬化度については五味淵¹³⁾の研究を、脳動脈硬化度については石井¹⁴⁾の分類基準を参考として分類した。

顕微鏡所見の各項目の判定は、成書¹⁵⁻¹⁷⁾および当教室で行われた研究¹⁸⁻²⁰⁾を参考とした。

脳組織は武谷の方法²⁰⁾により切り出し、所定の方法でパラフィン包埋後薄切した。

染色は HE 染色、Masson 染色(野口変法)、Azan 染色、PAM 染色(矢島変法)、Elastica van Gieson 染色、Holzer 染色、Luxol Fast Blue・Nissel 染色を使用した。

結 果

対象群を肉眼的に詳細に観察した結果、新旧または陳旧性梗塞巣を認めた例(梗塞群)は 13 例(38%)であり、梗塞巣と判定できる病巣を全く認めなかった例(非梗塞群)は 21 例(62%)で、脳出血例は 1 例もなく、特別な例としてクモ膜下出血を伴う例が 1 例あった。梗塞群では直接死因になるような急性大梗塞例は 1 例もなく、多発性小梗塞群が 8 例(62%)、単発ないし少数小梗塞群(単・少梗塞群)が 5 例(38%)であった。

性別をみると、この両群ともに男性が多く、それぞれ 7:1, 3:2 で対象群全体では 30:5 となっていた。年齢をみると、クモ膜下出血例は 76 才、多発小梗塞群は 51～86 才まで平均 68.4 才、単・少梗塞群は 50～80 才まで平均 65.2 才、肉眼的非梗塞群は 45

Table 1 Studied cases and control

		Cases	Male:femal	Age		Average
				Minimum	Maximum	
Myocardial infarction group	Subarachnoid hemorrhage	1	1 : 0	76		76
	large infarction	0	—	—	—	—
	Multiple small infarctions	8	7 : 1	51	86	68.4
	A few or single foci of small infarctions	5	3 : 2	50	80	65.2
	No macroscopic infarction	21	19 : 2	45	81	63.9
Control group		20	13 : 7	41	80	60.3

～81 才まで平均 63.9 才であった。一方、対照群では 41～80 才まで平均 60.3 才であった (Table 1)。

肉眼的梗塞群については、すでに当教室で行われた福井¹⁸⁾や矢島²⁴⁾の詳細な研究成績が報告されており、今回の症例でもほぼ同様な観察結果を示していた。

1. 心の病理学的所見

(1) 肉眼的脳梗塞群

冠動脈の硬化度を判定する規準として、冠動脈血栓好発部である冠動脈入口部より 2.5 cm 前後の最高度動脈硬化度をとることが最も信頼度の高いものであることは、五味淵ら¹³⁾の系統的研究により立証されている。著者もこの方法に従って、対象群および対照群の冠動脈硬化度を検討してみた (Table 2)。

冠動脈の硬化度は、多発小梗塞群でも単・少梗塞群

でも全例が高度型 (IV度) を示していた。また冠動脈血栓好発部には、新鮮梗塞性病変を示す例ではほとんどのものが閉塞性赤色血栓を認めた。血栓が認められなかった例では、矢島ら²⁷⁾のいういわゆる血栓準備状態を示していた。心筋梗塞の病型は、両群ともに新旧混合型が多かった。壁面血栓は、多発小梗塞群で 8 例中 4 例 (50%) にみられたのに対し、単・少梗塞群では 5 例中 1 例 (20%) のみであった。以上の所見は、矢島ら²⁷⁾およびその協同研究者ら¹⁸⁾の研究成績とよく一致していた。

なお高血圧既往の明らかな例は、多発小梗塞群で 0 例、単・少梗塞群で 2 例あり、糖尿病既往例はそれぞれ 1 例と 2 例にみられた。クモ膜下出血例では高血圧がみられたが糖尿病はみられなかった。

(2) 肉眼的非脳梗塞群

Table 2 Correlations between the macroscopic finding and clinical finding in macroscopically identifiable regions

No.	Age	Sex	neurologic sign	Hypertention	Diabetes mellitus	Coronary artery		Mural thrombus	Middle cerebral artery		Myocardial infarction
						Sclerosis	Thrombosis		Sclerosis	Thrombosis	
Multiple small infarction group											
1	51	♂	○			IV	●	●	IV		FO
2	57	♂				IV	●	●	IV	●	FO
3	59	♀				IV	●		IV		FO
4	69	♂	⊕		●	IV	●	●	IV	●	FO
5	70	♂				IV	●		IV		FO
6	77	♂	⊙			IV	●		IV		FO
7	78	♂	⊙			IV			IV		FO
8	86	♂				IV	●	●	IV	●	FO
A few or single foci of small infarction group											
1	50	♂			●	IV			IV		FO
2	55	♂	○	●		IV	●		IV		FO
3	70	♂	○		●	IV		●	III		FO
4	71	♀	○			IV	●		IV		FO
5	80	♀		●		IV			III		FO
Subarachnoid hemorrhage											
1	76	♂	○	●		IV			IV		FO

Table 3 Macroscopic observation of the studied group

No.	Age	Sex	neurologic sign	Coronary artery		Mural thrombus	Cerebral artery		Myocardial infarction Fresh:F, Old:O
				Sclerosis	Thrombosis		Sclerosis	Thrombosis	
1	45	♂		IV	○		III		F0
2	48	♂		IV		○	III		F
3	50	♂	○	IV	○		III		F0
4	51	♂		III	○		IV		F
5	52	♀		III			III		F
6	52	♂		IV	○	○	II		F0
7	53	♂	○	IV	○	○	IV		F0
8	55	♀		IV	○		III		F
9	56	♂		IV			IV		F0
10	57	♂		III	○		III		F0
11	58	♂		III	○		IV		F0
12	60	♂		IV	○		II		F
13	60	♂		IV	○		III		F0
14	63	♂		III	○		III		F0
15	68	♂	○	IV	○		III		F0
16	69	♂	○	IV	○		III		F0
17	72	♂		IV	○		III		F
18	73	♂		IV			III		F
19	78	♂	○	IV			III		F
20	80	♂		IV	○		III		F0
21	81	♂		III	○		III		F0

Table 4 Macroscopic investigation of the control group

No.	Age	Sex	Coronary artery		Cerebral artery		Pathologic diagnosis
			Sclerosis	Thrombosis	Sclerosis	Thrombosis	
1	41	♀	I		I		Rectal cancer
2	43	♀	I		I		Renal cancer
3	44	♂	II		II		Pancreas cancer
4	45	♂	II		I		Burned
5	47	♂	I		I		Liver cirrhosis
6	47	♂	II		I		Grawitz's tumor
7	53	♂	III		I	○	Pancreas cancer
8	55	♂	I		I		Grawitz's tumor
9	59	♀	III		III		Uterus cancer
10	60	♀	II		I		Gastric cancer
11	61	♂	II		III		Lung cancer
12	63	♂	II		II		Lung cancer
13	64	♀	I		II		Liver cancer
14	70	♀	II		II		Gastric cancer
15	71	♂	III		III		Maxillar cancer
16	74	♀	III		III		Uterus cancer
17	75	♂	II		III		Laryngeal cancer
18	77	♂	II		II		Pancreas cancer
19	77	♂	IV		II		Cholelithiasis
20	81	♂	II		II		Renal cancer

次に肉眼的非脳梗塞群を、高血圧・糖尿病を有する群とそうでない群に分け、以上のような心変化について比較検討したが、明確な差異がみられなかったためにこれらをまとめて肉眼的非脳梗塞群とし、対照群と比較検討した結果について述べる (Table 3, 4).

冠動脈硬化度についてⅢ～Ⅳ度の高度型をみると、21 例 (100%) がそうであったが、肉眼的脳梗塞群が

Ⅳ度のみであったのに比較すれば、Ⅲ度が 6 例 (29%) 混じっており変化の程度は少し軽いといえる。対照群で同様にⅢ～Ⅳ度の変化をみると、5 例 (25%) と肉眼的非脳梗塞群に比較し変化がさらに軽いことが示されていた。対照群の冠動脈硬化度の高い例はいずれも心筋線維症を示しており、これも五味淵¹³⁾の研究成績とよく一致していた。

冠基幹血栓症については、肉眼的脳梗塞群とほぼ同様に 21 例中 16 例 (76%) に認められ、残りの 5 例 (24%) は血栓準備状態を示していた。心筋梗塞症を示さなかった対照群では、当然のことながら 1 例も認められなかった。

壁在血栓は 21 例中 3 例 (14%) で、対照群では 1 例も認められなかった。

2. 中大脳動脈の肉眼所見

石井¹⁴⁾は、脳梗塞例では中大脳動脈入口部より 1.0 ～ 1.5 cm の部位に最高度の動脈硬化症が発生し、この部にのみ粥状硬化症、あるいは時に動脈瘤が発生する場合もあり、より末梢部に第 2、第 3 ないしそれ以上の粥状硬化症が発生する場合も多いが、内膜、中膜、外膜変化を総合してみると、この部位の変化が常に最高度であるという研究成績を発表している。著者は、当教室における以上のような研究成績を参照して、対象群および対照群の中大脳動脈基幹部の変化について検索を行った。

(1) 中大脳動脈硬化度

1) 脳梗塞群

上述の石井の判定規準にしたがって検索した結果は **Table 2** のとおりで、多発小梗塞群、単・少梗塞群ともに血栓好発部位ではいずれもⅢ～Ⅳ度の高度型を示し、末梢部に第 2、第 3 あるいはそれ以上の粥状硬化症を示す例も少なくなかったが、常にこの部に最高度の動脈硬化性変化を認めた。また脳底動脈全般に高度硬化症をみた例もあり、これらは高齢者に多い傾向を示していた。

2) 非脳梗塞群

Ⅲ～Ⅳ度の高度型をみると、21 例中 18 例 (86%) であり、対照群では 20 例中 5 例 (25%) で明らかに高度変化が少なく、さらにより強い変化であるⅣ度のみをみると 5 例 (24%) であるのに対し、対照群には 1 例もみられず明らかに対象群に高度な変化が多いことが示されていた (**Table 3, 4**)。

対象例の肉眼的非脳梗塞群は後述のごとく、肉眼的には梗塞症は認めなかったが、顕微鏡的には脳梗塞症に準じた脳虚血性障害を示す例がかなり認められたので、Ⅲ～Ⅳ度のような高度の中大脳動脈基幹動脈硬化症を示す例が比較的多く認められたものとみなされる。

(2) 中大脳動脈基幹血栓症

多発小梗塞群で血栓好発部位に相当し 3 例に赤色血

栓が認められ、これらの症例では新鮮梗塞病変を伴っていた。単・少梗塞群と非脳梗塞群では 1 例もこれを示した例はなかった。ただし、脳内動脈血栓を示した例が対照群に 1 例みられたが、これらは終末期に DIC を起こしていた例であった (**Table 2～4**)。

3. 肉眼的非脳梗塞群の病理組織学的所見

(1) 神経細胞虚血性変化

心筋梗塞発作後およびその後の重篤な全身状態時はもちろんのこと、死亡時に近い時期には、脳循環障害により発生する最も顕著な徴候である脳神経細胞の虚血性病変が発生するはずである。一方、他の原因による死亡例でも、死亡前の死戦期にはやはり脳循環失調が発生するので、同様の変化が脳神経細胞に起こることも当然考えられる。そこで著者は、急性期心筋梗塞死亡群を対象群とし、対象群とほぼ同様な年齢層の対照群について、脳神経細胞の虚血性変性の発生様相に差異があるか否かをまず検討してみた (**Table 5～7**)。

皮質各部と基底核各部の神経細胞変性を検索し、総合的な判定を下し、高度のものをⅢ度、以下Ⅱ度、Ⅰ度、±度、一度の 5 段階に分類した (以下各項目とも同様)。結果は **Table 5～7** のとおりで、皮質をみると対象群 21 例中 12 例 (57%)、対照群 20 例中 12 例 (60%) がⅢ度であったが、基底核をみると対象群 21 例 (100%)、対照群 19 例 (95%) がⅢ度の高度型で、両群間に明確な差異を認めえなかった。以上より、急性期死亡心筋梗塞例と対照例には明確な差異はみられず、急性期死亡心筋梗塞例に特有な脳神経細胞虚血性障害といえるものは見出すことができなかった。

(2) 血管周囲性出血および血鉄色素貪食細胞

心筋梗塞死亡例に限らず、急性期死亡例その他で終末期に起こったとみなされる血管周囲性出血はしばしばみられ、また同時に終末期以前に起こったとみなされる同様な変化を反映する所見として、後述の血鉄色素貪食細胞増生をみることがある。これらについて対象群、対照群を検索した結果が **Table 5～7** である。皮質をみると両群ともにⅢ度以上の変化はなく、Ⅱ度の変化をみると対象群 4 例 (19%)、対照群 3 例 (15%) と明確な差異は認められなかった。次に基底核をみると皮質と同様であり、Ⅱ度をみると対象群 13 例 (62%)、対照群 9 例 (45%) でやや対象群に多く認められた。以上により、基底核では皮質に比較し程度は軽い変化例が明らかに多く認められた。

血鉄色素貪食細胞についてみると、皮質ではⅢ度の

Table 5 Microscopic observation of the studied group

	Age	Sex	Ischemic change of nerve cell		Degeneration of cerebellum nerve cell		Perivascular bleeding		Perivascular hemosiderin laden cell		Rarefaction		Multiple hole formation	
			C	B	Nucleus dentatus	Purkinje cell	C	B	C	B	C	B	C	B
1	41	♀	卅	卅	卅	卅	±	+	+	卅	卅	+	卅	+
2	43	♀	卅	卅	+	+	—	—	—	—	+	+	±	+
3	44	♂	卅	卅	卅	卅	+	+	+	+	+	+	卅	+
4	45	♂	卅	卅	卅	卅	—	+	±	卅	+	±	+	±
5	47	♂	卅	卅	卅	卅	—	+	±	卅	+	卅	+	卅
6	47	♂	卅	卅	+	+	—	+	—	+	—	+	+	+
7	53	♂	卅	卅	卅	卅	—	±	±	+	+	+	+	+
8	55	♂	卅	卅	+	+	—	—	+	—	+	+	+	+
9	59	♀	卅	卅	卅	卅	—	±	±	+	+	卅	+	卅
10	60	♀	卅	卅	+	+	—	—	±	±	±	±	—	—
11	61	♂	卅	卅	+	卅	—	±	±	+	卅	+	+	卅
12	63	♂	卅	卅	卅	卅	—	+	±	卅	卅	卅	—	+
13	64	♀	卅	卅	卅	卅	+	+	+	卅	卅	+	+	+
14	70	♀	卅	卅	+	+	±	+	+	卅	+	+	+	卅
15	71	♂	卅	卅	卅	卅	+	±	卅	+	卅	+	+	+
16	74	♀	卅	卅	+	+	—	+	±	卅	卅	卅	卅	卅
17	75	♂	卅	卅	卅	卅	—	+	+	卅	卅	卅	卅	卅
18	77	♂	卅	卅	卅	卅	—	±	±	+	卅	+	卅	+
19	77	♂	卅	卅	卅	卅	—	±	±	+	卅	卅	卅	+
20	81	♂	卅	卅	卅	卅	—	±	±	+	卅	+	卅	+

C:Cortex and White matter, B:Basal ganglia

Table 6 Microscopic observation of the control group

No.	Age	Sex	Ischemic change of nerve cell		Degeneration of cerebellum nerve cell		Perivascular bleeding		Perivascular hemosiderin laden cell		Rarefaction		Multiple hole formation		PAM flex		Amyloid body		Perivascular softening		Micro cyste		Glia cell reaction	
			C	B	Nucleus dentatus	Purkinje cell	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B
1	45	♂	卅	卅	+	卅	±	±	+	+	卅	卅	卅	卅	±	±	+	卅	+	+	—	—	—	—
2	48	♂	卅	卅	卅	卅	±	+	±	卅	+	+	+	+	—	+	+	卅	+	卅	—	—	—	—
3	50	♂	卅	卅	+	卅	—	±	+	+	+	±	+	+	—	+	+	±	卅	+	—	—	—	—
4	51	♂	卅	卅	卅	卅	+	+	+	+	+	+	+	+	—	+	+	+	卅	+	—	—	—	—
5	52	♀	卅	卅	卅	卅	—	±	—	+	卅	±	卅	卅	卅	卅	+	+	+	卅	—	—	—	—
6	52	♂	卅	卅	卅	卅	—	±	—	+	+	+	+	+	—	+	卅	卅	卅	卅	—	—	—	—
7	53	♂	卅	卅	卅	卅	±	±	—	+	卅	卅	卅	卅	—	+	+	卅	卅	卅	⊕	—	—	⊕
8	55	♀	卅	卅	卅	卅	±	±	+	卅	+	+	+	+	卅	卅	+	卅	卅	卅	—	—	—	⊕
9	56	♂	卅	卅	卅	卅	+	+	+	+	卅	±	卅	+	—	+	卅	—	卅	卅	—	—	—	—
10	57	♂	卅	卅	卅	卅	±	+	+	+	+	+	+	+	—	+	卅	+	+	卅	—	—	—	—
11	58	♂	卅	卅	卅	卅	±	+	+	+	卅	+	卅	卅	±	±	卅	卅	卅	卅	—	—	—	—
12	60	♂	卅	卅	卅	卅	±	±	+	+	+	卅	+	卅	—	+	卅	卅	卅	卅	—	—	—	—
13	60	♂	卅	卅	+	+	±	+	+	卅	卅	卅	卅	卅	—	+	+	卅	+	卅	⊕	—	—	—
14	63	♂	卅	卅	卅	卅	±	±	±	卅	+	+	+	+	—	+	—	卅	+	卅	—	—	—	—
15	68	♂	卅	卅	卅	卅	—	±	+	+	+	卅	+	+	—	+	—	卅	+	+	—	—	—	—
16	69	♂	卅	卅	卅	卅	+	+	±	卅	+	+	+	卅	—	+	卅	±	+	卅	—	—	—	—
17	72	♂	卅	卅	卅	卅	+	+	+	卅	卅	卅	+	卅	—	+	+	+	卅	卅	⊕	—	—	⊕
18	73	♂	卅	卅	卅	卅	+	+	卅	+	卅	+	卅	卅	—	+	卅	卅	卅	卅	⊕	—	—	—
19	78	♂	卅	卅	卅	卅	±	±	+	+	卅	卅	卅	卅	卅	+	+	卅	卅	卅	—	—	—	—
20	80	♂	卅	卅	卅	卅	±	+	±	卅	卅	卅	+	+	—	+	卅	卅	卅	卅	—	⊕	—	—
21	81	♂	卅	卅	卅	卅	—	+	±	卅	卅	+	卅	卅	—	+	卅	卅	卅	卅	—	—	—	—

C:Cortex and White matter, B:Basal ganglia

高度型はみられず、卅度の変化をみると対象群1例(5%), 対照群1例(5%)と差はなく、基底核では皮質と同様であり、卅度の変化をみると対象群10例(48%), 対照群8例(40%)とほとんど差がみられな

かった。

これらのことから、血管周囲性出血および血鉄色素貪食細胞反応についても、心筋梗塞症に特有な変化とはみなされず、死戦期の脳循環障害の結果とみなさ

Table 7 Microscopic observation of the control group

No.	Age	Sex	PAM fleck		Amyloid body		Perivascular softening		Micro cyste		Glia cell reaction	
			C	B	C	B	C	B	C	B	C	B
1	41	♀	—	—	+	+	+	+	—	—	—	⊕
2	43	♀	—	—	±	+	±	+	—	—	—	—
3	44	♂	—	—	+	+	+	+	—	—	—	—
4	45	♂	—	—	+	+	+	+	—	—	—	—
5	47	♂	—	—	+	+	+	+	—	—	—	—
6	47	♂	—	—	—	+	±	+	—	⊕	—	—
7	53	♂	—	—	+	+	±	+	—	—	—	⊕
8	55	♂	—	—	±	±	+	+	—	—	—	⊕
9	59	♀	—	—	+	+	±	+	—	—	—	—
10	60	♀	—	—	+	+	±	+	—	⊕	—	—
11	61	♂	—	—	+	+	+	+	—	—	—	⊕
12	63	♂	+	+	+	+	+	+	—	—	—	⊕
13	64	♀	—	—	+	+	+	+	—	—	—	—
14	70	♀	—	—	+	+	+	+	—	—	—	—
15	71	♂	—	—	+	+	+	+	—	—	—	—
16	74	♀	+	+	+	+	+	+	—	—	—	—
17	75	♂	—	—	+	+	+	+	—	—	—	—
18	77	♂	—	—	+	±	±	+	—	—	—	—
19	77	♂	+	+	+	+	+	+	—	—	—	—
20	81	♂	—	—	+	+	+	+	—	—	—	⊕

C:Cortex and White matter, B:Basal ganglia

れ、基底核に強く現れることが明らかにされた。

(3) 白質の粗鬆化・多孔化, PAM 斑

脳白質粗鬆化は、虚血性脳障害の代表的な病変の一つにあげられ、広範囲性のこともあるが比較的狭い範囲のものが巣状に認められる場合が多く、急死例の検討からみてごく急性に出現したものでなく、ある程度経過のたった虚血性障害とされている。また脳白質に出現する理由として、脳白質が虚血に対し抵抗性が弱いことがその理由とされ、巣状出現は脳循環失調の形態学的反映とみなされている。広範囲性のものの典型は、人工呼吸器を比較的長く使用した例にみられるが、その他でみられることはほとんどない。脳白質粗鬆化は、対象群、対照群の両群ともに軽度の例を含めるとほとんどの例で白質、基底核の両方に認められたが、白質と基底核で程度の異なる例もあった。白質をみると、Ⅱ～Ⅲ度変化は対象群 11 例 (55%)、対照群 10 例 (50%) で、Ⅲ度の高度型のみでは対象群 3 例 (14%)、対照群 2 例 (10%) とほとんど差がみられず、基底核をみると、Ⅱ～Ⅲ度変化は対象群 8 例 (38%)、対照群 6 例 (30%) で、Ⅲ度のみでは対象群 1 例 (5%)、対照群 2 例 (10%) であった。

Ⅲ度の高度変化例は、他の例に比較して脳循環不全がより高度に起こったものとみなされるが、後述の微小嚢胞のようなより重篤な虚血性障害とはいえず、し

かもその例数は少ないといえることができる。Ⅱ～Ⅲ度ともう少し軽い変化を含めてみると、両群ともに基底核より白質に変化例が高率にみられたが、両群間に明確な差異はみられなかった。これらのことから、白質または基底核の粗鬆化は、急性心筋梗塞症に特有な変化とはいえないが、白質に高率に認められるという結果が得られた。

多孔化についてみると、目立つものは status spongiosus と呼ばれ、局所性微小脳質融解の名残りとして理解されており、やはり虚血性脳障害の代表的なものの一つとされている。その出現様相からみて、粗鬆化と同様な発生原因が考えられる。実際に検索した結果は Table 5～7 のとおりで、Ⅲ度の高度型は対象群の白質、基底核に各 1 例で、対照群にはみられず、Ⅱ～Ⅲ度でみると、対照群にも少なからずみられるが、やはり急性心筋梗塞症例のほうが、対照群に比較しわずかに高率にみられるという結果が得られた。

PAM 斑は、老人斑²⁸⁾とは異なる PAM 染色陽性の粗大斑で、矢島により初めて報告され、その後鈴木¹²⁾により詳細な病理学的研究がなされ、急性の脳循環失調の好個の指標であることが明らかにされている。山口¹⁹⁾の脳出血例での検索では、かなり高頻度に認められるとされている。白質をみるとⅡ～Ⅲ度の変化では対象群 3 例 (14%)、対照群 2 例 (10%) で、

基底核での同様の変化は対象群 2 例 (9.5%), 対照群 1 例 (5%) であり, 両群ともにきわめて少数であり, 両群間にほとんど差がみられなかった。

以上より, PAM 斑の高度なものは, 急性心筋梗塞例では発生頻度が低く, また心筋梗塞に特有な所見でないという結果が得られた。

(4) 小脳の歯状核神経細胞および Purkinje 細胞の変性萎縮・脱落

脳循環不全が繰り返されるような基礎疾患で死亡した例では, 小脳の歯状核の神経細胞および Purkinje 細胞の変性萎縮ないし脱落が認められるとされている^{29,30)}。このことは, これらの部における神経細胞変化が, 脳の繰り返される脳循環不全の発生の推定の指標となることを示している。

今回の急性心筋梗塞症群と対照群での観察成績では, Ⅲ度以下の軽度型まで入れると, 小脳歯状核神経細胞の変性・脱落は急性心筋梗塞群 18 例 (86%), 対照群 13 例 (65%) で差は少なかったが, Ⅲ度の高度型のみについてはそれぞれ 9 例 (43%), 2 例 (10%) で明らかな差を認めた。Purkinje 細胞の変化についてもほぼ同様で, Ⅲ度以下でみるとそれぞれ 20 例 (95%) と 14 例 (70%) であったが, Ⅲ度の高度型のみでは 9 例 (42%) と 4 例 (20%) という差がみられた (Table 5~7)。

以上のことから, 繰り返される脳循環不全の有力な指標とされている小脳の歯状核神経細胞および Purkinje 細胞の変性萎縮・脱落については, 対象群により多く認められ, 特に高度型についてみるとこの傾向がはっきりしていた。これらの変化も, 以上の成績から急性心筋梗塞症に特有な変化ではないが, 心筋梗塞症においてやや高い頻度で認められるということを示しているものとみなされる。

(5) 類澱粉小体

類澱粉小体は, 神経細胞軸索の変性によって発生する一種の多糖体蛋白とみなされ, やはり脳の虚血性障害の一つの指標とされているが, 一般に基礎的疾患に関係なく, 脳循環失調が強く起こった例で著明に出現するとされている。PAM 斑が急性の脳循環失調のあったことの指標とされているのに反し, その本態からみて, 類澱粉小体は繰り返される慢性の脳循環失調の存在の指標とされている。対象群について, 本小体の出現様相をみると, 全例に程度の差はあるが存在し, Ⅱ~Ⅲ度変化をみると白質では 10 例 (48%), 基底核では 15 例 (71%) で, Ⅲ度の高度型のみをみる

と白質ではみられず, 基底核では 4 例 (19%) にみられた。次に対照群を同様にみると, Ⅱ~Ⅲ度変化については白質で 5 例 (25%), 基底核で 10 例 (50%) であり, Ⅲ度については白質で 1 例 (5%), 基底核で 2 例 (10%) であった。以上により白質と基底核を比較すると, 基底核により多く出現し, 対象群では対照群に比較しやや多く出現することが認められた (Table 5~7)。

このことから, 急性心筋梗塞例では対照例に比較し, 慢性脳循環不全の起こる率がやや高いことがうかがえる。

(6) 血管周囲性軟化

動脈硬化症, 高血圧性脳症あるいは脳血管障害性病変では, 脳内血管周囲性の軟化により, 血管と脳質の間隙の拡大がしばしば認められる^{17,28)}。ある程度の大きさのものは lacunae³¹⁾と呼ばれ, きわめて多くの血管周囲腔がこのような変化を示す例から, ごく少数がこれを示すにすぎない例まである。

白質, 基底核のいずれかにⅡ~Ⅲ度の変化を示した例は対象群 19 例 (90%), 対照群 13 例 (65%) で対象群に多く, 同様にⅢ度の高度型のみでは対象群 8 例 (38%), 対照群 4 例 (20%) とこれもやや対象群が多かった。また白質と基底核を比較すると, 基底核のほうが程度, 例数において白質をしのいでいた。しかしながら, この変化は高齢者, 特に高血圧高齢者ではしばしば認められるもので, 急性心筋梗塞例に特有な変化とはみなし難いが, 対照群に比較すればやや高率にみられるという所見であった (Table 5~7)。

(7) 微小嚢胞, 神経膠細胞反応

肉眼的に梗塞性障害後の嚢胞化が認められなくても, 顕微鏡的に微小嚢胞がみられる場合があり, 一般に脳動脈硬化の高度な高血圧既往のある老年者に多くみられるとされている²⁴⁾。

白質, 基底核の両方またはその片方にみられた例は対象群 5 例 (24%), 対照群 2 例 (10%) で, 少数例ではあるが対象群にやや多くみられた。このことは, 微小範囲にとどまるとはいえ, 急性心筋梗塞群が, 対照群に比較して梗塞性病変を起こしやすいことを示しているとみなされる。しかし, 脳血管障害性病変の一方の代表である脳出血群で検索した山口¹⁹⁾の報告では, 23 例中 8 例 (35%) に認められたとされており, 明らかに急性心筋梗塞群より上回っている。これに比較すれば, 急性心筋梗塞群における微小嚢胞の出現はより低率であるといえる。

微小嚢胞と同じような意義を持つものに脳質内神経膠細胞反応がある。これは微小梗塞病巣の修復像として、泡沫細胞や神経膠細胞の微小増殖巣をみるものである。この反応はすべて基底核にみられ、対象群3例(14%)、対照群4例(20%)とほとんど差がなかった。山口によると、脳血管障害性病変、特に脳出血例では23例中12例(52%)に認めるとされている(Table 5~7)。

(8) 脳内動脈硬化

肉眼的に脳に梗塞性病変を認めた群では、特に梗塞症病巣支配動脈に様々な動脈硬化性病変を認めたが、その所見は福井¹⁹⁾が行った研究成績とほぼ同様であったので詳しい記載は省略する。

肉眼的に梗塞性病変を認めなかった群では、一般に動脈硬化性病変は軽度で拡張性硬化にとどまっていた。しかし、微小嚢胞や血管周囲性軟化を著明に示した例では、拡張性硬化の程度がより高度で、内膜線維型や細小動脈硬化型も認められた。特にこの傾向は基底核部において目立っていた。対照群の脳内動脈には、高度な内膜線維型や微小動脈瘤その他の特殊動脈硬化症はほとんど認められず、年齢に相当した拡張性硬化型のみであり、対象群のうちでも脳の比較的高度の虚血性障害を示す例とは明らかな差を示していた。

(9) 神経症状

通常、脳が障害を受けると、臨床的にその障害部位に相当する神経症状を示すことが知られている。ところが意識消失、片麻痺、共同偏視などの局所神経症状を示しながら剖検上脳に肉眼的に病変を認めない例が存在し、同時に心に心筋梗塞を頂点とする虚血性病変が存在する場合があり、これを沖中ら^{2,8)}は心脳卒中と呼んだ。そこで心脳卒中を解明する上で、この神経症状と肉眼的脳梗塞群および非脳梗塞群の各所見との対比が非常に重要なものとなるように考えられる。

肉眼的脳梗塞群についてみると、多発梗塞群では8例中4例(50%)に神経症状が認められ、その内訳は右片麻痺3例、左片麻痺1例、言語障害1例、見当識低下などの精神症状を示した例が1例で、右片麻痺例のうちには言語障害を示した例と視力障害を同時に示した例が含まれている。これらのうちの3例(右片麻痺2例、言語障害1例)は、心と脳に急性障害を示す心脳卒中例といえる症例であった。また単・少梗塞群では5例中3例(60%)で、その内訳は右片麻痺2例、眩暈1例となり、脳障害の主なものとは陳旧性であ

った。以上のうち、脳に梗塞性病変があっても神経症状を示さなかった症例についてその理由としては、急性心筋梗塞によるショック状態のために所見がとりにくく、経過が非常に早かったことなどが考えられる。したがって今回の検索における神経症状は、はっきりした症状を示したものだけを取り上げた。

次に肉眼的に脳に梗塞性病変を認めなかった群では、神経症状はすべて意識消失発作、片麻痺、言語障害、知覚異常などの一過性のものであり、これは臨床的な心脳卒中例ともいべき症例であり、対象群に5例(24%)認められた。顕微鏡所見との関連をみると、項目により卅度の高度型を示す例もみられたが、神経症状を示さない例の所見と明確な差異のみられない例もあった。

考 察

心脳卒中は、臨床症状の上から沖中ら^{2,8)}により初めて提唱され、その後藤井ら^{4,6)}により、より詳細な病像が紹介されたが、その後内外ともに研究報告はほとんどなく、わずかにごく最近当教室の飯田⁷⁾、加藤⁹⁾の研究がみられるのみである。これらの研究では、脳の血管障害性病変群にみられる心その他の重要臓器の動脈硬化性虚血性病変という観点から検索が行われた。そこで著者は、すでに緒言において述べたように、急性期心筋梗塞死亡例にみられる脳病変について検討し、飯田、加藤の研究によって得られた結論の再吟味を行うことを試み、以下に述べるような所見を得たので、いくつかの重要点について考察を加えてみたい。

1. 従来の心筋梗塞症例にみられる脳血管障害性病変に関する報告と著者の肉眼所見の比較

急性心筋梗塞症例における脳の血管障害性病変の病理学的研究はきわめて少数であり、比較的まとまったものとしては以下の報告が挙げられるにすぎない。すなわち、Dozzi¹⁰⁾は心筋梗塞症による死亡例41例中12例(29%)に、Peterら¹⁴⁾は急性心筋梗塞症による死亡例783例中255例(33%)にこれらを認めたとしている。これらをまとめてみると、急性心筋梗塞症における脳の血管障害性病変の合併率は、 $31 \pm 2\%$ と約1/3となる。著者の急性心筋梗塞症例の脳の検索では、多発梗塞群8例(22%)、少・単梗塞群5例(14%)で合計13例(36%)となり、ほぼ前述の他の報告と同様な結果であった。しかしながら例外として、

Fig. 1 Macroscopic observation of the acute myocardial infarction group and the control group

中大脳動脈破裂によるクモ膜下出血が1例あり、一過性に心筋梗塞曲線を示したが間もなく消失し、冠不全曲線に移行した異常型であった（一過性心筋梗塞症）。

以上の著者以外の研究報告では、脳の梗塞症性病変を示さなかった症例について、全く病理組織学的検索は行われていない。著者の教室で行われたこれまでの脳の血管障害性病変の病理組織学的研究¹⁸⁻²⁵⁾では、肉眼的に著明な変化を認めない例にも、虚血性ないし亜梗塞性変化がきわめてしばしば認められることが明らかにされている。そこで著者は肉眼的に梗塞性病変を示さなかった非梗塞群について、脳各部の詳細な病理組織学的検索を行い、このような病変がどの程度に出現し、それらのうちには心筋梗塞に特有な変化といえるものがあるか否かについて追求してみた。

2. 心筋梗塞症非脳梗塞群における脳の虚血性ないし亜梗塞性病変

従来からの当教室での脳の血管障害性病変の研究から、著者は Table 5~7 に示した各種病変について検討してみた。以下これらの各病変についての検索結果を総括する (Fig. 1)。

(1) 脳神経細胞の虚血性障害

急性心筋梗塞症例での発作後およびその後の重篤な状態後に死亡した例でも、他の原因で死亡した例でも、死戦期には高度の脳循環失調が発生すると考えられ、それにより脳の神経細胞が虚血性変性を起こすことが知られている。急性心筋梗塞症例の脳の神経細胞

をみると、基底核のほうが皮質より強い変性におちいっているが、ほとんどの例で高度の神経細胞の変性、脱落を認めた。しかし対照群でも同様のものが認められ、その差はほとんどなかった。一方、脳循環障害の高度に起こる脳出血例についての山口の報告でも同様の所見を報告しており、その差はほとんど認められなかった。

(2) 脳の血管周囲性出血、血鉄色素貪食細胞

いわゆる終末期から死戦期にかけては、血管周囲性出血が認められ、その反応として血鉄色素貪食細胞の出現がみられることがある。血管周囲性出血をみると、出血の程度は軽いが、急性心筋梗塞群では全例にみられ、基底核にやや出血程度が強くみられた。対照群では出血がほとんどみられない例がいくつかあったが、出血がみられた例では心筋梗塞とほぼ同じ内容であった。血鉄色素貪食細胞出現では高度のものではなく、より軽度のものをみると基底核に明らかに出現頻度が高いが、心筋梗塞例と対照例との差はほとんどみられなかった。

以上のことから、血管周囲における急性の小出血、あるいはその後遺症である血鉄色素貪食細胞反応は、急性心筋梗塞群に特有な所見ではなく、死戦期の脳における急性脳循環障害のためのものとみなされ、基底核にやや強くみられることが明らかにされた。

(3) その他の脳白質における虚血性亜軟化性変化

急性の脳循環障害の結果として、脳白質にはやや陳旧化した虚血性障害を起こしてくるが、その代表的な

ものが白質の粗鬆化・多孔化、および PAM 斑とされている。まず白質の粗鬆化についてみると、この変化は脳白質が虚血に対し抵抗が弱いことによるとされ、巣状出現は乱れた脳循環の反映とみなされる。極端型として広範囲性のものがあり、人工呼吸器を比較的長く使用した例にみられ、その他でみられることはほとんどない。やや高度な巣状粗鬆化を起こした例をみると、急性心筋梗塞群で 4 例 (19%)、対照群で 2 例 (10%) といずれも少数であった。山口の脳出血例 23 例中では 20 例 (87%) とされているが、これに比較して明らかに少なかった。

同様に多孔化についてみると、急性心筋梗塞例で 2 例 (10%)、対照群では認められなかった。これに反し山口の脳出血例では、23 例中 18 例 (78%) と高率であった。以上のとおり本病変は、急性心筋梗塞群と対照群を比較した場合にはわずかに前者に多いという結果であった。

次に PAM 斑をみると、高度な変化は前述の粗鬆化・多孔化と同じくごく少数にしかみられず、急性心筋梗塞群で 3 例 (14%)、対照群で 2 例 (10%) と少数であった。これに反し山口の脳出血例では 23 例中 17 例 (74%) とかなり高率に出現していた。

以上の各病変の急性心筋梗塞群と脳出血群での頻度の著しい差は、脳出血群では直接的に脳循環の障害が強く起こるとみなされているのに反し、心筋梗塞症では多くの例で間接的な脳循環不全しか起こらないためと推測される。

(4) 類澱粉小体

本小体は、脳の虚血性障害のうちで脳循環失調が繰り返して強く起こった例で著明に出現するとされている。このような繰り返される慢性の脳循環失調存在の指標とされている類澱粉小体についてみると、対象群、対照群のいずれにも全例にある程度の変化が認められたが、高度のものについてみると、急性心筋梗塞群で 4 例 (19%)、対照群で 2 例 (10%) で、急性心筋梗塞群にわずかに多くみられた。このことは心筋梗塞症が対照群に比較すれば、慢性脳循環不全の起こる率がわずかに高いということを示しているものとみなされる。

(5) 小脳神経細胞の虚血性障害

小脳の神経細胞も (1) と同様の変性を起こすことが矢島⁸⁰⁾、浅野⁸⁰⁾により報告されている。著者の検索結果では、心筋梗塞群のほうが対照群よりやや強い変化がみられたが、これは心筋梗塞に特有の所見ではな

く、重田²⁵⁾の研究においても糖尿病群と非高血圧、非病変群の間に同様の差があることが示されていた。

以上のことから、(1)、(2) に述べた神経細胞の虚血性病変は、心筋梗塞のような急激な循環障害をきたす疾患では、そうでない例に比較してわずかながら変性の程度が強いが、脳出血についての山口¹⁰⁾の研究、また糖尿病性脳障害についての重田²⁵⁾の研究にも同様な所見が示されており、必ずしも心筋梗塞に特有な所見ではないものとみなされる。部位的には、基底核に変性の程度が強いということも、現在までに同様の報告^{88,89)}が数多くあるところと一致するものである。

(6) 脳の軟化性変化

前述の (1)～(5) の障害より、より高度の虚血性病変として血管周囲性軟化、微小嚢胞、脳内神経膠細胞反応などの顕微鏡的軟化性変化が生じてくる。血管周囲性軟化の非常に大きな例は lacunar stroke^{35,40,41)} という臨床的な神経症状を呈するが、今回の検索で顕微鏡的に目立つ変化を示した例をみると、急性心筋梗塞群で 8 例 (38%)、対照群は 4 例 (20%) であり、山口の脳出血例では 23 例中 16 例 (70%) と高率であった。このことから、心筋梗塞群では対照群より高頻度にみられたが、脳出血例より著しく少なく、なお高齢者剖検例によくみられることから、心筋梗塞症例に特有な変化ではないといえる。

微小嚢胞をみると急性心筋梗塞群で 5 例 (24%)、対照群で 2 例 (10%) と少数であり、山口の脳出血例では 23 例中 8 例 (35%) にみられた。この微小嚢胞は、一般に脳動脈硬化の高度な高血圧既往のある老年者に多くみられるとされ、この結果もやはり心筋梗塞に多くみられ、さらに脳血管障害性病変の強い脳出血例で多くみられたのは当然のことと思われ、ほかに重田²⁵⁾も糖尿病、高血圧例で同様の報告を行っている。

次に脳質内神経膠細胞反応をみると、急性心筋梗塞群で 3 例 (14%)、対照群で 4 例 (20%) とこれも少数であり、山口¹⁰⁾の脳出血例では 23 例中 12 例 (52%) にみられた。これらから脳質内神経膠細胞反応もやはり心筋梗塞症特有の所見ではなく、対照群でむしろ高い数値を示した。

以上、著者は急性心筋梗塞群と対照群の脳の虚血性ないし亜梗塞性障害とされている代表的な各種病変について述べた。このうち、重要なものについては、脳血管障害性病変の一つの代表である脳出血群についての山口の同様な各病変についての観察成績と対比した。これらを要約すると以下のとおりとなる。

白質にみられる急性脳循環不全の代表的変化とされる PAM 斑については、急性心筋梗塞群と脳出血群では著しい出現頻度の差を示していた。すなわち前者では皮質の白質で 14%、基底核で 10% であったのに比較し、後者の山口の脳出血群では両者を含めて 74% という高頻度を示していた。また慢性の脳虚血性障害の重篤型である微小嚢胞ではそれぞれ 24% と 35% と少し差が認められ、神経膠細胞反応についてもほぼ同様の差がみられている。

以上のことは、きわめて重要な急性心筋梗塞症での脳循環不全性障害の発生様相を示唆しているように思われる。すなわち、急性心筋梗塞では軽微ないしある程度の虚血性障害を引き起こすような脳循環障害の発生はみられるが、それは対照群とほぼ同等かやや上回る程度のものであるのに反し、脳の直接的循環障害を引き起こす脳出血では、急性心筋梗塞群、対照群をはるかに上回る脳循環障害性病変が発生することが明らかに示されているといえるのである。

(7) 脳内動脈

肉眼的に脳に梗塞性病変を認めなかった群では動脈硬化性病変は軽度で、拡張性硬化にとどまっていた。しかし、顕微鏡的に軟化性変化を著明に示した例では、拡張性硬化がより高度で、内膜線維型や細小動脈硬化型も認められ、特に基底核部にこの傾向が強かった。この動脈硬化と梗塞性変化が基底核部に強いということに関しては多数の報告^{88,89)}がみられる。

(8) 神経症状

脳に器質的障害を起こすと、その部位に対応する局所脳神経症状を示すのは周知のとおりであるが、臨床的に神経症状を示しながら剖検上脳に肉眼的な梗塞巣を見い出せなかった例で、心に重大な虚血性病変があるものを心脳卒中と呼んでいるのはすでに述べたとおりである。ここでは片麻痺、言語障害などを神経症状として一括し、肉眼的、顕微鏡的脳の変化と対応させて心脳卒中を考察する。

多発梗塞群では、心と脳に陳旧性梗塞性病変とともに明らかな新鮮梗塞性障害を示し、臨床的にも心と脳の障害による症状を呈したものが 8 例中 3 例 (38%)、少・単梗塞群では 5 例中 1 例もなく、両群を合計した肉眼的梗塞群としては 13 例中 3 例 (23%) に認められた。これらの例は、臨床的のみならず病理解剖学的な観点からも心脳卒中といえるものとみなされる。著者はそういう意味で病理解剖学的心脳卒中例と名付けた。一方、非脳梗塞群では肉眼的に全く脳梗塞所見

を示さず、顕微鏡的観察でなんらかの脳血管障害性虚血性病変を認めるにすぎないのに、一過性ではあるが神経症状を呈した例があった。このような症例は、脳については脳卒中性病変が存在するとはいえない。しかし、臨床的な観点からは心脳卒中症状を呈したといって差し支えないように思われる。このような観点から、このような症例を前者と対比させて臨床的心脳卒中と著者は名付けた。

以上のほかに、心筋梗塞には新鮮病巣があるが、脳には陳旧性梗塞巣のみという症例があったのは前述のとおりである。病理解剖学的には、心脳卒中と呼んで差し支えないように思われるが、臨床的には心と脳の梗塞性病変が同時に発生したとは限らないので、心脳卒中症状を示したか否か不明である。したがって、このような症例は前述の病理解剖学的心脳卒中と同列に置くことはできないので、著者は広義の病理解剖学的心脳卒中と呼び狭義の病理解剖学的心脳卒中と区別した。これらのことを考慮して著者の症例と他の報告を検討してみる。

臨床的心脳卒中は一過性脳虚血発作^{86,42)}と考えてよく、肉眼的に脳に梗塞性変化をみないが、顕微鏡的には変化を認め、森⁸⁷⁾、塚越⁸⁸⁾らも同様の報告をしている。

病理解剖学的心脳卒中で狭義のものは、心筋梗塞 43 例中 3 例 (7%) ときわめて少なく、年齢も 69 才以上と高齢であり、小沢ら⁸⁹⁾が 122 例中 15 例 (12.4%) で著者の報告より多かったのは母集団が老人病院であったためと思われる。

以上の研究成績より、心脳卒中は心と脳に同時に致命的、ないしそれに近い急性循環障害性病変を認める真の意味での病理解剖学的な多臓器虚血性病変の極型であって、きわめてまれにしか認められないものであるといえよう。しかしながら、急性心筋梗塞例では重篤な虚血性脳障害である病理解剖学的心脳卒中を示すことはまれであるが、病理学的所見が乏しく脳の肉眼所見が認められるに至らないより軽度なものは、きわめて多数の例に認められるという結論が得られたものとみなされる。

結 論

本報告は、心脳卒中を解明するにあたり、急性心筋梗塞症剖検例にみられる脳の血管障害性病変の解析という観点から行われたものの成績で、以下のような結

論が得られた。

1) 急性心筋梗塞症 35 例の脳について、肉眼的に認められた障害は多発小梗塞 8 例 (23%)、少・単梗塞 5 例 (14%) であり、多発小梗塞例には 3 例 (9%) の新鮮脳梗塞症を伴うものがみられたが、少・単梗塞例はすべて陳旧性のものであった。また特別な例として、クモ膜下出血例が 1 例認められた。残りは肉眼的に変化を認めない無変化例 21 例 (60%) であった。

2) 冠動脈血栓好発部の冠動脈硬化症および血栓については、すでに教室から報告されている結果と全く同様な成績が得られた。中大脳動脈の血栓好発部のこれらの変化についても同様であった。

3) 肉眼的無変化例と対照例について、詳細な顕微鏡的検索を以下の項目について行った結果、多彩な虚血性ないし亜梗塞性変化を認めた。しかしこれらは、いずれも心筋梗塞症に特有のものではなく、対照群に比しやや頻度が高いとしかいえなかった。

4) 脳神経細胞の変性・萎縮は、対象群、対照群ともに全例に認められ、終末期から死戦期の脳循環障害によるものとみなされた。血管周囲性出血および血鉄色素貪食細胞反応についても同様で、対象群にやや多い結果であった。また PAM 斑は対象群 (14%)、対照群 (10%) とともに低率で、他の報告の脳出血群との間に著しい差を認めた。

5) 脳の白質、基底核の粗鬆化・多孔化は、両群ともに認められ、対象群にやや多い結果であった。

6) 繰り返される脳循環障害による虚血性変化の有力な指標となる小脳の歯状核の神経細胞と Purkinje 細胞の変性萎縮・脱落も両群で認められ、対象群でやや高率であった。類澱粉小体についても同様の成績が得られた。

7) やや高度の脳の虚血性障害である血管周囲性軟化、微小嚢胞、神経膠細胞反応についても対象群にやや多いという結果であった。これらの変化は、基底核部に発生する頻度が高かった。微小嚢胞について、山口の脳出血例での成績と対比した結果、脳出血のほうが高頻度である成績が得られた。

8) 脳の神経細胞障害症状について調べたところ、肉眼的脳梗塞症群のみでなく、肉眼的無変化群にも少数ではあるが、これを示すものがあることが明らかにされた。

9) 以上のことから、急性心筋梗塞症では、肉眼的無変化例でも顕微鏡的には各種の虚血性ないし亜梗塞

性病変の発生が認められ、多くは対照例に比しやや高い頻度を示したが、心筋梗塞症に特有なものではなかったこと、および脳の直接的循環障害の一つの型である脳出血例に比べれば、はるかに低い率であることが明らかにされた。

10) 臨床症状と病理学的所見から、病理解剖学的な例として心脳卒中には脳と心に同時に急性障害を示す狭義のものと、一方に急性障害があり他方に陳旧性の障害をみる広義のものがあり、さらに一方に急性障害があり、他方には肉眼的変化を認めない臨床的心脳卒中があるという結論を得た。

稿を終るにあたり、本研究に御協力いただいた本学第 1 病理学教室益田幸成副手ならびに同教室員各位、第 2 病理学教室松山郁夫研究技術員ならびに同教室員各位、中央検査室病理の研究技術員各位に深甚の謝意を表する。

なお、本論文の要旨は昭和 53、54 年、第 10、11 回日本動脈硬化学会においてそれぞれ発表した。

文 献

- 1) 厚生統計協会：人口動態。厚生指標，28，(9)，46～85，1981。
- 2) 沖中重雄：脳の血管障害。p. 139～145，最新医学社，大阪，1955。
- 3) 沖中重雄，藤井潤：心脳症候群。日臨，16，1352～1360，1958。
- 4) 藤井潤，小沢利男：心脳卒中。最新医，16，2499～2506，1961。
- 5) 藤井潤：心筋梗塞のすべて（沖中重雄編）。第 2 版，p. 89～92，南江堂，東京，1979。
- 6) Dozzi, D.L.: Unsuspected coronary thrombosis in patients with hemiplegia; Clinical study. Ann. Intern. Med., 12, 1991～1995, 1939。
- 7) 飯田正美：心脳卒中および虚血性心脳症の病理学的研究；脳血管障害例の心臓の病理学的検索。日医大誌，46，241～249，1979。
- 8) 加藤仁志：心脳卒中および虚血性心脳症の病理学的研究；脳血管障害例の腎臓，脾臓および副腎の検索。日医大誌，46，365～376，1979。
- 9) 勝木司馬之助：久山町研究。日内会誌，60，3～17，1971。
- 10) Aronson, S.M., and Aronson, B.E.: Ischemic cerebral vascular disease. N.Y. State J. Med., 66, 954～957, 1966。
- 11) 岡部信彦：脳動脈硬化と脳血管障害。綜合臨，27，23～28，1978。
- 12) 鈴木恒道：中枢神経系に出現するいわゆる PAM 斑について。日医大誌，40，79～89，1973。
- 13) 五味淵誠，矢島権八：動脈硬化性心疾患における冠動脈の病理組織学的研究。日医大誌，44，84～95，1977。
- 14) 石井精一：中大脳動脈基幹部の動脈硬化性病変に関する病理組織学的研究。日医大誌，42，127～135，1975。
- 15) 武谷止孝：神経病理組織学入門。p. 76～112，医学書院，東京，1975。

池庭論文付図(1)

池庭論文付図(2)

池庭論文付図（3）

- 16) 平野朝雄：神経病理を学ぶ人の為に。p. 112～157, 医学書院, 東京, 1976.
- 17) Greenfield, J.G.: Greenfield's Neuropathology. 3rd ed., p. 1～147, Edward Arnold, London, 1976.
- 18) 福井庸夫：脳軟化における脳血管硬化性病変の病理学的研究。日医大誌, **32**, 66～77, 1965.
- 19) 山口裕敬：脳出血例における軟化性病変の研究。日医大誌, **36**, 368～382, 1969.
- 20) 佐藤洋一：脳の血管障害の病理学的研究。日医大誌, **37**, 26～37, 1970.
- 21) 佐藤洋一：脳の血管障害の病理学的研究。第2編 腎及び脳動脈の病理組織学的検討。日医大誌, **37**, 38～44, 1970.
- 22) 中島興治：脳血管障害性病変の病理形態学的研究；とくに脳静脈系の変化について。日医大誌, **39**, 402～413, 1972.
- 23) 矢島権八, 福井庸夫, 佐藤洋一, 金川卓郎, 中島興治, 山口裕敬：脳卒中とは（病理面から）；特に脳出血について。今日の医学, **49**, 4～28, 1972.
- 24) 矢島権八：脳卒中とは（病理面から）；特に脳軟化について。今日の医学, **50**, 1～29, 1972.
- 25) 重田俊一：糖尿病患者における脳血管障害性病変の病理学的研究。日医大誌, **48**, 377～392, 1981.
- 26) 武谷止孝：脳の病理組織標本の作り方。第2版, 金原出版, 東京, 1951.
- 27) 矢島権八, 相原薫, 小野正博, 五味淵誠, 太田真夫, 田近豊一郎：心筋梗塞症非血栓例における血栓準備状態（矢島）の光顕的ならびに電顕的研究。動脈硬化, **5**, 267～273, 1977.
- 28) 平野朝雄：神経病理を学ぶ人の為に。p. 107～110, p. 180, 医学書院, 東京, 1976.
- 29) 矢島権八：代表的腎性高血圧症例における他臓器の変化及びその意義；病理形態学的研究。最新医, **19**, 3062～3093, 1964.
- 30) 浅野伍朗：低酸素脳の実験病理学的研究。日医大誌, **37**, 108～120, 1970.
- 31) Fisher, C.M.: Lacunes; Small, deep cerebral infarcts. Neurology (N.Y.), **15**, 774～784, 1965.
- 32) Thompson, P.L., and Robinson, T.S.: Stroke after acute myocardial infarction; Relation to infarct size. Br. Med. J., **II** (6135), 457～459, 1978.
- 33) 亀山正邦, 山之内博：脳梗塞の部位別にみた成因の検討。日老会誌, **14**, 375～380, 1977.
- 34) Büchner, F.: Das Hirn bei allgemeinen Durchblutung und Atmungsstörung. p. 37～58, 医歯薬出版, 東京, 1963.
- 35) 緒方絢：脳動脈硬化症の臨床；Lacunar stroke について。動脈硬化, **6**, 389～393, 1979.
- 36) 海老原進一郎：一過性脳虚血発作。“脳卒中のすべて”（沖中重雄編），p. 129～142, 南江堂, 東京, 1973.
- 37) Mori, K., Hasegawa, T., Araki, G., Hirai, S., Murakami, K., Sato, N., Yoshida, K., Kato, M., Tatsuzawa, Y., and Goto, Y.: A clinical evaluation of transient focal cerebral ischemia with some comments on its concept. Jpn. Circ. J., **29**, 847～854, 1965.
- 38) 塚越広：一過性脳虚血発作の臨床と病理。老年病, **8**, 538～542, 1965.
- 39) 小沢利男：Cardiocerebral apoplexy。“脳卒中のすべて”（沖中重雄編），p. 153～162, 南江堂, 東京, 1973.
- 40) 山口武典：Lacunar stroke. Medicina, **15**, 62～63, 1978.
- 41) 田崎義昭：ラクーネ発作。“神経病学”（田崎義昭, 吉田充男編），p. 284, 医学書院, 東京, 1981.
- 42) 荒木淑郎：神経病学。p. 69, 76～79, 金芳堂, 京都, 1980.

写真説明

写真 1	神経細胞虚血性変化 前頭葉, LFB 染色, 10×10
写真 2	歯状核細胞変性萎縮 LFB 染色, 20×10
写真 3	ブルキニエ細胞変性萎縮 HE 染色, 10×10
写真 4	血管周囲性出血 基底核, LFB 染色, 20×10
写真 5	粗鬆化 基底核, LFB 染色, 4×10
写真 6	白質多孔化 基底核, LFB 染色, 10×10
写真 7	PAM 斑 白質, PAM 染色（矢島変法）, 20×10
写真 8	類澱粉反応 血管周囲貪食細胞・軟化粗鬆化, 基底核, PAM 染色, 4×10
写真 9	微小嚢胞 基底核, LFB 染色, 4×10
写真 10	神経膠細胞反応 基底核, Holzer 染色, 40×10

（受付：1982 年 4 月 14 日）