— 原 著 —

Mallory body (アルコール硝子体) 形成機序に関する研究

DDC 投与によるマウス肝の形態的変化を中心に

角尾 知砂

日本医科大学第1病理学教室 (主任: 矢島権八教授)

Studies of Mallory body formation in DDC-fed mouse model

Chisa Tsunoo

The First Department of Pathology, Nippon Medical School

Male mice were fed a diet containing various concentrations of 3,5-diethoxycarbonyl-1,4-dihydrocollidine (DDC) for 20 to 95 days. The livers of the mice were examined by light, electron and fluorescent microscopy. The following results were obtained:

1) Mice fed daily a diet containing more than 0.1% DDC developed Mallory bodies (MBs) after 40 days regardless of the DDC concentration in the diet. After 60 days, MBs were more numerous in the mice fed higher concentrations of DDC. Some of the mice fed 0.05% DDC for 40 to 60 days developed MBs following an additional treatment of 2.5% DDC for 3 days. These results suggest that the formation of MBs in this animal model may involve two successive processes of cellular alteration which are termed priming and induction. Priming is the initial state which is time-dependent, whereas induction is the second stage which appears to be dose-dependent. During the priming stage marked hepatomegaly was observed and by light microscopy pale swollen hepatocytes were noted. In this stage the electron microscopic and immunofluorescent studies revealed that intermediate filaments (IFs) were increased in the hepatocytes. In the induction stage hepatomegaly was not as marked as that in the priming stage. At this stage MBs were observed in grossly misshapen hepatocytes. By immunofluorescent microscopy, MBs strongly reacted with anti-prekeratin antibody. However, the cytoplasmic stains of MB-containing hepatocytes were markedly decreased or totally absent. These observations suggest that the induction of MBs is caused by the aggregation of IFs, which are increased during the priming stage.

2) MBs in the livers of mice fed DDC completely disappeared after the withdrawal of DDC from the diet for about 10 weeks. MBs reappeared in this group of mice following challenge of a higher concentration of DDC for one week.

3) These events in the animal model might be analogous to the development of alcoholic hepatitis in patients with a history of heavy drinking for many years (priming) whose admission to the hospital was immediately preceded by a binge drinking (induction).

4) It is probable that cytoskeletal changes similar to those observed in this animal model also occur in patients with alcoholic hepatitis and that those changes may constitute a major pathogenic factor of cell injury and necrosis in alcoholic liver disease.

Key words: alcoholic hepatitis, Mallory body, cytoskeleton, prekeratin intermediate filament, 3,5-diethoxycarbonyl-1,4-dihydrocollidine (DDC)

緒 言

アルコール性肝障害の病態研究において、アルコールが肝細胞を変性・壊死に至らしめアルコール性肝炎を来す過程は線維増生を来し、非可逆的な肝硬変へと進行する経過を考える上で極めて重要な部分であるが、いまだにその機序は明らかにされていない。

病勢の進展には、アルコール自体の作用のほかに、栄養障害、遺伝的素因、免疫反応の関与などが複雑に絡み合っていると考えられるが、アルコール性肝障害は長期にわたる緩徐な変化の積み重ねであるため、人間でのその機序の検索は難しい。

そこで、多くの動物実験モデルが考案され、最近では Popper and Lieber¹⁾によるマントヒヒ (baboon) を用いての実験が報告されているが、現在のところアルコール性肝炎の実用的実験モデル²⁾は開発されていない。

Mallory body (アルコール硝子体, 以下 MB と略す) は、1911 年 Mallory³⁾がアルコール性肝炎の組織学的特徴をなすものとして発表して以後、種々の病態でもみられることが報告されてきているが⁴⁻¹⁸⁾、重症の急性アルコール性肝炎での出現率が高いことから¹⁴⁾、MB 形成と肝細胞障害とは密接な関係にあると考えられ、今なおその形態診断に重要な位置を占めている。

Yokoo ら¹⁹⁾が MB の filament 構造を電顕にて分類したことに始まり、近年 Franke ら¹⁶⁾、Denk ら¹⁷⁾により MB の主なる構成成分が intermediate filament (以下 IF と略す) であることが認められた。さらに蛍光抗体間接法により、現在五つに分類されている IFs の中でも prekeratin intermediate filament (以下 PK-IF と略す) であることが分かってきた。

cytoskeleton としての actin, myosin, microtubule, IF の研究^{18,19)}の急速な進展とともに、これらの細胞内 filament が細胞の形態維持、可動性、分裂などのみならず、細胞の分泌^{20,21)}などの機能にも重要な役割を果たしていることが明らかになってきていることから、cytoskeleton の変化と肝細胞障害との関係を検索することは新しいアプローチと思われる。

1975 年 Denk ら²²⁾は、griseofulvin を使ってマウス肝に MB を形成する実験系を確立し、1980 年 Borenfreund ら²³⁾は diethylnitrosamine によるラット肝癌の培養細胞に MB 様構造を形成することに成功している。また、1982 年 Yokoo ら²⁴⁾は、3,5-die-

thoxycarbonyl-1,4-dihydrocollidine (以下 DDC と略す) を食餌投与することにより、griseofulvin よりも少量かつ短期でマウス肝に MB を作る実験モデルを確立した。しかしながら、これらの実験モデルは、MB 自体の分析が主なるもので、MB の肝細胞障害における役割については検索がなされていない。MB の形成過程は、これらの動物肝でも、ヒト・アルコール肝でも同様と考えられ、アルコール以外の物質で動物に MB が形成される過程を検索することにより、ヒト・アルコール性肝炎における肝細胞障害機序の一部を解明できるものと考えた。

そこで著者は、DDC を用いてマウス肝での MB 形成過程を、光顕、電顕、蛍光抗体法を用いて観察した。

実験材料および方法

(1) 実験 1 DDC 食餌投与による経時的観察

体重 25~35 g の雄マウス [CrI-CD 1 (1 CR) B6 mice, Charles River Breeding Laboratories, Wilmington, MA (USA)] を 6 匹ずつのケージに入れ、1 週間、ビスケット状の正常食にて (Mouse Chow, Ralston Purina 社) 環境に慣れさせた後、種々の濃度 (0.025, 0.05, 0.1, 0.5, 2.5% および 5.0%) で DDC を含むビスケット状の食餌を与え (以下 0.05% DDC 食のように記す)、0, 20, 40, 60, 80 日または 95 日目にエーテル麻酔下で屠殺した。コントロール群は正常食のまま同じ日数で屠殺した。すぐに体重を測定した後、開腹し、下大静脈より血液を採取して、肝臓を切り取り、その重量を測定した。取り出された肝標本は、既存の方法に従って 10% ホルマリン液固定により光顕標本用に、2% グルタルアルデヒド液 (0.1 M リン酸緩衝液, pH 7.2) 固定により電顕標本用に、また液体窒素内での凍結標本を作り、-70°C 保存により蛍光抗体用に各々供された。

(i) 光顕標本は、既存の方法に従い、Hematoxylin Eosin 染色 (HE 染色)、Masson's trichrome 染色、periodic acid Schiff 染色 (PAS 染色) および PAS with diastase 染色をして、MB 形成の有無を中心に光顕的に観察した。

(ii) 電顕用の標本は、既存の方法でエポン包埋し、1 μ 切片はトルイジンブルーで染色し、600~800 Å の超薄切片は酢酸ウラニルとクエン酸鉛の二重染色をして、Phillips 301 electron microscope により電顕的に観察した。

(iii) 種々の濃度の DDC 食群における全体重、肝重量を経時的に測定し、またさらに肝重量の変化を明確にするため、肝重量の全体重に対する比率（以下 LW/BW と略す）も検討した。

(iv) 肝重量の増加をさらに体積的に分析するために、morphometric study がなされた。すなわち、HE 染色および Masson's trichrome 染色された切片の写真を撮り、最終倍率 1,230 倍の写真を 6 枚作って表面に 567 個 (27×21) の点を打ち、肝細胞の細胞質の点の合計 (C)，および肝細胞の核の点の合計 (N) を測定した。平均 C/N×肝重量 (LW) を肥大の指標に、平均 N/N+C×LW を過形成の指標に取り、肥大および過形成の進展の経時的变化を追ってみた。

(v) 実験動物より採取された血液を、2,000 rpm, 1 分間で遠沈して純血漿を得、DuPont 社の Automatic clinical analyzer により、総ビリルビン (Van den Bergh 反応の変法)、glutamic oxaloacetic transaminase (以下 GOT と略す、International Federation of Clinical chemistry 法)、アルカリフォスファターゼ (以下 ALP と略す、Bessey-Lowry-Brock 法の変法) 値を測定した。

(vi) 蛍光抗体間接法による観察は以下の方法で行った。すなわち、-70°C に保存された凍結標本は、凍結標本薄切片作成機 (Sorvall 社、Christensen FTS/LTS-2) により 1~2 μ に薄切され、アセトンで -20°C、5 分間固定した後、室温で乾燥させた。次に 10 倍希釈した抗 PK 血清 (モルモット抗ウシひづめ prekeratin 血清、Miles Scientific 社) を一次抗体として室温、湿箱内で 1 時間反応させた後、リン酸緩衝生理食塩液で 5 分ずつ 3 回洗浄した。さらに抗モルモット IgG fluorescein isothiocyanate (以下 FITC と略す) を同様に 1 時間反応させた後、同様に洗浄して、リン酸緩衝液加グリセリンで封入して、Dialux 蛍光顕微鏡 (Leitz 社) で観察した。同様の方法で、一次抗体として、ラビット抗 actin 血清、ウサギ抗ウシ子宮 myosin 血清、ウサギ抗ニワトリ胎児脳 microtubule 血清を用いて行った。

(2) 実験 2 MB を誘導する実験

以下の二つの方法を行った。

(i) 40 日では MB を形成しない 0.025, 0.05% の低濃度で DDC を含む食餌をマウスに 40 日間食べさせた後、2.5% DDC 食を 3 日間与えて屠殺し、実験 1 と同様の観察を行った。コントロールとして、40 日で MB を形成する 0.1% DDC 食で同様の実験を

行った群、および 0.025% DDC 食、0.05% DDC 食を各々 40 日間食べさせた群を作り、同様の観察を行った。

(ii) 0.1% DDC 食を 60 日間食べさせることにより MB の形成を顕微鏡で確認した後、60 日間の正常食を与えた。顕微鏡にて MB の消失を確認した後、5% DDC 食を 7 日間食べさせて実験 1 と同様の観察を行った。コントロール群としては 0.1% DDC 食 60 日間に引き続いて、67 日間正常食を与えた群を作り、同様の観察を行った。

結 果

1. 実験 1 DDC 食餌投与による経時的観察

種々の濃度で DDC を含む食餌をマウスに食べさせ、MB 形成過程を中心に肝の変化をみるため、顕微鏡、電顕、蛍光抗体法などでその経過を長期的に観察した。

(1) MB の形成

0.1, 0.5, 2.5% の濃度で DDC を含む食餌を投与し、顕微鏡にて MB の有無を確認した。DDC 食投与 20 日目では、どの濃度においても MB は認められず、初めて顕微鏡的に MB を認めるのには 40 日間に要した。Fig. 1 に示すごとく、MB の形成程度を

Fig. 1 Mallory body formation

The livers of 4 different groups of mice fed a diet containing DDC in the concentration of 0, 0.1, 0.5 and 2.5%, respectively, were examined by light microscopy for the presence of Mallory bodies. The percent of mice with Mallory bodies in each group is shown on 3 different intervals. The extent of Mallory body formation is expressed by different shades in the column.

Fig. 2 Terminal body weight

The mean body weight of mice fed 0.1% DDC as compared with that of the control group is shown on different time intervals. One standard deviation is shown by a vertical bar on the top of each column.

Fig. 3 Liver weight

The mean liver weight of mice fed 0.1% DDC as compared with that of the control group is shown on different time intervals. One standard deviation is indicated by a vertical bar on the top of each column.

Fig. 4 Liver weight over body weight

The mean ratio of liver weight to body weight of mice fed 0.1% DDC is shown on different time intervals. One standard deviation is shown by a vertical bar on the top of each column.

(一)～(卅)に分類すると、40日ではすべての濃度で(十)または(卅)であったのに対し、60日では投与量の増加に伴って(卅)や(卅)の占める割合が増加していた。

(2) 体重および肝重量の変化

0.1% DDC 食投与群では体重 (Fig. 2), 肝重量 (Fig. 3) とともに日数とともに増加した。LW/BW でみると (Fig. 4), 初めて MB を認める 40 日までは増加を示して最大値の 11.5% に達した後プラトーとなり、以後ほぼ一定値を示す傾向であった。一方、コントロール群では LW/BW は減少する傾向であった。LW/BW は他の濃度の DDC 食投与群でも、40～60

Fig. 5 Hypertrophy and hyperplasia morphometric study (0.1% DDC)

Sections of the livers of mice fed 0.1% DDC were stained with hematoxylin and eosin and the Masson's trichrome method. The photomicrographs were printed with superimposed lattice having a total of 567 points and the final magnification of 1230 times. 6 photomicrographs were used for each animal. Each experimental group consisted of 3 mice. Mean (C/N×LW) was used as an index of hypertrophy and mean (N/N+C×LW) as an index of hyperplasia.

日目に最大となり、以後ほぼ一定となる傾向にあったが、その最大値は 0.5% DDC 食群では 15%, 2.5% DDC 食群では 25% と、DDC 濃度が高いほど高値

Fig. 6 Hypertrophy and hyperplasia morphometric study (2.5% DDC)

The morphometric analysis was performed on the livers of mice fed 2.5% DDC the same way as described in Fig. 5.

Fig. 8 Plasma total bilirubin

Plasma total bilirubin was determined the same way as described in Fig. 7, using a modified Van den Bergh method.

を示していた。

(3) 肝重量の変化

肝重量の増加は肥大 (hypertrophy), 過形成 (hyperplasia) による肝の大きさの増加とどのような関係にあるのかをみるため, morphometric study による分析を行った。

肥大の指標である平均 $C/N \times LW$, および過形成の指標である平均 $N/N + C \times LW$ を検討してみると,

Fig. 7 Plasma alkaline phosphatase

Blood was obtained from the aortae of mice fed 0.1% DDC on different intervals. The plasma was used for the determination of alkaline phosphatase by a DuPont Clinical Analyzer using a modified Bessy-Lowry-Brock method.

Fig. 9 Plasma GOT level

Plasma GOT was determined the same way as described in Fig. 7, using the method of the International Federation of Clinical Chemistry.

0.1% DDC 食投与群では初めて MB 形成をみる 40 日まで肥大, 過形成ともに同程度の進展を示し, 60 日以後は肥大は進むが, 過形成の進展は緩徐となり, DDC 投与前の値に復する傾向であった (Fig. 5). 同様の傾向は, 2.5% DDC 食投与群でも認められた

Table 1 Light microscope alteration of livers (mice fed 0.1% DDC)

Days	0	20	40	60	95
MBs	absent	absent	occasional	frequent	numerous
Hydropic swelling of hepatocytes	rare	occasional	occasional	frequent	frequent
Glycogen content	normal	decreased	decreased	markedly decreased	markedly decreased
Prominent nuclei and nucleoli	rare	occasional	occasional	frequent	frequent
Protoporphyrin	absent	small amount	moderate amount	large amount	large amount
Proliferation of bile ducts	absent	mild	mild	marked	marked

Main features of light microscopic alterations of the livers of mice fed 0.1% DDC are summarized in Table 1.

Table 2 Ultrastructural alterations of hepatocytes (mice fed 0.1% DDC)

Days	0	20	40	60	95
MBs	absent	absent	occasional	frequent	numerous
Glycogen content	normal	decreased	decreased	markedly decreased	markedly decreased
Abnormal mitochondria	absent	rare	rare	occasional	frequent
SER	no increase	increased	increased	increased	markedly increased
Irregular nuclear envelope	absent	present	present	present	present
Protoporphyrin	absent	small amount	large amount	large amount	large amount

Main features of ultrastructural alterations of the livers of mice fed 0.1% DDC are summarized in Table 2.

が、進展に程度の差が認められた (Fig. 6).

(4) 肝機能について

これらの肝の大きさの変化が、肝機能とどのような関係にあるのかをみるために、血漿生化学検査値を検討した。

Fig. 7~9 に示すごとく、0.1% DDC 食投与群の血漿 ALP、総ビリルビン値、GOT 値は、いずれも DDC 投与後 40 日まで増加し異常値を認めたが、以後 DDC 投与にもかかわらず減少し、正常値に復する傾向がみられた。

(5) 光学顕微鏡所見

主な光顕所見を Table 1 に示した。

一般に DDC 投与のマウス肝組織では、種々の程度の肝細胞の変化、プロトポルフィリン色素の沈着、胆管および細胆管の増生を伴う門脈領域の拡大などが主な所見としてみられ、0.1% 以上の DDC 食投与群では、40 日以後のマウスの水様膨化した肝細胞内に MB が認められた。95 日までの経過中、DDC 投与群およびコントロール群において、Masson's trichrome 染色で、中心静脈領域の線維化は軽度で、肝硬変に至ったものはみられなかった。また脂肪変性も非常に軽度にしき認められなかった。肝細胞は水様膨化を示すもの、好酸性変性を示すもの、細胞質内に粗い顆粒状物質を含むものなどが認められた。核、核小体の目立つ細胞もみられたが、炎症性細胞浸潤は軽度であった。PAS 染色では細胞質内のグリコゲン含有量

の減少が認められた。これらの変化は DDC 食投与後 20 日より認められ、高濃度 DDC 食長期投与群で著しい傾向であった。プロトポルフィリン色素は、HE 染色で粗い褐色の顆粒沈着として肝に現れ、0.1% DDC 食投与 20 日では主として Kupfer 細胞内に認められ、以後日数とともに量を増し、肝細胞内にもみられるようになった。胆管および細胆管の増生を伴う中心静脈領域の拡大は、高濃度 DDC 食長期投与群でより著しい傾向にあったが、線維化および胆汁うっ滞は顕著ではなかった。

既述のごとく、MB は 0.1% 以上の DDC 食投与群では 40 日以後のマウス肝に認められた。その形態は、不規則な形の肝細胞質内封入体として認められ、HE 染色では好酸性に染まり、Masson's trichrome 染色では青または赤い芯をもった青に染まり、PAS 染色では染まらなかった。この所見はヒト・アルコール性肝炎の MB の組織所見と一致していた。DDC の投与量、投与期間が増すに従って、MB の数は増加し、中でも赤い中心部をもった大きな MB が増加する傾向にあった。MB をもつ肝細胞はしばしば集団をなして現れ、染色性の薄い腫大した細胞質をもち、核、核小体の目立つものが多かった。また、長期投与群においては MB をもつ肝細胞で核も消えかかり、細胞境界も不明となった大きなものも認められた。MB の分布をみると、0.1% DDC 食投与群において 40 日目では、中心静脈付近にしばしばみられ、

Fig. 10 Size of bile canaliculi (mice fed 0.1% DDC)
The size of bile canaliculi in the livers of mice fed 0.1% DDC was evaluated using electron micrographs. On each bile canaliculus the value of horizontal diameter (10^{-3} cm) times vertical diameter (10^{-3} cm) was used as a measure of the size of bile canaliculus. Each closed circle represents one animal in the experimental groups and the horizontal bars represent mean values.

60 日以後 MB の数が増すと門脈領域にも認められる傾向であった (Photo 1, 2).

(6) 電子顕微鏡所見

一般に DDC 食投与マウス肝では、肝細胞のグリコゲン含有量の減少、滑面小胞体 (SER) の増加、異常ミトコンドリア (cristae の緻密化、結晶形成、elongation などを含む) の増加、ライソゾーム様構造の増加などに加えて、プロトポルフィリン結晶が Kupfer 細胞内および肝細胞内に放射線状の電子密度の高い結晶として認められた。肝細胞の核、核小体が大型のものも認められ、核辺縁部の侵入がしばしばみられた。これらの変化は Table 2 に示すごとく、DDC 投与後 20 日目より認められ、DDC の投与量、期間が増すにつれて顕著になる傾向にあった。

毛細胆管は Fig. 10 に示すように、0.1% DDC 食投与群では 20 日より拡張・蛇行を示し、60 日では拡張面積は DDC 投与前の約 3 倍に達するが、以後その程度は減少する傾向にあった。この毛細胆管の拡張・蛇行は、正常の微絨毛の消失、逆に異常な微絨毛の増生などの変化を含んでいた。

ところで、今回最も興味があったのは、肝細胞内の cytoskeleton の変化であるが、DDC 食投与群マウスの肝細胞では、毛細胆管付近および細胞膜周辺での IF の増生がしばしばみられた (Photo 3)。MB は電顕においても、0.1% 以上 DDC 食投与群では、40 日以後の肝細胞内にみられたが、初期では不規則

に配列する直径 8~14 nm、長さ 0.1~0.2 μ の filament (Type II filament) の集まりとして認められた (Photo 4 a)。以後 DDC の投与量、期間を増すとともに、MB の数は増加し、中心に電子密度の高い物質 (Type III filament) をもった MB も多く認められる傾向であった (Photo 4 b)。時に MB の周囲に IF の束が認められた。MB をもつ肝細胞は、一般に細胞質が大きく、大きな核、核小体をもつものが多く、グリコゲン含有量の減少、異常ミトコンドリアの増加、SER の増生、ライソゾーム様構造の増加などが認められたが、細胞質内の IF は減少傾向を示していた。

(7) 蛍光抗体間接法による所見

filament の変化を免疫組織学的にみるために、5 種類の IF のうち正常の肝および他の上皮性細胞に特異的とされる PK-IF について検討した。抗ウシ PK 血清を使用して蛍光抗体間接法で観察すると、コントロール群のマウス肝では Photo 5 a のごとく、肝細胞の大きさはほぼ均一で、毛細胆管周辺および肝細胞膜付近が強い反応をもって平滑な細胞境界を示した。核周囲にも比較的強い蛍光を認め、また肝細胞質内には一様な微細網状構造がみられた。これらの肝細胞の変化は同一肝内ではほぼ均一の所見であった。また胆管上皮細胞にも強い蛍光を認めたが、間葉系細胞および血管系には強い反応を認められなかった。DDC 食投与群のうち、MB が形成される前のマウス肝では Photo 5 b に示すように、抗 PK 血清を使用すると、コントロールと比べて肝細胞の大きさは不均一となり、著しく拡張・蛇行した毛細胆管周辺および肝細胞膜の反応はより強くなっていた。肝細胞質内の反応も強まって、粗い網状構造として認められた。これらの肝細胞の変化は同一肝でも変化に富んでおり、一見してコントロール群との差が明らかであった。

DDC 食により MB が形成されたマウス肝に抗 PK 血清を使用すると、低倍率において蛍光の弱い暗い肝細胞の集団が認められ、この領域内の肝細胞に MB が認められた。Photo 6 に示すように、MB は抗 PK 血清と強い反応を示し、外形は光顕所見と一致していたが、大きな MB では中心部は蛍光が減弱または消失し、外縁のみ強い蛍光を示した。これは電顕で Type III filament が MB の中心部を成していることと一致する所見であった。

時に MB と同様の蛍光を示す小さな顆粒が肝細胞質内に認められ、それらが癒合した形態も認められ

た。これは初期の段階の MB と考えられた。MB を有する肝細胞は、非常に大きく不規則な形態を示し、細胞質内の蛍光は著しく減弱あるいは消失し、網状構造は不明瞭となり、細胞境界も不明で、“暗い細胞”として認められた。MB を有しない肝細胞の多くは細胞質内の網状構造は増加し、毛細胆管周辺および肝細胞膜の著明な蛍光反応を示す“明るい細胞”として認められたが、まれに MB を有する肝細胞と同様の“暗い細胞”として認められるものもあった。DDC の投与量、期間の増大とともに MB を有する“暗い細胞”の占める割合が増加し、MB は大型で、蛍光の減弱した中心部を有するものが増加する傾向であった (Photo 6)。

次にこれらの MB と、他の cytoskeleton との関係を見るために、actin, myosin, microtubule に対する抗体を用いてみた。ウサギ抗 actin 血清を使用して観察すると、コントロール群マウス肝では、毛細胆管周辺に抗 PK 血清の時よりも弱い反応を認め、細胞質内には抗 PK 血清にみられたような網状構造は認められなかった。しかし、肝細胞核内に顆粒状の蛍光を認め、胆管上皮の内腔側にも中等度の蛍光を認めた。DDC 投与による MB は Photo 7 a に示すごとく、抗 actin 血清と明らかな反応を示したが、抗 PK 血清の時ほど強くはなかった。MB を含む肝細胞質内の網状構造については一定した所見は得られなかった。ウサギ抗ウシ子宮 myosin 抗体での所見は、反応の分布は抗 actin 血清の時とほぼ同様であったが、肝細胞膜の反応はより強く、珠子状の境界線を示し、MB とは弱い反応を示した (Photo 7 b)。ウサギ抗ニワトリ胎児脳 microtubule 血清を用いて観察すると、コントロールマウス肝では毛細胆管周辺に抗 PK 血清に対するよりも弱い反応を認め、また類洞周辺にも弱い蛍光が認められたが、肝細胞質内の網状構造のはっきりした所見は得られなかった。DDC 投与による MB は Photo 7 c のごとく、抗 PK 血清の時よりも弱い反応を示したが、MB の辺縁部がより強い蛍光を示す傾向であった。

2. 実験2 MB を誘導する実験

(i) DDC 食投与後 40 日において、0.1% および 2.5% DDC 食投与群では 80% 以上のマウス肝に MB の形成をみたのに対し、0.05% および 0.025% DDC 食投与群では、40 日では MB 形成がみられなかった。しかし、Table 3 に示すごとく、0.05%

Table 3 Induction of MB in DDC-fed mice (number of mice with MBs/total number of mice)

Days of DDC feeding	% DDC in diet			
	0.025%	0.05%	0.1%	2.5%
20 days			0/6	0/6
40 days	0/16	0/16	12/15	8/9
40 days plus additional 2.5% DDC for 3 days	0/11	5/11	9/11	

Mice were fed 4 different concentrations of DDC and the presence of Mallory bodies was examined by light microscopy. The number of mice with Mallory bodies is shown by the numerator and the total number of mice by the denominator in each group.

Fig. 11 Ratio of liver weight to body weight of mice following withdrawal and refeeding of DDC. The treatment of mice is shown on the horizontal column on the top of the figure. The mean ratio of liver weight to body weight is shown on different time periods. The presence or absence of Mallory bodies is indicated on the bottom of the figure.

DDC 食を 40 日投与した群では 2.5% DDC 食を 3 日間追加投与することにより、一部のマウス (11 匹のうち 5 匹) に MB を形成することができた。この時の形態的变化は、0.05% DDC 食 40 日投与群では実験 1 での MB 形成前の所見に一致していた。また、2.5% DDC 食を追加投与することにより、MB を形成したマウスでは実験 1 での MB 形成以後の所見にほぼ一致していた。

(ii) Fig. 11 に示すごとく、0.1% DDC 食を 60 日間投与することにより、LW/BW の平均値は、DDC 投与前の 5.0 から 11.5% にまで増加し MB の形成をみたが、正常食に 60 日間置くことにより、平均 LW/BW はほぼ DDC 投与前の値 5.5% まで戻り MB は消失した。この後 5% DDC 食を 7 日間投与することにより、平均 LW/BW は 12% まで急増し、一部のマウス肝（7 匹のうち 4 匹）に再び 2 度目の MB を形成させることができた。

この実験 2 (ii) のマウス肝の光顕所見をみると、DDC 食投与により、いったん肝細胞は大きくなり MB 形成をみた (Photo 8 a)。その後、正常食に置き換えることにより、多くの肝細胞の大きさはほぼ正常にまで戻ったが (Photo 8 b)、一部の肝細胞は水様変化をとどめ、プロトポルフィリン色素の沈着および胆管増生も軽度から中等度に残存していた。この後、わずか 7 日間の高濃度 DDC 食投与により、肝細胞は初回 MB 形成時と同様の大きさまで急激な増加を示し、2 度目の MB 形成がみられた (Photo 8 c)。電顕および抗 PK 血清による蛍光抗体間接法で観察すると、MB 形成時の所見は初回も 2 回目も、実験 1 における MB 形成時の所見とほぼ一致していた。しかし一度 MB を形成した後、正常食により MB を消失させた時点では、以下の点で正常肝とは異なる所見を有していた。すなわち、電顕では SER の増生、グリコゲン含有量の減少などの肝細胞障害の一般的表現を軽度示しているのに加えて、毛細胆管の拡張・蛇行および IF の増加が軽度から中等度残存している肝細胞が一部に認められた。また抗 PK 血清を使つての蛍光抗体間接法でも、軽度から中等度の毛細胆管の拡張・蛇行を伴う細胞膜付近の反応の増加と、細胞質内に PK-IF の網状構造の増加を示す肝細胞が認められた。

考 察

1982 年 Yokoo 等²⁴⁾が確立した実験モデルは、DDC を食餌投与することにより、griseofulvin よりも少量かつ短期でマウス肝に MB を形成することができる。

DDC は (Fig. 12) 1959 年 Solomon and Figge²⁵⁾により、プロトポルフィリン代謝障害を起こす実験薬として開発されたものである。その機序は²⁶⁾、肝ミトコンドリア中の酵素である鉄キレターゼの活性を抑制することにより、プロトポルフィリンが鉄を取り入れ

Fig. 12 The chemical structure of 3,5-diethoxycarbonyl-1,4-dihydrocollidine (DDC)

Table 4 Main features of priming and induction in the livers of DDC-fed mice

	Priming	Induction
LW/BW	rapid increase	plateau
Biochemical values	marked elevation	return toward normal values
Light microscopy		
Hepatocytes	pale swollen cells in peri central areas	ballooning cells with MBs
Electron microscopy		
Bile canaliculi	moderate dilatation	moderate dilatation
IFs	increase	increase
Immunofluorescent microscopy		
Cytoplasmic stain	increase	decrease or absence in MB-containing cells
Peri canalicular stain	increase	decrease

Main features of priming and induction in the DDC-fed mouse model are summarized in Table 4.

てヘムとなることを阻害し、このヘム合成量の減少が、 δ -amino-levulinic acid の活性を促してプロトポルフィリンの産生を増加させ、肝組織内に沈着させるものとされている。DDC には、このプロトポルフィリン代謝阻害作用のほかに、griseofulvin と同様の作用として、催腫瘍作用、microtubule 障害作用を有すると思われる所見が得られている²⁷⁾。

今回、種々の濃度で DDC を含む食餌を投与することにより、マウス肝に MB が形成され、その経時的観察から以下のことが考察された。

実験 1 では、0.1% 以上の DDC 食投与群において、5% まで DDC の濃度を上げて、MB 形成に最低 40 日間を要し、以後投与量の増加に伴って MB の数が増加していた。実験 2 (i) では、40 日では

MB を形成しない低濃度 DDC 食投与群でも、高濃度 DDC 食を短期間追加投与することにより、MB を形成させることができた。これらの実験 1 および実験 2 (i) の結果より、MB 形成には DDC 投与量は少量でよいが長期間を要する priming stage (時間依存性) と、短期間でよいが大量の DDC を必要とする induction stage (投与量依存性) の二つのステップが存在することを想定した。LW/BW, 血液生化学検査, 光顕, 電顕, 蛍光抗体間接法を用いての二つのステップの特色を Table 4 に示す。

priming stage では、LW/BW が肥大、過形成の同程度の進展をもってある一定の最大値となるまで増加し、肝細胞が大きくなった。それに伴って、血漿 ALP, GOT, 総ビリルビンなどの肝機能の指標となる生化学検査値も正常域を超え、ある一定値まで上昇した。光顕では、プロトポルフィリンの増生、胆管増生を伴う門脈域の拡大に加えて、主として傍中心静脈領域の肝細胞が水様膨化していたのが特色である。電顕では、種々の肝細胞障害の一般的表現とともに、毛細胆管の拡張・蛇行と、細胞質内 (主として毛細胆管周辺) の IF の増生が認められた。蛍光抗体間接法では、この stage で拡張・蛇行した毛細胆管周囲および肝細胞膜に抗 PK 血清に対する強い反応が認められ、また肝細胞質内に粗い網目状構造を示す PK-IF の著明な増加が認められた。次に induction stage では LW/BW はプラトーとなり、血漿生化学検査値も正常に復する傾向を示す時に、光顕, 電顕で MB を認めた。蛍光抗体間接法では MB は抗 PK 血清と強い反応を示したが、MB を含む肝細胞内では、priming stage でみられた PK-IF の網目状構造が著しく減弱あるいは消失していたのが極めて特徴的である。この時、DDC 投与によるマウス肝の MB は、抗 actin 血清, 抗 myosin 血清, および抗 microtubule 血清とも反応を示したが、抗 PK 血清の時よりも弱い反応であった。同様の実験を、griseofulvin によるマウス肝 MB で、Franke and Denk ら²⁸⁾, Kimoff ら²⁹⁾も行っており、抗 PK 血清についてはほぼ同様の所見であった。MB 内に、actin³⁰⁾, myosin^{31, 32)}, microtubule が存在するかどうかについてはまだ十分な検討がなされていない。

これらの所見は以下のような可能性を示すと思われる。すなわち priming stage において薬に対する適応反応として、肝細胞が大きくなるのに伴って細胞の骨格をなす PK-IF が増生する。次にこの状態がある限

界に達すると、IF が凝集しやすい状態となり、induction stage となって MB が形成される。この時、IF が質的にも変化しているのか、肝細胞質内の異常が IF を凝集に導くのかは明らかではない。また IF が凝集する機序についてもまだ明らかな検討がなされていない。しかし、colcemide などの microtubule 阻害剤により、培養細胞内に IF の凝集が形成される実験^{29, 33-35)}が数多くなされていることは、microtubule の障害と IF の凝集との間には密接な関係があることを示している。さらに griseofulvin で前処置したマウス肝に、microtubule 阻害剤として知られている colchicine を投与することにより、MB を形成させることができ³⁶⁾, また griseofulvin³⁷⁾ や DDC 自体³⁸⁾にも microtubule 阻害作用があることは、microtubule の障害が MB 形成に重要な役割を果たしている可能性を考えさせる。一方、MB を形成した細胞が、光顕, 電顕で不規則に大きくなり、細胞境界も不明になっていたことは、cytoskeleton を失った結果とも考えられ、この状態の進展が肝細胞障害へと導くものと思われる。

このことは、ヒト・アルコール性肝炎の組織像でも、MB をもつ肝細胞は著しい水様膨化を示しており、しばしば浸潤炎症細胞に囲まれて壊死に陥っている所見をみると一致している。ヒト・アルコール性肝炎では、MB が古くなるとその構成 filaments が Yokoo ら¹⁵⁾の Type II から Type III へと形態的に変化する。本実験において、DDC によるマウス肝の MB の中心部はこの Type III に相当し、抗 PK 血清での反応が辺縁に比して弱かった。これは、MB の Type III filament の抗 PK 血清に対する免疫反応が減弱していることを示唆していると思われる。

priming stage で傍中心静脈の肝細胞がしばしば水様膨化を示し、induction stage で、主として初期の MB がこれらの肝細胞内に集団をなして現れることは、同一肝においても、MB 形成に関して細胞単位での差が存在すると考えられる。その理由の一つとして、中心静脈周辺の肝細胞は他に比して SER の含有量が多いこと³⁹⁾が挙げられ、DDC を代謝するために SER に富むこれらの細胞群が初めに障害を受け、早期に MB を形成すると推定される。また、ホ乳類の正常の上皮性細胞内の PK-IF が同一臓器においても細胞の成熟度により質的に異なるという最近の報告⁴⁰⁾も、同一肝における各々の肝細胞内の cytoskeleton の差による細胞単位での MB 形成に関する変化を示唆

していると思われる。Denk ら⁴¹⁾は、ビタミンAの欠乏が上皮細胞の成熟(角化)を促すことから、MB形成がビタミンA欠乏による肝細胞内の keratinization であるとの説を唱えており、Leo and Lieber⁴²⁾は、ヒト・アルコール性肝炎患者の肝細胞内のビタミンAが減少していることを報告している。また、French ら^{43,44)}、Borenfreund ら^{45,46)}は、MB形成は肝細胞の preneoplastic の表現と解釈している。しかし、これらのMB形成に関する説は、いずれもまだ仮説の段階である。

以上、MB形成に時間依存性の priming stage (主として薬に対する反応としての適応現象と思われる)と、投与量依存性の induction stage (肝細胞内の cytoskeleton の異常をきたし、filament が凝集してMBを形成すると思われる)の二つのstepを想定した。このことは、臨床においてしばしば認められる長期にわたる中等度以上の飲酒家が、短期間の大量飲酒を引き金に、急性アルコール性肝炎をきたす症例^{47,48)}においても、この二つのstepが存在している可能性を示唆している。

実験2(ii)に示したようなMBを誘導する実験においては、初回投与では5% DDC食投与によっても、LW/BWが10%以上になるのに20日を要し、MB形成には40日かかるのに、一度MBを形成した後に正常食によりMBを消失させたマウスでは、7日間という短期間の高濃度 DDC投与により、LW/BWは再び初回MB形成時とほぼ同様の値にまで急増して2度目のMB形成をみる事ができた。2回目のMB形成時の所見は、光顕、電顕、蛍光抗体法でも、初回MB形成時とほぼ同様の所見であった。この実験結果は、DDCによるマウス肝のMB形成が、ヒト・アルコール性肝炎の場合と同様に可逆的な反応であることを示すとともに、いったんMBを形成した肝細胞内は filament を容易に凝集しやすい状態にあること、あるいはいったん凝集した filament は何らかの変化を受けて容易に凝集しやすくなっていることを推定させる。同様の実験を Vic ら⁴⁹⁾は血管拡張剤である perhexiline maleate を用いて、Denk ら⁴⁰⁾は microtubule 阻害剤である colchicine を用いて行っているが、彼らはMB形成に二つのstepの関与を想定してはいない。

以上の実験結果は、臨床において急性アルコール性肝炎の患者が、入院および禁酒により肝機能は正常化し、肝組織も回復してMBも消失するが、その後、

短期間の大量飲酒により容易に再びMB形成を伴う急性アルコール性肝炎の状態になること、そして同様のエピソードを繰り返すことにより、次第に非可逆的な肝障害へと進行する症例との類似性を示唆するものと思われる。

結 論

種々の濃度で DDC を含む食餌を食べさせることにより、マウス肝に Mallory body (MB) が形成される過程を検索し、以下の結論を得た。

1) DDC濃度にかかわらず、初めてMBが形成されるまでに40日間を要した。以後、投与量の増加に伴ってMBの数が増加した。一方、40日ではMBを形成しない低濃度 DDC食投与群でも(0.1%未満 DDC)、高濃度 DDC食を短期間追加投与することによりMBを形成させることができた。

2) この結果より、時間依存性の priming stageと、投与量依存性の induction stageの二つのstepが、MB形成に関与していることが示唆された。

3) priming stageでは、肝重量の全体重に対する比(LW/BW)が急激に増加し、光顕にて水様膨化した肝細胞を認め、電顕では毛細胆管付近に prekeratin intermediate filament (PK-IF)の増加がみられた。蛍光抗体間接法では、拡張・蛇行した毛細胆管周辺および肝細胞質内に、抗 prekeratin 血清(抗 PK血清)に対する強い反応が観察された。

4) induction stageでは、LW/BWはプラトーに達する傾向を示し、光顕・電顕で不規則に腫大した肝細胞内にMBを認めた。蛍光抗体間接法では、MBは抗 PK血清と強く反応したが、MBを有する肝細胞の細胞質は、反応が著しく減弱あるいは消失していた。

5) 3)および4)より、priming stageで、薬に対して反応性に増加したPK-IFが、induction stageで何らかの機序により凝集してMBを形成することが考えられた。

6) いったん形成されたマウス肝MBは、正常食に置き換えることにより消失し、その後高濃度 DDC食を短期間投与することにより、再びMBを形成させることができた。

7) 臨床においても、急性アルコール性肝炎の発症は、5~10年以上の長期の中等度以上の飲酒家において、短期間の大量飲酒を引き金にもたらされることがしばしばみられる。これらのヒト・アルコール性肝炎

の発症においても、今回動物実験に示されたような、priming と induction という二つの step を踏まえて肝細胞障害が起きていることが推定される。すなわち、DDC 投与マウス肝のみならず、ヒト・アルコール性肝炎においても、cytoskeleton の障害が肝細胞障害に重要な役割を果たしている可能性を示唆するものとみなされる。

稿を終るにあたり、終始、本研究の御指導さらに論文の御校閲を頂きましたシカゴ、ノースウェスタン大学医学部病理学教室、横尾秀次郎教授に深く感謝いたします。

文 献

- 1) Popper, H., and Lieber, C.S. : Histogenesis of alcoholic fibrosis and cirrhosis in the baboon. *Am. J. Pathol.*, **98**, 695~710, 1980.
- 2) Schanne, F., Zucker, A.H., Farber, J.L., and Rubin, E. : Alcohol-dependent liver cell necrosis in vitro; A new model. *Science*, **212**, 338~340, 1981.
- 3) Mallory, F.B. : Cirrhosis of the liver; Five different types of lesions from which it may arise. *Johns Hopkins Hosp. Bull.*, **22**, 69~175, 1911.
- 4) Sternlieb, I. : Evolution of hepatic lesion in Wilson's disease (hepatolenticular degeneration). "Progress in Liver Diseases" (Popper, H., and Schaffner, F. eds.), IV th ed., p. 511~525, Grune and Stratton, New York, 1973.
- 5) Peters, R.L. : Patterns of hepatic morphology in jejunoileal bypass patients. *Am. J. Clin. Nutr.*, **30**, 53~57, 1977.
- 6) Falchuk, K.R., Fiske, S.C., Haggitt, R.C., Freedman, M., and Trey, C. : Pericentral hepatic fibrosis and intracellular hyalin in diabetes mellitus. *Gastroenterology*, **78**, 535~541, 1980.
- 7) Monroe, S., French, S.W., and Zamboni, L. : Mallory bodies in a case of primary biliary cirrhosis; An ultrastructural and morphogenetic study. *Am. J. Clin. Pathol.*, **59**, 254~262, 1973.
- 8) Itoh, S., Matsuo, S., Ichino, A., Yamaba, Y., and Miyazawa, M. : Nonalcoholic steatohepatitis and cirrhosis with Mallory's hyalin with ultrastructural study of one case. *Dig. Dis. Sci.*, **27**, 341~346, 1982.
- 9) Norkin, S.A., and Campagna-Pinto, D. : Cytoplasmic hyaline inclusions in hepatoma; Histochemical study. *Arch. Pathol.*, **86**, 25~32, 1968.
- 10) Roy, S., Ramalingaswami, V., and Nayak, N.C. : An ultrastructural study of the liver in Indian childhood cirrhosis with particular reference to the structure of cytoplasmic hyalin. *Gut*, **12**, 693~701, 1971.
- 11) Partin, J.S., Partin, J.C., Schubert, W.K., and McAdams, A.J. : Liver ultrastructure in abetalipoproteinemia; Evolution of micronodular cirrhosis. *Gastroenterology*, **67**, 107~118, 1974.
- 12) Kuhn, C., III., and Kuo, T.-T. : Cytoplasmic hyalin in asbestosis; A reaction of injured alveolar epithelium. *Arch. Pathol.*, **95**, 190~194, 1973.
- 13) Warnock, M.L., Press, M., and Churg, A. : Further observations on cytoplasmic hyalin in the lung. *Hum. Pathol.*, **11**, 59~65, 1980.
- 14) Christoffersen, P., Eghøj, K., and Juhl, E. : Mallory bodies in liver biopsies from chronic alcoholics; A comparative morphological, biochemical, and clinical study of two groups of chronic alcoholics with and without Mallory bodies. *Scand. J. Gastroenterol.*, **8**, 341~346, 1973.
- 15) Yokoo, H., Minick, O.T., Batti, F., and Kent, G. : Morphologic variants of alcoholic hyalin. *Am. J. Pathol.*, **69**, 25~40, 1972.
- 16) Franke, W.W., Denk, H., Schmid, E., Osborn, M., and Weber, K. : Ultrastructural, biochemical, and immunologic characterization of Mallory bodies in livers of griseofulvin-treated mice. *Lab. Invest.*, **40**, 207~220, 1979.
- 17) Denk, H., Franke, W.W., Dragosics, B., and Zeiler, I. : Pathology of cytoskeleton of liver cells; Demonstration of Mallory bodies (alcoholic hyalin) in murine and human hepatocytes by immunofluorescence microscopy using antibodies to cytokeratin polypeptides from hepatocytes. *Hepatology*, **1**, 9~20, 1981.
- 18) Gabbiani, G. : The cytoskeleton in normal and pathologic processes. "Methods and Achievements in Experimental Pathology" (Jasmin, G., and Cantin, M. eds.), Vol. 8, p. 1~41, 110~142, 201~230, S. Karger, New York, 1979.
- 19) Lazarides, E. : Intermediate filaments as mechanical integrators of cellular space. *Nature*, **283**, 249~256, 1980.
- 20) Phillips, M.J., Oda, M., Mak, E., Fisher, M.M., and Jeejeebhoy, K.N. : Microfilament dysfunction as a possible cause of intrahepatic cholestasis. *Gastroenterology*, **69**, 48~58, 1975.
- 21) Baraona, E., Leo, M.A., Borowsky, S.A., and Lieber, C.S. : Pathogenesis of alcohol-induced accumulation of protein in the liver. *J. Clin. Invest.*, **60**, 546~554, 1977.
- 22) Denk, H., Gschnait, F., and Wolff, K. : Hepatocellular hyalin (Mallory bodies) in long term Griseofulvin-treated mice; A new experimental model for the study of hyalin formation. *Lab. Invest.*, **32**, 773~776, 1975.
- 23) Borenfreund, E., and Bendich, A. : In vitro demonstration of Mallory body formation in liver cells from rats fed diethylnitrosamine. *Lab. Invest.*, **38**, 295~303, 1978.
- 24) Yokoo, H., Harwood, T.R., Racker, D., and Arak, S. : Experimental production of Mallory bodies in mice by diet containing 3,5-diethoxycarbonyl-1,4-dihydrocollidine. *Gastroenterology*, **83**, 109~113, 1982.
- 25) Solomon, H.M., and Figge, F.H.J. : Disturbance in porphyrin metabolism caused by feeding diethyl-1,4-dihydro-2,4,6-trimethylpyridine-3,5-dicarboxylate (24705). *Proc. Soc. Exp. Biol. Med.*, **100**, 583~586, 1959.

- 26) DeMatteis, F., Abbritti, G., and Gibbs, A.H. : Decreased liver activity of porphyrin-metal chelataase in hepatic porphyria caused by 3,5-diethoxycarbonyl-1,4-dihydrocollidine. *Biochem. J.*, **134**, 717~727, 1973.
- 27) Yokoo, H. : Hepatoma arising in livers of mice fed DDC. Personal communication.
- 28) Franke, W.W., Schmid, E., Kartenbeck, J., Mayer, D., Hacker, H.-J., Bannash, P., Osborn, M., Weber, K., Denk, H., Wanson, J.-C., and Drochmans, P. : Characterization of the intermediate-sized filaments in liver cells by immunofluorescence and electron microscopy. *Biol. Cellulaire*, **34**, 99~110, 1979.
- 29) Kimoff, R.J., and Huang, S.-N. : Immunocytochemical and immunoelectron microscopic studies on Mallory bodies. *Lab. Invest.*, **45**, 491~503, 1981.
- 30) Nenci, I. : Identification of actin-like proteins in alcoholic hyalin by immunofluorescence. *Lab. Invest.*, **32**, 257~260, 1975.
- 31) Meloan, S.N., and Puchtler, H. : Mallory bodies; Lesions of hepatocytes containing proteins of the keratin-myosin-epidermin group. *Histochemistry*, **75**, 445~460, 1982.
- 32) French, S.W., Davies, P.L., Carr, B.N. : The nature of Mallory body filaments. *Lab. Invest.*, **30**, 374, 1974.
- 33) DeBrabander, M., Aerts, F., De Veire, R.V., and Borgers, M. : Evidence against interconversion of microtubules and filaments. *Nature*, **253**, 119~120, 1975.
- 34) Zackroff, R.V., Steinert, P., Whitman, M.A., and Goldman, R.D. : Intermediate filaments. "Cytoskeletal Elements and Plasma Membrane Organization" (Poste, G., and Nicolson, G.L. eds.), Vol. 2, p. 56~92, Elsevier/North-Holland Biochemical Press, Netherlands, 1981.
- 35) Knapp, L.W., O'Guin, W.M., and Swayer, R.H. : Drug-induced alterations of cytokeratin organization in cultured epithelial cells. *Science*, **219**, 501~503, 1983.
- 36) Denk, H., and Eckerstorfer, R. : Colchicine-induced Mallory body formation in the mouse. *Lab. Invest.*, **36**, 563~565, 1977.
- 37) Weber, K., Wehland, J., and Herzog, W. : Griseofulvin interacts with microtubules both in vivo and in vitro. *J. Mol. Biol.*, **102**, 817~829, 1976.
- 38) Yokoo, H. : DDC interferes in vitro polymerization of microtubule. Personal communication.
- 39) Jones, A.L., and Schmucker, D.L. : Current concepts of liver structure as related to function. *Gastroenterology*, **73**, 833~851, 1977.
- 40) Lazarides, E. : Intermediate filaments; A chemically heterogeneous, developmentally regulated class of proteins. *Annu. Rev. Biochem.*, **51**, 219~250, 1982.
- 41) Denk, H., Franke, W.W., Kerjaschki, D., and Eckerstorfer, R. : Mallory bodies in experimental animals and man. *Int. Rev. Exp. Pathol.*, **20**, 77~121, 1979.
- 42) Leo, M.A., and Lieber, C.S. : Hepatic Vitamin A depletion in alcoholic liver injury. *Science*, **307**, 597~601, 1982.
- 43) Ihrig, T.J., Petter, N.B., Akeda, S., Benson, N.C., and French, S.W. : Liver injury due to griseofulvin; Gamma glutamyl transpeptidase induction correlated with Mallory bodies. *Fed. Proc.*, **39**, 876, 1980.
- 44) French, S.W. : The Mallory body; Structure, composition, and pathogenesis. *Hepatology*, **1**, 76~83, 1981.
- 45) Borenfreund, E., Higgins, P.J., and Peterson, E. : Intermediate-sized filaments in cultured rat liver tumor cells with Mallory body-like cytoplasmic abnormalities. *JNCI*, **64**, 323~333, 1980.
- 46) Borenfreund, E., Higgins, P.J., and Bendich, A. : In vivo-in vitro rat liver carcinogenesis; Modifications in protein synthesis and ultrastructure. *Ann. NY Acad. Sci.*, **349**, 357~372, 1980.
- 47) Beckett, A.G., Livingstone, A.V., and Hill, K.R. : Acute alcoholic hepatitis. *Br. Med. J. [Clin. Res.]*, **2** (5260), 1113~1122, 1961.
- 48) Galambos, J.T. : Alcoholic hepatitis. "The Liver and It's Disease" (Schaffner, F., Sherlock, S., Leevy, C.M. eds.), p. 255~267, Intercontinental Medical Book, New York, 1974.
- 49) Vic, P., Sablier, G., François, C., Michel, H., Sentein, P., and Boucard, M. : Toxicité hépatique comparée du maléate de perhexiline et de la griseofulvine chez la souris. *Toxicol. Eur. Res.*, **3**, 17~22, 1981.

Legends

- Photo 1 Photomicrograph of the liver of a mouse fed 0.1% DDC for 20 days. Note small deposits of protoporphyrin pigment (arrows) in the portal areas and pale swollen hepatocytes around the central vein (C). HE stain, $\times 100$
- Photo 2 Photomicrograph of the liver of a mouse fed 0.1% DDC for 40 days. There are enlarged portal areas with large deposits of protoporphyrin pigment (arrows). Note a large ballooning hepatocyte containing a Mallory body near a central vein (C). Inset shows a higher magnification of the Mallory body containing hepatocyte. HE stain, $\times 100$
- Photo 3 Electron micrograph of the liver of a mouse fed 0.1% DDC for 20 days. Note prominent bundles of intermediate filaments (arrows) adjacent to the bile canaliculus (BC). Uranyl acetate and lead citrate stain, $\times 43,000$
- Photo 4 a Electron micrograph of a Mallory body in the liver of a mouse fed 0.1% DDC for 60 days. The Mallory body is composed of random Type II filaments (large arrow). Bundles of intermediate filaments (small arrow) are seen at the periphery of the Mallory body. $\times 43,000$
- 4 b This Mallory body contains electron dense Type III filaments (arrow) in the center. Uranyl acetate and lead citrate stain, $\times 25,000$
- Photo 5 Indirect immunofluorescent microscopy of mouse

Plate (1)

Plate (2)

liver using anti-prekeratin antibody.

5 a Normal mouse liver showing distinct cytoplasmic borders with interspersed bile canaliculi and delicate networks of cytoplasmic filaments. $\times 630$

5 b DDC-fed mouse liver showing increased cytoplasmic and bile canalicular stains. Note thick tortuous cell borders. $\times 630$

Photo 6 Indirect immunofluorescent microscopy of Mallory body-containing hepatocytes using anti-prekeratin antibody. The mouse was fed 0.1% DDC for 80 days. Mallory bodies (arrows) appear in a group of large misshapen hepatocytes. Note the loss of cytoplasmic stain and cell borders in the Mallory body-containing hepatocytes. Hepatocytes without Mallory bodies show tortuous prominent cell borders and increased cytoplasmic and bile canalicular stains. $\times 630$

Photo 7 Indirect immunofluorescent microscopy of DDC-fed mouse liver using anti-actin (a), anti-myosin

(b), and anti-microtubule (c) antibody. Mallory bodies (arrows) stain not as intensely as with anti-prekeratin antibody. $\times 630$ (a), $\times 400$ (b), $\times 630$ (c)

Photo 8 Experiment No. 2 (ii)

8 a In this experiment mice were fed 0.1% DDC for 60 days, at which time some of the hepatocytes were large and contained Mallory bodies (arrow). Masson's trichrome stain, $\times 250$

8 b Subsequently, they were fed a normal diet for 60 days to insure the complete disappearance of Mallory bodies. Note the hepatocytes are almost normal in size. Masson's trichrome stain, $\times 250$

8 c Next, they were fed 5% DDC for 7 days. Large hepatocytes containing Mallory bodies (arrows) reappeared. Masson's trichrome stain, $\times 250$

(受付 : 1983 年 9 月 14 日)