— 原 著 —

ヒト胎児胸部交感神経幹および幹神経節の 形態学的検索について

野村 利夫

日本医科大学第2解剖学教室 (主任: 吉川文雄教授)

A morphological investigation of the thoracic sympathetic trunks and the chain ganglia of human fetuses

Toshio Nomura

The Second Department of Anatomy (Director: Prof. Fumio Kikkawa), Nippon Medical School

The present investigation was made to elucidate the anatomical features of the thoracic portion of the sympathetic trunks, their ganglia, and their rami communicantes in fetuses.

Twenty thoracic sympathetic trunks in ten fetuses, 5~6 months old, were studied. The results obtained were as follows;

1) The total number of ganglia in the thoracic sympathetic trunks in ten fetuses was 206 and the average number of ganglia was 10.3 in the thoracic portion of the trunk.

2) On the ventral side of the neck of the first rib, the first thoracic ganglion was fused with the inferior cervical ganglion to form the stellate ganglion on both sides in all of the ten fetuses. In one of these ten subjects the stellate ganglion was further fused with the second thoracic ganglion. The stellate ganglia were classified into three types according to shape; Type I, II, and III. The most frequent type was Type I, the cylinder shape, which was found in 9 out of 20 (45%).

3) The ganglia below the second thoracic ganglion, 186 in total, were classified into nonfusional and fusional form ganglia. The nonfusional form ganglia, 153, were further classified into 5 types according to shape, of which the most frequent was the triangular type, 77 of 153 (50.3%). The fusional form ganglia, 33, were again classified into 4 types according to shape. The most frequent of them was Type II where one ganglion makes a contact with the other without any narrow segment at the juncture. The incidence of such type was 14 of 33 (42.4%).

4) Fourteen cross communications between the right and the left sympathetic trunks were confirmed in 8 out of 10 fetuses.

5) All of the thoracic rami of thoracic spinal nerves had rami communicantes, connecting with sympathetic trunks. The number of rami communicantes was 3 on the average. The more caudally ventral rami were located, the less the number of rami communicantes became.

6) Rami communicantes to the dorsal rami of the thoracic spinal nerves were confirmed in 148 out of 240 thoracic spinal nerves corresponding to the spinal cord segments (61.7%).

7) Rami communicantes to the meningeal branches of the thoracic spinal nerves were confirmed in 51 out of 240 thoracic spinal nerves corresponding to the spinal cord segments (21.3%).

8) Four ganglia intermedia were confirmed on the rami communicantes to the ventral rami of the eleventh and twelfth thoracic spinal nerves.

Key words: trunks sympathicus, ganglion stellatum, rami communicantes, ganglia trunci sympathici

緒 言

腰痛と交感神経交通枝との関連性について Nathan (1968)¹⁾ は、臨床解剖学的に変形性脊椎症における骨棘による交感神経交通枝圧迫の問題をとり上げ、また福山 (1975)²⁻⁶⁾ は、基礎解剖学的に実験動物において末梢神経の扇形細裂標本法を用いて自律神経の形態学および機能的分析を行った結果「腰部交感神経幹の中には 30~50% におよぶ求心性線維が含まれており、この部における椎間板ヘルニアなどにより交感神経を刺激して腰痛惹起の原因となり得る」と指摘した。このことに関して当教室の迫田 (1983)⁸⁾ は、本邦人胎児死体の腰部交感神経幹の形態学的特徴について探索し報告したが、今回著者は、体幹胸部における交感神経幹について調査を行ったので追加報告する。ちなみに胸部交感神経幹の形態学的探索報告は、わずかに松井⁷⁾、松島⁹⁾、Atumi⁹⁾ および前田^{10,11)} の報告があるにすぎない。

研究材料および方法

日本医科大学第2解剖学教室所蔵の胎児死体 10 体 (5~6 ヶ月齢) を用い両側胸部交感神経幹の走行および吻合枝、交感神経節の形態、交通枝の数および走行について探索した。観察は Nikon および Wild の実体顕微鏡下に行い、交感神経節の大きさについては Fusoh の Digital 測定顕微鏡を用いた。なお写真撮影は、Wild の microphoto を用い、探索所見の記録は剖查の進行経過に従って逐次局所のスケッチおよびカラー写真撮影を行った。

成 績

1. 胸部交感神経幹の走行状態について (Photo 1, 2)

一般に成書¹²⁻²¹⁾ では、交感神経幹は頸部では椎体の近くに、胸部ではやや外方に偏して肋骨頭の前側に、腹部では再び椎体に近接して見られると記載されている。著者の観察所見では、交感神経幹は頸部から胸部に移行する部位で方向を変へ背方へと向かい第1肋骨頭に達するが、この前面において全例両側に第1胸部交感神経節は下頸神経節と合して星状神経節 (頸胸神経節) を形成していた。次いで下方に向かい第2以下の肋骨頭に接し、椎体の側面に密着しながら第11 または第12 胸部交感神経節の位置に達すると交感神経幹は肋骨頭を離れ、椎体の前面中央部に向かって

移動する傾向がみられた。

2. 胸部交感神経節の出現数について

胸部交感神経節の上界は、第1胸部脊髄神経と交通枝をもって連絡している神経節とされているが¹⁰⁻²¹⁾、今回の著者の探索では全例両側に星状神経節の形成が観察されたのでこれを上界とした。下界については松島⁹⁾ および西村²⁸⁾ に従い第12 胸部脊髄神経と交通枝をもつ神経節のうち、交通枝の走行状態および神経節と椎体との位置関係 (第11 胸椎から第1腰椎上に存在する神経節) とを併せて基準として第12 胸部交感神経節を同定しこれを下界とした。なお癒合型交感神経節 (後述) はこれを1個と算定した。

出現数は Table 1 に示すごとく総数 206 個で平均は 10.3 個 (片側) であった。最も多かったのは探索例 No. 4 (Plate 4)、No. 6 (Plate 6) のそれぞれ左側で 12 個、最も少なかったのは探索例 No. 7 (Plate 7) の左側で 8 個であった。ちなみに成人および胎児についての先人の報告は 10~12 個であった⁷⁻¹¹⁾。考察の項で述べるが胸部交感神経節の個数は癒合型交感神経節の出現数およびこの癒合型交感神経節を1個として算定するか、分離して算定するかとい

Table 1 Number of ganglia in the thoracic sympathetic trunk

Case number	R	L
1	11	10
2	9	9
3	10	10
4	11	12
5	11	9
6	11	12
7	11	8
8	9	10
9	11	11
10	10	11
Total	104	102
Total (R+L)	206	
Average (R+L)	10.3	

Table 2 Number of types of ganglia in the thoracic sympathetic trunk

Ganglia	R	L	Total
Stellate	10	10	20 (9.7%)
Nonfusional form	76	77	153 (74.3%)
Fusional form	18	15	33 (16.0%)
Total	104	102	206

う問題と、第 12 胸部交感神経節の同定の方法によっても相違が出てくるものと思われる。

Table 2 に示すごとく 10 体 20 側での胸部交感神経節は総数 206 個で、その内わけは星状神経節が 20 個 (9.7%)、非癒合型交感神経節が 153 個 (74.3%)、癒合型交感神経節が 33 個 (16.0%) であった。

3. 星状神経節（頸胸神経節）について

(1) 出現数

成書¹²⁻²¹⁾ には第 1 胸部交感神経節は大きく、しばしば第 2 胸部交感神経節とともに下頸神経節と合して星状神経節を作ると記載されている。著者の検索では全例両側に合計 20 個が観察された。

(2) 形状 (Photo 3, 4)

星状神経節は種々の形態を呈するが、今回著者はこれを **Fig. 1** のごとく 3 型に分類した。

Type I : 円筒形型 (南瓜型、卵円形型など不均等

な直径のものも含む)

Type II : 不正長方形型

Type III : ひょうたん型 (中央部に明らかなくびれのみられるもの)

各 Type の出現数は **Table 3** に示すごとくであった。

(3) 大きさ

星状神経節の大きさを測定し長径×短径で表した。

Table 4 のごとく大きさの平均は 5.39×2.09 mm で最大は Type III の 9.25×2.29 mm、最小は Type II

Table 3 Number of stellate ganglia

Type	R	L	Total
I	4	5	9 (45%)
II	2	3	5 (25%)
III	4	2	6 (30%)
Total	10	10	20

Fig. 1 Classification of stellate ganglia

Table 4 Average size of stellate ganglia

Type	R				L				R+L			
	(mm)	n	$\bar{x}$	SD	(mm)	n	$\bar{x}$	SD	(mm)	n	$\bar{x}$	SD
I	5.90×2.09	4	12.38	2.86	4.50×2.39	5	10.88	2.70	5.12×2.26	9	11.54	2.87
	(4.95×1.84 ~6.32×2.55)				(3.31×2.11 ~5.64×2.60)							
II	5.21×2.00	2	10.58	3.12	4.32×1.82	3	7.84	1.49	4.68×1.89	5	8.93	2.65
	(4.19×1.78 ~6.22×2.21)				(4.40×1.38 ~4.86×2.00)							
III	5.90×2.03	4	12.00	2.70	7.40×2.01	2	15.38	5.80	6.40×2.02	6	13.13	4.31
	(4.11×1.92 ~7.61×2.03)				(5.54×1.73 ~9.25×2.29)							
Average									5.39×2.09			

n=Number, $\bar{x}$ =Average, SD=Standard Deviation

の 4.40×1.38 mm であった。

4. 非癒合型交感神経節について

交感神経節は節間枝によって上下に連絡しているが、時には節間枝の消失している部位が観察された。この部位では上下の交感神経節は直接連絡し癒合してことになる。はなはだしい時には3個の神経節が癒合したとみられる長方形のかたまりが観察された。著者はこれらの神経節を癒合型交感神経節とし、独立して存在する神経節を非癒合型交感神経節として分類した。以下は非癒合型交感神経節の主要所見である。

(1) 出現数

非癒合型交感神経節は右側 76 個、左側 77 個で合

計 153 個観察された (Table 2)。これを高位別にみると Fig. 2 に示すごとく Th 4 位および Th 5 位と Th 11 位および Th 12 位では出現数が少なかった。

(2) 形状

非癒合型交感神経節の形は多様で松井⁷⁾、松島⁸⁾、Atumi⁹⁾、前田ら^{10,11)} はそれぞれに細かく分類しているが、著者は迫田⁹⁾ の分類に従った。Fig. 3 に示すごとく5型に分類した (Photo 7~10)

Type I : 長楕円形型

Type II : 三角形型

Type III : 四辺形型

Type IV : 星型

Type V : 不規則型

Fig. 2 Number of nonfusional form ganglia

Fig. 3 Classification of nonfusional form ganglia

Table 5 Number of nonfusional form ganglia

Type	R	L	Total
I	8	14	22 (14.4%)
II	41	36	77 (50.3%)
III	11	8	19 (12.4%)
IV	12	15	27 (17.7%)
V	4	4	8 (5.2%)
Total	76	77	153

各 Type の出現数は **Table 5** に示すごとくであった。これを高位別にみると **Table 6** のごとくであった。

(3) 大きさ

非癒合型交感神経節の大きさを測定し長径×短径で表した。 **Table 7** のごとく平均は 2.47×1.59 mm

で、最大は Type I の 4.88×1.94 mm, 最小は Type II の 1.10×0.53 mm であった。また、大きさを高位別に測定した結果は **Table 8** に示すごとくであった。

5. 癒合型交感神経節について (第2胸部交感神経節以下)

前記したごとく第1胸部交感神経節はすべて星状神経節に加わっていたので、以下に第2胸部交感神経節から下位の癒合型交感神経節について述べる。

(1) 出現数

癒合型交感神経節の出現数は **Table 9** に示すごとく右側 18 個, 左側 15 個で合計 33 個であった。これを高位別にみると **Table 10** のごとくで中位および下位に多くみられた。

Table 6 Nonfusional form ganglia in terms of level and type

Type	Th	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total	Total (R+L)
I	R	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	3	8	22
	L	0	1	3	2	0	0	1	3	2	0	2	14	
II	R	10	5	2	1	3	4	5	4	4	2	1	41	77
	L	7	4	2	4	2	4	4	2	4	3	0	36	
III	R	0	1	0	0	0	2	1	3	3	1	0	11	19
	L	0	2	0	0	3	0	1	2	0	0	0	8	
IV	R	0	1	1	2	3	1	2	0	1	1	0	12	27
	L	1	1	1	1	3	2	3	2	1	0	0	15	
V	R	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	8
	L	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	4	
Total		18	16	9	11	14	14	17	18	16	9	11	153	

Table 7 Average size of nonfusional form ganglia

Type	R				L				R+L			
	(mm)	n	$\bar{x}$	SD	(mm)	n	$\bar{x}$	SD	(mm)	n	$\bar{x}$	SD
I	2.81×1.37 (1.82×0.49 ~ 4.88×1.94)	8	4.19	2.62	3.04×1.75 (1.64×1.24 ~ 4.12×2.07)	14	5.43	2.04	2.95×1.61	22	4.98	2.35
II	2.19×1.58 (1.10×0.53 ~ 3.34×2.25)	41	3.52	1.26	2.41×1.62 (1.18×0.79 ~ 3.88×2.54)	36	4.07	1.88	2.29×1.60	77	3.78	1.60
III	2.34×1.67 (1.06×1.32 ~ 3.00×2.22)	11	4.00	1.56	2.44×1.61 (1.50×1.00 ~ 2.32×2.02)	8	3.93	1.12	2.15×1.49	19	3.97	1.39
IV	2.40×1.64 (2.25×1.15 ~ 3.16×2.14)	12	3.95	1.29	2.64×1.70 (1.48×1.30 ~ 4.56×2.15)	15	4.71	2.43	2.53×1.67	27	4.37	2.04
V	2.35×1.35 (1.52×1.42 ~ 3.54×1.38)	4	3.10	1.08	2.63×1.39 (1.94×1.09 ~ 3.44×1.36)	4	3.68	0.95	2.49×1.37	8	3.39	1.06
Average	2.47×1.59											

n=Number, $\bar{x}$ =Average, SD=Standard Deviation

Table 8 Average size of nonfusional form ganglia

Th	R				L				R+L			
	(mm)	n	$\bar{x}$	SD	(mm)	n	$\bar{x}$	SD	(mm)	n	$\bar{x}$	SD
2	2.36×1.69 (1.52×1.41 ~3.34×2.25)	10	4.09	1.49	2.20×1.57 (1.48×1.37 ~2.47×2.11)	9	3.42	0.97	2.28×1.64	19	3.84	1.30
3	2.53×1.68 (2.15×1.32 ~3.00×2.22)	8	4.27	1.11	2.83×1.69 (2.17×1.43 ~3.49×2.19)	7	4.89	1.57	2.67×1.68	15	4.56	1.38
4	2.39×1.90 (1.99×1.52 ~2.54×2.47)	3	4.59	1.33	2.99×1.75 (2.36×1.26 ~4.12×2.07)	6	5.32	2.00	2.79×1.80	9	5.08	1.84
5	2.15×1.49 (1.79×1.47 ~2.42×1.67)	4	3.21	0.52	2.52×1.75 (1.64×1.24 ~2.81×2.55)	7	4.54	1.74	2.38×1.65	11	4.05	1.56
6	2.18×1.60 (1.66×1.29 ~3.08×1.54)	6	3.50	0.90	2.76×1.91 (1.50×1.00 ~3.88×2.54)	8	5.00	2.36	2.51×1.78	14	4.69	2.34
7	2.42×1.59 (2.08×1.13 ~2.65×2.11)	7	3.87	1.04	2.85×1.79 (3.02×1.17 ~4.25×2.07)	7	5.09	1.65	2.63×1.69	14	4.48	1.51
8	2.48×1.50 (2.21×0.90 ~3.16×2.14)	8	3.79	1.31	2.50×1.66 (1.48×1.30 ~4.56×2.15)	9	4.32	2.28	2.49×1.59	17	4.07	1.90
9	2.19×1.40 (1.83×0.10 ~3.68×1.56)	9	3.22	1.77	2.61×1.52 (1.35×1.29 ~3.77×2.07)	9	4.10	1.77	2.40×1.46	18	3.66	1.82
10	1.96×1.36 (1.10×0.53 ~2.76×1.74)	9	2.79	1.27	2.31×1.40 (1.18×0.79 ~3.75×1.59)	7	3.38	1.49	2.11×1.38	16	3.05	1.40
11	2.73×1.60 (2.25×1.15 ~4.04×1.62)	6	4.34	1.35	1.58×1.24 (1.23×0.85 ~1.79×1.46)	3	2.02	0.69	2.35×1.48	9	3.57	1.61
12	2.50×1.19 (1.82×0.49 ~4.88×1.94)	6	3.31	2.82	3.09×1.55 (1.94×1.09 ~4.93×1.55)	5	4.84	1.85	2.77×1.36	11	4.00	2.55
Average (Th 2~Th12, R+L)									2.47×1.59			

Table 9 Number of fusional form ganglia

Type	R	L	Total
I	3	3	6 (18.2%)
II	9	5	14 (42.4%)
III	1	2	3 (9.1%)
IV	5	5	10 (30.3%)
Total	18	15	33

(2) 形状

Fig. 4 に示すごとく形状により次の4型に分類した。

Type I : 2 個の神経節が接着しておりその接合部には明らかにびれのみられるもの。

Type II : 2 個の神経節が接着しているがその接合部にはびれのみられないもの。

Type III : 3 個の神経節が癒合しているもの。

Type IV : 1 個の神経節から上下にわたる脊髄神経に交通枝を出すもの (同じレベルに他の神経節がみられない場合)

これらの癒合型交感神経節の出現数は Table 9 に示すごとくで最も多かったのは Type II の 14 個 (42.4%), 最も少なかったのは Type III の 3 個 (9.1%) であった。

(3) 大きさ

癒合型交感神経節の大きさを測定し長径×短径で表したところ Table 11 のごとくだった。大きさの平均は 4.89×1.71 mm であった。最大は右側の Type III で 11.04×2.76 mm で、最小は左側の Type IV で 1.76×1.19 mm であった。

6. 両側交感神経幹間の吻合枝 (横枝) について (Fig. 5~12, Plate 1~3, 5, 6, 8~10)

両側交感神経幹ないし神経節間を結合する吻合枝 (横枝) について成書では、しばしば存在するが第5腰椎以上の高さではまれであるとのみ記載されている (Gray ら²⁰⁾。腰部におけるこの吻合枝の存在については松島⁹⁾, Webber²⁴⁾ および迫田⁹⁾ の報告があるが

Table 10 Fusional form ganglia in terms of level and type

Level (Th)			R		L		Total
			num.	Type and num.	num.	Type and num.	
3	4		2	II × 2	1	II	3
3	4	5	0		2	III × 2	2
4	5		4	I, II × 3	1	II	5
4	5	6	1	III	0		1
5	6		1	IV	0		1
6	7		2	II × 2	2	I, II	4
7	8		1	II	1	II	2
8	9		1	II	0		1
9	10		0		1	II	1
10	11		1	IV	2	IV × 2	3
11	12		3	I, IV × 2	4	I, IV × 3	7
12	L ₁		2	I, IV	1	I	3
Total			18		15		33

Fig. 4 Classification of fusional form ganglia (Except stellate ganglia)

Table 11 Average size of fusional form ganglia (Except stellate ganglia)

Type	R				L				R+L			
	(mm)	n	$\bar{x}$	SD	(mm)	n	$\bar{x}$	SD	(mm)	n	$\bar{x}$	SD
I	4.72 × 1.49	3	7.04	1.15	5.04 × 1.57	3	7.83	0.92	4.88 × 1.53	6	7.44	1.12
	(3.76 × 1.44 ~5.29 × 1.50)				(3.99 × 1.68 ~5.36 × 1.67)							
II	4.99 × 1.97	9	10.01	3.46	4.48 × 1.60	5	7.33	2.23	4.81 × 1.84	14	9.05	3.34
	(3.78 × 1.82 ~7.19 × 2.59)				(3.56 × 1.23 ~5.47 × 2.01)							
III	11.04 × 2.76	1			7.37 × 1.82	2	13.71	4.07	8.59 × 2.13	3	19.30	8.57
					(6.47 × 1.47 ~8.27 × 2.15)							
IV	3.94 × 1.55	5	6.08	1.40	3.88 × 1.51	5	6.10	3.18	3.91 × 1.53	10	6.09	2.46
	(2.83 × 1.37 ~4.41 × 1.80)				(1.76 × 1.19 ~4.25 × 2.22)							
Average									4.89 × 1.71			

n=Number, $\bar{x}$ =Average, SD=Standard Deviation

Fig. 5 Anastomosis of case No. 1

胸部については報告がみられない。今回の著者の胸部における検索では 10 検体中 8 体 14 部位（下記第 1 例～第 14 例）に観察されたので各々の所見について述べる。

第 1 例：検索例 No. 1 (Fig. 5 中の 1)

右側 Th 2 位より出る 2 本の横枝が斜下方に走り、合して 1 本となり上行して左星状神経節に連絡する。なお右側起始部には、右星状神経節からの小枝が加わっている。

第 2 例：検索例 No. 1 (Fig. 5 中の 2)

右側 Th 4, Th 5, Th 6 位から出た横枝は合して 2 本となり椎体中央部前面を横走して左に向かい、複雑な分枝結合を繰り返して左側星状神経節から Th 8 位までの広い範囲に連絡している。

第 3 例：検索例 No. 1 (Fig. 5 中の 3)

右側 Th 9, 10 位より出た 2 本の横枝は椎体前面中央部で上下に結合した後、さらに左に向かって横走し左側 Th 9, 10 位に連絡する。

第 4 例：検索例 No. 2 (Fig. 6 中の 4)

右側より出る横枝の起始部は複雑で星状神経節下端から Th 4 位にまで及んでいる。これらの横枝は椎体前面で 3 本となり、再び分枝結合を繰り返して左側星状神経節から Th 5 位に及ぶ広範囲に連絡する。

第 5 例：検索例 No. 2 (Fig. 6 中の 5)

右側 Th 5, 6 位より出た 2 本の横枝は平行して左方へと走り左側 Th 6 位から Th 8 位に連絡する。

第 6 例：検索例 No. 2 (Fig. 6 中の 6)

右側 Th 9, 10 位より出た 2 本の横枝は右側内臓神経と連絡した後、1 本となって左方へと走り左側 Th 10 位と連絡する。

第 7 例：検索例 No. 3 (Fig. 7 中の 7)

両側 Th 8 位間の横位の連絡で、その経過中に左右の内臓神経とも連絡する。

第 8 例：検索例 No. 5 (Fig. 8 中の 8)

右側 Th 11, 12 位と左側 Th 12 位間の横位の連絡でその経過中に右側内臓神経と連絡する。

第 9 例：検索例 No. 6 (Fig. 9 中の 9)

右側星状神経節より出た 2 本の横枝は連結して 1 本となり左下方に向かい、椎体中央部

で反転し左上方へと向かい左側 Th 2 位と連絡する。

第 10 例：検索例 No. 6 (Fig. 9 中の 10)

右側 Th 3 位と左側 Th 4 位間の横位の連絡である。

第 11 例：検索例 No. 6 (Fig. 9 中の 11)

左右の Th 6 位間の横位の連絡である。

第 12 例：検索例 No. 8 (Fig. 10 中の 12)

Fig. 6 Anastomosis of case No. 2

Fig. 7 Anastomosis of case No. 3

Fig. 8 Anastomosis of case No. 5

右 Th 5 位より出た 3 本の横枝は合して 1 本となり椎体中央部でほぼ垂直に下方へ走り、第 8 胸椎前面で左方へと向かい、3 本に分枝して左側 Th 6 および Th 7 位と連絡する。

第 13 例：検索例 No. 9 (Fig. 11 中の 13)

右側 Th 5 位より出た横枝は左下方へと向かい第 6 胸椎中央部で左上方へと反転し、2 本に分枝して左側 Th 5 位と連絡する。

第 14 例：検索例 No. 10 (Fig. 12 中の 14)

右側 Th 3 位から Th 8 位の広範囲より出た 15 本の横枝は複雑に結合して叢を形成し、左下方へと向かい椎体中央部をやや斜走した後、左へ横走して左側 Th 4 位から Th 8 位にわたって連絡する。

7. 交通枝と脊髄神経前枝との吻合について

交感神経の交通枝は一般に同じレベルの脊髄神経前枝と連絡し、その数は 1 本から数本であるとされている¹²⁻²¹⁾。しかし脊髄神経と対応する同レベルの交感

Fig. 9 Anastomosis of case No. 6

神経節が欠除している場合や、脊髄神経前枝が上下の交感神経節や節間枝からの交通枝を受ける場合がある。脊髄神経前枝に連絡する交通枝の数は **Table 12**, **13** のごとくとなった。すなわち脊髄神経前枝1本が受ける交通枝の平均数は左右ともに約3本であった。高位別では Th 2 位の脊髄神経前枝が受ける交通枝が 73 本で最多であった。次に多かったのは Th 1 位の 70 本であったが、交通枝の数は下位に行くに従って減少する傾向がみられた。 **Table 13** は、脊髄神経前枝が上下のレベルの交感神経節や節間枝と交通する状

態を示したものであるが右側 51 本、左側 46 本、合計 97 本が観察された。これら 97 本のうち節間枝と脊髄神経前枝との交通枝は右側 11 本、左側 11 本、合計 22 本であった。これらの交通枝は脊髄神経からみて 1 椎体上下にずれた交感神経節や節間枝との結合であり、2 椎体以上ずれた交感神経節や節間枝との結合はみられなかった。最も多かったのは Th 2 位の脊髄神経前枝と星状神経節との交通枝で右側 9 本、左側 10 本、合計 19 本であった。

Fig. 10 Anastomosis of case No. 8

Fig. 11 Anastomosis of case No. 9

8. 交通枝と脊髄神経後枝との吻合について

交通枝と脊髄神経後枝との吻合については一般に成書ではその存在は記載されていないが Dass²⁹⁾ および当教室の藤倉²⁶⁾、迫田⁶⁾の報告がある。今回の著者の胸部における検索では 240 部位中 148 部位 (61.7%) に交通枝が脊髄神経後枝と結合していることが確認された (Table 14 および Plate 15)。高位についてみると上位ではやや少ない傾向がみられた。また、左右の差はあまりみられなかった。最多出現例は検索例 No. 9 の 24 部位中 23 部位、最少出現例は検索例 No. 1 の 24 部位中 1 部位と個体差が大きかった。

9. 交通枝と脊髄神経硬膜枝との吻合について

今回の著者の胸部における検索では交通枝から分岐した微細な小枝と脊髄神経硬膜枝とが結合している状態が観察され、Table 15 に示すごとく 240 部位中 51 部位 (21.3%) に確認された。

10. 副神経節 (ganglia intermedia) について (Plate 12, Photo 6)

交通枝の経過中にみられる肥厚部すなわち副神経節 (ganglia intermedia) は今回の著者の胸部における検索では 4 個観察された。第 1 例は検索例 No. 2 (Plate 2) で左側 Th 12 位、第 2 例は検索例 No. 3 (Plate 3) で左側 Th 12 位、第 3 例は検索例 No. 5 (Plate 5) で右側 Th 12 位、第 4 例は検索例 No. 9

Fig. 12 Anastomosis of case No. 10

Table 12 Number of rami communicantes to a ramus ventralis of ten fetuses

Level (Th)	R	L	Total
1	33	37	70
2	35	38	73
3	34	31	65
4	30	32	62
5	30	30	60
6	31	29	60
7	29	31	60
8	27	27	54
9	30	26	56
10	25	28	53
11	31	26	57
12	23	25	48
Total	358	360	718
Average	2.98	3.00	

(Plate 9) で右側 Th 11 位であった。これを迫田⁶⁾

の分類に従うと第 1~3 例はいずれも Type B, 第 4 例は Type C であった。ちなみに Type B は副神経節が完全に交通枝の経過中に存在するものであり, Type C は副神経節が脊髄神経に密接するものである。

考 察

当教室の迫田⁶⁾ は, 本邦人胎児死体 10 体を研究材料として腰部交感神経幹および幹神経節の形態学的特徴について検索し腰痛との関連について臨床解剖学的検討を加え報告した。今回著者はその一環として胸部交感神経幹と幹神経節について検索した。

(i) 胸部交感神経節の出現数の調査で胸部交感神経節の上界については, 今回の検索では 10 体の両側において星状神経節を観察しえたのでこれを上界とし

Table 13 Number of rami communicantes from different level of sympathetic trunk to a ramus ventralis

level of sympathetic trunk (Th)	Level of ramus ventralis (Th)	R	L	Total
1	→ 2	9	10 (1)	19 (1)
2	→ 3	8	5 (1)	13 (1)
3	→ 4	4 (2)	2	6 (2)
4	→ 5	3 (1)	3 (1)	6 (2)
5	→ 6	2	1	3
6	→ 7	2 (1)	2	4 (1)
7	→ 8	1 (1)	0	1 (1)
8	→ 9	0	0	0
9	→ 10	3 (1)	5 (2)	8 (3)
10	→ 11	7 (1)	4 (2)	11 (3)
11	→ 12	4	0	4
6	→ 5	1 (1)	0	1 (1)
12	→ 11	4 (1)	10 (3)	14 (4)
L1	→ 12	3 (2)	4 (1)	7 (3)
Total		51(11)	46(11)	97(22)

→=Direction

()=Rami communicantes from rami interganglionares

た。下界については第 12 胸部脊髄神経と交通枝を持つ交感神経節、すなわち第 12 胸部交感神経節であることについては一致しているが⁷⁻²²⁾、その同定については横隔膜 (松井⁷⁾、前田^{10,11)}、椎体 (Krause⁸⁾)、交通枝を特に重要視する (松島⁹⁾、Pick²²⁾)などを基準とする報告がある。松島⁹⁾は第 12 胸部交感神経節の位置が不定であること、また Pick²²⁾は、癒合、分裂によりその存在が明らかでないことなどにより同定が至難であることを強調している。実際に松島⁹⁾はその観察所見において第 12 胸部交感神経節はたびたび腹腔内あるいは横隔膜起始部の内に存在したと報告している。著者は前記のごとく松島⁹⁾および西村²³⁾に従い第 12 胸部脊髄神経と神経節との交通枝の走行状態および、神経節と椎体との位置関係 (第 11 胸椎から第 1 腰椎上に存在する神経節)により第 12 胸部交感神経節を同定した。また、同時に第 11 胸部交感神経節および第 1 腰部交感神経節も確認した。胸部交感神経節を観察するにあたり松井⁷⁾、松島⁹⁾は合併している神経節はこれを 2 個と数え、分割している神経節はこれを合わせて 1 個と数えて胸部交感神経節の出現数を松井⁷⁾は 11.2 個、松島⁹⁾は 11~12 個 (86% は 12 個)と報告している。ちなみに他の研究者⁹⁻¹¹⁾の報告も胸部交感神経節の出現数は 10~12 個であった。前田ら¹¹⁾は胎児 11.26 個、成人 11.25 個と報告して

いるが癒合型交感神経節および接触型交感神経節 (節間枝が存在するが極めて短く、2 ないし 3 個の神経節が相接する状態にあるもの)をそれぞれ分離して算定した。また、胎児と成人の癒合型交感神経節および接触型交感神経節の出現率の比較を行い胎児 8.87%、成人 3.23% にこれらの神経節が出現していたとも報告している。すなわちこのように癒合型および接触型交感神経節が胎児に多く出現するのは、神経節が個体の成長に従って分離していく事象を示すものであると推察している。今回の著者の検索では、癒合型および接触型交感神経節の接合部にも組織標本を作製してみると神経細胞が存在していることが確認されたのでこれらの神経節をすべて 1 個として算定した。その結果、検体 10 体における胸部交感神経節の総数は 206 個で平均は 10.3 個 (片側)となった。

(ii) 星状神経節については 10 検体 20 部位で 20 個すなわち 100% にその出現が観察された。ちなみに Atumi⁹⁾は星状神経節の出現率を 84%、前田ら¹¹⁾は胎児で 88.9%、成人で 81.3% であったと報告している。なお検索例 No. 1 の左側 1 部位のみで星状神経節は第 2 胸部神経節と癒合しておりこれは 5% の出現率である。Atumi⁹⁾は星状神経節 42 個中 2 個が第 2 胸部神経節をも癒合していたと報告しており、出現率は 4.76% で著者の出現率とほぼ一致する。形状については Atumi⁹⁾、前田ら^{10,11)}は星状神経節を南瓜型、不正長方形型、珠数型および卵円形型と 4 型に分類しているが、著者の検索では南瓜型と卵円形型との区別がつきにくくこれらを合わせて Type I とし 3 型に分類した。その結果、最も多かったのは Type I の 9 個 (45%) で、次いで Type III の 6 個 (30%)、Type II の 5 個 (25%) であった。Atumi⁹⁾、前田ら^{10,11)}の報告では南瓜型が過半数を占め (それぞれ 76.19% および 63.3%)、不正長方形型、珠数型、卵円形型がこれに次いでいた。大きさについては長径×短径を測定したところ最大は Type III の 9.25×2.29 mm で最小は Type II の 4.40×1.38 mm であった。平均値でみると Type III が最も大きく Type I、Type II がこれに次いでいた。星状神経節全体の平均は 5.39×2.09 mm であった。

(iii) 第 2 胸部交感神経節以下の神経節をその形態により非癒合型交感神経節と癒合型交感神経節に分類した。非癒合型交感神経節の同定については、隣接する神経節間に節間枝が存在し、かつ同じレベルの脊髄神経と交通枝をもっている神経節を非癒合型交感神経

Table 14 Rami communicantes to ramus dorsalis

Case	Th	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
1	R	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
2	R	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	10
	L	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	10
3	R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
	L	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
4	R	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11
	L	—	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	○	8
5	R	—	—	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	3
	L	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	2
6	R	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○	○	7
	L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
7	R	—	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	○	7
	L	○	○	○	○	—	○	○	○	—	○	○	○	10
8	R	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	4
	L	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○	6
9	R	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	11
	L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
10	R	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	—	5
	L	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	○	—	6
Total	R	4	5	6	7	6	7	5	7	6	6	7	5	71
Total	L	4	5	6	6	6	8	7	8	6	6	8	7	77
R+L		8	10	12	13	12	15	12	15	12	12	15	12	148

○=found, —=not found

節とした。出現数は右側 76 個，左側 77 個で合計 153 個であった。その出現状態を高位別にみると Th 4, Th 5 位および Th 11, Th 12 位で減少していた。これはこの部位で癒合型交感神経節が多いことを示し，また，この部位より内臓神経が派出することにも関連していると思われる。非癒合型交感神経節の形状については迫田⁹⁾の分類に従い 5 型に分類した。最も多かったのは Type II の三角形型で 77 個 (50.3%)，次いで Type IV の星型 27 個 (17.7%)，Type I の長楕円形型 22 個 (14.4%)，Type III の四辺形型 19 個 (12.4%)，Type V の不規則型 8 個 (5.2%) であった。各型の高位別出現数をみると Type I, II, III は上位から下位にまで分布しているが，複雑な形の Type IV, V が中位から下位にかけて多く出現するのは内臓神経との連絡や，胸部交感神経幹が椎体側面に移動することなどの影響が考えられる。大きさについては長径×短径として表したところ平均は 2.47×

1.59 mm であった。最大は Type I の 4.88×1.94 mm，最小は Type II の 1.10×0.53 mm であった。また，右側より左側のほうが大きく，下位に行くに従い小さくなる傾向がみられた。

(iv) 癒合型交感神経節(第 2 胸部交感神経節以下)については，節間枝が消失して上下の神経節が直接連絡している場合や，1 個の神経節から上下にわたる脊髄神経に交通枝を出し，かつ同じレベルに他の神経節が存在しない場合にこれらを癒合型交感神経節とし 4 型に分類した。癒合型交感神経節の出現数は右側 18 個，左側 15 個で合計 33 個であった。すなわち 16.0% の出現率となるが，これは Atumi⁹⁾の 3.75%，前田ら^{10,11)}の胎児 8.87%，成人 3.25% の癒合型交感神経節の出現率と比べかなり多い出現率であった。形状による分類では最も多かったのは Type II の 14 個 (42.4%) で最も少なかったのは Type III の 3 個 (9.1%) であった。これを高位別にみると Th 3~5 位お

Table 15 Rami communicantes to ramus meningeus

Case	Th	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
1	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
2	R	—	—	—	○	—	○	—	—	○	○	—	—	4
	L	—	○	—	○	○	—	○	○	○	—	○	○	8
3	R	—	—	—	○	○	○	—	—	—	○	○	—	5
	L	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	○	○	4
4	R	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	2
	L	—	—	○	—	—	○	○	○	—	—	—	—	4
5	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
6	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
7	R	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	2
	L	—	—	—	—	○	○	○	—	—	○	—	○	5
8	R	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	1
	L	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	○	○	5
9	R	—	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—	—	3
	L	—	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	8
10	R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Total	R	0	1	0	2	2	4	2	0	2	2	2	1	18
Total	L	0	1	2	2	3	5	3	4	2	3	4	4	33
R+L		0	2	2	4	5	9	5	4	4	5	6	5	51

○=found, —=not found

よび Th 10~12 位に多く出現する傾向がみられた。

(v) 両側交感神経幹間の吻合枝(横枝)は脊柱前面に接して走行しているため、脊柱から直接圧迫、牽引等の刺激を受けやすく背部痛の一因となりうるものである。その存在について腰部においては松島⁹⁾、Webber²⁴⁾、迫田⁶⁾の報告があるが胸部においては報告がみられない。今回の著者の胸部における検索では、10 検体中 8 体 14 部位において両側交感神経幹間の吻合枝を確認しえたのでその全例について図説した (Fig. 5~12)。

(vi) 交通枝と脊髄神経前枝との吻合は全部位において観察され 1 部位あたりの交通枝の数は両側とも平均 3 本であった。高位別にみると下位に行くに従って交通枝の数が減少していた。また、脊髄神経前枝が上下のレベルの神経節や節間枝と交通している部位が観察された。これらの交通枝は脊髄神経前枝からみて 1 椎体上下にずれた神経節および節間枝との交通であり

2 椎体以上、上下にずれた交通はみられなかった。

(vii) 交通枝と脊髄神経後枝との吻合については従来解剖成書にその記載はなくわずかに Dass²⁵⁾の報告があるのみであった。Dass は成人死体 2.5 体の頭部から腰仙部までの検索を行った結果 33 部位 (21.3%) において交通枝と脊髄神経後枝との吻合を確認し、これを 3 型に分類した。当教室の藤倉²⁶⁾は、成人死体 4 体の腰部 40 部位を検索しその 50% に交通枝と脊髄神経後枝との連結を確認し報告した。また、当教室の迫田⁶⁾は、胎児死体 10 体の腰部 100 部位を検索しその 34% に交通枝と脊髄神経後枝との連結を確認したと報告している。今回の著者の胸部における検索では、240 部位中 148 部位 (61.7%) に交通枝と脊髄神経後枝との連結を確認しえた (Plate 15)。

交通枝と脊髄神経後枝との連結の出現は右側 71 部位、左側 77 部位で左右の差はあまりないが最多出現例は検索例 No. 9 の 24 部位中 23 部位、最少出現

例は検索例 No. 1 の 24 部位中 1 部位と個体差が大きかった。Dass²⁸⁾ の検索で確認された 155 部位中 33 部位の交通枝と脊髄神経後枝との連結のうち 24 部位 (72.7%) は Th 1~11 位の間の胸部に確認されている。

(viii) 交通枝と脊髄神経硬膜枝との吻合については久良木²⁷⁾が腰部における脊髄神経硬膜枝の構成について検索し、交通枝も構成因子となっていると報告している。今回の著者の胸部における検索では、240 部位中 51 部位 (21.3%) に交通枝と脊髄神経硬膜枝との連結を確認した。

(ix) 副神経節は 4 個が確認された。いずれも Th 11 位および Th 12 位の脊髄神経前枝と連結している交通枝の経過上にあり迫田⁶⁾ の分類に従うと Type B が 3 個、Type C が 1 個であった。ちなみに副神経節について先人の報告は松井⁷⁾、岩間²⁸⁾、松島⁸⁾、藤倉²⁶⁾、Feneis²⁹⁾ および上記迫田⁶⁾ らのわずかな観察記録がみられるのみで胸部について言及しているのは松井⁷⁾ の 1 例の記載のみであった。

結 論

日本医科大学第 2 解剖学教室所蔵の胎児死体 (5~6 ヶ月齢) 10 体を用い、両側胸部交感神経幹の走行および吻合枝、交感神経節の形態、交通枝の状態について肉眼的観察を行い下記のごとき所見を得た。

1) 胸部交感神経幹は、頸部から胸部への移行部で方向を背方にとり、第 1 肋骨頭に達し、この部位で全例両側ともに第 1 胸部交感神経節は下頸神経節と合して星状神経節 (頸胸神経節) を形成していた。

2) 胸部交感神経節の総数 (星状神経節をも第 1 胸部交感神経節として算定) は 206 個であった。右側 104 個、左側 102 個で片側の平均は 10.3 個であった。

3) 星状神経節は形状により 3 型に分類した。星状神経節の大きさ (長径×短径) の平均は 5.39×2.09 mm であった。

4) 第 2 位以下のレベルの胸部交感神経節は総数 186 個観察され、またその形状により非癒合型交感神経節と癒合型交感神経節とに分類した。非癒合型交感神経節の出現数は 153 個でその出現率は 74.3% であった。また、非癒合型交感神経節は形状により 5 型に分類した。非癒合型交感神経節の大きさ (長径×短径) の平均は 2.47×1.59 mm であった。癒合型交感神経節の出現数は 33 個でその出現率は 16.0% であ

った。また、癒合型交感神経節は形状により 4 型に分類した。癒合型交感神経節の大きさ (長径×短径) の平均は 4.89×1.71 mm であった。

5) 両側交感神経幹間を結合する横位の吻合は、10 検体中 8 体の 14 部位に観察された。各々の所見については図説した。

6) 胸部交感神経幹の交通枝と脊髄神経前枝との吻合は全部位において観察され、その交通枝の総数は 718 本であった。交通枝の 1 部位あたりの平均数は左右とも 3 本であった。また、交通枝の数は下位に行くに従い減少していた。

7) 胸部交感神経幹の交通枝と脊髄神経後枝との吻合は、10 検体 240 部位中 148 部位 (61.7%) に確認された。その代表的所見については図説した。

8) 胸部交感神経幹の交通枝と脊髄神経硬膜枝との吻合は、10 検体 240 部位中 51 部位 (21.3%) に確認された。

9) 副神経節 (ganglia intermedia) は全例中に 4 個観察された。

稿を終るに臨み、終始ご指導ならびにご鞭撻を賜った日本医科大学第 2 解剖学教室の田沼久美子助教授に深甚なる謝意を捧げます。またご協力戴いた第 2 解剖学教室員各位に感謝の意を表します。

なお、本論文の要旨は第 68 回日本解剖学会関東地方会 (1984) において発表した。

文 献

- 1) Nathan, H.: Compression of the sympathetic trunk by osteophytes of the vertebral column in the abdomen; An anatomical study with pathological and clinical considerations. *Surgery*, **63**, 609~625, 1968.
- 2) 福山右門: 交感神経の解剖と外科への応用. 医学のあゆみ, **44**, 241~247, 1963.
- 3) 福山右門, 伊藤金得: 交感神経幹に出入する求心性神経線維について. 解剖誌, **41**, 199, 1966.
- 4) 福山右門: 自律神経系のなかの求心性神経線維. 解剖誌, **42**, 11~12, 1967.
- 5) 福山右門: 福山右門教授研究業績目録. 千葉大学医学部第 1 解剖学教室, 1975.
- 6) 迫田哲司: ヒト胎児腰部交感神経幹と幹神経節の形態学的検索. 日医大誌, **50**, 681~692, 1983.
- 7) Matsui, Y.: Beitrage zur Kenntnis der Anatomie des sympathischen Nervensystems. *Acta scholae medic, univers. Kioto*, **8**, 1~42, 1925.
- 8) 松島茂: 第 12 胸部交感神経節に就て. 満州医誌, **10**, 291~314, 1929.
- 9) Atumi, H.: Über den Verlauf, insbesondere die Spaltung und die sogenannte Unterbrechung des Brustgrenzstranges bei Japanern. *Redaktion der Okajimas Folia. Anat. Jap.*, **22**, 511~549, 1944.

- 10) 前田実行, 前原東作, 松元誠一: 九州日本人 (成人) の胸部交感神経節について. 鹿児島医誌, **33**, 1855~1857, 1960.
- 11) 前田実行, 松山静雄, 丸田実行: 九州日本人 (胎児) の胸部交感神経節について. 鹿児島医誌, **34**, 642~644, 1961.
- 12) 金子丑之助: 日本人体解剖学 3. 第15版, p. 632~658 南山堂, 東京, 1973.
- 13) 平沢興, 岡本道雄: 解剖学 2. p. 420~441, 金原出版, 東京, 1965.
- 14) Ranson, S.W.: *Anatomy of the Nervous System*. 9th edition, p. 135~150, W.B. Saunders, Philadelphia & London, 1953.
- 15) Mitchell, G.A.G.: *Anatomy of the Nervous System*. p. 201~256, E. & S. Livingstone, Edinburgh and London, 1953.
- 16) Kopsch, F.: *Lehrbuch und Atlas der Anatomie des Menschen*. Vol. 3, p. 318~335, Georg Thieme, Leipzig, 1953.
- 17) Braus, H.: *Anatomie des Menschen*. Vol. 3, 2nd edition, p. 350~365, Springer Verlag, Berlin, 1960.
- 18) Spalteholz, W.: *Handatlas der Anatomie des Menschen*. Zweiter Teil, p. 414~424, Schltema & Holkema N.V., Amsterdam, 1961.
- 19) Hollinshead, W.H.: *Anatomy for Surgeons*. Vol. 2, 2nd edition, p. 202~215, Harper & Row, New York, 1971.
- 20) Goss, C.M.A.B.: *Gray's Anatomy*. 29th American edition, p. 1010~1036, Lea & Febiger, Philadelphia, 1973.
- 21) Romanes, G.J.: *Cunningham's Textbook of Anatomy*. 12th edition, p. 810~821, Oxford Univ. Press, Oxford, 1981.
- 22) Pick, J.: The identification of Sympathetic Segments. *Ann. Surg.*, **145**, p. 355~365, 1957.
- 23) 西村貞男: 坐骨神経根と交感神経交通枝との交通に関する臨床的ならびに解剖学的研究. 日医大誌, **38**, 21~29, 1971.
- 24) Webber, R.H.: An analysis of the cross communications between the sympathetic trunks in the lumbar region in man. *Ann. Surg.*, **145**, 365~370, 1957.
- 25) Dass, R.: Sympathetic components of the dorsal primary divisions of human spinal nerves. *Anat. Rec.*, **113**, p. 493~501, 1952.
- 26) 藤倉国男: ヒト腰部交感神経交通枝の形態学的検索; 腰部交感神経交通枝と脊髄神経後枝との結合について. 日医大誌, **43**, 241~251, 1976.
- 27) 久良木孝晃: 腰部の脊髄神経硬膜枝に関する研究. 日医大誌, **40**, 143~152, 1973.
- 28) 岩間義夫: 腹部交感神経交通枝に於ける副神経節について. 日外宝, **3**, 1159~1169, 1926.
- 29) Feneis, H.: *Anatomisches Bildwörterbuch der inter-*

nationalen Nomenklatur, 3 Aufl. p. 312, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1972.

Legends

- Plate 1 Drawing of the thoracic portion of the sympathetic trunks of case 1
- Plate 2 Case 2
- Plate 3 Case 3
- Plate 4 Case 4
- Plate 5 Case 5
- Plate 6 Case 6
- Plate 7 Case 7
- Plate 8 Case 8
- Plate 9 Case 9
- Plate 10 Case 10
- Plate 11~15
- Photo 1, 2 Ventral aspects of the thoracic portions of the sympathetic trunks of case 9
- Photo 3, 4 Stellate ganglia
- Photo 5 Cross communications between the right and the left sympathetic trunks in case 2
- Photo 6 Ganglia intermedia on the ramus communicants in case 2
- Photo 7~10 Nonfusional form ganglia
- Photo 11~14 Fusional form ganglia
- Photo 15, 16 Rami communicantes to the dorsal ramus of the thoracic spinal nerve
- Schemata 15', 16' Schemata of photos 15 and 16
- Ventral ramus of the thoracic spinal nerve in photo 15 and schema 15' was turned over upward in photo 16 and schema 16'.

Abbreviations

- AN: Anastomosis between the right and the left sympathetic trunks
- GI: Ganglia intermedia
- GS: Spinal ganglion
- L: Lumbar spinal nerve
- RC: Ramus communicants to the thoracic spinal nerve
- RCD: Ramus communicants to the dorsal ramus of the thoracic spinal nerve
- RCV: Ramus communicants to the ventral ramus of the thoracic spinal nerve
- S: Stellate ganglion
- SP: Splanchnic nerve
- T: Sympathetic trunk
- Th: Thoracic spinal nerve

(受付: 1985 年 1 月 7 日)

Plate (1)

Case 1

Plate (2)

Case 2

Plate (3)

Case 3

Plate (4)

Case 4

Plate (5)

Case 5

Plate (6)

Case 6

Plate (7)

Case 7

Plate (8)

Case 8

Plate (9)

Case 9

Plate (10)

Case 10

Plate (11)

Plate (12)

Plate (13)

Plate (14)

Plate (15)

15'

16'