— 原 著 —

膵疾患の腹腔鏡的アプローチ法と生検

石田 博

日本医科大学第3内科学教室 (主任: 野村武夫教授)
指導: 常岡健二教授

A laparoscopic approach to and biopsy of pancreatic diseases

Hiroshi Ishida

The Third Department of Internal Medicine, Nippon Medical School

Either laparoscopy or laparoscopy with a biopsy of the pancreas under direct observation were performed on 124 patients suffering from various pancreatic diseases during the period of 1976 through 1981.

The pancreas was observed by supragastric pancreoscopy or by a new method designated as "supragastric bursoscopy". Supragastric bursoscopy entails the following steps.

The head end of the operating table is raised in order to inspect the lesser omentum. Next, a forceps is inserted into the peritoneal cavity and a lesser omentotomy is performed. The surface of the body of the pancreas can be observed directly from this opening in the lesser omentum. When the laparoscope is moved further into the peritoneal sac via this incision, it is possible to observe the surface of the pancreatic body over a fairly wide range.

When there was no manifested clotting disorder, a pancreatic biopsy was performed percutaneously with a fine needle, such as the Menghini needle, the Trucut needle, or the Robber's forceps.

Results.

1) Among 28 cases of acute pancreatitis, the pancreas could be observed at laparoscopy in 21 (75%).

2) Among 25 cases of chronic pancreatitis, the pancreas could be successfully observed in 17 (68%). There were diverse laparoscopic findings from almost normal to sclerotic and neoplastic.

3) Among 71 cases of pancreatic carcinoma, the laparoscopic diagnosis was accurate in 32% of the cases of head carcinoma and in 85% of the cases of body and tail carcinoma, respectively.

4) In 50 cases of pancreatic carcinoma, a laparoscopic cytodiagnosis was performed using a fine needle and the overall positive rate was 70%.

5) A laparoscopic tissue biopsy was performed in 44 cases of pancreatic carcinoma and the positive diagnostic rate was 70.5%.

6) When the results of cytodiagnosis and tissue diagnosis were combined, the diagnosis was positive in 20 of 27 cases of head carcinoma (74.1%) and in 28 of 32 cases of body and tail carcinoma (87.5%).

7) No fatal complications occurred in the 215 pancreatic biopsies. However, non-fatal complications were seen in seven cases (3.3%) and all were successfully treated by conservative treatments.

It is concluded that this may offer a very versatile diagnostic method in various pancreatic diseases.

Key words : laparoscopy, pancreatic disease, pancreatic biopsy

結 言

近年、腹腔鏡検査法は機材の改良、笑気ガス (N_2O) 気腹法の導入により、きわめて安全性の高い検査法となり、これに伴い特に本邦、西独を中心に最後に残された臓器である膵臓への腹腔鏡的アプローチが試みられるようになってきた。膵腹腔鏡検査法の開発は、内視鏡的肉眼診断はもとより直視下膵狙撃生検の安全性を可能にするものであり、従来より生検が困難なために立遅れている膵疾患の病理形態学的背景を明らかにしうるものとして期待される。

このような状況から、著者はまず屍体膵を用いた基礎的検討をもとに新しい膵腹腔鏡検査法と直視下膵生検法を開発し、さらに本法の有用性を各種膵疾患について確認した。すなわち、著者らの方法による膵観察可能例は膵炎 53 例中 38 例 (71%)、膵癌のうち特に臨床診断の困難な膵体尾部癌の診断率は 33 例中 28 例 (85%) に達した。

また腹腔鏡下膵生検 215 例のうち致死の合併症はなく、非致死の合併は 7 例 (3.3%) にすぎなかった。

研究対象および方法

(1) 対象

1) 剖検例

最初に種々の疾患により死亡した剖検例 11 例について、腹腔鏡による膵表面観察可能範囲を検討した。さらに屍体膵 50 例を対象に、各種膵生検器具 (Robber's 鉗子, Menghini 針, Tru-cut 針) を使用して組織を採取し型のごとく HE 染色標本を作製し、それ

ぞれについて主に生検合併症の危険性の面より膵管系、脈管系を中心に組織学的に検討した。

2) 臨床例

昭和 51 年 1 月から 56 年 12 月の期間に、日本医科大学付属病院第 3 内科入院患者のうち、腹腔鏡検査を受けた急性膵炎 28 例、慢性膵炎 25 例、膵頭部領域癌 38 例、膵体尾部癌 33 例の計 124 例を対象とした。急性膵炎は臨床所見、血液生化学所見より、慢性膵炎は日本膵臓病研究会診断基準に基づき診断した。膵癌は臨床的諸検査により診断が疑われ、膵生検、開腹手術、剖検により確定診断された症例である。

(2) 方法

1) 腹腔鏡検査

検査日早朝に微温湯による浣腸を行い、朝食を絶食とし午前中に検査を行った。

腹腔鏡は、町田製拡大腹腔鏡 LA-SL-CX と 2 channel 式処置用腹腔鏡²⁾の 2 機種を使用した。

鏡筒用トラカール刺入部位は、一般的な臍の左 1 横指、上方 2 横指の点とし、検査中は、アネソキシ (N_2O 30%, O 70%) による吸入麻酔を 4 l/min の割合で行い、検査に伴う苦痛の緩和を図った。

2) 膵観察法 (Fig. 1)

膵は後腹膜腔に位置しており、さらに周囲を胃、肝臓、小網、大網、胃十二指腸間膜、胃結腸間膜によって覆われている。網膜脂肪沈着の少ない例では、大網または小網を透して膵表面の一部が観察可能であるが、膵の直接観察のためには、膵頭部では大網切開、膵体尾部ではスコープが Winslow 孔、小網、胃結腸間膜を通過して網嚢内に到達することが必要となる。

Fig. 1 Diagrammatic representation of the technique for inspection of the pancreas

i. 膵頭部観察法

膵頭部は大網の脂肪沈着の少ない場合は、そのまま透明な網膜を透して胃幽門洞大弯側に観察可能である。大網脂肪沈着の多い症例では、胃幽門洞大弯側の膵頭部を鉗子にて偏位または切開して観察した。

ii. 上胃の膵臓鏡

1972 年 Meyer-Burg¹⁾ の報告した観察法であり、薄く透明な小網上より膵体部を間接的に透視観察する方法である。

iii. 網嚢鏡 (bursoscopy)

最初に著者の方法、上胃の網嚢鏡、supragastric bursoscopy²⁾ について述べる。LA-SL-CX による一般的な腹腔内照診後に内視鏡検査台を操作し、約 30 度まで頭部を挙上し、場合によってはさらに左側挙上位をとらせ、胃部を下げ肝左葉下に小網をできるだけ露出させる。小網の性状は個人差が多く、脂肪沈着のない場合は透明に近く小網を隔てて膵体部が観察される。しかし、一般的には小網への脂肪沈着が多く、小網上よりの透視観察では不十分のことが多い。次に左季肋下より 1 本の鉗子を腹腔内に挿入し、鉗子で小網を把持しかつ鈍的に切開する。この小網切開孔より膵体部表面が直接観察されるが、さらにこの切開孔を通して網嚢内に鏡筒を進め、網嚢鏡の状態にすると、膵体尾部のかなり広い範囲にわたって膵表面の直接観察が可能となる。小網の脂肪沈着が多く鉗子による切開が困難な時は 2 channel 式処置用腹腔鏡を利用し、経腹腔鏡的に挿入された 2 本の鉗子にて小網切開を行った。

下胃の網嚢鏡 (infragastric bursoscopy) は、1973 年 Ottenjann³⁾ が報告した方法である。背臥位にて上腹部より 2 本の特殊な鉗子を腹腔内に挿入し、互いの操作にて胃結腸間膜を切開する。この切開孔より網嚢内に鏡筒を進め膵体部を直接観察する方法である。

(3) 膵生検法

膵生検は術前に出血時間、凝固時間、プロトロンビン時間の測定を行い、出血傾向のない場合に、直径 0.6, 0.8 mm の細径針、直径 1.0, 1.2, 1.4 mm の

Menghini 針、Robber's 生検鉗子、匙鉗子、Tru-cut 針を選択使用し、経皮的に行った。一部の症例においては、2 channel 式処置用腹腔鏡を利用し、長径 400 mm の long Menghini 針を用いて経腹腔鏡的生検を行った。生検後は鉗子による圧迫止血を行い、内視鏡的に止血を確認してから検査を終了した。

成 績

1. 剖検例での検討

(1) 膵表面観察可能範囲

剖検中に胃幽門洞大弯側の膵頭部を偏位または除去し、膵頭部領域の観察可能範囲を決定した。さらに小網を除去し胃小弯上に露出する膵体部の観察可能範囲を決定し、摘出した膵の前面面積に対する割合を Videomat-II (Zeiss) によって測定した。その結果、①膵頭部の可視域は膵前面面積の 11%、②膵体部の可視域は小網除去により膵前面面積の 20%、網嚢内へのスコープ挿入により 34% であった。しかし、実際の腹腔鏡検査例における膵表面可視範囲は、種々の制限のためにこれら剖検例での成績より若干低値であると考えられる。

(2) 膵生検

屍体膵 50 例について臨床生検と同様な方法で膵組織を採取し、生検危険性の面より脈管系、膵管系を中心に組織学的に検討した。

Table 1 のごとく、Tru-cut 針による標本 51 例中には、小葉間のレベル以上の膵管は 57%、100 μ 以上の動脈、300 μ 以上の静脈はそれぞれ標本の 45%、59% にみられた。1.2 mm Menghini 針による標本 82 例中、小葉間レベル以上の膵管は 29%、上述の動脈、静脈はそれぞれ 41%、43% にみられた。また Robber's 生検鉗子による標本 82 例においては、上述の膵管、脈管は、それぞれ標本の 23%、17%、21% に観察された。

Tru-cut 針、1.2 mm Menghini 針を用いて採取した膵組織標本の 50% 前後に小葉間以上の膵管ある

Table 1 Frequency of ducts and vessels in pancreatic specimens from 50 autopsy cases

No.	Pancreatic ducts		Pancreatic vessels		Langerhans islet
	Interlobular	Intralobular	Artery	Vein	
Trucut needle 51	29 (57%)	51 (100%)	23 (45%)	30 (59%)	41 (80%)
Menghini needle 82 (ϕ 1.2 mm)	24 (29%)	69 (84%)	34 (41%)	35 (43%)	78 (95%)
Robber's forceps 82	19 (23%)	72 (88%)	14 (17%)	17 (21%)	48 (59%)

は太めの脈管がみられ、臨床例での使用に際しては、出血、膵炎、膵瘻などの合併症の危険性がかなり高いものと思われる。これに対し、鉗子類による生検は、針生検に比べれば安全性が高いと推定される。

2. 臨床例の検討

(1) 急性膵炎

1) 腹腔鏡診断

Table 2 に示すごとく、急性膵炎 28 例の膵観察可能例は 21 例 (75%) であった。このうち 13 例が浮腫性膵炎と視診され、1 例が緊急腹腔鏡検査により出血壊死性膵炎と診断され、緊急手術の適応が決定された。残り 7 例は、腹腔鏡的に膵炎の所見に乏しかった。観察不可能例は 7 例あり、5 例は小網脂肪過多、2 例は腹腔内癒着がその原因であった。

Table 3 に急性膵炎の腹腔鏡所見を示す。浮腫性膵炎においては、膵は通常発赤調を増し浮腫状に腫脹し膵表面の分葉構造は消失してくる (**Photo 1**)。消息子による圧診にて正常膵より硬く、圧痛がある。腹腔内変化として 6 例 (46%) に脂肪壊死巣、2 例に網膜浮腫、1 例に胆のう炎所見がみられた。出血壊死性膵

炎においては、膵体部出血、網嚢内血腫がみられ、腹腔内には腹膜炎、血性腹水、多発脂肪壊死巣嚢胞形成などの多彩な所見が観察された (**Photo 2**)。

Table 4 は、Forell 臨床重症度分類と腹腔鏡診断と比較したものである。腹腔鏡診断正常型は、Forell 分類軽症型が多く、臨床診断に問題があったか、もしくは軽症膵炎例と推定される。腹腔鏡診断浮腫性膵炎例は Forell I・II 型が多く、出血壊死性膵炎例は Forell III 型を示し、両者の成績は良く一致していた。

2) 生検 (**Table 5**)

急性膵炎の生検は、16 例に施行された。このうち 10 例は網膜の白色斑部より生検され、残り 6 例が膵体部よりの生検である。10 例の白色斑は、病理組織学的に全例脂肪壊死巣と診断された。膵体部よりの生検 6 例中 2 例は間質浮腫、腺房解離、好中球を中心とした炎症性細胞浸潤の所見より、浮腫性膵炎と診断された。1 例は膵体部腫瘤よりの生検であり、壊死性膵炎と診断され、残り 3 例は組織学的に炎症像がなく、正常膵とされた。

(2) 慢性膵炎

1) 腹腔鏡診断 (**Table 2**)

Table 2 Diagnostic accuracy of laparoscopy in the case of pancreatitis

	Inspected		Not inspected	
	No. (%)	Finding	No. (%)	Case
Acute pancreatitis n=28	21 (75)	Edematous 13 Hemorrhagic 1 Normal 7	7 (25)	Fatty omentum 5 Adhesion 2
Chronic pancreatitis n=25	17 (68)	Chronic pancreatitis 12 Normal 3 Pancreatic cancer 2	8 (32)	Fatty omentum 5 Adhesion 2 Operation 1

Table 3 Laparoscopic findings of acute pancreatitis

A. Edematous type	edematous swelling of the pancreas edematous change of the omentum peripancreatic fatty necrosis yellowish serous ascites cholecystitis local peritonitis
B. Hemorrhagic-necrotizing type	hemorrhage into the lesser peritoneal sac fatty necrosis of the pancreas and the surrounding adiposal tissue hemorrhagic ascites pancreatic pseudocyst panperitonitis

Table 4 Laparoscopic diagnosis and Forell classification of acute pancreatitis

Laparoscopic diagnosis	No.	Forell classification		
		I (mild)	II	III (severe)
Normal pancreas	7	6 (86%)	1 (14%)	—
Edematous pancreatitis	13	8 (61%)	5 (39%)	—
Hemorrhagic-necrotizing pancreatitis	1	—	—	1 (100%)
Not classified	5	2 (40%)	2 (40%)	1 (20%)

Table 5 Results of the biopsy in the cases of acute pancreatitis

Laparoscopic finding	No.	Biopsy site	Fatty necrosis	Normal pancreas	Interstitial edema	Inflammatory cell	Necrosis
White spot	10	omentum	10				
Normal pancreas	2	pancreas		2			
Edematous pancreatitis	3			1	2	2	1
Hemorrhagic-necrotizing pancreatitis	1		1				

日本膵臓病研究会診断基準による慢性膵炎 25 例のうち膵観察可能例は 17 例 (68%) であった。このうち腹腔鏡所見により慢性膵炎と診断されたものは 12 例 (71%), 正常膵とされたもの 3 例 (18%), 膵の髄様白色調, 表在血管の不正像, 石様硬より膵癌と診断されたものが 2 例 (12%) であった。膵表面観察不可能 8 例の原因は, 膵周囲炎による癒着 7 例, 既往手術による癒着 1 例であった。

Table 6 に慢性膵炎の所見を示す。舌様軟のほぼ正常膵に近い例から髄様白色, 石様硬, 血管不正より膵癌と鑑別しにくい例までみられるが, 一般的な慢性膵炎の腹腔鏡所見としては, 膵表面顆粒状結節, 微細血管増生, 小網膜体部間の癒着などがあげられ, 特にゾンデ操作による膵硬化所見の把握が重要である (**Photo 3**)。また限局性膵腫瘍形成例においては, 被膜浸潤を伴わない膵癌との鑑別が困難であり, 腹腔鏡診断の限界ともいえ, この場合には直視下生検の併用が必要となる。

2) 細胞診生検

慢性膵炎 5 例において, 膵癌の存在を否定するため直径 0.6 mm の細針を使用して, 細胞診を行った。5 例とも十分量の細胞成分が採取され, いずれも癌細胞陰性であった。組織生検は 17 例に行われ, 14 例に膵組織が採取された。残りの 3 例は, 線維組織の採取にとどまり, 肥厚した被膜や peripancreatitis の部分よりの生検組織像と思われる。膵実質の採取された 14 例について線維性結合組織の増生, 炎症性細胞浸潤の有無, 外分泌腺細胞の変化について, 腹腔鏡所見

との関連性の上から検討した。膵線維化は, I 型: 軽度 (**Photo 4**), II 型: 中等度 (**Photo 5**), III 型: 高度 (**Photo 6**) の 3 型に分類した。外分泌腺細胞の変化は, 正常ないし軽度萎縮, 変性を I 型とし, 中等度以上の萎縮, 変性を II 型とした。

Table 7 に示すように, 腹腔鏡的に正常膵に近いと診断された 3 例は, 膵線維化, 外分泌腺細胞の変化ともに I 型を示した。腹腔鏡診断が慢性膵炎の 10 例において, 膵線維化は I 型 2 例, II 型 5 例, III 型 3 例であり, 外分泌腺細胞の変化は I 型 3 例, II 型 7 例であった。腹腔鏡的に膵癌と診断された 1 例には, III 型の高度線維化, II 型の外分泌腺細胞の萎縮, 変性がみられた。

腹腔鏡的膵肉眼所見と膵組織の結合組織増生度は, かなり良く一致し, 白色調, 表面凹凸不平が進行する例ほど結合組織増生が高度であった。しかし臨床検査により慢性膵炎と診断された例においても, その生検像の組織学的変化が軽度な症例がみられた。慢性膵炎が肝炎その他の臓器炎症と異なり, 病変分布に不規則性を持つことは周知の事実であり, これらの例では軽度病変部より生検された可能性が強い。慢性膵炎の生検はこの特異性のために膵の広範囲な肉眼観察所見をふまえた上で選ばれる部位より施行することが重要と思われる。

(3) 膵癌

膵癌における腹腔鏡診断は, ①膵の解剖学的位置における表面悪性像を呈する腫瘤, ②膵腫瘍に肝転移, 播種性転移を伴うもの, ③表面悪性像を呈する硬化膵

Table 6 Laparoscopic findings of chronic pancreatitis

1. the size of the pancreas varies with the severity of the disease
2. smooth or uneven pancreatic surface with whitish color
3. indistinct lobular pattern
4. inflammatory adhesion between lesser omentum and pancreatic surface
5. the organ is indurated by probe palpation
6. chronic pancreatitis shows wide macroscopic variation
7. collateral circulation due to pre-hepatic block
8. cholestatic liver, occasionally
9. the pancreatic biopsy is sometimes needed for differential diagnosis

Table 7 Correlation between laparoscopic diagnosis and histological findings in the cases of chronic pancreatitis

Laparoscopic diagnosis \ Histology	Fibrosis			Atrophy of parenchyma		Cell infiltration	
	I	II	III	I	II	I	II
Normal pancreas n=3	3	0	0	3	0	3	0
Chronic pancreatitis n=10	2	5	3	3	7	3	7
Pancreatic carcinoma n=1	0	0	1	0	1	0	1

Table 8 Diagnostic accuracy of laparoscopy in the cases of carcinoma of the pancreas

	Laparoscopic diagnosis		
	correct n (%)	false negative	false positive
Carcinoma of the head of the pancreas n=38	12 (32)	26 (68)	
		16 head tumor	
		7 obstructive jaundice	1/13 (7.7)
		1 retroperitoneal tumor	
		1 secondary liver cancer	
		1 intrahepatic cholestasis	
Carcinoma of the body and tail of the pancreas n=33	28 (85)	5 (15)	
		2 body tumor	4/32 (12.5)
		2 pancreatic cyst	
		1 obstructive jaundice	

の場合を、癌の直接所見とした。

1) 膵頭部領域癌の腹腔鏡診断

臨床的諸検査により膵癌が疑われ、後に開腹手術、剖検にて確定診断された膵頭部領域癌 38 例のうち、腹腔鏡診断が膵癌であったものは 12 例 (32%) であった。16 例 (42%) は膵頭部腫瘍、7 例 (18%) は閉塞性黄疸と診断されたにとどまった (Table 8)。これに対して腹腔鏡診断が膵頭部領域癌であった 13 例のうち、胃幽門洞進行癌 1 例を膵癌と誤診していた。Table 9 に膵頭部領域癌の腹腔鏡所見を示す。これら直接所見のほかには膵頭部領域癌に起因する間接所見、すなわち胃幽門洞変形、側副血行路の形成、緊満腫大し

た胆嚢などを診断の手がかりとするが、腹腔鏡視診は十分な診断根拠を持つとはいえない。

2) 膵体尾部癌の腹腔鏡診断

膵体尾部癌 33 例中、腹腔鏡診断が膵体尾部癌であったのは 28 例 (85%) であった。残り 5 例が腹腔鏡的に非膵癌とされ、2 例が膵体部腫瘍、2 例が膵嚢胞、1 例が閉塞性黄疸と診断された (Table 8)。これに対して腹腔鏡診断が膵体尾部癌であった 32 例のうち、実際は非膵癌であったのが 4 例 (12.5%) あり、これらの確定診断は慢性膵炎 2 例、他癌の膵周囲転移 1 例、脂肪化膿 1 例であった。

Table 10 に膵体尾部癌の腹腔鏡所見を示す。膵体

Table 9 Laparoscopic findings of carcinoma of the head of the pancreas

A) Direct sign	1) malignant tumor in the duodenal C-loop
	2) head tumor with liver metastasis or dissemination
B) Indirect sign	1) cholestatic liver
	2) large, distended gallbladder
	3) collateral circulation due to the pre-hepatic block
	4) deformity of the antrum of the stomach

Table 10 Laparoscopic findings of carcinoma of the body and tail of the pancreas

A) Direct sign	1) malignant tumor in the anatomical position of pancreatic body and tail
	—whitish tumor with proliferation of irregular vessels—
	2) tumor of pancreatic body with liver, lymph node metastasis
B) Indirect sign	1) deformity of the corpus of the stomach
	2) left lobe of the liver may be pushed upward by the tumor
	3) marked collateral circulation due to pre-hepatic block
	4) cholestatic liver, distended gall bladder occasionally

Table 11 Classification of intraperitoneal spread of carcinoma of the pancreas

1. Liver metastasis	3. Dissemination to the peritoneum
H 0 : metastasis (—)	P 0 : dissemination (—)
H 1 : metastasis to the one lobe	P 1 : disseminated to the peripancreatic peritoneum
H 2 : a few metastatic lesions to the both lobes	P 2 : a few metastatic lesions to the distant peritoneum
H 3 : many metastatic lesions to the both lobes	P 3 : many metastatic lesions to the distant peritoneum
2. Infiltration to the pancreatic capsul	4. Tumor
S 0 : infiltration (—)	T 0 : tumor (—)
S 1 : doubtful	T 1 : tumor under a size of sparrow-egg
S 2 : infiltrated to the capsul	T 2 : about a size of hen's egg
S 3 : infiltrated the organs beyond the capsul	T 3 : tumor over a size of goose-egg

尾部癌は頭部領域癌と比較すると、より大きな腫瘍を形成することが多い。このため、膵体尾部癌の存在を示唆する間接所見としては、膵腫瘍による周辺臓器の圧排像が中心となる。すなわち、腫瘍による肝左葉挙上、胃体部の挙上・変形、脾静脈圧迫や血栓形成による側副血行路の発達などがあげられる。特に膵体尾部癌例の側副血行路形成は、肝硬変などの肝性ブロックによる門脈圧亢進にみられる所見よりも著しく高度であり、特徴的である (Photo 7)。このように膵体尾部癌の場合、腹腔鏡による肉眼診断率は 85% と高率であり、腹腔鏡検査は高精度の診断能力を有すると考えられた。

3) 膵癌の腹腔内進展度

腹腔鏡により膵癌の腹腔内進展度を判定するために日脾研膵癌取扱規約を参考にして Table 11 のよう

な基準を設定した。すなわち H (肝転移), S (漿膜浸潤), P (腹膜転移), T (腫瘍) の各因子別に進展度を 3 段階に分類し、膵頭部領域癌と膵体尾部癌について比較、検討した。腹腔鏡的に各因子の進展度判定が、癒着、網膜脂肪過多などにより困難な場合は不明例とした。

Table 12 に示すように、H 因子陽性率は膵頭部領域癌 10.8%, 膵体尾部癌 50.0% であった。膵体尾部癌は、膵頭部領域癌に比べ約 5 倍の肝転移がみられ、しかも有転移例のうち Grade 2, 3 の進行例がそれぞれ 31%, 38% を占めており、広範な転移例が多かった。不明例を除いた S 因子の陽性率は、膵頭部領域癌 55%, 膵体尾部癌 92% であった。癌の被膜浸潤は、表面髓様白色調、微細不正血管の増生あるいは小網、大網への連続性進展像の存在により判定した。P 因子

Table 12 Intraperitoneal spread of carcinoma of the pancreas

	H-factor					S-factor					P-factor					T-factor				
	(un-known)	0	1	2	3	(un-known)	0	1	2	3	(un-known)	0	1	2	3	(un-known)	0	1	2	3
Carcinoma of the head of the pancreas n=38	(1)	33	2	1	1	(18)	9	3	6	2	(1)	28	5	2	2	(1)	10	14	10	3
			(10.8%)					(55%)					(24.3%)					(73%)		
Carcinoma of the body and tail of the pancreas n=33	(1)	16	5	5	6	(7)	2	3	14	7	(0)	13	11	6	3	(0)	5	2	15	11
			(50.0%)					(92.3%)					(60.6%)					(84.8%)		

Table 13 Results of aspiration cytology for the diagnosis of carcinoma of the pancreas

Laparoscopic diagnosis	Carcinoma	Tumor	Obstructive jaundice	Diagnostic rate
Carcinoma of the head of the pancreas n=26	$\frac{7}{9}$ (77.8)	$\frac{7}{13}$ (53.8)	$\frac{1}{4}$ (25.0)	$\frac{15}{26}$ (57.7)
Carcinoma of the body and tail of the pancreas n=22	$\frac{15}{18}$ (83.8)	$\frac{3}{3}$ (100)	$\frac{0}{1}$ (0)	$\frac{18}{22}$ (81.8)
Diffuse carcinoma n=2	$\frac{2}{2}$ (100)	—	—	$\frac{2}{2}$ (100)
	$\frac{24}{29}$ (82.8)	$\frac{10}{16}$ (62.5)	$\frac{1}{5}$ (20.0)	$\frac{35}{50}$ (70.0)

は膵頭部領域癌の 24%, 膵体尾部癌の 61% に陽性であり, T 因子陽性すなわち腫瘍形成例は, 頭部領域癌, 体尾部癌ともに 80% 前後であり, 膵癌では萎縮硬化型よりも腫瘍形成型のほうがはるかに多いといえる。膵頭部領域癌の腫瘍は, 半数以上が鶏卵大よりも小さく, 体尾部癌においてはほとんどが鶏卵大以上の腫瘍を形成し, このうち約 40% が鶏卵大以上の腫瘍であった。

4) 膵癌の細胞診 (Table 13)

膵癌症例 71 例中 50 例において腹腔鏡的肉眼診断

決定後に, 直視下に最適生検部位を決定し, 直径 0.6 または 0.8 mm の細針針を使用し吸引細胞診を行った。Table 13 に示すように, 癌細胞陽性率は膵頭部領域癌 57.7%, 膵体尾部癌 81.8%, 膵全体癌 100% であり, 平均 70.0% であった。これを腹腔鏡診断との関連の上で検討すると, 腹腔鏡診断膵癌例の癌細胞陽性率は 82.8%, 膵腫瘍, 閉塞性黄疸の癌細胞陽性率は, それぞれ 62.5%, 20.0% であった。本来, 腹腔鏡的に癌と診断しえない症例の診断率向上のために併用される細胞診成績が, 閉塞性黄疸の症例において良

Table 14 Results of tissue biopsy for the diagnosis of carcinoma of the pancreas

biopsy finding	Fibrofatty tissue	Normal pancreas	Chronic pancreatitis	Malignancy
Carcinoma of the head of the pancreas n=18	6	1	2	9 (50.0%)
Carcinoma of the body and tail of the pancreas n=26	3	1	0	22 (84.6%)

好とはいえなかった。腫瘍が小さいために生検針が随伴性肺炎部分に刺入され、適確に腫瘍部分に達しなかったものと思われる。

5) 膵癌の組織生検 (Table 14)

組織生検は、膵癌 71 例中 44 例に施行された。いずれも膵組織よりの生検である。通常は Robber's 鉗子生検を中心に施行し、腫瘍が大きく安全性が高いと思われる場合は、Menghini 針、Tru-cut 針による生検を行った。癌組織は、頭部領域癌 18 例中 9 例 (50.0%)、体尾部癌 26 例中 22 例 (84.6%) に採取され、平均診断率は 72.1% であった。生検標本の病理組織型は、31 例中 26 例 (83.9%) が管状腺癌であり、4 例が未分化癌、1 例が扁平上皮癌であった。

病理組織型と癌の腹腔内進展度について検討すると管状腺癌 26 例の S, P, H 因子の陽性率は、それぞれ 85.7%, 65.4%, 32.0% であったのに対し、未分化癌 4 例の各因子陽性率は、それぞれ 100%, 50%, 0% であった。管状腺癌においては、局所浸潤、血行遠隔転移ともにみられたが、未分化癌においては、局所浸潤傾向が強く、血行遠隔転移は少ないように思われた。

生検標本が癌陰性と判定されたのは 13 例 (膵頭部領域癌 9 例、膵体尾部癌 4 例) であり、いずれも Robber's 鉗子生検によつては、膵内に限局する癌組織の採取が不可能であったことが、誤陰性の原因と思われ、深部病変の採取の困難な鉗子生検法の限界を示しているものと考えられた。

6) 細胞診、組織診の併用

両者の併用により膵癌と確定診断された症例は、膵頭部領域癌 27 例中 20 例 (74.0%)、膵体尾部癌 32 例中 28 例 (87.5%) であり、吸引細胞診と組織生検との併用により診断率は向上する。しかし、膵頭部癌の細胞診、生検成績については、十分に満足のいく成

績とはいえず、特に外科的切除の可能性の高い膵頭部小病変の生検方法の改善が必要であると考えられた。

(4) 合併症

1) 膵アプローチ法

Table 15 に示すように、昭和 51 年 1 月より 56 年 12 月までの間の腹腔鏡検査 360 例について、種々の腹腔鏡的膵観察法が試みられた。

supragastric pancreoscopy (212 例) は、安全性の高い方法であり合併症の発生は皆無であった。Henning の方法による膵頭部観察例 (36 例) と supragastric bursoscopy (102 例) においては、網膜切開時にまれに小出血をみるが自然に止血し加療を要する合併症はみられなかった。しかし、infragastric bursoscopy 10 例中 1 例において、アプローチ中に腸間膜動脈損傷による大量出血をきたし開腹手術のやむなきに至った例を経験した。膵へのアプローチ法自体のリスクは、360 例中 1 例 (0.28%) と低いものであり、膵への腹腔鏡的アプローチ法は、infragastric bursoscopy を除き極めて安全性の高い方法と結論された。

2) 膵生検

Table 16 に示すように、215 回の腹腔鏡下膵生検のうち、致死合併症の発生はみられなかった。非致死合併症は 7 例 (3.3%) に発生し、2 例が生検部位よりの膵液漏出、3 例が出血、1 例が壊死性物質の流

Table 16 Complications of laparoscopic biopsy of the pancreas

	No.	Non-fatal	fatal
Robber's forceps	144	4 (2.8%)	0
Trucut needle	2	1 (50.0%)	0
Menghini needle (ϕ 1.2 mm)	6	1 (16.7%)	0
Fine needle (ϕ 0.6, 0.8 mm)	63	1 (1.6%)	0
Total	215	7 (3.3%)	0

Table 15 Complication of laparoscopic approach to the pancreas

No.	Head region	Body and tail region		
	Henning's method	Supragastric pancreoscopy	Bursoscopy	
			Supragastric bursoscopy	Infragastric bursoscopy
No.	36	212	102	10
Complication No. (%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (10) massive bleeding from the injury of mesenteric artery

Fig. 2 Fluctuations of serum and urinary amylase values after pancreatic biopsy

出であったが、いずれも開腹処置には至らなかった。**Fig. 2** に示すように生検後3日間にわたって血清、尿アミラーゼ値の測定を行ったところ、生検前に高アミラーゼ血症の例を除くと、72時間後には、血清、尿アミラーゼ値はほぼ正常域に復帰していた。しかし、慢性膵炎の生検例1例において急性膵炎が併発した。

考 察

腹腔鏡による膵へのアプローチは、膵臓の解剖学的特殊性のために不可能視されてきたが、1972年、Meyer-Burgがsupragastric pancreoscopyを報告し、腹腔鏡による膵観察に成功したのが嚆矢となり、1973年にはOttenjannのinfragastric pancreoscopy、Henning⁸⁾らの膵頭部観察法が発表され、最近では、1978年Cuschieriが膵癌の腹腔鏡診断について報告している。

著者らの経験によれば、supragastric pancreoscopyは、簡単に施行しうる利点を持つが、小網脂肪沈着のために膵体部観察の不十分な症例があり、膵の広範囲にわたる観察と詳細な表面変化の把握のためには、網嚢内よりの膵体部直接観察が必要と思われた。このため著者は剖検例の膵臓について、種々の腹腔鏡的アプローチを検討した結果、新しく上胃的網嚢鏡supragastric bursoscopyを開発した。本法は鉗子にて小網を切開し、場合によってはさらに網嚢内にスコープを挿入し、膵体尾部を観察する方法であり、若干の技術的熟練を要するが、この方法により初めて実際に膵の

腹腔鏡的直接観察が可能になったといえよう。

現在のところ、膵へのアプローチ法として膵頭部領域の観察には、Henningの方法、膵体尾部観察にはsupragastric pancreoscopyにより膵の全貌を把握したのち、精査法としてsupragastric bursoscopyを併用するのが適切と思われる。Infragastric bursoscopyは、手技的に困難なことが多く、合併症の危険性も高く、胃体部大弯側に腫瘍が存在する症例以外では、臨床応用は不可能であると考えられた。

1979年Arbeiter⁹⁾は急性膵炎患者33例に発症後24時間以内に腹腔鏡検査を行い、31例(94%)において浮腫型と出血壊死型の鑑別が可能であり、しかも重篤な合併症発生前に外科的処置の適応を決定しえたとしており、膵炎重症度判定面での腹腔鏡検査の有用性を報告している。著者は、高度の腹部所見を伴う急性腹症6例に緊急腹腔鏡検査を行い、1例の出血壊死型膵炎を早期診断し、緊急手術の適応を決定した。このさい懸念された腹腔鏡検査による合併症は起こらなかった。今後、ショック徴候のない症例については、緊急腹腔鏡検査による膵炎重症度の早期把握、治療法の早期適応により膵炎救命率の向上が期待される。

本邦においては、慢性膵炎の診断は日本膵臓病研究会診断基準のうち、X線上の膵石陰影と膵外分泌機能低下により診断されることが多く、組織診断例は比較的少ない。これに加えて、膵生検の困難性もあり慢性膵炎の病理組織学的研究は立ち遅れているといわざるをえない。膵腹腔鏡検査は、膵の肉眼診断と直視下生検併用による組織診断を可能とし臨床的に有用なアプローチ法と考えられる。特に開腹の膵生検の行いにくい軽度慢性膵炎や日膵研診断基準の疑診例の解明は慢性膵炎の成立機序を知る上で重要なことであり、膵腹腔鏡検査は、今後有力な膵形態学的検査法の一つとなりえよう。

昭和50年度慢性膵炎調査報告によれば、腹腔鏡検査は63例に施行され、その異常所見率は54.8%である。その詳細は不明であるが、膵の直接観察よりも主に合併する肝、胆道系病変の観察を目的としたもの

と思われる。著者は 25 例の慢性肺炎例について脾自体の観察と直視下生検を行ったが、脾周囲炎による癒着のために脾観察可能例は、17 例 (68%) にとどまった。慢性肺炎の腹腔鏡所見としては、脾表面顆粒結節状、微細血管増生、表面白色調の増強が上げられるが、特にゾンデ操作による脾硬化所見の把握が重要である。これらの所見をもとに 12 例 (71%) が慢性肺炎と視診されたが、腹腔鏡的にほぼ正常脾と思われるものから、脾硬化、表面髄様白色、血管走行不正により脾癌と診断されるものまで多彩な所見がみられ、これは慢性肺炎の早期軽症例から進行例までの幅広い疾患分布を示すものと思われる。一方、限局性腫瘤形成型慢性肺炎においては、視診上被膜浸潤を伴わない脾癌との鑑別が困難な例もあり、確定診断のためには直視下脾生検の併用が必要と思われた。慢性肺炎の診断は脾機能検査以外に ERCP、腹腔動脈造影、腹腔鏡検査、脾生検を含めて総合的に行うべきであり、これにより他疾患と鑑別可能であることが多い。脾癌の腹腔鏡診断については、Cuschieri¹²⁾、Meyer-Burg⁹⁾ らの報告がみられる。Meyer-Burg によれば、脾癌は小網下の腫瘤として観察され、表面不正血管増生により肉眼診断に迷うことはなく、125 例の腹腔鏡検査中 15 例の脾癌を診断し、しかも外科的切除の可能であった症例を報告している。

著者らの経験した脾癌 71 例の腹腔鏡的肉眼診断率は、脾体尾部癌 84.8%、脾頭部領域癌 32% であった。脾体尾部癌の腹腔鏡診断率は、Meyer の報告と同じく良好であったが脾頭部領域癌の診断率は低く、さらに質的診断の追求が必要であり、直視下脾生検、細胞診の併用も要求される。

脾癌の腹腔鏡検査は癌の腹腔内進展度判定を可能とし、治療方針決定の上で有用である。脾癌 71 例の肝転移率は、脾頭部領域癌 11%、脾体尾部癌 50.0% であり、脾体尾部癌では H 2.3 の広範な肝転移が 69% を占めていた。腹膜播種は、脾頭部領域癌の 24%、脾体尾部癌の 61% に観察された。検査時すでに癌が周辺臓器に浸潤したり、遠隔転移を認める例が多く、このため予後に関しては非観的である。脾頭部癌の 1 例において脾全摘出術を施行し、2 年間の生存をえたが、他症例は治療法のいかに問わず、全例 18 ヶ月以内に死亡している。現在のところ、脾癌の根治治療の可能な段階での診断は非常に困難であるが、腹腔鏡検査は、脾癌の確定診断とその腹腔内進展度の判定や治療方針決定の上で有用と思われた。

脾疾患診断における最も重大な課題は脾組織をより早く、より容易にしかも安全に採取することである。

最近の診断法の進歩により従来より原則であった開腹生検、十二指腸液の細胞診に加えて、開腹によらない脾生検法が報告されている。すなわち内視鏡を用いる経胃、十二指腸の吸引生検法¹⁰⁾、超音波¹¹⁾、CT scan¹²⁾、腹腔動脈造影¹³⁾、ERCP¹⁴⁾ により誘導される画像下脾細胞吸引法が開発され、いずれの方法においても 70% 以上の診断成績が得られている。重篤な合併症の発生もないため、最近では脾癌の早期確定診断を目標に、積極的に細径針による脾生検が施行される傾向にある。

著者は 1976 年より腹腔鏡下脾生検⁹⁾を行っているが、本法は術前脾生検法のうち唯一の直視下狙撃生検法であり、安全性が高く、対象とする脾病変の状態に応じて、各種生検器具の選択が可能のため細胞診レベルから組織レベルまでの診断が可能である。さらに最大の利点は、本法により肺炎や脾癌を始め各種脾疾患の術前組織診断ができるようになったことである。

著者らの腹腔鏡下脾癌細胞診 50 例のうち癌陽性率は、頭部領域癌 57.7%、体尾部癌 81.8%、平均陽性率 70.0%、一方脾癌組織診を併用すると、陽性率は頭部領域癌 74.0%、体尾部癌 87.5% と向上し、頭部領域癌の診断成績は他生検法と同程度であるが、体尾部癌については、従来の脾生検法よりも良好な診断成績が得られている。

最後に、古くより問題となっている脾生検の合併症について、Lightwood¹⁵⁾、宮崎¹⁶⁾らはかなり危険性が高いと報告しており、一方 Coté¹⁷⁾、Spjust¹⁸⁾ らは、慢性肺炎と脾癌の鑑別に必要であり、十分な注意を払って施行すれば安全性が高いとしており、その臨床的価値、安全性については一致した見解をみるに至っていない。

術前脾生検法としての腹腔鏡下脾生検は、215 例に施行され、7 例 (3.4%) に非致死性合併症をみたが、致死性合併症はなかった。非致死性合併症の発生率は、ほぼ開腹下脾生検と同程度であるが、剖検脾を用いた生検成績をもとに危険性の高いと思われた針生検を頻用しなかったこと、および病変部肉眼所見により使用生検器具を選択したことにより重篤な合併症の発生が防止されたと考えられる。脾への腹腔鏡的アプローチ法は、脾肉眼診断と生検併用による脾組織診断を可能にする唯一の検査法であり、今後、アルコール脾障害の解明や慢性肺炎、脾癌確定診断の上で有用な検査法

Plate (1)

Plate (2)

となろう。しかし、短所としては技術的困難性と生検可能域の制約があげられる。今後さらに方法論的に改善され臨床検査法としての確立が期待される。

結 論

1) 腹腔鏡による膵の観察可能範囲を屍体膵について検討すると、頭部領域では膵前面面積の 11%, 膵体部では膵前面面積の 20~34% であった。

2) 屍体膵より臨床生検と同様な方法にて組織標本を採取した場合、針生検標本には、脈管 (100 μ 以上の動脈, 300 μ 以上の静脈) 小葉間以上の膵管が鉗子生検標本の約 2.5 倍採取されており、針生検はかなり危険性が高いことが示唆された。

3) 膵の腹腔鏡的観察は, supragastric pancreoscopy と小網切開法の併用により、急性膵炎の 75%, 慢性膵炎の 68% に可能であった。観察不可の主因は、腹腔内癒着、小網脂肪過多であった。

4) 膵頭部領域癌 38 例の腹腔鏡的肉眼診断率 12 例 (32%) に対し、膵体尾部癌 33 例の診断率は 28 例 (85%) であった。

5) 膵癌を対象とした腹腔下細胞診の陽性率は 70.0%, 同組織診の陽性率は 72.1% であった。また細胞診と組織診併用による膵癌の陽性率は、頭部領域癌 27 例中 20 例 (74.0%), 体尾部癌 32 例中 28 例 (87.5%) となり両者の併用により診断率は向上した。

6) 腹腔鏡的膵アプローチ法自体は、極めて安全性の高い方法であり、総数 360 例の膵アプローチのうち、開腹処置を必要とした合併症の発生は infragastric pancreoscopy の 1 例 (0.28%) にすぎなかった。

7) 腹腔鏡下膵生検 215 例において、7 例 (3.26%) の非致命的合併症がみられたがいずれも開腹処置には至らなかった。

文 献

- 1) Meyer-Burg, J. : The inspection, palpation and biopsy of the pancreas by peritoneoscopy. *Endoscopy*, **4**, 99~101, 1972.
- 2) 石田博 : 2 channel 式処置用腹腔鏡の開発とその有用性について. *Prog. Dig. Endoscopy*, **12**, 56~58, 1978.
- 3) Look, D., Henning, H. and Liiders, C.J. : Darstellung und Biopsie des Pankreaskopfes bei der Laparoskopie. *Z. Gastroenterol.*, **10**, 209~214, 1972.
- 4) 石田博, 常岡健二 : 膵疾患とくに膵癌の腹腔鏡診断. *内科*, **43**, 800~806, 1979.
- 5) Strauch, M., Lux, G. and Ottenjann, R. : Infragastric pancreoscopy. *Endoscopy*, **5**, 30~32, 1973.
- 6) 石田博, 常岡健二 : 腹腔鏡下膵生検法. *Gastroenterological Endoscopy*, **23**, 1643~1644, 1981.
- 7) Cuschieri, A., Hall, A.W. and Clark, J. : Value of

laparoscopy in the diagnosis and management of pancreatic carcinoma. *Gut*, **19**, 672~677, 1978.

- 8) Arbeiter, G., Marsch-Ziegler, U. and Leonhart, H. : Laparoskopie bei akuter Pankreatitis. *Fortschritte der gastroenterologischen Endoskopie* Band 10, 89~93, Verlag Gerhard Witzstock.
- 9) Meyer-Burg, J. : Peritoneoscopy in carcinoma of the pancreas. *Endoscopy*, **5**, 86~90, 1973.
- 10) Tsuchiya, R. : Endoscopic aspiration of the pancreas. *Gastroenterology*, **73**, 1050~1052, 1977.
- 11) Hancke, S., Holm, H.H. and Koch, F. : Ultrasonically guided percutaneous fine needle biopsy of the pancreas. *Surg. Gynecol. Obstet.*, **140**, 361~364, 1975.
- 12) Goldstein, H.M. and Zornoza, J. : Percutaneous transperitoneal aspiration biopsy of pancreatic masses. *Am. J. Dig. Dis.*, **23**, 840~843, 1978.
- 13) Tylen, U. : Percutaneous biopsy of carcinoma of the pancreas guided by angiography. *Surg. Gynecol. Obstet.*, **142**, 737~739, 1976.
- 14) Chia-Sing, Ho : Percutaneous fine needle aspiration biopsy of the pancreas following endoscopic retrograde cholangiography. *Radiology*, **125**, 351~353, 1977.
- 15) Lightwood, R. : The risk and accuracy of pancreatic biopsy. *Am. J. Surg.*, **132**, 189~193, 1976.
- 16) 宮崎逸夫, 広野慎介 : 膵パノプシーの意義. *臨と研*, **44**, 1683~1686, 1967.
- 17) Coté, J., Dockerty, M.B. and Priestley, J.T. : An evaluation of pancreatic biopsy with the Vim-Silverman Needle. *A.M.A. Arch. Surgery*, **79**, 588~596, 1959.
- 18) Spjst, H.J. : An evaluation of biopsy-frozen section of the ampullary region and pancreas. *Ann. Sur.*, **146**, 923~930, 1957.

Legends

- Photo 1 Laparoscopic picture showing acute edematous pancreatitis. It is slightly reddish and showed edematous swelling.
- Photo 2 Hemorrhagic ascites (left) and fatty necroses (right) in acute hemorrhagic necrotizing pancreatitis.
- Photo 3 Laparoscopic view of chronic pancreatitis. The yellowish pancreatic surface is uneven and shows nodule formation.
- Photo 4 Mild pancreatic fibrosis (grade I) with no change of the lobules. (HE stain $\times 25$)
- Photo 5 Moderate pancreatic fibrosis (grade II) with slight atrophy of the lobules. (HE stain $\times 25$)
- Photo 6 Severe pancreatic fibrosis (grade III) with only a few remaining atrophic lobules. (HE stain $\times 40$)
- Photo 7 Carcinoma of the body of the pancreas
a : collateral circulatory tree due to the block to splenic vein
b : an incised hole in the lesser omentum
c : the surface of the pancreatic carcinoma
d : a biopsy specimen, adenocarcinoma

(受付: 1985 年 5 月 28 日)