Ueber die Säurebindung bei der Pepsinverdauung.

Von

Dr. E. Funaoka.

Die Verdauungsprodukte der Eiweisskörper besitzen ein grösseres Säurebindungsvermögen im Vergleich zu ursprünglichen Eiweisskörpern. Auch die Bindungswerte einzelner Verdauungsprodukte unter einander bewegen sich in nicht unbedeutenden Grenzen. Im allgemeinen vermögen die Eiweissverdauungsprodukte um so grössere Säuremengen zu binden, je weiter der Verdauungsprozess fortschreitet, d. h. je mehr ihre Moleküle zerlegt werden. Wie es schon vielfach behauptet worden ist, sind im Eiweissmolekül mehrere α -Aminosäuren als präformierte Bestandteile enthalten. Die Aminosäuren verbinden sich bekanntlich mit Salzsäure zu Chlorhydraten, indem die Salzsäure der Amingruppe einfach addiert wird, wobei der Stickstoff des Ammoniakrestes von der Ammoniakkonfiguration in die Ammoniumkonfiguration übergeht. Diese Annahme wird sich wohl auch bei der Verbindung von Verdauungsprodukten und Salzsäure geltend machen.

*Kühne*¹⁾ und *Neumeister*²⁾ hatten angenommen, dass bei der Pepsinverdauung die Spaltung der Eiweissmoleküle mit dem Auftreten von Pepton abschliesst. Nach den Untersuchungen von *Hoffa*³⁾ und anderen soll die Pepsinverdauung des Serumalbumins nach 46—64 Stunden schon vollständig beendet sein und jetzt das Bindungsvermögen der Verdauungsprodukte sein Maximum erreicht haben und weiterhin nicht mehr zunehmen, wie lange auch noch die Pepsinwirkung fortdauert. Er gab nämlich an, dass 5 Atome Stickstoff in der Verdauungsprobe im Maximum 1 Molekül Salzsäure binden können. Später zeigten *Zunz*⁴⁾, *Pfaundler*⁵⁾ und andere, dass nach der Ausfällung der Albumosen und Peptone von der Verdauungsprobe noch über die Hälfte des Stickstoffes in einer abiiureten Form in der Probe bleibt. Da es als ausgemacht gilt, dass das Pepsin so gut wie das Trypsin

das Eiweiss in Aminosäuren zerlegt, strebten mehrere Forscher darnach, bei sehr lang fortgesetzter Pepsinverdauung Aminosäuren zu finden. Es gelang endlich *Langstein*⁶⁾, *Salaskin*⁷⁾, *Kowalevsky*⁸⁾, *Dzierzowsky*⁹⁾, dieselben nachzuweisen. Gegenwärtig dürfte also wohl die Annahme zulässig sein, dass bei genügend lang fortgesetzter Pepsinwirkung die Eiweisspaltung noch weiter fortschreitet als bloss bis zur Peptonisation.

Unter diesen Umständen scheint es nicht überflüssig zu sein, dass man untersucht, wie sich die Säurebindung dabei gestaltet. Ich habe deshalb einige Versuche in dieser Richtung gemacht, uzw:

1. bei genügend lang dauernder Pepsinverdauung,
2. bei maximaler Pepsinverdauung.

Die erste Versuchsreihe sollte überhaupt die Frage entscheiden, ob die Pepsinverdauung in der Tat bereits nach einigen Tagen vollendet ist, wie *Hoffa* meint. Wenn es wirklich der Fall wäre, so müsste das Wachsen des Säurebindungsvermögens der Verdauungsprobe gerade nach Ablauf der angegebenen Zeit sistiert sein. Wenn nicht, so müsste es als sicher festgestellt angesehen werden, dass der Verdauungsprozess noch weiter fortschreiten kann.

Was die zweite Versuchsreihe anlangt, so war ihr Ziel, zu untersuchen, wie hoch das Säurebindungsvermögen der Probe bei maximaler Pepsinverdauung gesteigert werden kann.

Als Verdauungsmaterialien dienten die durch Dialyse salzfrei gemachte Serumalbumin- und Serumbulbulinlösung, deren Darstellungsweise in meiner früheren Mitteilung näher geschildert worden ist.

Das Enzym war Pepsinglyzerin, welches von *E. Merck* bezogen wurde und sich bei verschiedenen Verdauungsversuchen als sehr wirksam erwiesen hatte.

Um die Wiederholungen zu vermeiden, will ich an dieser Stelle eine Bemerkung einschalten, dass künftighin unter HCl $\frac{1}{10}$ Normal-HCl und unter NaOH ebenfalls $\frac{1}{10}$ Normal-NaOH gemeint ist.

I. Versuchsreihe bei genügend lang dauernder Verdauung.

Bei dieser Versuchsreihe wurde in folgender Weise operiert. In jedem Versuch wurde eine abgemessene Menge der Serumalbuminlösung, deren Salzsäurebindungsvermögen schon bekannt war, in 2 oder 3 Proben geteilt, dann der einen Probe eine volle Menge HCl, d. h. eine dem Bindungswerte des betreffenden

Serumalbuminquantums entsprechende Salzsäuremenge, der zweiten eine halbe solche Menge, der dritten Probe die anderthalbe Menge HCl und dazu noch sämtlichen Proben je 1 Tropfen Pepsin zugefügt. Nach gutem Umschütteln wurden sie in einem auf 40° C temperirten Thermostat eine gewisse Zeit lang digeriert. Inzwischen täglich auf die *Günzburg'sche* Reaktion hin geprüft, wurde denselben im Falle negativer Reaktion die zum Eintritt der *Günzburg'schen* Reaktion nötige Salzsäuremenge zugesetzt. Nach einer gewünschten Zeitdauer wurden sie aus dem Thermostat herausgenommen und nach dem Erkalten mit Natronlauge bis zur genauen Neutralisation zurücktitriert.

Die dazu erforderliche Natronmenge zeigt uns bekanntlich die Salzsäuremenge an, die in der betreffenden Probe an Verdauungsprodukte gebunden ist. In der Wirklichkeit bindet doch 1 Tropfen Pepsin selbst eine winzig kleine Menge HCl, die nach meinen früheren Erfahrungen nur 0,09 mgr beträgt. In diesem Falle dürfte wohl ein so kleiner additiver Bruchteil ohne Bedenken vernachlässigt werden. Die auf diese Weise gefundene Säurewerte auf den nach *Kjeldahl* ermittelten Stickstoffgehalt in den entsprechenden Verdauungsproben bezogen, ergibt das Säurebindungsvermögen für 1 gr Stickstoff.

Versuch I.

10 cm³ Serumalbuminlösung gaben, mit 8,7 cm³ HCl versetzt, die *Günzburg'sche* Reaktion.

Probe 1. 10 cm³ Serumalbuminlösung + 8,7 cm³ HCl (volle Menge) +
1 gtt Pepsin.

11 Tage lang der Verdauung unterworfen. In dieser Zeitdauer war ein Zusatz von 4,1 cm³ HCl nötig, also im Ganzen 12,8 cm³ HCl. Das dazwischen wachsende Säurebindungsvermögen ist in a Fig 1 graphisch dargestellt. 1 mm in der Ordinate bezeichnet 0,1 cm³ HCl und 1 mm in der Abszisse entspricht 1 Tag.

Am 11. Tag untersucht, waren in 10 cm³ Verdauungsprobe 16,4 mgr HCl an 24,92 mgr N gebunden. Daraus ergibt sich, dass 1 gr Stickstoff bzw. 1 Atom N (in gr = 14 berechnet) in derselben 0,658 gr bzw. 9,212 gr HCl bindet. Würde das Verhältnis zwischen N und HCl anstatt 14: 9,212 14: 9,125 sein, so entsprächen 4 Atome N genau 1 Molekül HCl.

Probe 2. 10 cm³ Serumalbuminlösung + 4,35 cm³ HCl (eine halbe Menge)
+ 1 gtt Pepsin.

Ebenso 11 Tage lang digeriert. Inzwischen war eine Hinzusetzung von $8,32 \text{ cm}^3$ HCl nötig; also im Ganzen $12,67 \text{ cm}^3$ HCl (b Fig 1).

Am 11. Tag waren in 10 cm^3 der Verdauungsprobe $19,71 \text{ mgr}$ HCl an $34,46 \text{ mgr}$ N gebunden. Es kommen also auf 9 Atome N beinahe 2 Moleküle HCl.

Versuch II.

10 cm^3 Serumalbuminlösung gaben mit $5,5 \text{ cm}^3$ HCl die *Günzburg'sche* Reaktion.

Probe 1. 10 cm^3 Serumalbuminlösung + $5,5 \text{ cm}^3$ HCl (volle Menge) + 1 gtt Pepsin.

40 Tage lang digeriert. Inzwischen waren $4,3 \text{ cm}^3$ HCl nachträglich zusetzen; also im Ganzen $9,8 \text{ cm}^3$ HCl (a Fig 2).

Am 40. Tag waren in 5 cm^3 der Verdauungsprobe $9,27 \text{ mgr}$ HCl an $14,69 \text{ mgr}$ N gebunden. 1 gr bzw. 1 Atom N bindet folglich $0,657 \text{ gr}$ bzw. $9,198 \text{ gr}$ HCl. Es kommt auf 4 Atome N beinahe 1 Molekül HCl.

Probe 2. 10 cm^3 Serumalbuminlösung + $2,75 \text{ cm}^3$ HCl (eine halbe Menge) + 1 gtt Pepsin.

Ebenfalls 40 Tage lang verdaut. Inzwischen war ein Zusatz von $6,85 \text{ cm}^3$ HCl nötig; im Ganzen also $9,6 \text{ cm}^3$ HCl (b Fig 2).

Am 40. Tag untersucht, waren in 5 cm^3 der Verdauungsprobe $9,855 \text{ mgr}$ HCl an $15,82 \text{ mgr}$ N gebunden. 1 gr bzw. 1 Atom N bindet mithin $0,623 \text{ gr}$ bzw. $8,722 \text{ gr}$ HCl. 42 Atome N entsprechen 10 Moleküle HCl.

Versuch III.

10 cm^3 Serumalbuminlösung gaben mit $5,5 \text{ cm}^3$ HCl die *Günzburg'sche* Reaktion.

Probe 1. 10 cm^3 Serumalbuminlösung + $5,5 \text{ cm}^3$ HCl (volle Menge) + 1 gtt Pepsin.

15 Tage lang verdaut. Inzwischen war ein Zusatz von $3,9 \text{ cm}^3$ HCl nötig; also im Ganzen $9,4 \text{ cm}^3$ HCl (a Fig 3).

Am 15. Tag untersucht, waren in 5 cm^3 der Verdauungsprobe $8,58 \text{ mgr}$ HCl an $13,04 \text{ mgr}$ N gebunden. 1 gr bzw. 1 Atom N bindet demnach $0,658 \text{ gr}$ bzw. $9,212 \text{ gr}$ HCl. Es kommen 4 Atome N auf ungefähr 1 Molekül HCl.

Probe 2. 10 cm^3 Serumalbuminlösung + $2,75 \text{ cm}^3$ HCl (eine halbe Menge)

+ 1 gtt Pepsin.

27 Tage lang digeriert. In diesem Zeitraum war ein Zusatz von $6,05 \text{ cm}^3$ HCl nötig, also im Ganzen $8,8 \text{ cm}^3$ HCl (b Fig 3).

Am 27. Tag untersucht, waren in 5 cm^3 der Verdauungsprobe $9,125 \text{ mgr}$ HCl an Verdauungsprodukte gebunden. Leider ist hier die Stickstoffbestimmung an der Zerspringung des Oxydationskolbens gescheitert.

Probe 3. 10 cm^3 Serumalbuminlösung + $8,25 \text{ cm}^3$ HCl (anderthalbe Menge) + 1 gtt Pepsin.

Ebenfalls 27 Tage lang verdaut. Während dieser Zeit war ein Zusatz von $0,85 \text{ cm}^3$ HCl nötig; also im Ganzen $9,1 \text{ cm}^3$ HCl (c Fig 3).

Am 27. Tag untersucht, waren in 5 cm^3 der Verdauungsprobe $9,125 \text{ mgr}$ HCl an $13,72 \text{ mgr}$ N gebunden. 1 gr bzw. 1 Atom N bindet somit $0,665 \text{ gr}$ bzw. $9,31 \text{ gr}$ HCl. 39 Atome N entsprechen annähernd 10 Molekülen HCl.

Die drei vorhergehenden Versuche zeigen übereinstimmend, dass die Pepsinverdauung, wie *Hoffa* und andere meinen, nie in 46—64 Stunden beendet ist, sondern noch weiter fort dauert, denn das Säurebindungsvermögen der Probe nimmt immer mehr zu, wie es aus dem Verlaufe der in Fig 1, 2 und 3 dargestellten Kurven leicht ersichtlich ist.

II. Versuchsreihe bei maximaler Pepsinverdauung.

Bei dieser Versuchsreihe wurde die Anordnung wesentlich gleichartig wie bei der vorangehenden getroffen. Beide unterschieden sich doch darin, dass das Ausgangsmaterial hierbei äusserst lange Zeit, usw. so lange digeriert wurde, bis das Säurebindungsvermögen nicht mehr zunahm, d. h. bis kein weiterer Zusatz von Salzsäure nötig war, um die *Günzburg'sche* Reaktion zu erhalten, und dass ferner Enzym hin und wieder nachträglich hinzugesetzt wurde, falls das Wachsen des Säurebindungsvermögens einige Tage ausblieb. (Die unter den einzelnen Kurven beigegebenen Ziffern bezeichnen die Pepsinmenge in Tropfenzahl, welche an dem Tag den betreffenden Proben hinzugesetzt wurde).

Versuch IV.

10 cm^3 der $2,92\%$ igen Serumglobulinlösung gaben mit $3,4 \text{ cm}^3$ HCl die *Günzburg'sche* Reaktion.

Probe 1. 20 cm^3 Serumglobulinlösung + $6,8 \text{ cm}^3$ HCl (volle Menge)

+ 3 gtt Pepsin.

214 Tage lang digeriert. In diesem Zeitraum war ein Zusatz von 9,2 cm³ HCl nötig, also im Ganzen 16 cm³ HCl, wozu noch 9 gtt Pepsin kamen, also vom Anfang an gerechnet 12 gtt (a Fig 4)..

Am 214. Tag wurde zweimal je 1 cm³ der Verdauungsprobe untersucht. Beide Resultate stimmten ganz überein. Darin waren nämlich 3,8325 mgr HCl an 5,74 mgr N gebunden. Daraus ergibt sich, dass 1 gr bzw. 1 Atom N 0,668 gr bzw. 9,352 gr HCl bindet und 39 Atome N ungefähr 10 Molekülen HCl entsprechen.

Probe 2. 20 cm³ Serumglobulinlösung + 10,2 cm³ HCl (anderthalbe Menge) + 3 gtt Pepsin.

Ebenfalls 214 Tage lang digeriert. Während dieser Zeit war ein Zusatz von 5,8 cm³ HCl nötig, dazu wurden noch 7 gtt Pepsin hinzugesetzt, also im Ganzen 16 cm³ HCl und 10 gtt Pepsin, wie es b Fig 4 zeigt.

Am 214. Tage wurde zweimal je 1 cm³ der Verdauungsprobe untersucht. Der Stickstoffgehalt betrug 6,16 mgr und 6,58 mgr, im Mittel 6,37 mgr, daran waren 4,19 mgr HCl gebunden. 1 gr bzw. 1 Atom N bindet folglich 0,658 gr bzw. 9,21 gr HCl, und 4 Atome N kommen nahezu auf 1 Molekül HCl.

Probe 3. 20 cm³ Serumglobulinlösung + 3,4 cm³ HCl (eine halbe Menge) + 3 gtt Pepsin.

Ebenso 214 Tage lang verdaut. Dazwischen war erforderlich ein Zusatz von 12,6 cm³ HCl, wozu ausserdem noch 10 gtt Pepsin zugesetzt wurden, also im Ganzen 16 cm³ HCl und 13 gtt Pepsin (c Fig 4).

Am 214. Tag wurde je 1 cm³ der Verdauungsprobe zweimal untersucht. Beide Resultate stimmten ganz überein, indem 4,19 mgr HCl an 5,83 mgr N gebunden waren. 1 gr bzw. 1 Atom N bindet daher 0,656 gr bzw. 9,198 gr HCl, und 4 Atome N entsprechen ungefähr 1 Molekül HCl.

Versuch V.

10 cm³ einer 3,3% igen Serumglobulinlösung gaben mit 3,9 cm³ HCl die *Günzburg'sche* Reaktion. In diesem Versuch wurden zwei Proben gleichfalls mit voller Menge HCl versetzt, um eine davon als Kontrollprobe zu gebrauchen.

Probe 1. 20 cm³ Serumglobulinlösung + 7,8 cm³ HCl (volle Menge) + 3 gtt Pepsin.

209 Tage lang verdaut. Dazwischen ein Zusatz von 9,5 cm³ HCl, ferner wurden noch 9 gtt Pepsin hinzugesetzt, also im Ganzen 17,3 cm³ HCl und 12 gtt Pepsin (a Fig 5).

Am 209. Tag wurde je 1 cm³ der Probe zweimal untersucht, wobei die Resultate miteinander übereinstimmten. Darin waren nämlich 3,65 mgr HCl an 5,6 mgr N gebunden. 1 gr bzw. 1 Atom N bindet deshalb 0,651 gr bzw. 9,114 gr HCl, und 4 Atome N entsprechen annähernd 1 Molekül HCl.

Probe 2. 20 cm³ Serumglobulinlösung + 7,8 cm³ HCl (volle Menge) + 3 gtt Pepsin.

Ebenso 209 Tage lang digeriert. Hierbei wurde aber die Versuchsanordnung etwas modifiziert. Es war nämlich in den ersten 6 Tagen ein Zusatz von 2,8 cm³ HCl nötig. Am 6. Tag wurde die Probe aus dem Thermostat herausgenommen, in ein anderes Kölbchen übergegossen und im Wasserbad auf 100° C erhitzt, um die weitere Enzymwirkung abzuschliessen. Nachdem das Verdauungsfläschchen mit Natron, Salzsäure und Wasser völlig gereinigt war, wurde die Probe wieder darein zurückgegossen und in den Thermostat gebracht. Darauf täglich geprüft, war keine Zunahme des Säurebindungsvermögens wahrnehmbar. Am 21. Tag wurden 3 gtt Pepsin und wie bei den anderen Versuchen nötigenfalls Salzsäure und Pepsin von Zeit zu Zeit zugesetzt. So waren vom Anfang bis zum letzten Verdauungstag in toto 16,7 cm³ HCl und 13 gtt Pepsin (b Fig 5) hinzugegossen worden.

Am 209. Tag wurden zwei quantitative Bestimmungen mit je 1 cm³ der Probe gemacht. Sie gaben übereinstimmende Resultate und zeigten, dass darin 2,01 mgr HCl an 3,08 mgr N gebunden waren, 1 gr bzw. 1 Atom N bindet deshalb 0,653 gr bzw. 9,14 gr HCl, und 4 Atome N entsprechen nahezu 1 Molekül HCl.

Probe 3. 20 cm³ Serumglobulinlösung + 12 cm³ HCl (um 0,3 cm³ mehr als die anderthalbe Menge) + 3 gtt Pepsin.

Ebenso 209 Tage lang digeriert. Inzwischen war erforderlich ein Zusatz von 5,3 cm³ HCl und 8 gtt Pepsin, also im Ganzen 17,3 cm³ HCl und 11 gtt Pepsin (c Fig 5).

Am 209. Tag wurden zwei quantitative Bestimmungen mit je 1 cm³ der Probe ausgeführt. Der Stickstoffgehalt betrug 5,18 mgr und 5,33 mgr, im Mittel 5,25 mgr, und die daran gebundene Salzsäuremenge 3,431 mgr. Daraus folgt,

dass 1 gr bezw. 1 Atom N 0,654 gr bezw. 9,156 gr HCl bindet, und 4 Atome N etwa 1 Molekül HCl entsprechen.

Versuch VI.

10 cm³ einer 3,42 % igen Serumalbuminlösung gaben mit 5,6 cm³ HCl die *Günzburg'sche* Reaktion.

Probe 1. 10 cm³ Serumalbuminlösung + 5,6 cm³ HCl (volle Menge) + 3 gtt Pepsin.

227 Tage lang digeriert. Die inzwischen hinzugefügten 8 cm³ HCl und 12 gtt Pepsin brachten die Salzsäuremenge auf 13,6 cm³ und den Pepsingehalt auf 15 gtt (a Fig 6).

Am 227. Tag wurden zwei quantitative Bestimmungen mit je 1 cm³ der Probe ausgeführt mit dem Ergebnisse, dass 5,81 mgr, 5,95 mgr, im Mittel 5,88 mgr N an 5,11 mgr HCl gebunden waren. Es ergibt sich daraus, dass 1 gr bezw. 1 Atom N 0,869 gr bezw. 12,166 gr HCl bindet, und 3 Atome N annähernd 1 Molekül HCl entsprechen.

Probe 2. 10 cm³ Serumalbuminlösung + 8,9 cm³ HCl (hierbei wurde aus Versehen um 0,5 cm³ mehr als die anderthalbe Menge zugesetzt) + 3 gtt Pepsin.

Ebenfalls 227 Tage lang digeriert. In dieser Zeitdauer war ein Zusatz von 4,7 cm³ HCl nötig; ausserdem wurden noch 11 gtt Pepsin hinzugesetzt; also im Ganzen 13,6 cm³ HCl und 14 gtt Pepsin (b Fig 6).

Am 227. Tag wurden zwei quantitative Bestimmungen mit je 1 cm³ der Probe ausgeführt, welche übereinstimmende Resultate ergaben. 5,64 mgr N waren darin an 4,38 mgr HCl gebunden, woraus folgt, dass 1 gr bezw. 1 Atom N 0,869 gr bezw. 12,166 gr HCl bindet, und 3 Atome N beinahe 1 Molekül HCl entsprechen.

Probe 3. 10 cm³ Serumalbuminlösung + 2,8 cm³ HCl (eine halbe Menge) + 3 gtt Pepsin.

Ebenfalls 227 Tage lang digeriert. Dazwischen musste ich 10,1 cm³ HCl zusetzen, wozu noch 13 gtt Pepsin kamen; also in toto 12,9 cm³ HCl und 16 gtt Pepsin (c Fig 6).

Hierbei ist zunächst zu bemerken, dass diese Probe am 99. Verdauungstag durch ein zufälliges Missgeschick etwa um ein Drittel verloren ging (dies ist in

Fig 6 durch Zeichen $\times$ angedeutet).

Am 227. Tag wurden zwei quantitative Bestimmungen mit je 1 cm³ der Probe ausgeführt, wodurch festgestellt wurde, dass darin 5,49 mgr, 5,46 mgr, im Mittel 5,48 mgr N an 4,76 mgr HCl gebunden waren. 1 gr bzw. 1 Atom N bindet demnach 0,869 gr bzw. 12,166 gr HCl, und auf 3 Atome N kommt ungefähr 1 Molekül HCl.

Versuche IV und V zeigen fast eindeutig, dass bei maximaler Pepsinverdauung 4 Atome N in den Spaltungsprodukten von Serumglobulin nahezu 1 Molekül HCl zu binden vermögen. Aus dem Versuch VI sehen wir dagegen, dass in den terminalen Verdauungsprodukten von Serumalbumin bei der Pepsinverdauung auf 3 Atome N beinahe 1 Molekül HCl kommt. Dieser Unterschied ist wahrscheinlich durch die Verschiedenheit der Natur beider Eiweisskörper bedingt.

Der besseren Uebersichtlichkeit halber sind alle durch die oben erwähnten Versuche gewonnenen Resultate in nachstehender Tabelle (auf folgender Seite) zusammengestellt.

Wie aus der Tabelle hervorgeht, binden 4 Atome N in der Verdauungsprobe von Serumalbumin nach 11 — 27- tägiger Digestion ungefähr 1 Molekül HCl, während bei maximaler Verdauung 3 Atome N genügen, um 1 Molekül HCl zu binden. In einer anderen Arbeit, worin ich das Salzsäurebindungsvermögen von Serumalbumin und Serumglobulin untersuchte, wurde angegeben, dass 7 Atome N im ersteren und 10 Atome N im letzteren 1 Molekül HCl binden. An der Hand dieser Angabe ist leicht zu ersehen, dass bei maximaler Pepsinverdauung das auf 1 Atom N bezogene Säurebindungsvermögen um einen nicht unbedeutenden Betrag zunimmt, bzw. um das $1\frac{1}{3}$ - fache für Serumalbumin, um das $1\frac{1}{2}$ - fache für Serumglobulin.

Wenn man den Verlauf der Kurven betrachtet, so findet man im Allgemeinen, dass der Pepsinverdauungsprozess in den ersten 10 Tagen sehr schnell, dann allmählich langsamer fortschreitet. Dies rührt sicher davon her, dass anfangs die Anhäufung der Verdauungsprodukte noch nicht bedeutend ist und so die Enzymwirkung keine stärkere Störung erfährt. Bis zum 10. — 20. Verdauungstag zeigen die mit anderthalb Anfangsmenge Salzsäure versetzten Proben keine Zunahme ihres Säurebindungsvermögens, weil die schon vorhandene überschüssige Salzsäuremenge etwa neuauftretenden Anforderungen leicht entsprechen kann. Dagegen stellen die Kurven der eine halbe Menge HCl enthaltenden

Tabelle.

Versuchs- nummer	Anfangs zugesetzte Salzsäuremenge cm ³	Nachträglich zugesetzte HCl cm ³	Anfangs zu- gesetzte Pepsin- menge glt	Nachträglich zugesetzte Pepsin glt	Verdauungs- dauer Tage	Verdauungsmaterial cm ³	Bindungsverhältnis N : HCl Atom : Molekül
I { 1 2	8,7	4,1	1	fehlt	11	Serumalbuminlösung 10	4 : 1
	4,35	8,32	1	fehlt	11	Serumalbuminlösung 10	9 : 2
II { 1 2	5,5	4,3	1	fehlt	40	Serumalbuminlösung 10	4 : 1
	2,75	6,85	1	fehlt	40	Serumalbuminlösung 10	42 : 10
	5,5	2,9	1	fehlt	15	Serumalbuminlösung 10	4 : 1
III { 1 2 3	2,75	6,05	1	fehlt	27	Serumalbuminlösung 10	fehlt
	8,25	0,85	1	fehlt	27	Serumalbuminlösung 10	
IV { 1 2 3	6,8	9,2	3	9	214	Serumglobulinlösung 20	39 : 10
	10,2	5,8	3	7	214	Serumglobulinlösung 20	4 : 1
	3,4	12,6	3	10	214	Serumglobulinlösung 20	4 : 1
	7,8	9,5	3	9	209	Serumglobulinlösung 20	4 : 1
V { 1 2 3	7,8	8,9	3	10	209	Serumglobulinlösung 20	4 : 1
	12,0	5,3	3	8	209	Serumglobulinlösung 20	4 : 1
	5,6	8,0	3	12	227	Serumalbuminlösung 10	3 : 1
VI { 1 2 3	8,9	4,7	3	11	227	Serumalbuminlösung 10	3 : 1
	2,8	10,1	3	13	227	Serumalbuminlösung 10	3 : 1

Proben in den ersten Tagen einen sehr steilen Verlauf dar. In dieser Hinsicht nehmen die Proben mit voller Menge HCl eine mittlere Stellung ein. Dieser von den verschiedenen Salzsäurekonzentrationen in den einzelnen Proben hervorgerufene Einfluss bleibt jedoch nur eine gewisse Zeit lang bestehen. Nach 40—70 Verdauungstagen treffen nämlich alle drei Kurven an einer bestimmten Höhe zusammen, um sodann in der Regel einen gemeinsamen Verlauf zu nehmen (vergl. a, b und c der Fig 4; a und c der Fig 5; a und b der Fig 6).

Im Versuch V wurden, wie oben schon erwähnt, zwei *Proben 1* und *2* gleichfalls mit voller Menge HCl versetzt. Am 6. Tag wurde allein die *Probe 2* (b Fig 5) erhitzt. Darauf nahm ihr Säurebindungsvermögen nicht weiter zu, weil sie von der Enzymwirkung ausgeschlossen war. Nachdem sie erst am 21. Tag von neuem Pepsin bekommen hatte, fing das Säurebindungsvermögen wieder an zuzunehmen. Nun verlief die Kurve (b) zwar parallel denjenigen der *Proben 1* und *3* (a und c), erreichte aber nicht mehr die gleiche Höhe, wie jene, was vielleicht aus dem Substanzverlust, den *Probe 2* durch die besondere Prozedur erfuhr, erklärt werden kann.

Die Kurven von drei *Proben* im Versuch VI trafen am 42. Tag zusammen und boten dann ein und denselben Verlauf dar. Da aber am 99. Tag durch ein Missgeschick die *Probe 3* (c Fig 6) etwa um ein Drittel verloren ging, so blieb die betreffende Kurve sodann immer niedriger als die anderen

Ich will nicht unerwähnt lassen, dass die anfangs hellen Verdauungsproben mit der Zeit immer dunkler wurden und gegen den 200. Tag sogar sich bräunlich gefärbt hatten, sodass die Prüfung auf die *Günzburg'sche* Reaktion sehr erschwert war. Mit grösster Vorsicht allein konnte eine Täuschung vermieden werden.

Ferner muss ich zugeben, dass ich mangels genügender Probemengen in meinen Versuchen Verzicht auf den Nachweis von Aminosäuren leisten musste.

Schliesslich muss ich noch eine Bemerkung über den Begriff „Säurebindungsvermögen der Verdauungsprobe“ einschalten. In jeder gegebenen Verdauungsprobe sind bekanntlich verschiedene Verdauungsprodukte mit einander gemischt vorhanden. Unter Säurebindungsvermögen einer Verdauungsprobe ist deswegen stets das mittlere Säurebindungsvermögen der gesamten, in der betreffenden Probe neben einander vorhandenen Verdauungsprodukte zu verstehen.

Aus den dargestellten Untersuchungen resultieren folgende Schlüsse:

1. Der Verdauungsprozess ist nicht in einigen Tagen vollendet, sondern schreitet mehrere Monate lang fort, insofern die dazu nötige Quantität von Salzsäure und Pepsin immer zur Verfügung steht.
2. Dementsprechend nimmt das Salzsäurebindungsvermögen der Verdauungsproben immer weiter zu, bis der Prozess endlich zum Stillstand kommt.
3. Die Fortschrittgsgeschwindigkeit des Verdauungsprozesses bleibt nicht dieselbe im ganzen Verlauf; sie ist im allgemeinen anfangs am grössten und wird allmählich kleiner.
4. Die Beeinflussung des Verdauungsprozesses durch die vorest hinzugesetzte, ungleiche Salzsäuremenge wird nach 40—70 Verdauungstagen ausgeglichen.
5. Bei maximaler Pepsinverdauung von Serumalbumin binden 3 Atome N in der Verdauungsprobe nahezu 1 Molekül HCl.
6. Wenn das Serumglobulin der maximalen Pepsinverdauung ausgesetzt wird, so binden 4 Atome N in der Verdauungsprobe annähernd 1 Molekül HCl.

Die vorliegenden Untersuchungen wurden im Jahre 1903—1904 im physiologischen Institut zu Würzburg ausgeführt. Herrn Professor *von Frey*, welcher mir alle Hilfsmittel dieses Instituts zur Verfügung stellte, sowie Herrn Privatdozent Dr. *Gürber* (damals Assistent der medicinischen Chemie) für mannigfache Anregungen sage ich hiermit meinen aufrichtigen Dank.

Okayama, den 15. Juli 1906.

Literatur.

- 1) *Kühne*, Verhandlungen des naturhistor. medicinischen Vereins zu Heidelberg. N. F. Bd. 1. Heft 3. S. 197.
 - 2) *Neumeister*, Lehrbuch der physiolog. Chemie Bd. 1. S. 184. 1893.
 - 3) *B. Hoffa*, Über den Einfluss der Pankreasverdauung auf das Salzsäure-Bindungsvermögen des Eiweisses. Inaugural-Dissertation. Würzburg. 1897.
 - 4) *E. Zunz*, Über den quantitativen Verlauf der peptischen Eiweisspaltung. Zeitschr. f. physiolog. Chem. Bd. 28. S. 219. 1899.
 - 5) *Pfaundler*, Zur Kenntnis der Endprodukte der Pepsinverdauung. Zeitschr. f. physiolog. Chem. Bd. 30. S. 90. 1900.
 - 6) *Langstein*, Zur Kenntnis der Endprodukte der peptischen Verdauung. Hofmeister's Beiträge. Bd. 1. S. 507. 1902; *ibid.* Bd. 2. S. 229. 1902.
 - 7) *S. Salaskin*, Über die Bildung des Leucinimids bei der peptischen und tryptischen Verdauung des Oxyhämoglobins, resp. des Globins. Zeitschr. f. physiolog. Chem. Bd. 32. S. 592. 1901.
 - 8) *Kowalevsky* und *S. Salaskin*, Über die Wirkung des reinen Hundemagensaftes auf das Hämoglobin, resp. Globin. *Ibid.* Bd. 38. S. 571. 1903.
 - 9) *Dzierzowski* und *S. Salaskin*, Über die Ammoniakabspaltung bei der Einwirkung von Trypsin und Pepsin auf Eiweisskörper. Centralblatt f. Physiologie. Bd. 15. S. 249. 1901.
-