● 無月經ノ療法

Zur Behandlung der Amenorrhöe.

Berlin von prof. F. Fromme.

姫路 沖津 亘 譯

吾人ハ從來妊娠所見ノ證明シ得ルモノヲ除キ長期間月經ノ閉止セル患者ヲ所置シテ満足スベキ效果ヲ齎サント苦心焦慮スル所實ニ少カラズ、而モ諸般ノ固有療法ガ多クハ吾人ヲ失望ニ歸セシメタリ、余ハカノザイツ Seit 氏ガ甚有效ナリト鼓吹シタル溫熱的子宮消息子 Thermische uterussonde ヲ反覆適用シ見タルモ是亦何レモ無効ニ終レリ、勿論ザイツ氏ハ無月經ノ原因ガ子宮ニアラズシテ卵巢ニ存在スル時ハ此溫熱的子宮消息子ハ全然無効ナルガ如シト注意セリ、然リト雖ソハ觀察ノ大多數ニ於テ然ルモノニシテ確ニ一定數ノモノニハヨシ其原因ノ卵巢ニ存スルモ亦溫熱的子宮消息子ヲ應用セラレ得ベシト、氏ハ斯ル三例ノ觀察ヲ記載シタリ。

内分泌ヲナス各個ノ腺ハ相互ニ代償スルヲ得ベシテフ考察ニヨリ就中妊娠中ニ必然招來スベキ松果腺ノ増殖ニ鑑ミテ余ハ茲ニ松果腺越幾斯ノ注射ヲ長短種々ノ無月經患者ニ試用シタリ、而シテ余ハ此目的ニ向ツテカノ Firma Hoffmann-La Roche ニヨリテ 1 cm ノ「アムブルレ」ニ造ラレタル「ピツグランドル」 Pituglandol ヲ應

用スルコト、セリ、松果腺越幾斯ノ長期間持久セル應用ガ當該人ニ有害ナルヤ否ヤノ觀察ハ現時ニ至ルマデ未ダ之レ有ラザルヲ以テ本療法ヲ始ムルヤ自然此疑問ノ解決ニ勉メザルヲ得ザリキ。

本療法ヲ乞フ患婦ハ其各例ニ於テ内臟器就中肺ノ疾患ノ存スルヤ否ヤヲ精細ニ檢查シタリ、多數ノ實驗例中ニハ初期ノ若クハ進行セル肺結核ガ無月經ヲ惹起セルモノモ亦少ナカラザリキ、之ニ反シテ其以前ニ肺ニ何等ノ疾患モナク單ニ月經ノ閉止ノミヲ訴ヘテ診ヲ乞フ患者ヲ見タリ、此ノ如キハ其原因ヲ他ノ内科的疾患ニ歸着スベキモノナリ、而シテ松果越幾斯ノ注射療法ハ上述ノ如キ患者ニハ不可ナリ。

余ハ左ニ記載スル諸例ニ於テ良好ナル效果ノ見ハル、マデ若クハ注入シタル本藥ノ作用ガ充分ニシテ爾今兩三週間本療法ノ不必要ヲ認ムルマデ殆ド毎日「ビッグランドール」^{1 ccm}ノ皮下ニ注射シタリ、余ハコノ方法ニヨリテ本春以來既ニ十二名ノ患婦ヲ所置シタリ、但シ兩三回ノ注射ノミニテ爾來療法ヲ停止セルモノハ茲ニ計上セズ、各例ノ記載ニ先チ之ヲ總括スレバ其十二名中五名ハ何レモ無効ニ二名ハ不充分ナガラ奏效ヲ示シ他ノ五例ハ完全ナル效果ヲ呈セリ。

此ノ結果ニヨリテ吾人ハ明ニ本注射療法ガ總テノ場合ニ奏效スルモノニ非ザルヲ知ルベシ、此關係ニ就テハ尙ホ後日ノ研鑽ヲ要スルモノナリ、以下ニ於テ余ガ「ビッグランドール」ノ應用ニヨリテ月經ヲ正通スルヲ得タル病例ヲ簡單ニ記載スベシ。

第一例 二十六歳 既婚婦 二年前結婚シ未ダ妊娠流産等ナシ、初經ハ十三年ニシテ來潮爾來一九一一年九月マデ正調ニ反覆シタリシガ俄ニ停止シ翌一九一二年三月マデ即チ六箇月間之ヲ見ザリシヲ以テ診ヲ余ガ臨牀室ニ乞ヘリ。

體格通常、脂肪ノ異常沈着モナシ、内臟器亦健全ナリ、陰門ハ甚多毛、子宮ハ小兒性ニシテ後屈後轉ス、子宮所屬器ニ變化ヲ認メズ。

一日一回一ccmノ「ピツグランドール」ヲ五回皮下ニ注射ス、此時忽ニシテ月華發來シ可ナリノ強度ニテ五日間持續シタリ、月經ノ終了後尙ホコレガ二回ノ注射ヲ施シ以テ本療法ヲ中止シタリ、其後三箇月ヲ經テ受取りタル書信ニヨレバ爾來月經ハ正調ニ發來セリト。

第二例 十六歲 初經ハ十四歲ニ來リ其後二年間正調、然ルニ八箇月以前ヨリ全ク無月經トナレリト、内臟器ニ何等ノ變化ヲ認メズ、然ルニ患者ノ年齡ニ比シテ脂肪組織ノ發育甚高度ナリキ、他ニ一般ノ小兒性處見ナシ、子宮ハ小、附屬器モ通常。

毎回一ccmヅ、ノ「ピツグランドール」ヲ十日間ニ九箇注射シタルニ間モナク一日間持續ノ月經ヲ見タリ、依テ更ニ其後ノ四週間ニ七回ノ本注射ヲ施シタルニ第二ノ月經起リ可ナリノ強度ニテ三日間持續シタリ、月經終了後ノ四週間ニ尙ホ四箇ノ本注射ヲナセリ、爾來月經ハ普通ノ強度ニテ正調ニ反覆スルニ至レリ。

第三例 十五歲 月經ハ一年前ニ開始シタルモ常ニ不正ナリト云フ、最終月經ハ三箇月以前ナリト、内臟器ハ全ク通常、一ノ小兒性症狀ヲモ認メズ、子宮ハ稍小サク前屈ス、附屬器ハ健全。

先ツ六日間ニ三回ノ本注射ヲナシタルニ月華來リ三日間持續シタリ、更ニ次ノ四週間ニ五箇ノ注射ヲナシタルニ第二ノ月經見ハレ甚強度ニ四日間續ケリ、患婦ハ其後尙ホ四回ノ本注射ヲ乞ヒタルガ其時甚シキ第二心音ノ亢進ヲ來シタルヲ以テ茲ニ本療法ヲ停止シタリ。

第四例 二十七歲 既婚婦 八年前分娩ス其後健康愉快ナル歲月ヲ過セリ、然ルニ三箇月以前ヨリ身體著シク肥滿シ始メ百五十封度ノ體重ハ今ヤ二百三十封度ニ達スルニ至レリ、月經ハ二年前ヨリ隔月ニ之ヲ見ルニ至リ且其分量モ大ニ減少シタリト云フ、内臟器ハ健全、子宮ハ萎縮性ニシテ附屬器ニハ異狀ヲ認メズ。

先ツ初メノ十二日間ニ於テ十回ノ本注射ヲナシタルニ甚強盛ナル月經起リ八日間持續シタリ、即チ最近數年間ニ於テ此ノ如キ大量ノ月經ハ未ダ一度モ見ザリシト云フ、而シテコノ十二日間ニ於テ體重三封度ヲ減少シタリ、其後更ニ二十四日間ニ九回ノ注射ヲ施セリ、本患者ハ今尙ホ觀察中ナリ。

第五例 十六歲 初經ハ十二年五箇月ニシテ來潮爾來長キ間歇ヲ以テ六回之ヲ見タリ、六箇月以前ヨリ全ク閉止シタリト、内臟器ハ健全ナリ、患婦ハ甚シキ脂肪質ニシテ顔面強度ニ潮紅ス、子宮ハ小サク、附屬器ハ通常ナリ。

五日間ニ五回ノ本注射ヲ行フ、然ル時ニ月經起リ六日間持續シタリ、尙ホ次ノ四週間ニ於テ更ニ八回ノ注射ヲナセリ、爾來月經ハ正調ニ見

ハレ可ナリノ強度ニテ持續スルニ至レリ。

他ノ二例ハ上記五例ノ如ク「ビツグランモール」注射ノ效果ヲ判然目撃スルヲ得ザリキ、尙ホ其他ノモノハ全ク何等ノ奏效ヲモ示サバリキ、然リト雖余ハ此等ノ總テニ於テ數週間ニ亘リ「ビツグランモール」ノ三〇ccmヲ注射シタルモ何等ノ有害作用ヲモ觀察セザリシヲ特ニ茲ニ報告スルヲ得ベシ、又個々ノ患者ノ言ニヨレバ全然月經ノ來潮セザリシモノニ於テモ其自覺的症狀ハ減退セシムルヲ得タリ。

余ハ全ク僅少ナリト雖上記實驗ノ根據ニヨリテ無月經ノ治療上松果腺越幾斯ノ應用ガ最可ナリトノ印象ヲ得タリ、殊ニ身體内何レカノ腺ニ内分泌ノ障害アリテ強度ノ脂肪沈着ヲ既ニ證明スル患婦ニ於テ然リトス、但シ余ガ經驗シタルガ如キ例外ノ存スルヲ知ラザル可ラズ。

内分泌ヲ營ム各腺相互間ノ影響ニ就テ全然無智ナル現時ノ吾人ハ此ノ如キ症例ニ對スル松果腺越幾斯ノ作用ニ就テハ暫ク不明ノ事實トシテ認メザル可ラズ、茲ニ吾人ハ「ビツグランモール」ノ注射ニヨリ子宮ノ收縮ガ緩解セラレ以テ月經ヲ招來スルニアラズヤトノ臆說ヲ構成シ得ベシ、此關係ニ就テハ目今吾人ガ證明スルヲ得ザルモ蓋シ有リ得ベカラザル假定ナルヲ信ズルモノナリ。

無月經ノ一定數ニ松果腺越幾斯ノ應用ガ良好ナル效果ヲ呈スル理由ハ將來ニ於テ解明セラルナルベシ、要スルニ本問題ハ尙ホ今後ノ深キ檢索ヲ待ツモノナリ。(Zentralblatt für Gynäkologie. Nr. 41. 1912.)

(譯者附記、溫熱的子宮消息子ニ就テ詳細ヲ知ラント欲セバ Seitz, über eine thermische uterussonde. Zentralblatt für Gynäkologie 1910. Nr. 50. ヲ見ヨ)。(十一月二十六日記)