Über die Galvanotaxis der Histiozyten und über den Einfluss ihrer elektrischen Eigenladung auf ihr phagozy- täres Vermögen.

Von

Masaji Seki.

(Aus dem anatomischen Institut der medizinischen Fakultät zu Okayama, Japan.)

Inhalt.

- I. Versuchsverfahren der Galvanotaxis der Histiozyten im lebenden Körper.
- II. Galvanotaxis der Histiozyten des Kaninchens.
- III. Galvanotaxis der Histiozyten des Meerschweinchens.
- IV. Galvanotaxis der Histiozyten der Ratte und Maus.
- V. Galvanotaxis der Histiozyten der Taube.
- VI. Galvanotaxis der Histiozyten des Kaninchens bei stärkeren Strömen.
- VII. Elektrische Ladung der Histiozyten (Eigenladung).
- IIX. Über den Einfluss der elektrischen Eigenladung der Histiozyten auf ihr phagozytäres Vermögen.
- IX. Zusammenfassung.

I. Versuchsverfahren der Galvanotaxis der Histiozyten im lebenden Körper.

Vom Mesenchym kommen eine Art Zellen, die Kiyono Histiozyten (oder Histioleukozyten) genannt hat. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie gewisse Farbstoffe, Kolloidteilchen u. a. besonders energisch aufspeichern und diese in ihren Zelleibern an gewisse Granula von verschiedener Grösse ablagern. Diese Zellen sind bereits vorher unter verschiedenen

Namen (Klasmatozyten bei Ranvier, adventitielle Zellen oder leukozytoide Zellen bei Marchand, Polyblasten bei Maximow) beschrieben worden, wenn auch nicht immer in völlig gleichem Sinne. Sie sind überall, wo sich Stützgewebe findet, mehr oder weniger zahlreich anzutreffen. Nach Kiyono¹⁾ müssen die Histiozyten von den in Bezug auf die vitale Färbung negativen Lymphozyten (Lympholeukozyten) und Leukozyten (Myeloleukozyten) scharf geschieden werden. Kiyono hat die Histiozyten und die Retikuloendothelien der blutbereitenden Organe, welche letztere sich auch durch eine intensive Karminspeicherung auszeichnen und wohl die Histiozyten liefern können, unter dem Namen histiozytäre Zellen zusammengefasst. Die histiozytären Zellen haben mit den Fibroblasten und Endothelzellen der Blut- und Lymphgefäße ihrer Natur nach eine grosse Ähnlichkeit, aber während diese letzteren beiden in der Regel selbst bei hochgetriebener Färbung nur eine sehr spärliche und feine farbige Granulierung aufweisen, färben sich die histiozytären Zellen deutlich und lassen sich deshalb leicht von den anderen unterscheiden.

Bei Entzündung ändert sich, wie bekannt, die Zusammensetzung der Zellansammlung im Verlauf des Prozesses. In den meisten Fällen herrschen anfänglich die polymorphkernigen Leukozyten vor und später die kleinen und grossen Lymphozyten. Bei akuter oder subakuter Entzündung vergehen erst einige Tage, ehe die Ansammlung der Histiozyten ihren Höhepunkt erreicht. Bei chronischer Entzündung dagegen wird dieser Höhepunkt in relativ frühem Stadium erreicht, wenn die Bildung des Granulationsgewebes schon lebhaft ist. Dabei wandern sesshafte Histiozyten, die auch mit Bewegungsfähigkeit ausgestattet sind, an die Entzündungsherde, wo sie durch Zellteilung wuchern. Zu gleicher Zeit treten auch Histiozyten durch die Gefässwand hindurch und gelangen in die Entzündungsherde hinein. Diese Histiozyten beteiligen sich dadurch am Heilungsprozesse, dass sie eingedrungene Mikroorganismen, durch Entzündung entstandene Zerfallsprodukte u. a. habgierig verspeisen. Wenn eine Ent-

1) Siehe darüber besonders: K. Kiyono, Die vitale Karminspeicherung. 1914. Jena.
Derselbe, Zur Frage der histiozytären Blutzellen. Folia haematologica, Bd. 18, 1914.
Derselbe, Über den gegenwärtigen Stand der Forschung über die vitale Färbung und über ihre Untersuchungsmethoden. 1921. Tokyo. (japanisch).

zündung lange dauert, können sich sogar histiozytäre Riesenzellen bilden.

Um die Histiozyten vital zu färben, ist Karmin (Merck, Darmstadt) am bequemsten in der Anwendung. Man braucht es nur in gesättigter Lithiumkarbonatlösung aufzulösen und dann diese im Wasserbad 10 Minuten lang zu kochen. Vor dem Gebrauch wird die 4%ige Farbstofflösung jedesmal filtriert. Man erwärmt diese Lösung bis Körperwärme und injiziert während etwa 6 Tagen täglich einmal je 6 ccm in die Ohrvenen des Kaninchens. Bei Meerschweinchen werden verschiedene Venen, die Vena jugularis, die Vena femoralis u. a., benutzt, bei Ratten hauptsächlich die Schwanzvenen und bei Tauben meist die Flügelvenen. Bei allen diesen Tieren wird die intraperitoneale Injektion mit 2%iger Farbstofflösung kombiniert. Bei Mäusen wird allein die 2%ige Karminlösung in die Bauchhöhle eingespritzt. Um die Histiozyten im lebenden Körper an einen bestimmten Ort zu locken und da wuchern zu lassen, führt man ein in 0,9%iger Kochsalzlösung mit Hitze sterilisiertes Schwammstückchen unter die Stirnhaut des Kaninchens, resp. unter die Rückenhaut des Meerschweinchens u. a. ein. Dadurch entsteht eine durch chemische und mechanische Reize verursachte Entzündung. Der elektrische Strom wird durch zwei 0,9%ige Kochsalzlösung enthaltene Agar-agarsäulen, welche man in Nelatons Katheter gefüllt hat, geführt. Das eine Ende des Katheters wird mit Zelloidin an der Haut befestigt und das andere Ende mit einem Glasrohr verbunden, in dem sich gesättigte Zinksulfatlösung findet, in die dann ein mit der Stromquelle (meist 10 Volt) verbundener Zinkstab getaucht wird. In den meisten Fällen wird die Stromdurchleitung (ca. 0,05 Milliampère) auf 12 Stunden beschränkt, um das Eindringen verschiedener höchst schädlicher Ionen in das Gewebe zu vermeiden.

Zu verschiedenen Zeitpunkten nach dem Einlegen des Schwammstückchens und nach dem Durchleiten des Stromes wird das Schwammstückchen mit dem benachbarten Gewebe herausgeschnitten und in Formollösung fixiert. Davon werden dann nach dem gewöhnlichen Verfahren mikroskopische Zelloidinschnittpräparate angefertigt. Zur Färbung der Zellkerne wird, wenn nötig, Böhmers Hämatoxylin verwendet.

Unter dem Einflusse des elektrischen Stromes bewegen sich nicht nur die Histiozyten, welche sich an dem Schwammstückchen vermehrt haben,

sondern auch diejenigen, die sich an einem Ende des Katheters häufen. Diese am Katheterende angehäuften Histiozyten wandern unter Umständen in die gefüllte Agar-agarsäule hinein. Man kann also auch, um Histiozyten zu erhalten, das Ende der Agar-agarsäule aus dem Katheter herauspressen, fixieren und Paraffinschnittpräparate anfertigen.

II. Galvanotaxis der Histiozyten des Kaninchens.

8 mittelgrosse Kaninchen wurden—wie hier zunächst tabellarisch angegeben—verschiedenartig behandelt, ehe die zu untersuchenden Gewebestückchen herausgeschnitten wurden.

		Karmininjektion :	Schwamm eingelegt :	Stromdurchleitung :
Kaninchen	1	6 mal	vor 7 Tagen	12 Stunden lang
„	2	6 „	„ 6 „	12 „ „
„	3	6 „	„ 5 „	12 „ „
„	4	6 „	„ 4 „	12 „ „
„	5	6 „	„ 3 „	12 „ „
„	6	6 „	„ 2 „	12 „ „
„	7	7 „	„ 24 Stunden	24 „ „
„	8	7 „	„ 48 „	48 „ „

Kaninchen 1 (Fig. 1, Phot. 1 u. 2)

Karmininjektion 6 mal, Schwamm eingelegt vor 7 Tagen,
Stromdurchleitung (10 Volt, 0,05 Milliampère) 12 Stunden lang.

Bevor ich auf die Beschreibung der Galvanotaxis eingehe, werde ich über die Zellansammlung am Schwammstückchen und über den Organisationsprozess berichten.

Das Schwammstückchen ist von neugebildetem, dichtem Bindegewebe völlig eingeschlossen. Diese bindegewebige Kapsel ist im Schnittpräparate vor allem auf den beiden Seiten des Schwammstückchens etwas dicker. Dort finden sich aber nur wenige Bindegewebszellen. Das Lumen des Schwammes ist von Leukozyten, Lymphozyten, Histiozyten und bloss oberflächlich vorhandenen spärlichen Fibroblasten ausgefüllt. Die in das

Schwammstückchen eingewanderten Zellen lassen grösstenteils Degeneration erkennen. Auch die Histiozyten sind hier und da in Zerfall begriffen und färben die Umgebung mit dem von ihnen vorher aufgenommenen Farbstoffe rot.

Fig. 1

In dieser schematischen Figur bezeichnen die kleinen Pünktchen die Histiozyten, die feinen, schrägen Striche die Leukozyten- und Lymphozyteninfiltration. Ausserdem sind das Schwammstückchen, die Haare und die quergestreifte Muskelschicht unter der Haut angegeben. Das Zeichen — ist der Ladungssinn der Elektrode. In späteren Figuren tritt auch das Zeichen + auf. Die Ringe geben die mikrophotographierten Stellen an. Diese Bilder wurden immer von denjenigen Schnittpräparaten genommen, die gar nicht oder nur ganz schwach mit Hämatoxylin gefärbt waren, um eine Verteilung der gefärbten Histiozyten möglichst deutlich zu machen.

Am kathodischen Ende des Schwammstückchens sind Histiozyten innerhalb der bindegewebigen Kapsel nur spärlich zu finden, aber tiefer im Inneren finden sie sich zahlreicher. Am anodischen Ende dagegen liegen Histiozyten dicht innerhalb der Kapsel zahlreich zusammen, was sofort beim ersten flüchtigen Anblick auffällt, da sie rot gefärbt sind. Die Histiozyten können aber nicht durch die dicke bindegewebige Wand hindurchgehen und bleiben deshalb innerhalb derselben. Von da nach innen, d. i. nach der Kathodenseite hin, werden Histiozyten immer spärlicher.

An den Elektroden liegen die Verhältnisse etwas komplizierter. Wo der elektrische Strom in das Gewebe eintritt, d. i. an der anodischen Elektrode, und wo er es verlässt, d. i. an der kathodischen Elektrode, drängen sich ausserordentlich viele Leukozyten (aber wenig Lymphozyten) zusammen und bilden dichte Zellmassen. Um diese Zellanhäufungen entstehen ziemlich dichte bindegewebige Kapseln, die auch viele Histiozyten enthalten. Diese Histiozyten nehmen verhältnismässig sehr wenig Farbstoff auf, was ohne Zweifel darauf beruht, dass sie sich ununterbrochen teilen und infolgedessen keine Zeit haben, genügend Farbstoff aufzunehmen.

Was die Ursache der dichten Leukozytenansammlung sowohl an der kathodischen als auch an der anodischen Elektrode betrifft, so steht es ausser Zweifel, dass der Vermittler des elektrischen Stromes nichts anderes ist als die im Agar enthaltene 0,9%ige Kochsalzlösung, so dass von der Kathodenseite her viele Chlorionen und von der Anodenseite her viele Natriumionen in das Gewebe eindringen. Diese angehäuften Ionen beginnen das Gewebe zu schädigen und wirken dadurch reizend auf die Leukozyten, die sich dann dahin bewegen und rasch wuchern. Unter den Wanderzellen, die sich zuerst an der Elektrode anhäufen, sind die Leukozyten am zahlreichsten, während sowohl die Lymphozyten als auch vor allem die Histiozyten und Fibroblasten, welche letztere auch mit aktiver Beweglichkeit begabt sind, sich erst später und nur weniger zahlreich ansammeln und auch weniger wuchern. Bei näherer Betrachtung kann man wahrnehmen, dass die Histiozyten an der kathodischen Elektrode—im Unterschied zur anodischen Elektrode—von der bindegewebigen Kapselwand her nicht weit in die Leukozytenansammlung eindringen. Diese Tatsache ist wichtig und im Laufe der weiteren Untersuchung wird noch näher davon die Rede sein.

Kaninchen 2 (Fig. 2, Phot. 3, 4, 5 u. 6)

Karmininjektion 6 mal, Schwamm eingelegt vor 6 Tagen,
Stromdurchleitung (10 Volt, 0,05 Milliampère) 12 Stunden lang.

Das Schwammstückchen ist von einer neugebildeten, ziemlich dichten Bindegewebsschicht, die zahlreiche Histiozyten enthält, eingeschlossen. Von der Bindegewebsschicht her ist lockeres Bindegewebe mit neugebildeten kapillaren Blutgefässen in das Schwammstückchen hineingewachsen, aber nicht sehr tief. In diesem Bindegewebe finden sich ausser den Fibroblasten auch viele Histiozyten, Lymphozyten und Leukozyten. Die Histiozyten nehmen stark an Umfang zu. Die in das Lumen des Schwammes vorgedrungenen Zellen fallen zum grösseren Teile der Degeneration anheim.

Die Verteilung der Histiozyten auf der Oberfläche des Schwammstückchens ist nicht gleichmässig. Am kathodischen Ende des Schwammstückchens dringen viele Histiozyten tief in das Innere des Schwammstückchens ein, aber nur wenige sind ausserhalb der bindegewebigen Kapsel zu finden. Am anodischen Ende dagegen, wo nur wenige Histiozyten im Lumen des Schwammes bleiben, wandern die meisten durch die binde-

gewebige Kapsel hindurch nach der Anode.

Fig. 2

An der anodischen Elektrode sammeln sich sehr viele Leukozyten dicht aneinander an. Daneben findet man nur wenige Lymphozyten. Alle sind von jungem Bindegewebe eingekapselt. In diesem Bindegewebe finden sich viele Histiozyten, die—wie beim ersten Präparat an der kathodischen Elektrode—nur wenig Farbstoff enthalten. Beachtenswert ist hier jedoch, dass Histiozyten, wenn auch nur ganz wenige, in die Leukozytenanhäufung eindringen. Das war bei der kathodischen Elektrode des vorigen Präparats nicht der Fall. Aber diese Verschiedenheit ist hier beim Kaninchen nicht so deutlich wie beim Meerschweinchen, wie wir in Kapitel III sehen werden.

Nach den bis hierher erwähnten Beobachtungen ist es schon sehr wahrscheinlich, dass die Histiozyten unter dem Einflusse des elektrischen Stromes im wesentlichen nach der Anodenseite hin wandern. Die im ersten Präparat an der kathodischen Elektrode vorhandenen Histiozyten scheinen nicht von fern angewanderte Histiozyten zu sein, sondern—sicherlich zum grössten Teile—nur Abkömmlinge sesshafter Histiozyten, die unter dem Reize der Elektrodenflüssigkeit gewuchert haben.

Kaninchen 3 (Fig. 3, Phot. 7 u. 8)

Karmininjektion 6 mal, Schwamm eingelegt vor 5 Tagen,
Stromdurchleitung (10 Volt, 0,05 Milliampère) 12 Stunden lang.

Die durch Wucherung des Bindegewebes an der Grenzfläche des Schwammstückchens entstandene Kapsel ist ganz dünn. Im Innern des Schwammstückchens ist eingewachsenes Bindegewebe so spärlich, dass es kaum bemerkbar ist. Das Lumen des Schwammes ist mit Leukozyten, Lymphozyten und Histiozyten ausgefüllt, die aber zum grösseren Teil bereits degeneriert sind. Die Histiozyten dagegen, besonders intakte, sind mehr oberflächlich und seltener im Inneren anzutreffen.

Fig. 3

Die Histiozyten bleiben fast alle an der kathodischen Oberfläche des Schwammstückchens. Von da bis zur kathodischen Elektrode im Unterhautgewebe sind nur wenige zu finden. Am anodischen Ende des Schwammstückchens dagegen bleiben die Histiozyten zwar zum grössten Teil auch an der Oberfläche der bindegewebigen Kapsel, aber nicht wenige wandern weiter nach der Anode hinaus.

Wenn man die Bilder an der kathodischen und an der anodischen Elektrode vergleicht, kann man wahrnehmen, dass sich auf der kathodischen Seite verhältnismässig wenige Histiozyten ansammeln, und dass keine Histiozyten in die Leukozytenanhäufungen eindringen, dass aber auf der anodischen Seite einige der vielen angesammelten Histiozyten in die Leukozytenmasse eindringen.

Kaninchen 4 (Fig. 4, Phot. 9 u. 10)

Karmininjektion 6 mal, Schwamm eingelegt vor 4 Tagen,
Stromdurchleitung (10 Volt, 0,05 Milliampère) 12 Stunden lang.

Das Lumen des Schwammstückchens ist mit vielen Leukozyten, aber nur wenigen Lymphozyten völlig ausgefüllt, die alle mehr oder weniger der Degeneration verfallen sind. Die neugebildete bindegewebige Kapsel um das Schwammstückchen ist noch nicht gut entwickelt. Die Histiozyten sind zwar schon sehr zahlreich vorhanden, aber noch nicht tief ins Innere gewandert.

Am kathodischen Ende des Schwammstückchens scheinen die Histiozyten nicht über die bindegewebige Kapsel hinaus weiter nach der Kathodenseite gewandert zu sein, denn sie sind ausserhalb der Kapsel sehr spärlich zu finden. Am anodischen Ende des Schwammstückchens aber liegen nicht nur zahlreiche Histiozyten dicht an der Innenfläche der Kapsel, sondern auch sowohl in der Wand der Kapsel wie ausserhalb derselben. Diese Histiozyten müssen also durch die bindegewebige Kapsel hindurch nach der Anode hin ausgewandert sein.

Fig. 4

Wie im vorigen Präparate haben sich an den Elektroden Leukozyten angehäuft, die von einer, viele Histiozyten enthaltenden, bindegewebigen Kapsel eingeschlossen sind. Die gewöhnlich gefundene Verschiedenheit, dass sich an der anodischen Elektrode ein gewisser Teil der Histiozyten mit der Leukozytenanhäufung vermischt, was an der Kathode nicht der Fall ist, ist leider in diesem Präparate undeutlich, was ausser Zweifel darauf zurückzuführen ist, dass die kathodische Elektrode aus Versehen schief und zu nahe dem Schwammstückchen in das Gewebe hineingelegt worden ist.

Kaninchen 5 (Fig. 5, Phot. 11 u. 12)

Karmininjektion 6 mal, Schwamm eingelegt vor 3 Tagen,
Stromdurchleitung (10 Volt, 0,05 Milliampère) 12 Stunden lang.

Das das Schwammstückchen umgebende, neugebildete Bindegewebe ist locker und dünn. Das Lumen des Schwammes ist dicht mit zum grösseren Teil der Degeneration verfallenen, zahlreichen Leukozyten und spärlichen Lymphozyten ausgefüllt. Die Histiozyten sind mehr an der Oberfläche des Schwammstückchens zu finden.

Fig. 5

Am kathodischen Ende des Schwammstückchens ist nichts Besonderes zu finden, aber am anodischen Ende häufen sich Histiozyten an, die sogar weiter nach der Anode hinauswandern.

An der Anode sammeln sich viele Histiozyten an und nicht wenige davon dringen sogar tief in die Leukozytenanhäufung ein. An der Kathode dagegen gibt es nur wenige Histiozyten, und keine davon dringt unter die Leukozyten vor.

Kaninchen 6

Karmininjektion 6 mal, Schwamm eingelegt vor 2 Tagen,
Stromdurchleitung (10 Volt, 0,05 Milliampère) 12 Stunden lang.

Das Innere des Schwammstückchens ist mit zahlreichen Leukozyten und wenigen Lymphozyten ganz ausgefüllt. Die neugebildete bindegewebige Kapsel ist noch sehr mangelhaft. Die sich da an der Kapsel findenden Histiozyten sind auch noch so spärlich, dass ihre Galvanotaxis nicht zu beobachten ist.

Was aber die Ansammlung von Histiozyten an den Elektroden betrifft, so sind sie—ganz wie im vorigen Präparate—an der Anode zahlreicher anzutreffen als an der Kathode.

Kaninchen 7

Karmininjektion 7 mal, Schwamm eingelegt vor 24 Stunden,
Stromdurchleitung (10 Volt, 0,05 Milliampère) 24 Stunden lang.

Trotz beträchtlicher Leukozyteninfiltration im Schwammstückchen sind die Histiozyten nur an der Oberfläche vorhanden, und zwar sehr wenige, so dass sich das Galvanotaxisbild nicht scharf abhebt.

Während der 24 Stunden Stromdurchleitung sammeln sich viele Histiozyten an der Anode an und einige dringen tief in die Leukozytenansammlung ein und erreichen sogar die Oberfläche des Agar-agars.

Kaninchen 8

Karmininjektion 7 mal, Schwamm eingelegt vor 48 Stunden,
Stromdurchleitung (10 Volt, 0,05 Milliampère) 48 Stunden lang.

Die Verhältnisse der Leukozyten, Lymphozyten, Histiozyten und des Bindegewebes am Schwammstückchen sind wie bei Kaninchen 6, das auch einer 48-stündigen Schwammeinpflanzung unterworfen war.

Hier aber wurde der elektrische Strom 48 Stunden lang durchgeführt. Im neugebildeten Bindegewebe, das an der anodischen Elektrode die Leukozytenanhäufung einschliesst, befinden sich sehr viele Histiozyten. Nicht wenige von ihnen dringen tief in der Leukozytenanhäufung hinein und erreichen sogar das Agar-agar wie im obigen Präparate. Die Klumpen des Agar-agars sind hier und da diffus rot gefärbt, was ohne Zweifel auf die Auflösung des Karmins nach Zerfall der Histiozyten zurückzuführen ist. An der kathodischen Elektrode dagegen findet man nur wenige Histiozyten, die alle an der Oberfläche der Leukozytenanhäufung bleiben.

Die in Kapitel II erwähnten Tatsachen berechtigen zu dem Schlusse, dass die an aseptischer Fremdkörperentzündung angesammelten Histiozyten des Kaninchens wesentlich eine positive Galvanotaxis zeigen, d. h. sie wandern mit ihrer aktiven Beweglichkeit nach der Anode. Diese Wanderung ist keineswegs eine Kataphorese, wie später in Kapitel VII gezeigt wird.

III. Galvanotaxis der Histiozyten des Meerschweinchens.

Tabellarischer Überblick.

	Karmininjektion:	Schwamm eingelegt:	Stromdurchleitung:
Meerschweinchen 1	6 mal	vor 7 Tagen	12 Stunden lang
„ 2	6 „	„ 6 „	12 „ „
„ 3	6 „	„ 5 „	12 „ „
„ 4	6 „	„ 5 „	12 „ „
„ 5	7 „	„ 4 „	12 „ „
„ 6	7 „	„ 3 „	24 „ „
„ 7	6 „	„ 3 „	12 „ „
„ 8	6 „	„ 2 „	12 „ „

Meerschweinchen 1 (Phot. 13)

Karmininjektion 6 mal, Schwamm eingelegt vor 7 Tagen,
Stromdurchleitung (10 Volt, 0,06 Milliampère) 12 Stunden lang.

Das junge Bindegewebe wächst in das Lumen des Schwammstückchens hinein. Neben den Lymphozyten, Histiozyten und Leukozyten finden sich noch viele Bindegewebszellen von verschiedener Form. Dieses Bild zeigt, dass das Schwammstückchen als ein Fremdkörper auf das Unterhautgewebe des Meerschweinchens nur geringen Reiz ausübt, so dass die Entzündung sehr rasch abläuft und die pathogene Organisation sehr glatt stattfindet. Die Histiozyten finden sich in der neugebildeten bindegewebigen Kapsel ziemlich zahlreich, aber doch nicht genügend, um eine Galvanotaxisbeobachtung zu erlauben.

Was interessant ist, ist das Bild an den Elektroden. An der katho-

dischen Elektrode häufen sich viele Leukozyten, wenige Lymphozyten und fast gar keine Histiozyten an. Diese bleiben auch hier nur an der Oberfläche der Zellanhäufung. An der Anode aber dringen auch hier nicht wenige Histiozyten in die Zellanhäufung bis zu den Rissen im Agar-agar vor. (Phot. 13)

Meerschweinchen 2 (Fig. 6, Phot. 14)

Karmininjektion 6 mal, Schwamm eingelegt vor 6 Tagen,
Stromdurchleitung (10 Volt, 0,06 Milliampère) 12 Stunden lang.

Das Schwammstückchen ist von einer dünnen bindegewebigen Kapsel eingeschlossen und von meist abgestorbenen, degenerierten Zellen ausgefüllt. Im Innern des Schwammstückchens finden sich nur wenige Histiozyten, aber oberflächlich, sich mit dem Bindegewebe vermengend, sehr viele.

Fig. 6

Am kathodischen Ende des Schwammstückchens finden sich Histiozyten bis in dasselbe hinein, am anodischen Ende dagegen finden sich im Schwammstückchen und in dem dieses einschliessenden Bindegewebe nur wenige, was deutlich zeigt, dass sie nach der Anodenseite hin ausgewandert sind.

Von den Histiozyten, die an der anodischen Elektrode die dichte Leukozytenanhäufung umringen, dringen einige in die Zellanhäufung tief hinein. (Phot. 14)

Meerschweinchen 3 (Fig. 7)

Karmininjektion 6 mal, Schwamm eingelegt vor 5 Tagen,
Stromdurchleitung (10 Volt, 0,05 Milliampère) 12 Stunden lang.

Fig. 7

Das Lumen des Schwammstückchens ist mit unzähligen Leukozyten, aber wenigen Lymphozyten völlig ausgefüllt. Die neugebildete bindegewebige Kapsel um das Schwammstückchen ist noch ganz dünn.

Am kathodischen Ende des Schwammstückchens sind innerhalb der Kapsel Histiozyten zahlreich zu finden, aber ausserhalb der Kapsel nur in geringer Zahl. Auf der Anodenseite dagegen sind bis weit in das Unterhautbindegewebe hinein viele Histiozyten anzutreffen. An der kathodischen Elektrode selbst sind Histiozyten überhaupt kaum zu finden.

Meerschweinchen 4 (Fig. 8)

Karmininjektion 6 mal, Schwamm eingelegt vor 5 Tagen,
Stromdurchleitung (10 Volt, 0,06 Milliampère) 12 Stunden lang.

Fig. 8

Die Galvanotaxis der am Schwammstückchen angesammelten Histiozyten kann wegen einer Blutung nicht beobachtet werden. Aber interessant ist, dass sich an der anodischen Elektrode viele Histiozyten ansammeln, von denen einige sogar das Agar-agar erreichen, dass aber an der kathodischen nur sehr wenige Histiozyten zu finden sind.

Meerschweinchen 5 (Fig. 9, Phot. 15 u. 16)

Karmininjektion 7 mal, Schwamm eingelegt vor 4 Tagen,
Stromdurchleitung (10 Volt, 0,06 Milliampère) 12 Stunden lang.

Fig. 9

Das charakteristische, asymmetrische Bild der Verteilung der Histiozyten auf die beiden Seiten des Schwammstückchens ist auch hier sehr deutlich. Am kathodischen Ende des Schwammstückchens häufen sich

viele Histiozyten an, die aber nicht nach der kathodischen Elektrode hinaus wandern. Vom anodischen Ende aus dagegen begeben sich viele Histiozyten in das Unterhautbindegewebe hinein fern nach der anodischen Elektrode hin. Sogar an der anodischen Elektrode selbst kann man eine Histiozytenansammlung beobachten, nicht aber an der kathodischen.

Meerschweinchen 6 (Fig. 10, Phot. 17 u. 18)

Karmininjektion 7 mal, Schwamm eingelegt vor 3 Tagen,
Stromdurchleitung (10 Volt, 0,05 Milliampère) 24 Stunden lang.

Die neugebildete bindegewebige Kapsel um das Schwammstückchen ist noch spärlich und locker. Das Lumen des Schwammes ist völlig mit Leukozyten und Lymphozyten ausgefüllt. Auch Histiozyten haben sich schon viele angesammelt.

Fig. 10

Sehr auffallend ist die Verteilung der Histiozyten. Am kathodischen Ende des Schwammstückchens bleiben die Histiozyten zum grösseren Teil innerhalb der bindegewebigen Kapsel oder im Lumen des Schwammes, während am anderen Ende viele Histiozyten in das Unterhautgewebe hinein nach der Anode hin wandern. Da hier der elektrische Strom 24 Stunden lang hindurchgeleitet wurde, so war das Galvanotaxisbild natürlich sehr deutlich.

Meerschweinchen 7 (Phot. 19)

Karmininjektion 6 mal, Schwamm eingelegt vor 3 Tagen,
Stromdurchleitung (10 Volt, 0,06 Milliampère) 12 Stunden lang.

Die Schnittpräparate sind durch ein Versehen nicht gelungen, und die Galvanotaxis der Histiozyten am Schwammstückchen ist leider nicht zu beobachten.

An der kathodischen Elektrode sammeln sich viele Leukozyten an, welche von einer ziemlich dichten bindegewebigen Kapsel eingeschlossen sind, aber Histiozyten finden sich hier nur sehr wenige. In der Leukozytenansammlung sieht man auch nicht einen einzigen Histiozyt. Im Gegen-

satz zur kathodischen dringen an der anodischen Elektrode einige Histiozyten sehr tief in die Agar-agarrisse hinein, wie das Bild (Phot. 19) klar zeigt.

Meerschweinchen 8 (Phot. 20)

Karmininjektion 6 mal, Schwamm eingelegt vor 2 Tagen,
Stromdurchleitung (10 Volt, 0,06 Milliampère) 12 Stunden lang.

Die Wanderung und Wucherung der Histiozyten am Schwammstückchen ist noch zu gering, als dass man ihre Galvanotaxis beobachten könnte. Die Verhältnisse liegen ganz ähnlich wie bei dem Kaninchen, das einer 2 tägigen Schwammeinpflanzung unterworfen war.

An der kathodischen Elektrode sind Histiozyten kaum zu finden, an der anodischen aber gibt es schon viele Histiozyten; einige davon dringen sogar in die Agar-agarrisse ein. (Phot. 20)

Die hier im Kapitel III bei der Galvanotaxis der Histiozyten des Meerschweinchens beobachteten Erscheinungen stimmen mit denen beim Kaninchen überein, d. h. die Histiozyten wandern nach der Anode, hier sogar noch etwas deutlicher als beim Kaninchen.

IV. Galvanotaxis der Histiozyten der Ratte und Maus.

Tabellarischer Überblick: Ratte.

	Karmininjektion:	Schwamm eingelegt:	Stromdurchleitung:
Ratte 1	6 mal	vor 5 Tagen	12 Stunden lang
„ 2	5 „	„ 4 „	12 „ „

Ratte 1 (Fig. 11, Phot. 21 u. 22)

Karmininjektion 6 mal, Schwamm eingelegt vor 5 Tagen,
Stromdurchleitung (10 Volt, 0,05 Milliampère) 12 Stunden lang.

Die am Schwammstückchen angesammelten Histiozyten sind sehr wenig zahlreich. Aber man kann doch wahrnehmen, dass die Histiozyten

Fig. 11

auf der kathodischen Seite des Schwammstückchens seltener sind als auf der anodischen.

Ratte 2

Karmininjektion 5 mal, Schwamm eingelegt vor 4 Tagen,
Stromdurchleitung (10 Volt, 0,05 Milliampère) 12 Stunden lang.

Wegen mangelhafter vitaler Färbung und wegen Blutung an der Oberfläche des Schwammstückchens hebt sich das Galvanotaxisbild nicht scharf ab. Dennoch kann man bei genauer Beobachtung wahrnehmen, dass die Histiozyten wie im vorigen Präparat nach der Anodenseite gewandert sind.

Tabellarischer Überblick: Maus.

	Karmininjektion:	Schwamm eingelegt:	Stromdurchleitung:
Maus 1	8 mal	vor 8 Tagen	10 Stunden lang
„ 2	6 „	„ 6 „	12 „ „
„ 3	5 „	„ 5 „	10 „ „
„ 4	6 „	„ 4 „	10 „ „

Maus 1

Karmininjektion 8 mal, Schwamm eingelegt vor 8 Tagen,
Stromdurchleitung (5 Volt, 0,025 Milliampère) 10 Stunden lang.

Das Lumen des Schwammstückchens ist überall mit Histiozyten und Leukozyten ausgefüllt. Die Histiozyten sind hier und da vergrößert, es haben sich sogar histiozytäre Riesenzellen gebildet. Die Leukozyten fallen meist der Degeneration anheim.

Das Schwammstückchen ist von einer neugebildeten bindegewebigen Kapsel eingeschlossen. Sowohl in der Kapsel als auch im Unterhautgewebe in der Nähe des Schwammstückchens befinden sich viele an Umfang vergrößerte Histiozyten. Dieses Bild lässt uns vermuten, dass sich die Entzündung nicht auf die Partie dicht am Schwammstückchen beschränkt,

sondern etwas ausgedehnter ist. Daher ist die Galvanotaxis der Histiozyten nicht wahrnehmbar.

Maus 2 (Fig. 12, Phot. 23 u. 24)

Karmininjektion 6 mal, Schwamm eingelegt vor 6 Tagen,
Stromdurchleitung (5 Volt, 0,025 Milliampère) 12 Stunden lang.

Fig. 12

Die Verteilung der Histiozyten auf die beiden Seiten des Schwammstückchens ist asymmetrisch. Vom anodischen Ende des Schwammstückchens wandern viele Histiozyten in das Unterhautgewebe hinein nach der Anode hin. Am kathodischen Ende dagegen bleiben die Histiozyten mehr auf der Oberfläche, und von da nach der Kathode hin sind nur sehr wenige Histiozyten zu finden, die wohl schon vor der Stromdurchleitung dort waren und unbeweglich oder sehr schwer beweglich sind.

Maus 3 (Fig. 13, Phot. 25 u. 26)

Karmininjektion 5 mal, Schwamm eingelegt vor 5 Tagen,
Stromdurchleitung (8 Volt, 0,04 Milliampère) 10 Stunden lang.

Im Lumen des Schwammstückchens sind viele Leukozyten und Lymphozyten anzutreffen, die aber fast alle schon der Degeneration verfallen sind. Die Histiozyten sind in die Tiefe des Schwammstückchens hineingewandert, und einige derselben haben etwas an Umfang zugenommen.

Fig. 13

Vom anodischen Ende des Schwammstückchens aus sind viele Histiozyten in das Unterhautgewebe nach der Elektrode hin vorgedrungen, während auf der entgegengesetzten Seite des Schwammstückchens nur wenige Histiozyten zu finden sind und immer nur in der Nähe desselben.

Maus 4 (Fig. 14, Phot. 27 u. 28)

Karmininjektion 6 mal, Schwamm eingelegt vor 4 Tagen,
Stromdurchleitung (8 Volt, 0,04 Milliampère) 10 Stunden lang.

Fig. 14

Das Lumen des Schwammstückchens ist mit ausserordentlich vielen Leukozyten völlig ausgefüllt. Die Histiozyten sind nur im oberflächlichen Teile der Infiltration vorhanden und noch nicht tief in das Innere vorge-
drungen. Sie finden sich meist innerhalb der bindegewebigen Kapsel am Schwammstückchen und in der Nähe der Kapsel. Die Verteilung der Histiozyten auf die beiden Seiten des Schwammstückchens ist ebenso charakteristisch zu sehen wie im vorigen Präparat.

V. Galvanotaxis der Histiozyten der Taube.

Tabellarischer Überblick.

	Karmininjektion:	Schwamm eingelegt:	Stromdurchleitung:
Taube 1	6 mal	vor 7 Tagen	12 Stunden lang
„ 2	6 „	„ 6 „	12 „ „
„ 3	6 „	„ 5 „	12 „ „
„ 4	6 „	„ 4 „	12 „ „
„ 5	6 „	„ 3 „	12 „ „
„ 6	6 „	„ 2 „	12 „ „

四
五
四

Taube 1 (Fig. 15)

Karmininjektion 6 mal, Schwamm eingelegt vor 7 Tagen,
Stromdurchleitung (10 Volt, 0,05 Milliampère) 12 Stunden lang.

Das neugebildete Bindegewebe ist sogar bis in das Lumen des Schwammstückchens vorge-
drungen. Die eingewanderten Zellen, besonders

die Leukozyten, fallen überall der Degeneration anheim. Selbst bis in die Mitte des Schwammstückchens hinein finden sich viele Histozyten.

Fig. 15

Auf der kathodischen Seite des Schwammstückchens ausserhalb der bindegewebigen Kapsel sind Histozyten kaum zu finden. In der Muskulatur bemerkt man bedeutende Histozytenherde (Fig. 15 *), aber diese stehen mit der Galvanotaxis der am Schwammstückchen angesammelten Histozyten in keinem Zusammenhang. Im Gegensatz hierzu sind an der anodischen Seite des Schwammstückchens nicht wenige Histozyten—sich mit vielen Leukozyten vermengend—in das Unterhautgewebe ziemlich weit nach der Anode hin eingedrungen. An der anodischen Elektrode ist die Zellanhäufung ein wenig rötlich gefärbt, was von den Histozyten kommt.

Taube 2 (Fig. 16)

Karmininjektion 6 mal, Schwamm eingelegt vor 6 Tagen,
Stromdurchleitung (10 Volt, 0,05 Milliampère) 12 Stunden lang.

Fig. 16

Die Verhältnisse der Histozyten am Schwammstückchen sind ganz wie im vorigen Präparat, so dass hier auf eine Beschreibung verzichtet werden kann. Weder an der anodischen noch an der kathodischen Elektrode sind Histozyten zu bemerken, weil die vitale Färbung bei dieser Taube zu schwach ist.

Taube 3 (Fig. 17, Phot. 29 u. 30)

Karmininjektion 6 mal, Schwamm eingelegt vor 5 Tagen,
Stromdurchleitung (10 Volt, 0,05 Milliampère) 12 Stunden lang.

Bei der Einführung des Schwammstückchens wurde ein Blutgefäß verletzt und das Schwammstückchens mit Blut durchtränkt. Auf dem

Schnittpräparate ist deshalb das Lumen des Schwammstückchens völlig mit Blutgerinnsel gefüllt. Das Blutgerinnsel wird von einer Schicht angesamelter Leukozyten umsäumt, welche ihrerseits von einer neugebildeten, dünnen bindegewebigen Schicht eingeschlossen wird. In der Leukozytenansammlung und vor allem in der bindegewebigen Kapsel sind viele Histiozyten anzutreffen. Wenn man aber die Verhältnisse der Histiozyten am anodischen und am kathodischen Ende vergleicht, so wird ein deutlicher Unterschied bemerkbar. Vom anodischen Ende des Schwammstückchens aus wandern nicht wenige Histiozyten in das Unterhautgewebe hinein. Im Gegensatz hierzu wandern am kathodischen Ende die Histiozyten in das Blutgerinnsel hinein, so dass in der bindegewebigen Kapsel und in der Leukozytenansammlung nur wenige anzutreffen sind, geschweige denn im Unterhautgewebe.

Fig. 17

An der kathodischen Elektrode sind Histiozyten nur schwer zu finden, an der anodischen aber sind sie ziemlich zahlreich.

Taube 4

Karmininjektion 6 mal, Schwamm eingelegt vor 4 Tagen,
Stromdurchleitung (10 Volt, 0,05 Milliampère) 12 Stunden lang.

Die Lage des kathodischen und anodischen Endes des Schwammstückchens ist verschieden. Das kathodische Ende liegt im Muskelgewebe, das anodische aber im Unterhautgewebe. Deshalb ist das Galvanotaxisbild der Histiozyten unklar.

Aber man kann auch hier einen Unterschied bemerken. An der anodischen Elektrode ist die Zellanhäufung ein wenig rötlich gefärbt, was beweist, dass Histiozyten vorhanden sind.

Taube 5 (Fig. 18)

Karmininjektion 6 mal, Schwamm eingelegt vor 3 Tagen,
Stromdurchleitung (10 Volt, 0,05 Milliampère) 12 Stunden lang.

Das Schwammstückchen ist mit Leukozyten ausgefüllt. Die Histiozyten sind nur oberflächlich in der neugebildeten, lockeren, bindegewebigen

Kapsel vorhanden und noch nicht tief in das Schwammstückchen eingewandert.

Fig. 18

Vom anodischen Ende des Schwammstückchens aus wandern die Histiozyten weit nach der Anode hinaus, ein Bild, das von der kathodischen Seite verschieden ist.

Taube 6

Karmininjektion 6 mal, Schwamm eingelegt vor 2 Tagen,
Stromdurchleitung (10 Volt, 0,05 Milliampère) 12 Stunden lang.

Unzählige Leukozyten wandern in das Schwammstückchen hinein und füllen das Lumen schon völlig aus. Aber die Wanderung und Wucherung der Histiozyten ist noch nicht genügend vorgeschritten, um ein Galvanotaxisbild erkennen zu lassen.

VI. Galvanotaxis der Histiozyten des Kaninchens bei stärkeren Strömen.

Bei obiger Untersuchung wurde meist nur Strom von 0,05 Milliampère benutzt. Wie bereits wohl bekannt ist, sammeln sich die Ciliaten in der Regel an der Kathode, die Flagellaten aber an der Anode an. Aber wir¹⁾ haben beobachtet, dass *Chilomonas paramecium*, eine Flagellatenart, bei schwachem Strome nach der Anode, bei stärkerem Strome (stärker als 60 Volt und 0,4 Milliampère) aber nach der Kathode wandert. Deshalb wurde auch hier bei der Untersuchung der Galvanotaxis der Histiozyten mit stärkeren Strömen, z. B. 42 Volt und 0,37 M. A., probiert.

1) Kosaka u. Seki, Nachtrag zur Untersuchung der Galvanotaxis I. Okayama-Igakkwai Zasshi, Nr. 349, 1919. (japanisch)

Tabellarischer Überblick.

	Karmininjektion:	Schwamm eingelegt:	Stromdurchleitung:
Kaninchen 9	7 mal	vor 5 Tagen	9 Stunden lang (0,24 M.A.)
„ 10	7 „	„ 5 „	9 „ „ (0,37 M.A.)
„ 11	7 „	„ 5 „	9 „ „ (0,4 M.A.)
„ 12	7 „	„ 5 „	9 „ „ (0,6 M.A.)

Kaninchen 9

Karmininjektion 7 mal, Schwamm eingelegt vor 5 Tagen,
Stromdurchleitung (36 Volt, 0,24 Milliampère) 9 Stunden lang.

Die Ansammlung der verschiedenen Zellen am Schwammstückchen gleicht der bei Kaninchen 3, welches auch das Schwammstückchen 5 Tage lang subkutan trug, nur mit dem Unterschiede, dass hier die Zahl der angesammelten Histiozyten etwas reichlicher ist.

Das asymmetrische Bild der Verteilung der Histiozyten auf die beiden Seiten des Schwammstückchens ist deutlich. Vom anodischen Ende des Schwammstückchens aus wandern viele Histiozyten in das Unterhautgewebe weit nach der Anode hin, was sich deutlich von dem Bild auf der Kathodenseite des Schwammstückchens unterscheidet, wo im Unterhautgewebe nur verhältnismässig wenige Histiozyten zu sehen sind.

Kaninchen 10

Karmininjektion 7 mal, Schwamm eingelegt vor 5 Tagen,
Stromdurchleitung (42 Volt, 0,37 Milliampère) 9 Stunden lang.

Da die Verhältnisse ganz ähnlich liegen wie bei Kaninchen 9, kann auf eine ausführliche Beschreibung verzichtet werden.

Kaninchen 11

Karmininjektion 7 mal, Schwamm eingelegt vor 5 Tagen,
Stromdurchleitung (55 Volt, 0,4 Milliampère) 9 Stunden lang.

Das charakteristische, asymmetrische Bild der Verteilung der Histiozyten ist auch hier sehr deutlich. Auf eine nähere Beschreibung kann auch hier verzichtet werden.

Kaninchen 12

Karmininjektion 7 mal, Schwamm eingelegt vor 5 Tagen,
Stromdurchleitung (80 Volt, 0,6 Milliampère) 9 Stunden lang.

Vom anodischen Ende des Schwammstückchens aus wandern unzählige Histiozyten nach der Anode hin und zeigen ein klares und prächtiges Bild auf dem Schnittpräparate. Beim Herausschneiden des Gewebstückes mit dem Schwammstückchen blieb der grössere Teil des auf der kathodischen Seite des Schwammstückchens gelegenen Unterhautgewebes an der Stirn des Kaninchens zurück, so dass die Beobachtung der Histiozytenverteilung am kathodischen Ende des Schwammstückchens leider unmöglich war.

Vorliegende Untersuchung hat bisher darin bestanden, die an subkutan eingeführten Schwammstückchen auftretenden Histiozyten unter dem Einflusse des elektrischen Stromes (0,025—0,6 Milliampère) nach einer Richtung wandern zu lassen und diese Wanderung auf mikroskopischen Schnittpräparaten zu beobachten. Die Verteilung der Histiozyten am Schwammstückchen ist schon vor der Stromdurchführung in einzelnen Fällen mehr oder minder verschieden, so dass die Beurteilung der Galvanotaxis der Histiozyten am Schnittpräparate einer Schwierigkeit begegnet. Dennoch ist es möglich, Ergebnisse über Galvanotaxis zu erhalten, wenn man eine Reihe von Bildern, die die asymmetrische Verteilung der Histiozyten am anodischen und kathodischen Ende des Schwammstückchens zeigen, untersucht. Und diese Untersuchung ergibt, dass die Histiozyten der Kaninchen, Meerschweinchen, Ratten, Mäuse und Tauben im lebenden Körper positive Galvanotaxis zeigen, d. h. sie wandern unter der Einwirkung des elektrischen Stromes nach der Anode.

Im folgenden Kapitel möchte ich den Versuch einer Theorie dieser Erscheinung geben.

VII. Elektrische Ladung der Histiozyten. (Eigenladung)

Man nimmt ein Schwammstückchen, das man einem Tiere 5 Tage vorher eingelegt hatte, und dem man während dieser Tage 6 mal Karminlösung injiziert hatte, zerschneidet es und legt die Schnitte in 0,9%ige Kochsalzlösung. Die Zellen der Schnitte, die sich mit der Lösung vermischen, werden kataphoretisch untersucht. Zunächst seien hier einige technische Details der kataphoretischen Untersuchung in Kürze erläutert.¹⁾

Ein längliches viereckiges Kämmerchen mit 400 μ hohem Rahmen auf einem grösseren Objektglas wird mit 0,9%iger Kochsalzlösung gefüllt, in die man an den beiden Enden des Kämmerchens die Schnabelspitzen grösserer Kalomelektroden eintauchen lässt. Nachdem der Kammerflüssigkeit einige Tropfen der, zu prüfende Zellen enthaltenden, physiologischen Kochsalzlösung zugesetzt worden sind, untersucht man mit dem Mikroskop (Leitz: Objektivglas 5, Okularglas 3), das mit Okularmikrometer versehen sein muss, um die kataphoretische Bewegung der Zellen beobachten zu können. Dabei werden 150 Volt und etwa 0,005 Ampère gebraucht. Man misst die kataphoretische Bewegung der Zellen in einer Flüssigkeitsschicht 10—20 μ hoch über dem Boden des Kämmerchens.

Da die am Schwammstückchen angesammelten Zellen von ganz verschiedener Grössen sind, und da eine grosse Menge derselben schon in Degeneration übergegangen ist, so kann ohne Zweifel die kataphoretische Geschwindigkeit von Zellen ein und derselber Art eine ziemlich verschiedene sein. Die kataphoretische Untersuchung wird deshalb nur an den lebenskräftigen Zellen, die oft Pseudopodien aussenden, ausgeführt und nicht an den Zellen, die viel grösser sind als die gewöhnlichen polymorphkernigen Leukozyten, und auch nicht an den Zellen mit deutlich sichtbaren Körnern oder leicht sichtbaren Kernen. Diese Zellen sind in der Regel stark negativ geladen. Um möglichst sichere Werte zu bekommen, wird die Messung bei jeder Zellenart etwa 10 mal wiederholt. Dieser Versuch ergibt folgendes Resultat.

1) Dieses ganze Verfahren ist von mir bereits an anderer Stelle vorgeschlagen worden: M. Seki, Eine neue Diagnostik der Syphilis auf Grund der seroelektrischen Reaktion, Okayama-Igakkwai Zasshi, Nr. 388, 1922. (deutsch)

Kataphoretische Geschwindigkeit (μ/sek)

	kleine Lymphozyten	polymorphkernige Leukozyten	Histiozyten	Erythrozyten
Kaninchen	1,6 $\rightarrow +$	1,1 $\rightarrow +$	$- \leftarrow 0,2$	$- \leftarrow 0,8$
Meerschweinchen	1,3 $\rightarrow +$	$- \leftarrow 0,3$	$- \leftarrow 0,5$	1,1 $\rightarrow +$
Ratte	0,4 $\rightarrow +$	$- \leftarrow 0,2$	$- \leftarrow 0,3$	2,1 $\rightarrow +$
Maus	0,4 $\rightarrow +$	$- \leftarrow 0,2$	$- \leftarrow 0,4$	2,1 $\rightarrow +$
Taube	$- \leftarrow 0,3$	$- \leftarrow 0,5$	$- \leftarrow 0,5$	1,3 $\rightarrow +$

In Abb. 1 ist das Resultat graphisch dargestellt. Aus dieser Tabelle

Abb. 1

und dieser Abbildung geht hervor, dass die Histiozyten verschiedener Tiere immer schwach positiv geladen sind. Die polymorphkernigen Leukozyten sind mit Ausnahme der vom Kaninchen, die negativ geladen sind, noch

schwächer positiv geladen als die Histiozyten. Die kleinen Lymphozyten aber sind mit Ausnahme der von der Taube negativ geladen, am deutlichsten die vom Kaninchen und Meerschweinchen. Es unterliegt also keinem Zweifel, dass die Wanderung der Histiozyten nach der Anode im lebenden Körper, wie in Kapitel II—VI angegeben worden ist, keineswegs Kataphorese ist, sondern eine Wanderung der Zellen kraft ihrer eigenen aktiven Beweglichkeit ist. Wir haben schon früher die Galvanotaxis der Leukozyten verschiedener Tiere direkt unter dem Mikroskop untersucht¹⁾ und darauf aufmerksam gemacht, dass stark negativ geladene Leukozyten ihre Pseudopodien merklich nach der Kathode ausstrecken, positiv geladene dagegen nach der Anode, z. B. strecken die negativ geladenen Leukozyten vom Kaninchen ihre Pseudopodien nach der Kathode aus, dennoch dehnen die häufig elektrisch neutral, manchmal aber schwach positiv geladenen Leukozyten vom Meerschweinchen ihre Pseudopodien mehr nach der Anode als nach der Kathode aus. Die Lymphozyten des Kaninchens und Meerschweinchens, die sich durch ausgesprochene negative Ladung auszeichnen, wandern im lebenden Körper nach der Kathode. Die Histiozyten wandern mit ihrer aktiven Beweglichkeit, wie oben erwähnt, mehr nach der Anode. Die Ladung der Histiozyten ist, wie wir soeben gesehen haben, schwach positiv. Schon vor einigen Jahren haben wir nach vielen Versuchen über die Galvanotaxis der Flagellaten, Ziliaten, Amöben und Leukozyten die Hypothese aufgestellt, dass stark negativ geladenen Zellen, die mit aktiver Beweglichkeit ausgestattet sind, im allgemeinen nach der Kathode fliehen, weil ihre negativ geladenen Zellleiber auf der Anodenseite von elektrisch positiv geladenen Ionen zerstört werden. Auch unser Versuch über die Galvanotaxis der Histiozyten bestätigt diese Annahme.

Es bleibt aber hier noch die Frage zu erörtern übrig, wie es denn möglich sei, dass eine negativ geladene Zelle ein Pseudopodium nach der Kathode und eine positiv geladene Zelle ein Pseudopodium nach der Anode

1) K. Kosaka und M. Seki, Zweiter Nachtrag zur Erforschung der Galvanotaxis und der Kataphorese (vorläufige Mitteilung). Okayama-Igakkwai Zasshi, Nr. 357, 1919. (japanisch)

aussenden kann. Die amöboide Bewegung wird heute allgemein als eine Erscheinung aufgefasst, die durch das Spiel der Oberflächenspannung hervorgerufen wird (Quincke, Berthold, Bütschli, Rhumbler u. a.). Denn wenn man die Oberflächenspannung eines Flüssigkeitstropfens in irgendeiner Weise lokal erniedrigt, so wird das Innere sofort hervorgepresst und eine der amöboiden Bewegung ähnliche Erscheinung findet statt. Eine Reihe schöner Beispiele und Erklärungen derselben sind hier schon gegeben worden¹⁾. Was die Bewegungserscheinung des Flüssigkeitstropfens in einem Flüssigkeitsmedium unter dem Einflusse des elektrischen Stromes betrifft, so sind die Verhältnisse relativ einfach, solange es sich um nicht mischbare Flüssigkeiten handelt und um Stoffe, die in der einen Phase löslich, in der andern unlöslich sind. Christiansen²⁾ hat bei der Elektrolyse einer Elektrolytlösung, in der sich Quecksilbertropfen befanden, folgende Erscheinung beobachtet: Wurde ein Strom von 10 Milliampère durch eine KNO_3 -Lösung gesandt, so wurde ein ursprünglich runder Quecksilbertropfen eiförmig, und zwar befand sich das spitze Ende dem positiven Pol gegenüber. Gleichzeitig bewegt sich der Tropfen nach dem negativen Pol hin. Das will Freundlich aus der Lippmann-Helmholtzschen Theorie erklären, welche darin besteht, dass sich die Grenzfläche, der Sitz einer Doppelschicht, durch den zugeführten elektrischen Strom elektrostatisch ändert und infolgedessen ihre Oberflächenspannung sich erhöht oder erniedrigt, je nach der Verminderung oder Vergrößerung der elektrischen Ladung. Der Quecksilbertropfen ist in einer KNO_3 -Lösung positiv geladen. Wo der positive Strom eintritt, wird also die Ladung vermindert und nimmt infolgedessen die Oberflächenspannung des Quecksilbers zu, wo er austritt, nimmt sie ab.

Aber bei der Galvanotaxis der Zellen sind die Verhältnisse viel komplizierter. Sendet man einen Strom durch die Grenze zwischen der wässrigen Lösung eines Neutralsalzes und der Lösung desselben Neutralsalzes in einem anderen, aber wasserhaltigen Lösungsmittel, so treten an der

1) Siehe: M. Verworn, Allgemeine Physiologie. 7 Aufl. 1922. A. B. Macallum, Oberflächenspannung und Lebenserscheinungen (übersetzt von Else Asher). Ergebnisse der Physiologie, Jahrg. 11. 1911.

2) Christiansen, Drud. Ann. 8, 1902. Zit. nach H. Freundlich, Kapillarchemie, 2. Aufl. 1920. S. 212.

Grenzfläche, wie vor allem Nernst u. Riesenfeld¹⁾ gezeigt haben, wegen der relativen Wanderungsgeschwindigkeiten der Ionen in den beiden Phasen Konzentrationsänderungen auf. Ferner bemerkte Bethe²⁾, wenn man Diaphragma von Kollodium, Gelatin, Hühnereiweiss, Agar-agar, Pergamentpapier, Tierblase, Kohle oder Ton in eine neutrale Elektrolytlösung einschaltet und einen elektrischen Strom durchführt, so tritt auf der Anodenseite Alkali und auf der Kathodenseite der Membran Säure auf. Die Natur der zugesetzten Elektrolyten übt in Bezug auf die Wertigkeit der Ionen und die Reaktion der Lösung einen wesentlichen Einfluss auf die Neutralitätsstörung aus. Unter Umständen können sogar Säure und Alkali ihren Ort vertauschen. Da auch diese Konzentrationsveränderungen und verschiedene andere Änderungen die Oberflächenspannung mannigfaltig ändern können, so kann man den Galvanotaxismechanismus nicht auf einfache Weise, z. B. bloss mit der Lippmann-Helmholzschens Theorie, erklären. Die Hypothese von Robertson³⁾ über die Bewegung der Amöbe ist sehr einfach. Er erklärte die amöboide Bewegung mit der Zunahme oder Abnahme der Potentialdifferenz zwischen der Oberfläche des Organismus und dem Flüssigkeitsmedium. Nach ihm rührt diese Potentialdifferenz von schwer, resp. nicht diffusiblen Ionenproteinen und leichter diffusiblen, unorganischen Ionen in der Oberflächenschicht des Organismus her. Jede Veränderung im Potential führt dann zu lokaler Veränderung in der Oberflächenspannung und folglich zu einer Bewegung. Wenn man nun einen elektrischen Strom durch die Flüssigkeit leitet, in der eine positiv geladene Amöbe ist, so ändert sich die Potentialdifferenz zwischen der Amöbe und dem Flüssigkeitsmedium, und zwar wird sie am anodischen Ende der Amöbe erniedrigt und am kathodischen Ende erhöht. Dementsprechend steigt die Oberflächenspannung am anodischen Ende und sinkt am kathodischen Ende. Die

-
- 1) W. Nernst u. E. H. Riesenfeld, Über elektrolytische Erscheinungen an der Grenzfläche zweier Lösungsmittel. *Annalen d. Physik*, Bd. 8, 1902.
 - 2) A. Bethe, Elektrolytische Trennung von Alkali und Säure an gallertigen (nicht metallischen) Oberflächen. *Münch. mediz. Wochenschr.*, 1911, Nr. 3.
A. Bethe u. Th. Toropoff, Über elektrolytische Vorgänge an Diaphragmen. Teil I. Die Neutralitätsstörung. *Zeitschr. f. physik. Chemie*, Bd. 88, 1914.
 - 3) Brailsford Robertson, Remarks on the Theory of Protoplasmic Movement and Excitation. *Quarterly Journ. of Exper. Physiol.*, Vol. 2, 1909.

Herabsetzung der Oberflächenspannung am kathodischen Ende hat dann zur Folge, dass an der betreffenden Stelle Ektoplasma hervorgepresst wird — eine Pseudopodiumbildung nach der Kathode. Die Hypothese von Hirschfeld¹⁾ ist etwas komplizierter. Er war auch der Meinung, dass die Amöbe positiv geladen sei. Und sich auf die Loeb'sche Angabe²⁾ stützend, wonach der konstante Strom an der Protoplastenoberfläche Änderungen von Ionenkonzentration herbeiführt, welche in der Weise als Reiz wirken, dass das kathodische Ende durch H-Ionen, das anodische durch OH-Ionen beeinflusst wird, kam er zu der Annahme, dass die so entstandenen positiven H-Ionen die Eigenschaft haben, die Oberflächenspannung der positiv geladenen Amöbe am kathodischen Ende herabzusetzen, während die negativen OH-Ionen die Oberflächenspannung am anodischen Ende erhöhen, weshalb hier eine negative Galvanotaxis stattfindet.

Meiner Untersuchung nach ist die *Amoeba limax* im Gegensatz zur Annahme dieser Forscher elektrisch negativ geladen, und dessenungeachtet wandert sie mit ihrer aktiven Beweglichkeit nach der Kathode. Und wie wir schon früher angegeben haben³⁾, wird das Aussenden von Pseudopodien nach der Kathode lebhafter, wenn man dem Wasser, in dem sich Amöben befinden, Natronlaugenlösung hinzufügt. Selbst eine Amöbe, die infolge grösseren Alkalizusatzes dem Tode nahe war, reagierte genau in derselben Weise. Eine kleine Menge Säure dagegen macht die Richtung der Pseudopodien unregelmässig. Sowohl diese Tatsache, als auch die bei der Galvanotaxis und Kataphorese der Lymphozyten, Leukozyten und Histiozyten beobachteten Tatsachen, dass negativ geladene Zellen galvanotaktisch nach der Kathode und positiv geladene nach der Anode wandern, stehen alle mit der Robertsonschen und mit der Hirschfeld'schen Annahme im Widerspruche und zeigen klar, dass alle Versuche, die Erscheinung der

-
- 1) L. Hirschfeld, Ein Versuch einige Lebenserscheinungen der Amöben physikalisch-chemisch zu erklären. Zeitschr. f. allg. Physiol., Bd. 9, 1909.
 - 2) Vermutlich: J. Loeb u. S. P. Budgett, Zur Theorie des Galvanotropismus. Über die Ausscheidung elektropositiver Ionen an der äusseren Anodenfläche protoplasmatischer Gebilde als Ursache der Abweichungen vom Pflügerschen Erregungsgesetz. Pflügers Archiv, Bd. 65, 1897.
 - 3) K. Kosaka u. M. Seki, Further Electro-biological Studies. Okayama-Igakkwai Zasshi, No. 386, 1922.

Galvanotaxis einfach mit der Lippmann-Helmholtzschen Theorie in Einklang zu bringen, vergeblich sind.

Meine Ansicht über den Mechanismus der Galvanotaxis ist etwas anders. Schon im Jahre 1864 beobachtete Kühne bei einem Rhizopoden, *Actinosphaerium Eichhornii*, dass die Erregung stets an der Anodenseite stattfindet. Später wurde diese Tatsache von Verworn¹⁾ auch bei einer Reihe anderer Protisten und von Loeb und Budgett²⁾ bei *Amblystoma* und bei Protozoen konstatiert. Auch wir³⁾ haben bei dem elektrisch negativ geladenen *Blepharisma lateritia* und bei *Paramaecium aurelia* festgestellt, dass die Erregungserscheinung, resp. der Zerfall an der Anodenseite stattfindet. Dieser Reiz verursacht in der Regel eine Kontraktion an der betreffenden Stelle der Plasmasubstanz und bei der negativ geladenen amöboiden Zelle, dass der flüssige Bestandteil der Zelle nach der Kathode getrieben wird, was meiner Meinung nach bei der Wanderung der Zellen nach der Kathode die Hauptrolle spielt. Aber wie zieht sich die gereizte Stelle der Plasmasubstanz zusammen? Das ist schwer zu beantworten. Während nach Ansicht vieler Autoren (Quincke, Berthold, Bütschli, Rhumbler u. a.) die Vorbedingung der amöboiden Bewegung eine Änderung der Oberflächenspannung zwischen Protoplasma und umgebenden Medium ist, kommt für die Erklärung des Galvanotaxismechanismus vor allem eine Veränderung der elektrischen Ladung und eine Veränderung der molekularen Konzentration in Betracht. Bei der Galvanotaxis der elektrisch negativ geladenen Zellen halte ich es im Gegensatz zur Annahme der beiden genannten Forscher für mehr wahrscheinlich, dass sich an der Grenzfläche, an der der Strom in die Zellen eintritt, die elektrische Ladung infolge der Anprallung der elektropositiven Ionen des äusseren Elektrolyten erniedrigt, was eine höhere Oberflächenspannung

-
- 1) M. Verworn, Die polare Erregung der Protisten durch den galvanischen Strom. Pflügers Archiv, Bd. 45, 1889; Bd. 46, 1889; Bd. 62, 1896; Bd. 65, 1897.
 - 2) J. Loeb u. S. Budgett, loc. cit.
 - 3) K. Kosaka u. M. Seki, Über die Galvanotaxis. Okayama-Igakkwai Zasshi, Nr. 345, 1918. (japanisch)
Dieselben, Nachtrag zur Erforschung der Galvanotaxis I. Okayama-Igakkwai Zasshi, Nr. 349, 1919. (japanisch)

zur Folge hat, dass sich aber an der gegenüberliegenden Grenzfläche infolge ähnlich entstandener Steigerung der elektrischen Ladung die Oberflächenspannung erniedrigt, was für den Mechanismus der negativen Galvanotaxis sehr wichtig ist. Das hier Gesagte gilt nur von elektrisch negativ geladenen Zellen. Bei den positiv geladenen Zellen, wie Histiozyten und gewissen Leukozyten, bei denen eine positiv Galvanotaxis entsteht, liegen die Verhältnisse natürlich umgekehrt.

Was zweitens die Änderung der molekularen Konzentration betrifft, so vermute ich, dass an der Anodenseite der negativ geladenen Zellen zugleich mit der Erregung dieser Seite die molekulare Konzentration zunimmt und dementsprechend die Oberflächenspannung steigt, dass dagegen an der Kathodenseite die Oberflächenspannung abnimmt.

In welchem Masse aber diese Änderung der Oberflächenspannung infolge der Änderung der elektrischen Ladung und der molekularen Konzentration für den Galvanotaxisvorgang von Bedeutung ist, das ist heute noch nicht zu bestimmen. Dazu bedarf es noch weiterer Untersuchungen. Aber schon hier kann mit voller Sicherheit behauptet werden, dass sich die Galvanotaxis der amöboiden Zellen nicht analog dem Lippmann-Helmholtzschen Phänomen abspielt, und es ist mir weiter sehr wahrscheinlich, dass bei den negativ geladenen Zellen auf der Anodenseite und bei den positiv geladenen auf der Kathodenseite die Plasmasubstanz gereizt wird, sich dementsprechend zusammenzieht und den flüssigen Bestandteil der Zelle nach der entgegengesetzten Seite verdrängt, wodurch die negative, resp. positive Galvanotaxis zustande kommt.

IX. Über den Einfluss der elektrischen Eigenladung der Histiozyten auf ihr phagozytäres Vermögen.

Nach Kiyono¹⁾ sind im allgemeinen Farbstoffe, die vital gut färben, für die supravitale (agonale) Färbung nicht so günstig. Und umgekehrt sind die Farbstoffe, die supravital gut färben, für die vitale Färbung weniger

1) Loc. cit.

gut zu gebrauchen. Diese Farbstoffe stehen der echten Lösung näher. Anderseits muss man zwischen der vitalen Färbung und der Phagozytose einen Unterschied machen. Die in Bezug auf die vitale Färbung negativen polymorphkernigen Leukozyten, Lymphozyten, Myelozyten u. a. können auch Metallteilchen, Tuscheteilchen und Bakterien verspeisen. Kiyono hebt hervor, dass die Körner im Zelleib bei der vitalen Färbung nicht die Masse des Farbstoffes selbst seien, sondern vorher in der Zelle vorhandene Körner, die Farbstoffe an sich ablagern, und dass der Unterschied der Grösse der Farbstoffteilchen das Hauptmerkmal sei, um die vitale Färbung von der Phagozytose zu unterscheiden.

Zu beachten ist nun der Umstand, dass die histiozytären Zellen durch energisches phagozytäres Vermögen ausgezeichnet sind. Kiyono berichtet: Wenn man eine Aufschwemmung schwarzer chinesischer Tusche, deren Russpartikelchen durch Beimischung von Gelatine in feste Konsistenz gebracht worden sind, in die Ohrvenen der Kaninchen injiziert, so erscheint sofort die gesamte sichtbare Schleimhaut des Tieres dunkelgrau, was aber schon nach einigen Stunden verschwindet, indem die Russpartikelchen von bestimmten Zellelementen aufgenommen werden. In der Leber sind die Teilchen wesentlich von den Kupfferschen Sternzellen aufgenommen worden, in der Milz und im Knochenmark von den Retikuloendothelien und deren Abkömmlingen. Alle diese Zellen sind histiozytäre Zellen. Die in Bezug auf die vitale Färbung negativen Zellarten (polymorphkernige Leukozyten, Lymphozyten, Myelozyten u. a.) nehmen an der Phagozytose nur sekundären oder gar keinen Anteil. Auch ins Blut eingeführte Bakterien werden wie die Tuscheteilchen zum grössten Teil von histiozytären Zellen aufgenommen. Ferner werden die in die Lymphbahn gelangten Bakterien meistens von den im Lymphgewebe vorhandenen histiozytären Zellen aufgenommen.

Ich selbst unternahm folgenden Versuch. Bei einer Temperatur von 37°C nahm ich 3—5 Tage vorher subkutan eingelegte Schwammstückchen von Kaninchen, Meerschweinchen und Maus, denen ich 6 mal Karminlösung injiziert hatte, und legte es schnell in eine mit physiologischer Kochsalzlösung bereitete Tuschelösung und bewegte die Flüssigkeit vorsichtig hin- und her, um eine möglichst gleichmässige Berührung von Zellen und Tuscheteilchen zu unterhalten. Dann nahm ich es nach 10, 20 oder 40

Minuten heraus, fixierte es in 4%iger Formalinlösung und fertigte Paraffinschnittpräparate an. Im Lumen der Schwammstücke sieht man fast überall der Degeneration anheimgefallene Zellen. Nur die an den Rändern liegenden ganz intakten Zellen berühren sich mit der Tuschelösung. Man bemerkt, dass die Histiozyten relativ viele Tuscheteilchen aufgenommen haben, die Leukozyten aber und vor allem die Lymphozyten nur wenige oder gar keine (Phot. 31 u. 32). Es unterliegt also keinem Zweifel, dass die Leukozyten zwar, wie wohl bekannt, ein viel stärkeres phagozytäres Vermögen haben als die Lymphozyten, dass ihr phagozytäres Vermögen aber keineswegs so stark ist wie das der Histiozyten. Und was die elektrische Ladung anbelangt, so sind die Lymphozyten, Leukozyten und Histiozyten, wie oben erwähnt, in dieser Reihenfolge elektrisch immer weniger negativ und immer stärker positiv. Diese Tatsachen verdienen unser grösstes Interesse, denn hier entsteht die Frage, ob das energische phagozytäre Vermögen der Histiozyten in irgendeiner Beziehung zu ihrer elektrischen Ladung steht.¹⁾

Eine Verminderung der Potentialdifferenz zwischen irgendwelchen Teilchen und der sie umgebenden Flüssigkeit hat eine Erhöhung der Oberflächenspannung zur Folge. Und ist diese Potentialdifferenz gleich Null, so hat die Oberflächenspannung ihr Maximum erreicht. Wir wissen nun andererseits, dass unter der Einwirkung der Oberflächenspannung kleine Teilchen sich zu grösseren Komplexen zu vereinigen streben, um eine möglichst kleine Gesamtoberfläche zu bilden. Die Ausflockung und Fällung des Kolloides der Zellen muss also um so leichter stattfinden, je neutraler das Kolloid elektrisch ist. Und was die Kolloidteilchen an der Oberfläche der Leukozyten und Histiozyten von verschiedenen Tierarten betrifft, so sind sie, wie wir bei der kataphoretischen Untersuchung beobachtet haben, in der Regel elektrisch fast neutral, genauer ganz schwach positiv. Sie stehen

1) Die Tatsache, dass elektrische Ladung von Bakterien, roten Blutkörperchen u. a. das phagozytäre Vermögen der Leukozyten beeinflusst, ist von uns bereits an anderem Orte erwähnt worden (Okayama-Igakkwai Zasshi, Nr. 386, 1922). Je schwächer negativ die Bakterien u. a. geladen sind, desto energischer werden sie in der Regel von den Leukozyten aufgenommen.

beinahe im isoelektrischen Punkt, befinden sich also in einem labilen Zustande. Berücksichtigt man nun die bekannte Tatsache, dass die Oberflächenspannung sich stets nach Möglichkeit dem Nullpunkte zu nähern sucht, und dass nach dem Gibbs-Thomson'schen Theorem diejenigen Stoffe, welche eine vorhandene Oberflächenspannung erniedrigen, an die Oberfläche kommen, so liegt es nahe anzunehmen, dass die Leukozyten und Histiozyten, welche relativ hohe Oberflächenspannung haben, die oberflächenaktiven Substanzen leicht adsorbieren und mit ihnen zusammenflocken. Zu beachten ist noch der Umstand, dass, wenn der Phagozyt selbst irgendeine elektrische Ladung hat, diese Ladung auf die Adsorption einer Substanz von gleicher Ladung hemmend wirkt, und auf eine Substanz von entgegengesetzter Ladung fördernd. Die meisten Stoffe, die man in neutraler 0,9%iger Kochsalzlösung suspendiert, sind elektrisch negativ geladen, z. B. Kohle, Karmin, Glas, Klümpchen von Eiweiss und Lezithin. Auch die meisten der etwa 20 Spezies Bakterien, mit denen neulich M. Oka Versuche angestellt hat, sind negativ geladen.¹⁾ Die positiv geladenen Histiozyten vermögen also diese negativ geladenen Substanzen und Bakterien leicht zu adsorbieren.

Diese Vorstellung, die mit der modernen physikalischen Chemie übereinstimmt, erlaubt vielleicht eine Erklärung für die von einigen Forschern festgestellte günstige Wirkung der Azidosis auf die vitale Färbung. Hoshijima und Yoshinare²⁾ schreiben darüber: Die Azidosis lässt sich im Plasma von Kaninchen, die der vitalen Farbstoffspeicherung gegenüber positiv sind, im allgemeinen leicht nachweisen. Die Azidosis ist zwar nicht als Ursache der Farbstoffspeicherung anzunehmen, es ist aber sehr wahrscheinlich, dass bei gesteigerter Azidosis die Farbstoffspeicherung der Zellen leichter vor sich geht, da beim Vorhandensein der Azidosis die Kohlensäure im Gewebe stärker abnimmt als im Blutplasma, was also gleichbedeutend ist mit höherer Azidität. Ihre Annahme stützt sich auf die Tatsache, dass die Karminlösung, eine kolloidale Lösung, sich in vitro

1) Einige derselben sind zwar positiv geladen, dann aber stets von sehr schwacher Ladung.

2) H. Hoshijima u. N. Yoshinare, Über die Azidosis im Blutplasma bei der vitalen Farbstoffspeicherung. Kyoto Igaku Zasshi, Bd. 18, 1921.

beim Zusatz von Säurelösung niederschlägt. Asada¹⁾, der früher auf den Zusammenhang zwischen der vitalen Färbung und der Azidosis aufmerksam gemacht hat, ist der Meinung, dass die Karminspeicherung nicht die Färbung der intrazellulären spezifischen Granula, sondern nichts anders als ein physikalisch-chemisches Phänomen als Folge der im Verlaufe der Behandlung künstlich hervorgerufenen Azidosis des Organismus sei. Aber meiner Meinung nach ist der elektrische Zustand der histiozytären Zellen selbst hier bei der Azidosis nicht zu vernachlässigen. Wir haben folgendes beobachtet. Wenn man den elektrisch negativ geladenen Leukozyten von Frosch und Kaninchen kleine Mengen von Salzsäure hinzufügt, so setzt sich ihre Ladung herab, um schliesslich sogar positiv zu werden, und sie senden ihre Pseudopodien nach unbestimmten Richtungen aus, manchmal sogar nach der Anodenseite. Es ist doch höchst wahrscheinlich, dass diese beträchtliche Veränderung der elektrischen Ladung irgendeinen Einfluss auf das phagozytäre Vermögen ausübt.

Dies erinnert an die ausführliche Beobachtung von Hamburger²⁾, dass das phagozytäre Vermögen von einer Abnahme der Alkalität des Serums ungünstiger beeinflusst wird als von einer entsprechenden Zunahme. Aber diese Untersuchung wurde mit relativ konzentrierten Säure- und Alkalilösungen gemacht, so dass die Phagozyten wahrscheinlich stark beeinträchtigt wurden. Er untersuchte den Einfluss verschiedener Agenzien auf das Leben der Phagozyten, indem er den Prozentsatz der Leukozyten bestimmte, die Kohlepartikelchen aufgenommen hatten. Er hat aber den Prozess der Phagozytose selbst nicht genügend berücksichtigt. Nach der von Fenn neulich gemachten Arbeit³⁾ ist die amöboide Bewegung und das Anhaften der Leukozyten der Ratte an einer Glasplatte am lebhaftesten bei Neutralität oder schwacher Alkalität der umgebenden Flüssigkeit. Die Quarzteilchen einer Suspension werden mit zunehmender Azidität durch Phagozytose leichter aufgenommen. Diese Zunahme erreicht bei pH=6,7

-
- 1) H. Asada, Vitale Färbung und Azidosis. Verhandlungen der japanischen pathologischen Gesellschaft, 8. Jahrg., 1918.
 - 2) H. G. Hamburger, Physikalisch-chemische Untersuchung über Phagozyten. 1912, Wiesbaden.
 - 3) W. O. Fenn, Effect of the Hydrogen Ion Concentration on the Phagocytosis and Adhesiveness of Leucocytes. J. Gen. Physiol., Vol. V, No. 2, 1922.

ihren höchsten Wert. Schon früher hat Bechhold⁴⁾ den Einfluss von Natronlauge und Milchsäure auf das phagozytäre Vermögen der Leukozyten von Kaninchen untersucht. Er benutzte dabei Staphylokokken und kam zu demselben Resultate. NaOH hob die Phagozytose auf, aber erst dann, nachdem die Phagozyten sichtbar verändert waren. Eine relativ grosse Menge von Milchsäure dagegen beeinflusste die Phagozytose nicht erheblich, und selbst eine sichtbare Veränderung der Leukozyten durch Milchsäure verhinderte die Phagozytose nicht. Er machte darauf aufmerksam, dass die stimulierende Wirkung der Milchsäure auf die Phagozytose naturgemäss zu einer Betrachtung ihrer Rolle im normalen und im infizierten Organismus anrege.

Man kann also sagen: Wenn die mit starkem phagozytärem Vermögen begabten Histiozyten, die von Hause aus schwach positiv geladen sind, infolge irgendeines Umstandes, z. B. Azidosis, ihre elektrische Ladung etwas vermehren, so wird sich auch ihr phagozytäres Vermögen und ihre Farbstoffaufnahme steigern. Es sei aber hier bemerkt, dass bei der Phagozytose keineswegs die elektrischen Ladungsverhältnisse allein massgebend sind, sondern dass dabei eine ganze Reihe von Momenten mitspricht. Die diesbezüglichen Versuche sind noch keineswegs ausreichend, um daraus allgemeingültige Schlüsse ziehen zu können. Es bedarf in dieser Richtung noch vieler Versuche. Dennoch glaube ich, dass meine Untersuchung die interessante Tatsache festgestellt hat, dass die **Phagozyten selbst** schon verschiedene elektrische Ladung haben. Das aber kann als ein neuer Angriffspunkt dazu dienen, um in das Wesen der vitalen Färbung und der Phagozytose tiefer einzudringen.

4) H. Bechhold, Phagozytosestudien. Münchener med. Wochenschr., 1908, No. 34.

IX. Zusammenfassung.

1) Die Histiozyten verschiedener Tiere (Kaninchen, Meerschweinchen, Ratte, Maus, Taube) zeigen positive Galvanotaxis, d. h. sie wandern mit ihrer aktiven Beweglichkeit nach der Anode.

2) Die Histiozyten bewegen sich kataphoretisch langsam nach der Kathode, d. h. sie sind elektrisch schwach positiv geladen. Die Leukozyten bewegen sich kataphoretisch auch nach der Kathode (abgesehen von denen des Kaninchens), aber langsamer als die Histiozyten. Die Lymphozyten dagegen ziehen nach der Anode (abgesehen von denen der Taube). Die positive Galvanotaxis der Histiozyten ist wahrscheinlich auf die positive Ladung derselben zurückzuführen. Aber der Mechanismus dieser Galvanotaxis lässt sich nicht mit der Lippmann-Helmholtzschen Theorie erklären. Es ist sehr wahrscheinlich, dass bei den negativ geladenen Zellen auf der Anodenseite und bei den positiv geladenen auf der Kathodenseite die Plasmasubstanz gereizt und zur Zusammenziehung gebracht wird, wodurch der flüssige Bestandteil der Zellen nach der Kathodenseite, resp. Anodenseite verdrängt wird, was negative, resp. positive Galvanotaxis zustande bringt.

3) Die Histiozyten haben eine lebhafte Phagozytose. Angesichts unserer Versuchsergebnisse liegt der Gedanke nahe, dass bei der Phagozytose der Histiozyten, Leukozyten und Lymphozyten nicht nur die elektrische Ladung der aufgenommenen Teilchen, sondern auch die Ladung der Zellen selbst eine wichtige Rolle spielt.

Zum Schlusse möchte ich nicht verfehlen, Herrn Prof. Dr. Kosaka für seine überaus freundliche Anregung und Unterstützung bei dieser Untersuchung meinen herzlichsten Dank auszusprechen. Ebenso bin ich Herrn Prof. Dr. Yagita für gewährte Erleichterungen und Herrn Lektor a. D. M. R. Fehler für die sorgfältige Korrektur des deutschen Textes zu grossem Danke verpflichtet.

Kaninchen 1

Phot. 1

Phot. 2

Kaninchen 2

Phot. 3

Phot. 4

Phot. 5

Phot. 6

Kaninchen 3

Phot. 7

Phot. 8

Kaninchen 4

Phot. 9

Phot. 10

Kaninchen 5

Phot. 11

Phot. 12

Meerschweinchen 1
Phot. 13

(Einige Histiocyten dringen in einen Agar-agarrissein.)

Meerschweinchen 2
Phot. 14

Phot. 15 Meerschweinchen 5

Phot. 16

Meerschweinchen

Phot. 17

Phot. 18

Meerschweinchen 7

Phot. 19

(Einige Histiozyten dringen in einen Agar-agarrissein.)

Meerschweinchen 8

Phot. 20

(Vgm. Bem. oben.)

Ratte 1

Phot. 21

Phot. 22

Maus 2

Phot. 23

Phot. 24

Maus 3

Phot. 25

Phot. 26

Phot. 27

Phot. 28

Phot. 29

Phot. 30

Phagozytose der Histiocyten des Kaninchens.

Phot. 31

Phot. 32

(Das Gewebestückchen hatte 20 Minuten lang in Tuschelösung gelegen.)

(Das Gewebestückchen hatte 40 Minuten lang in Tuschelösung gelegen.)