發熱ニ對スル網狀織内被細胞系ノ影響

岡山醫科大學柿沼内科教室

醫學士 三 谷 登
醫學士 日 下 連
醫學士 原 田 要 一

(本論文要旨ハ昭和6年2月21日岡山醫學會第42回總會席上ニテ發表セリ。)

内 容 目 次

第1章 緒 論	第3節 「テルミン」注射試験
第2章 實驗材料及ビ實驗方法	第4章 總括並ニ考察
第3章 實驗成績	第5章 結 論
第1節 「チフスワクチン」注射試験	
第2節 生大腸菌注射試験	主要ナル文獻

第 1 章 緒 論

恒溫動物ニ於テ體溫調節ガ其ノ生活現象ニ向ヒ重大ナル意義ヲ有スルハ今更贅言ヲ要セザルトコロニシテ、其ノ生理並ニ病理ニ關シテハ古來多數ノ學者ニヨリテ實驗的並ニ臨牀的ニ研索サレ其ノ業績ハ枚舉ニ遑アラズト雖モ、今日未ダ全ク餘蘊ナキ程度ニ達シタリト言フコト能ハズ。就中、發熱ハ顯著ナル症狀ニシテ既ニ古クヨリセラレタル現象ナルモ、其ノ微細ニ至ツテハ現今尙ホ不明ナル點尠シトセズ。殊ニ各種疾患時ニ於テ稽留、弛張等ノ種々ナル熱型ヲ呈シ、又同一疾患時ニ於テモ或ハ個人ニヨリ或ハ經過ニ隨ヒテ發熱ノ高低及ビ持續ノ一様ナラザルハ臨牀上熟知ノ事實ナルモ、之ガ成因ニ至ツテハ未ダ殆ド全ク不明ト言フモ敢テ過言ナラズ。嘗テ Friedberger u. Mita¹⁾, Schittenhelm u. Weichardt²⁾ 及ビ Leschke³⁾ 氏等ハ過敏症狀態ニアル個體ニ異種蛋白ヲ注入シ、其ノ際異種蛋白ノ分量及ビ注射時間ヲ適當ニ變化スレバ隨意ニ種々ノ熱型ヲ作り得ルコトヲ證明セシモ、Friedberger 氏ノ所謂 Anaphylatoxin 說ノミヲ以テハ複雑ナル熱型ノ諸相ヲ説明シ得ザルコトハ同氏ノ共同研究者三田教授⁴⁾ モ述ベラレタルトコロニシテ、之ガ解決ニハ更ニ幾幾ノ研究ヲ俟ツモノナリ。

訊ツテ惟フニ網狀織内被細胞系ノ機能ニ關スル研究ハ殊ニ最近10年間ニ異常ナル進歩ヲ遂ゲ、本系統ガ生體內ニ於テ重要ナル位置ヲ占ムル特殊細胞群タルコトハ現今諸學者ノ齊シク承認セルトコロナリ。而シテ本系統ノ重要ナル生理的機能トシテ認メラルモノノ中重要ナルモノヲ舉グレバ、(1) 異物攝取、(2) 赤血球新生及ビ破壊、(3) 免疫體產生、(4) 酵素形成、(5) 膽汁色素產生、(6) 無機質新陳代謝、(7) 三養素

新陳代謝ノ關係ナルベシ。即チ本系統ハ細菌或ハ其ノ毒素等ガ生體內ニ侵入スレバ第1線ニ立チテ之ヲ攝取食喰シ以テ生體ヲ防禦スベク、從ツテ網狀織内被細胞系ノ機能狀態如何ガ細菌或ハ其ノ毒素等ノ體內侵入ニヨリテ惹起セラルル發熱現象ニ對シテ一定ノ影響ヲ與フベキハ敢テ想像ニ難カラズ。又生體內新陳代謝ニ關與セル諸内分泌臟器。就中、甲状腺、副腎等ガ體溫調節並ニ發熱機構ニ對シテ一定ノ關係ヲ有スルコトハ否定シ得ザル事實ナリ⁵⁾。網狀織内被細胞系モ亦生體內新陳代謝ニ密接ナル關係ヲ有シ、而モ從來ノ諸家ノ成績ヲ綜合スルニ本系統ハ體內諸新陳代謝ノ調節器官ト見做スベキヲ至當トスルノ感深シ。カカル見地ヨリシテモ亦網狀織内被細胞系ガ紋上ノ内分泌臟器ト同様ナル意味ニ於テ又體溫調節並ニ發熱機構ニ向ヒ一定ノ意義ヲ有スルモノト想像スルモ敢テ不當ノコトニ非ズト信ズ。

斯クノ如ク網狀織内被細胞系ノ機能ガ發熱機構ニ對シ一定ノ關係ヲ有スベキコトハ容易ニ想到シ得ルニモ拘ラズ、余等ノ寡聞未ダ此方面ニ關スル研索ノ行ハレタルモノアルヲ知ラズ。只 Petersen and Müller⁶⁾ 兩氏ガ “The splanchnoperipheral balance during chill and fever” ナル論議文中ニ於テ自律神經系ノ刺激ハ網狀織内被細胞系ノ媒介ニヨリテ行ハルモノナルベシト論述シ、又最近今村⁷⁾ 氏ガ所謂異物熱ニ就テ研究シソレト脾臟トノ間ニ一定ノ關係アルヲ證明セラレタルヲ見ルノミナリ。

茲ニ於テ余等ハ恩師柿沼教授御指導ノ下ニ本研究ニ着手シ略ボ一定ノ成績ヲ得タルヲ以テ、爰ニ其ノ結果ヲ發表シ聊カ卑見ヲ述ベント欲ス。

第 2 章 實驗材料及ビ實驗方法

實驗動物トシテハ體重 2000 g 前後ノ強壯ナル成熟家兎ヲ用ヒ、總テ 1 週日間以上一定量ノ豆腐粕ヲ以テ飼養シタル後實驗ニ供セリ。實驗中家兎ハ常ニ自由位ニ置キ、體溫ハ動物用檢溫器ヲ直腸内ニ 5—6 cm 挿入シ常ニ一定時間ヲ經タル後之ヲ測定セリ。尙ホ檢溫時ニハ其ノ腰部及ビ尾根部ヲ擱ミテ後肢ヲ床上ヨリ少許舉上スルトキハ比較的安靜ヲ保チツツ測定スルヲ得タリ。

元來家兎ハ體溫調節不完全ニシテ外氣溫ノ影響ニヨリテ容易ニ體溫ノ動搖ヲ來シ、殊ニ夏季炎暑時 (30°C 以上) ニハ普通體溫 40°C 前後ヲ示スモノニシテ、カカル時期ニ發熱試驗ヲ行フハ勿論不適當ナルヲ以テ本實驗ハ總テ春秋ノ期 (室溫 18—25°C) ヲ擇ビテ行ヒ、且實驗當日ハ室溫ノ動搖ヲ可及的少ナカラシムル様注意セリ。

本實驗ニ於テハ余等ハ網狀織内被細胞系ノ機能ヲ減弱セシメテ諸種ノ發熱操作ヲ施シ其ノ影響ヲ觀察セント欲シタリ。從來網狀織内被細胞系ノ機能失調ヲ惹起センガタメニ應用サレン方法ニハ動物ニ諸種ノ膠樣物質ヲ注射シテ之ヲ本系統ニ屬スル細胞群ニ攝取飽食セシムル所謂填塞法 (Blockierung) アリ、或ハ本系統ニ屬スル細胞ノ數量的減少ヲ來サシムベク脾剔出ヲ行フカ、又ハ兩者ヲ併用スル法等アリ。此内填塞法ナルモノハ既ニ Aschoff⁸⁾ 氏モ論述セルガ如ク注入物質ノ性質、分量及ビ時期、又該細胞系ノ狀態等ガ重大ナル關係ヲ有スルモノニシテ、之等ノ關係如何ニヨリテ該系統機能ハ或ハ刺激セラレ或ハ麻痺ヲ來スモノナリ。又脾臟剔出後ニハ清野⁹⁾、得能¹⁰⁾ 氏等ハ網狀織内被細胞系ノ機能ハ一時的ニ抑制セラルト説クモ、三輪今村⁷⁾ 氏等ハ逆ニ機能亢進ヲ來スト論ズ。而シテ兩者ヲ併用セシ場合ニハ本細胞系統ノ機能減弱ヲ來スベキハ Bieling¹¹⁾、小林及ビ鹽津¹²⁾、Siegmund¹³⁾、尼子¹⁴⁾ 氏等ノ實驗成績ヨリ之ヲ疑知シ得ルヲ以テ、余等ハ此併用試驗ヲ用ヒ其ノ方法ハ大略教室藤田¹⁵⁾ 氏ノ行ヒシ方法ニ據レリ。即チ家兎ニ脾臟剔出ヲ行ヒ、翌日ヨリ

毎日3日間ニ亙リ Electrargol (Clin) 體重 pro Kg 4 cc 宛靜脈内ニ注射セリ。

發熱操作トシテハ「チフスワクチン」、生大腸菌、「テルミン」等ヲ用ヒタルガ、其ノ詳細ニ關シテハ後ニ各節ニ於テ述ベシ。

第3章 實驗成績

第1節 「チフスワクチン」注射試驗

「チフスワクチン」トシテハ北里研究所製造ノ「チフスワクチン」第2號ヲ使用シ各頭 2.0 cc 宛靜脈内ニ注射シ體溫ノ變動ヲ觀察セリ。其ノ成績ハ第1表及ビ第1圖ニ示サガ如シ。

第1表 「チフスワクチン」注射試驗

14/V, 1930

室 溫	經過 時間	試 驗 家 兎			對 照 家 兎		
		Nr. 12. 1900 g	Nr. 13. 2000 g	Nr. 14. 1850 g	Nr. 1. 2000 g	Nr. 2. 2100 g	Nr. 3. 1900 g
22°C	前	39.0	38.8	39.3	38.8	39.6	39.2
	注 射						
	後 10分	39.2	39.0	39.5	38.9	40.0	39.4
	20分	39.7	39.2	39.8	39.2	40.2	39.6
	30分	40.0	39.3	40.1	39.4	40.3	39.7
	40分	40.3	39.5	40.3	39.5	40.4	39.9
	50分	40.4	39.5	40.4	39.5	40.2	40.1
23°C	1時間	40.4	39.6	40.4	39.4	40.0	40.2
	15分	40.0	39.5	39.9	39.3	39.9	40.1
	30分	39.9	39.2	40.1	39.5	39.8	40.0
	45分	39.8	39.5	39.5	39.7	40.1	40.1
24°C	2時間	40.0	39.4	38.5	39.8	40.1	40.3
	30分	40.2	39.8	38.4	39.8	40.4	40.5
25°C	3時間	40.4	40.0	39.0	40.1	40.5	40.3
	30分	40.4	40.0	39.4	40.1	40.5	40.3
25°C	4時間	40.3	39.9	39.2	39.9	40.3	40.2
	30分	40.1	39.7	39.4	39.7	39.9	40.0
25°C	5時間	40.0	39.6	39.6	39.6	39.9	39.8
	30分	39.9	39.6	39.8	39.3	39.6	39.4
24°C	6時間	39.8	39.6	39.9	39.1	39.7	39.2
	30分	39.7	39.7	39.9	39.0	39.5	39.2
23°C	7時間	39.7	39.7	39.9	39.0	39.6	39.2
	30分	39.8	39.6	39.9	39.0	39.6	39.3
22°C	8時間	40.0	39.5	40.0			
	30分	39.9	39.5	40.0			
22°C	9時間	39.9	39.5	40.0			
	30分	39.9	39.6	39.9			
22°C	10時間	39.9	39.6	39.8 (數時間後 死亡)			

第 1 圖 「チフスワクチン」注射試験

他ノ實驗例ニ於テモ常ニ之等ト略ボ同様ノ成績ヲ得タリ。此成績ヲ觀ルニ正常家兎ニ於テハ注射後 10 分ニシテ既ニ體溫上昇シハジメ 1 時間乃至 1 時間 30 分ノ間ニ一時下降シ、後再ビ上昇シテ約 3 時間後最高ニ達ス。次イデ漸次下降シ凡ソ 6 乃至 7 時間後ニハ注射前ノ體溫ニ復歸ス。網狀織内被細胞系ノ機能失調ヲ有スル家兎ニ於テハ最初ノ體溫經過ハ大略對照家兎ノソレト一致シ、且發熱ノ程度モ對照例トノ間ニ一定セル變化ヲ認ムルコト能ハザリシモ、體溫最高ニ達シテヨリ後ハ著シク徐々ニ下降シ注射後 10 時間ヲ經ルモ尙ホ高溫ヲ持續セリ。ノミナラズ試験家兎 Nr. 14 ニ於テハ「チフスワクチン」注射後 1 時間 30 分乃至 3 時間 30 分ノ間ニ至リ體溫下降著明ニ起リ、他ノ 2 例ニ比シテ稍々異常ナル經過ヲトリ遂ニ死亡セリ。脾臟剔出ヲ行ヒシ動物ガ細菌感染ニ對スル抵抗力減退セルコトハ Metschnikoff⁽¹⁶⁾ 氏ガ初メテ之ヲ指摘シ、後諸學者ニヨリテ確認セラレシトコロナレドモ、本死亡例ニ於テハ他例ニ於ケル傾向ガ特ニ強調サレタルモノトモ推セラル。

第 2 節 生大腸菌注射試験

大腸菌ハ母乳營養兒ノ糞便ヨリ分離セルモノヲ用ヒ、其ノ 1 Öse ニ生理的食鹽水 2.0 cc ノ割合ニ加ヘタル生菌ノ平等浮游液ヲ作り、各頭 1.0 cc 宛頸脈内ニ注射セリ。從ツテ各頭ニ生大腸菌 $\frac{1}{2}$ Öse 宛注入セルコトナル。此實驗成績ノ 1 部ハ第 2 表及ビ第 2 圖ニ示サガ如シ。

第 2 表 生大腸菌注射試験

24/V. 1930

室 溫	經 過 時 間	試 驗 家 兎			對 照 家 兎		
		Nr. 21. 2100 g	Nr. 22. 1900 g	Nr. 23. 2000 g	Nr. 7. 1800 g	Nr. 8. 2200 g	Nr. 9. 2000 g
20°C	前	39.2	39.3	39.2	39.3	39.0	39.5
	注 射						
	後 10分	39.7	39.8	39.1	39.6	39.1	39.3
	後 20分	39.8	40.4	39.0	39.6	39.3	39.2

室溫	經過時間	試 驗 家 兔			對 照 家 兔		
		Nr. 21. 2100 g	Nr. 22. 1900 g	Nr. 23. 2000 g	Nr. 7. 1800 g	Nr. 8. 2200 g	Nr. 9. 2000 g
21°C	注射後30分	40.0	40.8	38.9	39.4	39.4	39.7
	40分	40.3	41.1	38.3	39.6	39.5	39.7
	50分	40.6	41.2	38.2	39.7	39.5	39.4
	1時間	40.6	40.8	38.1	39.7	39.3	38.9
	15分	40.3	40.8	38.0	39.7	39.0	38.9
	30分	40.6	41.0	死亡	39.6	39.6	38.2
	45分	40.7	41.2		39.7	38.9	37.9
21°C	2時間	40.8	41.3		39.7	38.6	37.7
	30分	41.0	41.7		39.7	38.8	37.3
22°C	3時間	41.0	41.4		39.8	38.8	37.5
23°C	30分	41.0	41.2		39.3	39.1	37.7
	4時間	41.0	40.8		39.0	39.0	38.1
23°C	30分	40.8	40.6		38.8	39.0	38.1
	5時間	40.6	40.4		38.9	39.4	38.6
23°C	30分	40.4	40.5		39.0	39.2	38.4
	6時間	40.3	40.6		39.1	39.1	38.7
23°C	30分	40.1	40.8		39.1	39.2	39.0
	7時間	40.1	41.2		39.2	39.0	39.2
23°C	30分	40.3	41.0		39.2	39.1	39.1
	8間時	40.2	41.0		39.1	39.2	39.1

第 2 圖 生大腸菌注射試驗

此成績ニ依レバ前節ノ「チフスワクチン」注入試験ニ比シ兩家兎群ノ間ニ一層顯著ナル差異ヲ來セリ。即チ正常家兎ニ於テハ Nr. 7 ノ如ク僅ニ體溫上昇ノ傾向ヲ示スモノアリ、或ハ殆ト上昇ヲ來スコトナクシテ寧ロ體溫下降ノ傾向ヲ示スモノアリ、又 Nr. 9 ノ如キハ體溫下降シテ注射後 2 時間 30 分ニハ 2.2°C ノ低下ヲ來シタルガ尙ホヨク回復スルヲ得タリ。然ルニ網狀織内被細胞系ノ機能失調ヲ來セル家兎ニ在リテハ 3 例中 2 例ハ著明ナル發熱ヲ現シ、且體溫上昇永ク持續セリ。Nr. 23 ハ注射後漸次體溫下降シテ終ニ死亡セリ。仍チ正常家兎ニテハ體溫下降スルモ尙ホ能ク回復シ得ルニ反シテ、網狀織内被細胞系ノ機能失調ヲ有スル家兎ニテハ抵抗力減弱セルタメカ終ニ死ノ轉歸ヲトリタルナリ。

第 3 節 「テルミン」注射試験

余等ハ第 1 節及ビ第 2 節ニ於テ「ワクチン」或ハ生菌ヲ注入セシ場合網狀織内被細胞系ノ機能狀態如何ガ發熱現象ニ大ナル影響ヲ及ボスモノナルコトヲ知レリ。而シテ同様ノ事實ガカカル Korpuskuläre Elemente ノミナラズ尙ホ眞正溶液注入時ニ於テモ亦證明シ得ルヤ否ヤヲ探求スルハ興味深キヲ以テ本實驗ヲ企テタリ。

「テルミン」ハ 2.0—3.0% 溶液トナシ、初メ「テルミン」ヲ體重 pro kg 0.01 g 宛皮下注射ヲ行ヒタルニ、第 3 表及ビ第 3 圖ニ示スガ如キ成績ヲ得タリ。

第 3 表 「テルミン」pro kg 0.01 g 注射試験

28/V, 1930

室 溫	經 過 時 間	試 驗 家 兎			對 照 家 兎		
		Nr. 28. 2100 g	Nr. 29. 1900 g	Nr. 30. 2050 g	Nr. 15. 2200 g	Nr. 16. 1850 g	Nr. 17. 1900 g
21°C	前	39.2	38.9	39.0	39.0	38.8	39.1
	注 射						
	後 10分	39.8	39.2	39.5	39.1	38.9	39.3
	20分	40.1	39.5	39.6	39.1	39.0	39.3
	30分	40.3	39.0	39.4	39.1	39.0	39.1
	40分	40.4	39.0	39.3	39.0	38.9	39.4
21.5°C	50分	40.5	39.0	39.3	39.1	39.0	39.3
	1時間	40.5	39.0	39.4	39.0	38.9	39.4
	15分	40.1	38.7	39.3	39.2	38.8	39.4
	30分	40.2	38.9	39.3	39.3	38.8	39.6
23°C	45分	40.1	38.8	39.3	39.3	39.0	39.8
	2時間	40.0	38.6	39.1	39.3	39.0	39.8
23°C	30分	39.6	38.8	39.1	39.3	39.0	39.6
	3時間	39.4	39.0	39.4	39.3	38.8	39.5
24°C	30分	39.3	39.3	39.4	39.3	38.8	39.5
	4時間	39.4	39.5	39.8	39.1	38.8	39.2
24°C	30分	39.3	39.6	40.0	38.9	38.7	39.3
	5時間	39.2	39.6	39.9	39.0	38.8	39.2
24°C	30分	39.1	39.4	39.9	39.1	38.9	39.2
	6時間	39.2	39.3	39.8	39.0	38.9	39.2

第 3 圖 「テルミン」pro ko 0.01 g 注射試験

之ニ依レバ正常家兎ニテハ1時間以内ニ1度下降次デ上昇スルモ一般ニ發熱著明ナラザルニ反シ、網狀織内被細胞系ノ機能失調ヲ來セル家兎ニ於テハ各時期ノ延長及ビ増強ヲ來シ、殊ニ最初ノ上昇期ノ延長及ビ増強ノ著明ニナルノ觀アリ。

次ニ「テルミン」體重pro kg 0.03 g 宛皮下注射ヲ行ヒタルニ、其ノ成績ノ一部ハ第4表及ビ第4圖ニ示スガ如シ。

第 4 表 「テルミン」pro kg 0.02 g 注射試験

2/X, 1930

室 溫	經 過 時 間	試 驗 家 兎			對 照 家 兎		
		Nr. 34. 2100 g	Nr. 35. 2050 g	Nr. 36. 1900 g	Nr. 18. 1950 g	Nr. 19. 2000 g	Nr. 20. 2150 g
21°C	前	38.5	39.3	39.3	38.8	38.9	39.2
	注 射						
	後 10分	38.8	39.6	39.5	38.8	38.7	38.9
	20分	38.7	39.6	39.6	38.6	38.8	38.8
	30分	38.5	39.7	39.6	38.4	39.1	39.2
	40分	38.5	39.7	39.8	38.6	39.2	39.4
22°C	50分	38.6	39.8	39.9	38.6	39.3	39.4
	1時間	38.7	39.8	39.9	39.0	39.4	39.6
	15分	38.8	40.0	40.1	39.4	39.6	40.0
	30分	38.9	40.1	40.3	39.6	39.9	40.1
23°C	45分	38.9	40.2	40.3	39.8	40.0	40.4
	2時間	38.9	40.5	40.6	40.2	40.1	40.6
	30分	39.1	40.7	40.6	40.6	40.0	40.6

室 温	経過 時間	試 験 家 兎			對 照 家 兎		
		Nr. 34. 2100 g	Nr. 35. 2050 g	Nr. 36. 1900 g	Nr. 18. 1950 g	Nr. 19. 2000 g	Nr. 20. 2150 g
24°C	後 3時間	39.2	41.0	40.8	40.2	39.8	40.3
	30分	39.6	41.1	40.9	40.4	39.8	40.0
24°C	4時間	39.7	41.3	41.0	39.8	39.5	39.8
	30分	39.8	41.5	40.5	40.0	39.4	39.7
24°C	5時間	40.0	41.4	41.0	39.5	39.5	39.9
	30分	39.9	41.2	41.2	40.0	39.2	39.6
23°C	6時間	39.8	41.1	41.2	39.8	39.1	39.4
	30分	39.8	41.1	41.1	39.4	39.2	39.4
22°C	7時間	39.7	41.0	40.8	39.2	39.0	39.4
	30分	39.8	40.9	40.6	39.0	39.0	39.3
22°C	8時間	39.6	40.8	40.6	39.1	39.0	39.3
	30分	39.4	40.8	40.4			
21°C	9時間	39.5	40.8	40.2			
	30分	39.5	40.8	40.1			
20°C	10時間	39.4	40.8	40.0			

第 4 圖 「テルミン」pro kg 0.02 g 注射試験

即チ正常家兎ニ於テハ前記小量注射ニ比シテ注射直後一時多少體温ノ下降ヲ來スモノ多ク、次チ上昇シテ凡ソ2時間乃至2時間30分後最高ニ達シ、後漸次下降及ビ上昇ヲ呈シ7乃至8時間後ニハ常温ニ復スルモ、網狀織内被細胞系ノ機能失調ヲ來セル家兎ニ在リテハ正常家兎ニ比シ體温上昇徐々ニ起リ約5乃至6

時間後最高ニ達シ、且高温ニ達スルモノ多ク、注射後 10 時間ヲ經ルモ依然トシテ發熱狀態ヲ持續セリ。即チ小量注射時ニ既ニアリシ初期上昇ノ延長及ビ増強スルノ傾向ガ愈々顯著ニナルヲ見タリ。

第 4 章 總括並ニ考察

敘上ノ實驗成績ヲ總括スルニ「チフスワクチン」、生大腸菌、「テルミン」等ノ注射ヲ行ヘバ網狀織内被細胞系ノ機能失調ヲ有スル家兎ニ於テハ正常家兎ニ現ルル體溫上昇ノ變化ノ度ハ増強セラレ、又其ノ長ク持續スルヲ見タリ。次ニカカル現象ガ如何ナル成立機轉ニ基因スルモノカニ就テ聊カ考察ヲ加ヘント欲ス。

抑々網狀織内被細胞系ノ重要ナル機能トシテ血行中ニ移入サルタル異物ヲ攝取貪喰シ以テ血液ヲ清淨ナラシムル作用アルコトハ既ニ古クヨリ知ラレタル事實ナリ (Aschoff, 清野氏等)。而シテ Saxl u. Donath^{17) 18)} 氏等ハ網狀織内被細胞系ノ機能失調時ニ於テハ單ニ Korpuskuläre Elemente ノミナラズ、眞正溶液或ハ藥物等ヲ血行ニ注入セシ場合ニモ夫等ノ物質ノ永ク血行中ニ殘留スルヲ證明セシガ、其ノ後諸家ノ多數ノ實驗成績モ總テコノ事實ニ左袒セリ (野間¹⁹⁾, 藤田¹⁵⁾, 伊藤及ビ藏本²⁰⁾ 氏等)。從ツテ余等ノ實驗ニ於テ「チフスワクチン」或ハ生大腸菌ヲ靜脉内ニ注入セシ場合ニハ網狀織内被細胞系ノ機能失調ヲ有スル家兎ニ於テハ正常家兎ニ比シ之等ノ細菌及ビ其ノ毒素ガ長ク血行中ニ存留シ又ハ其ノ處理ノ遲延スベキハ明白ニシテ、夫等ノ所謂發熱物質ノ作用ニヨリテ惹起セラルル體溫上昇ガ長ク持續スルコトハ當然ノ結果ナルベシ。尙ホ又我教室伊藤、藏本兩氏ノ實驗ニ徵スルニ網狀織内被細胞系ノ機能失調時ニハ血行中ニ注入サレタル異種蛋白(卵白)ハ血行中ニ長ク殘存スルノミナラズ、又組織中ニモ長ク停滯スルモノナルヲ以テ、「チフスワクチン」及ビ生大腸菌ヲ靜脉内ニ注入セシ場合ニ於テモ網狀織内被細胞系ノ機能失調時ニハ該細菌並ニ其ノ毒素等ガ長ク組織中ニ止リ、從ツテ組織細胞ノ破壞モ甚ダシク且延引スベク、コレ又發熱ヲ來シ易ク且遲延セシムルノ一因ト思惟シ得ルナリ。

次ニ「テルミン」注射實驗ハ「テルミン」ヲ皮下ニ注射セシタメ「チフスワクチン」或ハ生大腸菌ノ靜脉内注入實驗トハ稍々其ノ趣ヲ異ニスルモノナリ。曩ニ我教室藤田、植村²¹⁾兩氏ハ Uranin ヲ用ヒテ血液組織間物質交代現象ト網狀織内被細胞系ノ官能トニ關シテ實驗的研究ヲ行ヒタルガ、兩氏ノ成績ニ依レバ網狀織内被細胞系ノ機能失調ヲ來セル家兎ニ於テハ Uranin ヲ皮下ニ注射スレバ正常家兎ニ比シ靜脉血中ニ迅速且著明ニ出現スルモノニシテ、其ノ成因ニ關シテハ兩氏ハ次ノ如ク考察セリ。即チ網狀織内被細胞系ノ機能失調時ニ於テハ皮下ニ注入サレタル色素ノ吸收ハ恐ラク徐々タルモ、血液中ニ入リシ色素ノ血管外消失ノ遙延セルタメ血液内ニ於テ色素ノ一定濃度ニ達スル時期ノ速ナルモノナラント論述セリ。兩氏ノ用ヒシ Uranin ハ Lipoid 溶性ニシテ擴散度強烈、且清野氏ニヨレバ生體染色陰性ニシテ略ボ眞性溶液ニ近キモノナルヲ以テ、「テルミン」ヲ皮下ニ注射セシ場合モ之ト同様ノ經過ヲトルモノト見做シテ差支ナカルベシ。余等ノ實驗ニ於テ正常家兎ニテハ「テルミン」ノ小量注射ハ發熱ヲ著明ニ起サザルニ拘ラズ

網狀織内被細胞系ノ機能失調ヲ來セル家兎ニ於テハ發熱ヲ見タルハ、恐ラク血液中ニ吸收サレタル「テルミン」ノ血管外消失ノ遲延セルコトガ有力ナル一因タルベシ。次ニ「テルミン」ヲ大量注射セシ場合ニハ正常家兎ノ方寧口速ニ溫體上昇ヲ來セルガ、此場合ニハ「テルミン」ヲ多量ニ注射セシ故正常家兎ニテモ血液内ノ「テルミン」濃度一定度ニ達スベク、從ツテ「テルミン」ノ吸收並ニ血管外排泄速ニ行ハルル正常家兎ニ於テ「テルミン」ノ作用速ニ出現シ且早ク消失セルニハ非ザルカトモ考ヘ得ベク、或ハ「テルミン」ハ強烈ナル交感神經毒ニシテ溫中樞ノミナラズ又交感神經ヲ刺戟シテ發熱セシムルヲ以テ、網狀織内被細胞系ノ機能失調時ニ於ケル交感神經ノ態度ニ其ノ原因ヲ求ムベキニハ非ザルカトモ思惟シ得ルモ余等ノ實驗ノミニテハ今違ニ之ヲ斷ズルコト能ハズ。次ニ此際尙ホ考慮スベキハ注入サレタル「テルミン」自體ノ運命ニ就テナリ。Händel u. Rosenberg²²⁾, 永田²³⁾, 三羽²⁴⁾, 上村²⁵⁾氏等ニ依レバ網狀織内被細胞系ハ體內ニ注入サレタル毒物ニ對シテ有力ナル解毒機能ヲ有スト言フ。由之觀是、余等ノ實驗ニ於テモ網狀織内被細胞系ノ機能失調ヲ來セル家兎ニ於テハ注入サレタル「テルミン」ノ解毒機能不十分ナルベク、コレ又發熱ヲ來シ易ク且發熱狀態永ク持續スルノ一因ヲナスモノナラン。

以上余等ハ主トシテ注入物質自體ヲ中心ニシテ考察セシガ、尙ホ網狀織内被細胞系ハ體內新陳代謝ニ密接ナル關係ヲ有スルモノナルヲ以テ此方面ヨリモ尙ホ考按ヲ加フベキ要アリ。周知ノ如ク發熱時ニ於テハ體內新陳代謝ハ一般ニ亢進セルモノナルガ、此際網狀織内被細胞系ノ機能狀態如何ニ依リテソレガ又質的或ハ量的ニ差異ヲ生ズベク、從ツテ化學的溫調節ニモ何等カノ變調ヲ來スベキモノト想像シ得ルモ、此點ニ關シテハ從來ノ文獻ニ徵スルモ未ダ何等一定セル實驗の根據ヲ求ムルコト能ハズ。然レドモ、野間¹⁹⁾, 岩崎²⁶⁾, 石島²⁷⁾氏等ノ含水炭素、或ハSaxl u. Donath¹⁷⁾ 18), 藤田¹⁵⁾氏等ノ水分及ビス鹽等ニ關スル新陳代謝實驗等ニヨレバ、網狀織内被細胞系ノ機能失調時ニ於テハカカル體內正常成分ノ過剰ニ移入サレタル場合ニ再ビ正常狀態ニ復歸スルコト甚ダシク遲延セルヲ見ル。由之觀是、網狀織内被細胞系ハ少クトモ體內諸物質交代現象ニ一定ノ關係ヲ有シ、而モ速ニ正常狀態ニ復歸セシメントスルノ調節機構ニ重大ナル意義ヲ有スルハ爭フベカラザル事實ニシテ、カカル諸物質交代現象モ生體內一般新陳代謝ノ部分現象ナルヲ思ヘバ恐ラク網狀織内被細胞系ハ一般新陳代謝ガ異常ナル狀態ニ持來サレタル場合迅速ニ之ヲ正常狀態ニ復歸セシムルニ與ツテ重要ナル調節器官ニハ非ザルカ。果シテ然ラバ余等ノ全實驗成績ヲ通ジテ發熱持續期間延長セルハカカル機能減弱セルニ其ノ一因ヲ求ムベキナリ。又「テルミン」ノ大量注射實驗ニ於テ網狀織内被細胞系ノ機能失調時ニ發熱ノ徐々ニ出現シタルハ、「テルミン」ノ交感神經刺戟ニ因ル新陳代謝亢進現象ガ正常時ノ如ク速ニ行ハレ得ズシテ緩徐ニ起リタルモノトモ解シ得ベシ。又網狀織内被細胞系ト甲状腺トノ關係ヲ想ヘバ(綱島²⁸⁾氏等)網狀織内被細胞ノ機能失調時ニ Fieberfähigkeit ニ變調アルベキハコノ方面ヨリモ首肯セラル。

要之、網狀織内被細胞系ノ機能失調時ニ於テハ、諸種發熱操作ニヨリテ體溫上昇ヲ來シ易ク

(Fieberbereitschaft), 且一度發熱スレバ長ク高温状態ヲ持續スルヲ見ル。從來發熱ノ種々ナル型ヲ呈スルハ唯漠然ト或ハ病原菌ノ性質, 或ハ個人ノ體質的要約, 就中神經系統ノ亢奮性及ビ内分泌腺ノ機能状態如何等ニ歸因スベキモノナラント想像セラレタルニ止リタルガ, 余等ノ實驗ハ此不明ナル發熱機構ニ向ヒ一新見地ヲ提供シ得タルモノニシテ, 將來發熱ノ療法等ニ際シテハ網狀織内被細胞系ノ機能状態ヲモ一應考慮スベキ必要アルモノト信ズ。

第 5 章 結 論

余等ハ家兎ニ就テ脾臓剔出竝ニ Electargol 注入ニヨリテ網狀織内被細胞系ノ機能失調ヲ來サシメ, 「チフスワクチン」, 生大腸菌及ビ「テルミン」等ヲ注入シテ其ノ發熱状態ニ就キ觀察セリ。其ノ成績ニヨレバ網狀織内被細胞系ノ機能失調ヲ來セル家兎ニ於テハ正常家兎ニ比シ之等諸物質ノ注入ニヨリテ發熱シ易ク (Fieberbereitschaft), 且發熱持續期間延長スルヲ認メタリ。此實驗成績ハ未ダ暗冥ノ域ヲ脱シ得ザル發熱機構ノ闡明ニ向テヒ一新領域ヲ開拓シ得タルモノト信ズ。

終ニ臨ミ懇篤ナル御指導ト御校閲ノ勞ヲ忝フセル恩師柿沼教授ニ滿腔ノ謝意ヲ表ス。

(6. 4. 30. 受稿)

主 要 文 獻

- 1) *Friedberger u. Mita*, Z. f. Immunitätsforschung u. exper. Therap. Bd. 10, H. 1, S. 216, 1911. 2) *Schittenhelm u. Weichardt*, Z. f. Immunitätsforschung u. exper. Therap. Bd. 14, S. 609, 1912. 3) *Leschke*, Z. f. exper. Path. u. Therap. Bd. 14, S. 151, 1913. 4) 三田, 東西醫學大觀, 第7輯, 昭和4年. 5) *Cramer*, Endoklinol. Bd. 4, S. 25, 1929. 6) *Petersen a. Müller*, Arch. of internal med. Bd. 40, Nr. 5, S. 575, 1927. 7) 今村, 朝鮮學會雜誌, 第20卷, 第6號, 昭和5年. 8) *Aschoff*, Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk. Bd. 26, S. 1, 1924. 9) 清野, 生體染色研究ノ現況及ビ其検査術式, 昭和4年. 10) 得野, 岡醫雜, 第41年, 第8號, 昭和4年. 11) *Bieling*, Z. f. Immunitätsforschung u. exper. Therap. Bd. 38, H. 3/4, S. 193, 1923. 12) 小林, 鹽津, 東京醫事新誌, 第2386號, 大正13年. 13) *Siegmund*, Kl. Wschr. Nr. 52, S. 2566, 1922. 14) 尼子, 醫學中央雜誌, 第23卷, 大正15年. 15) 藤田, 岡醫雜, 第40年, 第6號, 昭和3年. 同第41年, 第10號, 昭和4年. 16) *Metschnikoff*, Virchows Arch. Bd. 109, 1887. 17) *Saxl u. Donath*, Kl. Wschr. Nr. 31, S. 1397, 1924. 18) *Ebenda*, Wien. Arch. f. inn. Med. Bd. 13, H. 1, S. 7, 1926. 19) 野間, 岡醫雜, 第428號, 大正14年. 20) 伊藤, 藏本, 第42回岡山醫學會總會, 昭和6年. 演 21) 藤田, 植村, 岡醫雜, 第40年, 第5號, 昭和3年. 22) *Händel u. Rosenberg*, Dtsch. med. Wschr. Jg. 52, S. 320, 1926. 23) 永田, 京都醫學會雜誌, 第25卷, 昭和3年. 24) 三羽, 大阪醫學會雜誌, 第25卷, 第10號, 大正15年. 25) 上村, 日本藥物學雜誌, 第10卷, 第3號, 同第11卷, 第1號, 昭和5年. 26) 岩崎, 東京醫學會雜誌, 第41卷, 第2號, 昭和2年. 27) 石島, 千葉醫學會雜誌, 第6卷, 第10號, 昭和3年. 28) 網島, 岡醫雜, 第39年, 第10號, 昭和2年. 同第40年, 第1號, 昭和3年.

*Kurze Inhaltsangabe.***Über den Einfluss des Retikuloendothelialsystems auf das Fieber.**

Von

Dr. med. Noboru Mitani, Muraji Kusaka u. Yoichi Harada.

Aus der med. Universitätsklinik von Prof. Dr. K. Kakinuma, Okayama.

Eingegangen am 30. April 1931.

Daraus, dass das Retikulendothelialsystem einerseits als ein Speicherapparat gegen die in den Körper eingeführten Fremdkörper, andererseits aller Wahrscheinlichkeit als ein Regulationsapparat des intermediären Stoffwechsels anzusehen ist, kann man ohne weiteres schliessen, dass das Retikulendothelialsystem auf das Fieber einen bestimmten Einfluss ausübt. Um diese Frage experimentell zu lösen, untersuchten wir sie an Kaninchen.

Die Versuchstiere wurden durch Entmilzung und nachfolgenden Electrargolinjektionen in einen gestörten Funktionszustand des Retikulendothelialsystems versetzt, worauf man sie unter Verabreichung der verschiedenen fiebererzeugenden Mittel, wie Typhusvakzin, Colibazillen und Tetrahydro- β -Naphthylamin fiebern liess. In allen Versuchen liess sich bei den Versuchstieren eine höhere und länger dauernde Temperatur als bei den normalen Tieren nachweisen.

Aus diesen Ergebnissen kann geschlossen werden, dass die Funktionsstörung des Retikulendothelialsystems den Organismus in eine Fieberbereitschaft versetzt. Diese Kenntnis könnte für die Lösung der noch dunklen Entstehungsweise der verschiedenartigen Fiebertypen einen neuen Aufschluss geben. (Autoreferat)