144.

611.65

陰極線ノ家兎卵巢ニ及ボス作用ニ就テ
特ニRöntgen線放射トノ比較研究

岡山醫科大學解剖學教室（指導 上坂名譽教授）

守屋 千代野

[昭和7年5月17日受稿]

*Aus dem Anatomischen Institut der Universität Okayama**(Leiter: Emeritus-Prof. K. Kōsaka).*

Über die Wirkung der Kathodenstrahlen auf den Eierstock
beim Kaninchen, besonders über ihre vergleichende
Untersuchung mit der der X-Strahlen.

Von

Chiyo Moriya.

Eingegangen am 17. Mai 1932.

Wenn man den Eierstock des erwachsenen weiblichen Kaninchens direkt mit Kathodenstrahlen bestrahlt, so fallen Follikel, Keimepithel, Zwischenzellen, Corpora lutea und Bindegewebe der Degeneration anheim, aber die Veränderung beschränkt sich auf das Lokal.

Die Degeneration der Follikel, Zwischenzellen, Corpora lutea und Keimepithelzellen ist eine regressive, die im starken Falle nekrotisch wird. Mit anderen Worten üben Kathodenstrahlen auf das Eierstockgewebe eine zerfallende Wirkung aus.

Durch Kathodenstrahlen fallen die Tunica albuginea und das oberflächliche Bindegewebe der Nekrose anheim, im Gegensatz zum Bindegewebe der tiefen Rindenschicht und der Marksubstanz, das nach der Bestrahlung eine reaktive Wucherung zeigt und die Stelle der zugrundegehenden Elemente ausfüllt, um endlich das Narbengewebe zu bilden.

Nach der Bestrahlung zeigt der Eierstock eine Hyperämie, indem seine Blutgefäße sich erweitern und sogar hier und da zu kleinen Blutungen Anlass geben.

Die verschiedenen Gewebselemente im Eierstock sind nicht gleichempfindlich gegen Kathodenstrahlen. Wenn man sie nach wachsender Widerstandsfähigkeit ordnet, so ergibt sich die folgende Reihe :

Keimepithelzellen- reife Follikel- mittlere und kleine Follikel- primäre Follikel- Blutgefässe- Zwischenzellen- Corpora lutea-Bindegewebe.

Als differenzpunkte zwischen der Wirkung der Kathodenstrahlen und der der X-Strahlen sind folgende hervorzuheben.

Die durch Kathodenstrahlen verursachten Gewebsveränderungen sind von starkem Grade und treten bald nach der Bestrahlung auf, während die infolge der X-Strahlen auftretenden erst nach einer Latenzzeit zum Vorschein kommen und schwach sind.

Wenn man die verschiedenen Gewebselemente von dem empfindlichsten nach dem widerstansstärksten gegen X-Strahlen ordnet, so stellen sie sich in der folgenden Reihe.

Primäre Follikel- mittlere Follikel- reife Follikel- Zwischenzellen- Blutgefässe- Keimepithel- Corpora lutea.

So beschädigen X-Strahlen vor allem die noch nicht differenzierten jüngsten Primärfollikel im Gegensatz zu den Kathodenstrahlen, die in erster Linie die hochdifferenzierten reifen Follikel angreifen. Einen besonderen Widerstand gegen X-Strahlen bieten die Zellen der Theca interna dar, die einige Tage nach der Bestrahlung nur eine sehr schwache Schrumpfung zeigen, deren Grad übrigens der Bestrahlungsdose nicht proportional ist. Dagegen verfallen sie nach der Bestrahlung mit Kathodenstrahlen schnell in eine starke Degeneration, sodass sie bald zerfallen.

Die Wirkung der Kathodenstrahlen sowie der X-Strahlen ist, im Grunde genommen, eine zerstörende, was besonders bei Kathodenstrahlen der Fall ist, während die Bestrahlung mit X-Strahlen oft eine Wucherung der Zwischenzellen zur Folge hat. Daher sagt man, dass X-Strahlen im Falle der Bestrahlung mit einer kleinen Dosis eine Reizwirkung auf das Eierstockgewebe ausüben, sodass das Gewebe danach oft wuchert. Meiner Meinung nach aber ist diese Wucherung nichts anderes als eine vorübergehende Erscheinung, denn später die Entwicklung der Zwischenzellen auf der bestrahlten Seite als auf der Kontrollseite schlechter vor sich geht und sogar die von der Theca interna differenzierten Zwischenzellen der Degeneration anheimfallen können.

Die Differenz der Empfindlichkeit verschiedener Eierstockelemente gegen X-Strahlen ist viel grösser als gegen Kathodenstrahlen, sodass die Wirkung der X-Strahlen stark selektiv ist im Gegensatz zu der der Kathodenstrahlen, die annähernd gleichermasse alle Elemente zerstören.

Die Follikel und die Zwischenzellen können nach der Bestrahlung mit X-Strahlen nur selten einer nekrotischen Veränderung anheimfallen, die übrigens von leichtem Grade ist, dagegen hat die Bestrahlung mit Kathodenstrahlen eine starke Nekrose zur Folge.

Das Keimepithel kann nach der Bestrahlung mit X-Strahlen eine leichte Abblätterung und Veränderung zeigen, doch selbst in diesem Falle sind zahlreiche intakt bleibende Epithelzellen vorhanden, während das Epithel nach der Bestrahlung mit Kathodenstrahlen immer in die Nekrose verfällt, um endlich sich zu einer hyalinenartigen Substanz umzuwandern.

Die Zellen der Corpora lutea weisen nach der Bestrahlung mit X-Strahlen keine Veränderung auf, dagegen können sie nach der Bestrahlung mit Kathodenstrahlen der fettigen Degeneration und der Nekrose anheimfallen.

Die Blutgefässe in dem Bindegewebe, besonders der Mardsubstanz erweitern sich nach der Bestrahlung mit Kathodenstrahlen, sodass der Eierstock stark hyperämisch wird, und sogar stellenweise kleine Blutungen zeigen, die auch in der blutgefässarmen Tunica albuginea stattfinden können, wobei die Gefässwand eine degenerative Verdichtung und das Gefässlumen eine Stenose oder Obliteration darbietet. Im Gegensatz hierzu sieht man nach der Bestrahlung mit X-Strahlen keine solche Veränderung bis auf leichte Verdichtung der Gefässwand, die übrigens auch auf der Kontrollseite auftreten kann.

Das interstitielle Bindegewebe und die Tunica albuginea erfahren keine Beschädigung nach der Bestrahlung mit X-Strahlen, während die oberflächliche Schicht des interstitiellen Bindegewebes und die Tunica albuginea nach der Bestrahlung mit Kathodenstrahlen eine nekrotische Degeneration zeigen können, obwohl das Bindegewebe später eine reaktive Wucherung zu erfahren pflegt.

Die Vernarbung des Eierstockes findet nach der Bestrahlung mit Kathodenstrahlen statt, während dies nach der Bestrahlung mit X-Strahlen nicht der Fall ist.

Nach der Bestrahlung mit Kathodenstrahlen, namentlich mit ihrer grossen Dose gehen alle Follikel zu Grunde, sodass keine Rede von ihrer Regeneration ist, während X-Strahlen selbst nach der Bestrahlung mit einer grösseren Dosis nicht alle Follikel einschliesslich der primären Follikel zerstören, sodass ihre Regeneration möglich ist.

Auch das Bindegewebe zeigt nach der Bestrahlung mit Kathodenstrahlen einstweilen eine nekrotische Veränderung, doch ist diese keine vernichtende, da später das Gewebe vielmehr eine regenerative Wucherung erfährt. (*Kurze Inhaltsangabe.*)

内 容 目 次

第1章 緒 論	第1項 肉眼の變化ノ概括
第2章 文 獻	第2項 顯微鏡の變化ノ概括
第3章 實驗方法	第6章 陰極線並ニX線ノ家兎卵巢ニ及ボス作用ノ比較研究
第1節 實驗動物	第1節 緒 言
第2節 陰極線裝置	第2節 X線放射ノ自己實驗成績ノ概要
(1) 電 源	第3節 陰極線及ビX線ニヨル被放射卵巢ノ所見比較
(2) Funkeninduktor	第4節 考 按
(3) 陰極線管	第1項 陰極線及ビX線ノ深達力ノ比較
(4) 管外陰極線ノ定性的實驗	第2項 陰極線及ビX線作用ノ強弱
第3節 陰極線放射方法	第3項 陰極線及ビX線ノ生物的作用ノ本態
第4節 組織検査方法	第7章 總括的結論
第4章 健康家兎卵巢ノ組織の構造及ビ其ノ生理的變化	主要文獻
第5章 陰極線放射實驗及ビ其ノ成績	附圖說明
第1節 第1實驗(30分間放射例)	附 圖
第2節 第2實驗(60分間放射例)	
第3節 實驗成績ノ概括	

第 1 章 緒 論

陰極線ハX線ノ發因ニシテX線ヨリ古ク知ラレタルニ拘ラズ、陰極線ノ透過力弱クシテ衝突シタル硝子壁ニ吸收サレ易ク、之ヲ大量ニ管外ニ射出セシムル事困難ナル爲メ管外ニ於ケル此線ノ研究ハ久シク着手サレザリシモ、1928年 Lenard ハ對陰極硝子壁ニ小孔ヲ設ケコニ0.003 mmノAluminium薄板ヲ張りテ、陰極線ヲ管外ニ射出セシムル事ニ成功ナシタル以來、其ノ生物ニ對スル作用ヲ研究セントスル者漸ク表ハレントスルニ至レリ。然レドモ其ノ業績ハ極メテ少ク、最近本城氏ハ家兎睾丸、眼球、節狀神經節ニ放射シ其ノ組織的變化ヲ詳細ニ報告シタルノ他殆ド此種ノ詳細ナル業績ヲ見ズ。是レ余ガ陰極線ヲ家兎卵巢ニ放射シ其ノ組織的變化ヲ詳細ニ檢シ、併セテX線放射後ノ所見ト比較研究セシ所以ナリ。X線放射ニ因ル家兎卵巢内ノ變化ニ就テノ研究ハ極メテ多ク、同線ノ卵巢ニ及ボス生物學的作用モ殆ド闡明シ盡サレタリト云フモ過言ニアラズ。本研究ニ於テモX線ニ關シ、既ニ多數研究者ノ行ヘル方法ニ從ヒ、家兎卵巢ヲ放射シタリ。然レドモ之ニ因リテ起リシ變化ハ大體先人ノ業績ニ一致セシガ故ニ、陰極線ノ作用トノ比較ニハX線ニ關シテハ、既知ノ事實ヲ引用シ論究セント欲ス。

第 2 章 文 獻

1919 年 Pauli u. Grober ハ大腸菌及ビ Axolotllarve ヲ陰極線ニテ死滅セシムルコトヲ實驗シ、1914 年 Strebel ハ健康皮膚及ビ皮膚癌ニ放射シテ Radium ノ如キ作用ヲ認メ、1924 年 Pauli u. Hartmann ハ大腸菌及ビ B. Proteus ニ放射シ之ヲ死滅セシムル事、植物ノ葉ヲ放射シ、葉綠素ニ變化ヲ起サシムル事、發芽シタル植物根ニ放射シテ一時之ヲ枯死セシムルモ深達作用ナキタメ Wachstumspunkt ヲ犯ス事能ハズ、植物ハ再ビ發芽シ發育成長スル事、Infusorien ニ放射シテ之ヲ殺ス事、白鼠ノ皮膚ニ放射シ之ニ炎症ヲ起サシムル事等ヲ發表セリ。1925 年 Angerer, Pauli ハ試験管内及ビ創傷内ノ細菌ニ放射實驗ヲ試ミ、1925 年—1928 年 Passow, W. E. Pauli ハ角膜ニ對スル作用ヲ實驗セリ。1928 年 Baensch, Finsterbusch ハ狼瘡, Psoriasis, Cancroid ヲ Lenard'sche Phönixröhre ヲ以テ放射シ治癒ヲ促ス事ヲ得タリト云ヒ、1928 年 Guyer, u. F. Farrington, Daniels ハ白鼠ノ皮膚ニ癌腫ヲ接種シ、之ヲ Coolidge'sche Kathodenröhre ヲ以テ照射シ、陰極線ニ破壞的作用アル事ヲ報告セリ。1929 年 Schäfer, Walter, Ernst, Witte ハ本線ハ葡萄狀球菌、結核菌ヲ殺滅セシムル作用ヲ有スト云ヒ、1929 年 Stenstrom, Wilhelm Charles H. Watkins, Carl E. Nurnberger, Madeleine Fullon ハ兎ノ耳殻血管ヲ本線ニテ放射シ其ノ白血球ニ及ボス作用ヲ檢シ、1929 年 Baker, Lillian E., Robert B. Carey ハ本線ノ血清蛋白ニ及ボス作用ニ就キ研究セリ。1929 年 Politzer G., W. E. Pauli ハ Salamandrina maculosa ノ Larve ヲ本線ヲ以テ放射シ之ヲ殺ス事ヲ得、而モ其ノ際細胞核ニ起ル變化ハ X 線作用ニテハ説明シ能ハザル特種ノモノニシテ、其ノ作用ハ Radium β ニ似タル事ヲ論述セリ。1929 年 W. Baensch, R. Finsterbusch ハ Coolidge 陰極線管球ヲ用ヒテ植物ヲ放射シ、本線ノ植物細胞ニ及ボス作用ヲ研

究シ、又皮膚結核, Psoriasis, 慢性濕疹, Cancroid, 治癒機轉惡シキ創傷ヲ本線ニテ放射シ好結果ヲ擧ゲ、且細菌ヲ本線ニテ放射シ其ノ芽胞ヲモ死滅セシムル事ヲ確メタリ。1930 年 Baensch ハ 1. 家兎及ビ海豚ノ表皮ヲ本線ニテ放射スレバ其ノ部ハ壞死シ潰瘍ヲ形成スルモ Röntgen 潰瘍ト異リ良ク治癒機轉ヲ營ミ深層ノ筋肉結締織ニハ破壞作用ヲ及ボサズ。2. 眼球角膜ニ放射シ角膜濁濁、前房膿瘍ヲ造ル事 3. 細菌ヲ死滅セシムル作用アル事。4. 狼瘡ノ潰瘍慢性濕疹, Cancroid, Psoriasis ニ好結果ヲ及ボスモ疣贅狀狼瘡ニハ影響ナク、又皮膚癌ニ對シモ持續的效果ナシト云フナリ。1930 年本城氏ハ氏ノ考案ニヨル管球ニ依リ管外ニ陰極線ヲ放射セシムル事ニ成功シ同管球ヲ用ヒテ家兎辜丸、眼球、節狀神經節ニ陰極線ヲ放射シテ内部ニ起ル變化ヲ詳細ニ研究シ陰極線ハ X 線ニ比シテ著シク急激ナル破壞作用ヲ及ボス事ヲ證明セリ。

上述ノ Pauli, Hartmann, 本城諸氏ノ業績ニ基キ陰極線ノ生物的作用ヲ總括スレバ次ノ如シ。

1. 潜伏期ハ X 線ニ比シテ著シク短ク 1 乃至 2 日ヨリ長キ事ナシ。一般ニ 6 乃至 12 時間ニテ既ニ變化表ハル。
2. 陰極線ハ主トシテ破壞作用ヲ有シ刺激作用ハ僅ナリ。而シテ其ノ破壞作用タルヤ X 線ノ夫レニ比シテ著シク激烈ニシテ低電壓ノ電源ヲ以テスルモ著明ナル破壞作用ヲ起スモノトス。Pauli, Hartmann, 本城氏ハ 3.5 乃至 7 cm ノ Funkenstrecke ノ感應「コイル」ヲ用ヒ陰極線ヲ發生セシメシモ、之ニ由テ著明ナル變化ヲ起シ得タリ。
3. 陰極線ノ作用ハ全ク限局性ニシテ遠達セズ。
4. 深達力ハ X 線ニ比シテ極メテ弱ク 5 mm ノ組織ニテ完全ニ吸收セラル。但陰極線ノ深達力ハ電源ノ電壓ニ比例シ、被放射組織ノ原子質量ニ反比例

ス.

5. 陰極線ハX線ノ如キ著明ナル選擇作用ヲ有セ

ズ.

第3章 實驗方法

第1節 實驗動物

成熟シ或ハ成熟ニ近キ 1700 乃至 2000 g ノ白毛種
雌性家兎ヲ使用セリ。常ニ飼育ニ注意シ一器一頭ト

第2節 陰極線裝置

(1) 電源

日本電池株式會社製 6 Volt「ラジオ」用蓄電池ヲ使用シ Voltage 及ビ Ampere ヲ一定ニ保ツ様注意セリ。

(2) Funkeninduktor

丸中電氣株式會社製ノ火花間隙 6 cm ノモノヲ使用セリ。

(3) 陰極線管

本城氏ノ實驗ニ使用サレシモノヲ用フ。即チ細長
梨子狀形ノ管球ニシテ陰極ヨリ對陰極壁ニ向テ漸次
膨脹シ管内ノ空氣ハ Mc.LeodノVakuummeterニテ
50000 分ノ 1mmヲ示セルモノトス。全管長ハ 23 cm
巾最大 8.5 cm, 最小 2 cm ナリ。管ノ側面ニ 2 個ノ
突起アリ。其ノ 1 ッハ陽極ヲ導入シ、他ハ管ヲ支持
スル用ニ供ス。管壁ハ全部曹達硝子ヲ用ヒ、厚サハ
大部分 2mm ナルモ、對陰極壁ハ 0.2mm ナリ。電源
ハ管頂ハ管側ニ附セル長サ 3.5 cm, 大サ約 1.5 cm ノ

突起管内ニ硝子管ヲ以テ被包セル銅線ヲ挿入シ、之
ヲ導キ、其ノ尖端ニ Aluminiumノ小桿ヲ附シ陽極ト
セリ。陽極ヨリ離ルル 11 cm ナル陰極ハ梨子形ヲナ
セル管ノ柄ニ相當スル部ヨリ硝子ニ包埋セル導線ヲ
管内ニ導キ、其ノ尖端ニ長サ 3.5 cm ノ Aluminium 小
桿ヲ附シ、其ノ尖端ニ直径 2 cm ノ同質ノ圓盤ヲ小桿
ニ直角ニ連結セル部ヨリ成ル。圓盤ノ後面及ビ之ニ
連結セル小桿ハ硝子ヲ以テ包埋シ、圓盤ノ前面ハ平
坦トセリ。而シテ陰陽兩極ノ方向ハ互ニ直角ナリ。

(4) 管外陰極線ノ定性的實驗

其ノ 1 金箔檢電器ノ金箔ヲ陽電氣ヲ以テ豫メ開
キ、之ヲ對陰極硝子壁ノ前方 2 cm ノ所ニ置キ、感應
「コイル」ヲ連結シテ陰極線ヲ放射セシムル時ハ金箔
ハ閉鎖ス。而シテ金箔ヲ閉ゾルニ要スル時間ハ檢電
器ト管球トノ距離ニ比例ス。

次ニ金箔ヲ閉ヂタル儘放射シタルニ、金箔ハ開ク。
之ヲ檢スルニ陰電氣ヲ持チ行ク時ハ金箔ハ開キタル
儘ニテ止リ、陽電氣ヲ持チ行ク時ハ金箔ハ閉ゾルヲ
以テ、管外放射線ハ陰電氣ヲ帶ビタルモノナル事ヲ

知ル。

其ノ 2. 金箔檢電器ノ金箔ヲ陽電氣ヲ以テ開キ、
檢電器ト陰極線管トノ間ニ強力ナル棒狀磁石ノ
Nordpolヲ置キ、陰極線ヲ放射スル時ハ、金箔ハ開
キタル儘其ノ位置ニ止リ、磁石ヲ取去ル時ハ金箔ハ
速ニ閉ヅ。

以上ノ 2 實驗ニヨリ陰極線ノ管外ニ射出セル事ヲ
知ル。

第 3 節 陰極線放射方法

家兎ヲ背位ニ固定シ放射セントスルー側卵巢ノ上部ニ於テ、白線ニ平行ニ側腹壁ニ骨盤ノ上方ヨリ骨盤内ニ互ル約 2 乃至 3 cm ノ縦切開ヲ施シ腹腔ヲ開ク時ハ卵巢ハ多クノ場合自然ニ創口外ニ露出ス。然ラザル時ハ輕ク之ヲ腹腔外ニ牽出シ壓迫牽引セザル様「ガーゼ」ニテ輕ク把持シ管球下 2 cm ノ所ニ置キ卵巢ノ周圍ニハ「ガーゼ」ヲ堆キテ卵巢以外ノ組織ヲ照射セサル様ニ注意セリ。陰極線ハ熱ノ發生ヲ伴フ

モ、管球ト卵巢トノ距離ヲ 2 cm トスレバ、被照射部ノ溫度ハ家兎ノ健康體溫タル 39°C ヲ上超スル事ナシ。

手術ハ定規ニ從ヒ消毒ヲ完全ニシ、手術後腹壁ハ二重縫合ニテ鎖シ沃度丁幾、「コロヂウム」ヲ塗布シ、創傷傳染ヲ防グ、尙ホ手術中ハ勿論手術後モ室内ノ溫度、濕氣、換氣、採光、飼糧ニ細心注意シ手術操作ニ依ル實驗成績ノ誤謬ヲ來サザル事ニ務メタリ。

第 4 節 組織検査方法

1 側ノ卵巢ヲ 30 分間或ハ 1 時間放射シ 1, 2, 3, 5, 7, 14 日等ノ種々ノ間隔ヲ置キ、耳靜脈ヨリ空氣ヲ吹入シ空氣栓塞ニテ家兎ヲ屠殺シ、被照卵巢及ビ

對照側卵巢ヲ各別々ニ Orth 氏液ニ固定シ、「ヘマトキシリン」—「エオジン」染色及ビ Mullory 氏染色ヲ行ヒ毎常各頭毎ニ對照側ト比較研究セリ。

章 4 章 健康家兎卵巢ノ組織的構造及ビ其ノ生理的變化

外觀

卵巢ノ重量容積形狀ハ個々ノ家兎ニ從テ異ナルノミナラズ、左右不同ナル事多シ。一般ニ前後ニ扁平ナル圓柱狀ニシテ上下兩端ハ圓錐形ヲナセリ。表面ハ滑澤ニシテ平常帶紅灰白色ヲ呈セルモ、週期的變化ニ伴ヒ其ノ色調ヲ變ジ、交尾期ニハ紅色ヲ呈ス。表面ニハ成熟膿胞及ビ黃體ガ突隆セルノ他無數ノ小膿胞ヲ透明ナル斑點トシテ透見ス。

組織的構造

イ、胚上皮細胞ハ多ク單層ニシテ稀ニ複層ノ部ヲ見ル。細胞ハ長方形乃至骰子形ニシテ、中央ニ圓形ノ核ヲ有ス。

ロ、白膜ハ纖維性結締織ヨリ成ル。

ハ、皮質ハ卵巢ノ大部分ヲ構成シ膿胞、間質細胞及ビ基質結締織ヨリ成ル。

膿胞 原始膿胞及ビ小膿胞ハ皮質表層ニ 1 乃至數層ヲナシテ配列シ、其ノ間ニ介在セル成熟膿胞ハ表層ヨリ深層ニ達セリ。成熟膿胞ハ數層ノ顆粒細胞ニテ卵ヲ包圍シ、顆粒細胞ハ内、外夾膜層ヨリ圍マル。

内夾膜層ハ類圓形上皮細胞ヨリ成リ、外夾膜層ハ菲薄ナル纖維性結締織ヨリ成レリ。内夾膜層ト顆粒細胞層ノ間ニハ無構造ノ硝子膜ヲ見ル。

間質細胞 家兎ニテハ間質細胞ハ良ク發育セリ。細胞ノ形狀ハ多角形ヲ帶ビタル圓形或ハ卵圓形ニシテ限界明瞭ナリ。核ハ圓形ニシテ、「クロマチン」ニ富ミ、多クハ細胞ノ中央ニ存在ス。細胞體中ニハ強ク光線ヲ屈折スル多數ノ顆粒アリ、主トシテ核ノ周圍ニ密集セリ。本細胞ハ多クノ群ヲナシ基質結締織ニヨリ分タレ索狀或ハ蜂巢狀ノ觀ヲ呈セリ。

黃體細胞 黃體細胞ハ間質細胞ニ甚ダ相似タリ。間質細胞ト異ナル點ハ

1. 間質細胞ヨリ大ナル事。

2. 各箇ノ黃體細胞ハ、多クハ基質ニテ圍繞セラレ或ハ多クモ 2 乃至 3 箇ノ細胞ガ同質ニテ共同ニ包圍セラルルニ反シ、間質細胞ハ多ク群集シ共ニ基質ニテ圍繞セラル。

3. 黃體ハ血管ニ富ミ、間質細胞部ハ比較的血管ニ乏シ。

4. 間質細胞ハ隣接セル細胞ニヨリ互ニ壓迫セラレテ尖鋭ナル多角形ヲ呈セルモ黃體細胞ハ個々ノ細胞互ニ接觸セル所ニテモ斯カル事ナク、寧ロ細胞ハ鈍多稜或ハ圓形ヲ呈ス。

ニ。髓質ハ卵巢ノ中心部ニアル纖維性結締組織ヨリ成リ、其ノ中ニ多數ノ大ナル血管ヲ有ス。

家兎卵巢ニ於ケル生理的變化

1. 濾胞ニハ成熟、排卵機能ル見ヲノ他ニ閉鎖機轉ヲ認ム。

原始濾胞ニテハ先ヅ卵細胞變性シ胚斑、次ヅ胚胞ニ變化ヲ起シ次ヅ卵黃ハ顆粒體トナリ、終ニハ各部相融合シテ凝固萎縮シ「エオジン」ニ好染スル無構造物質トナリ凝固シテ周圍ヨリ離レ次第ニ吸收セラル。

更ニ成熟セル濾胞ニテハ前記ノ卵細胞ノ變化ヲ起シ卵膜ハ肥厚シ周圍ヨリ剝離シ、濾胞液モ顆粒狀ニ凝固シ「ヘマトキシリン」ニテ汚穢ニ染色スル物質ト成リ終ニハ卵細胞ト融合ス。

顆粒細胞モ相次ヅ變性ヲ始メ、中央部ヨリ外圍ニ及ビ次第ニ變性ス。即チ細胞ハ萎縮、Pyknose, Karyorrhexis, Karyolyse 等各種ノ變性ヲ表ハシ、排列亂レ、内部ヨリ次第ニ細胞溶解シ互ニ融合シテ更ニ前記ノ變性セル卵細胞濾胞液ト融合スルニ至ル。變性顆粒細胞間ニ白血球ヲ見ル。硝子膜ハ多少肥厚シ、内方ニ陥没シ顆粒細胞卵等ト融合シテ無構造物質ヲ形成ス。同時ニ増殖セル内夾膜細胞内方ニ進入シ全

ク濾胞ノ形態ヲ失フ。以上ハ通常ノ閉鎖機轉ナルガ時ニハ變性セル卵、顆粒細胞共ニ液化シ濾胞液ニ混ジ、所謂囊狀閉鎖濾胞ヲ形成スル事アリ。上記ノ如ク内夾膜細胞ハ通常増殖シ、漸次萎縮シツツアル閉鎖濾胞ノ内腔ニ向ヒテ進入シ多數ノ大ナル上皮様細胞トナリ、内腔ヲ充填シ充填性濾胞ヲ造リ、其ノ外層ノ細胞ハ漸次間質細胞ニ移行スルモノナリ。

2. 間質細胞モ生理的變化ヲ營ムモノニシテ、内夾膜細胞ヨリ分化シタル幼若ナルモノハ小ナリ。而シテ小ニシテ「クロマチン」ニ富メル核ヲ有シ、細胞ノ境界明瞭ナラズ。然レドモ細胞成熟スルニ從ヒ核ト共ニ大トナリ、Zytoplasm 増量シ、其ノ内ニハ核ノ周圍ニ於テ多數ノ好「エオジン」性ニシテ強ク光線ヲ屈折スル微細顆粒ヲ有シ、細胞境界明瞭トナル。更ニ古キモノハ退行變性ニ陥リ、核ハ變性破壊消失シ、空胞形成セラル。斯クノ如ク間質細胞ハ變化ヲナス故ニ、Saimont ハ間質細胞ヲ

- a. Die junge Form.
- b. Die Übergangsform.
- c. Die ausgebildete Form.
- d. Die degenerierende Form.
- e. Die hypertrophische Form.

等ニ分テリ。今陰極線ヲ放射シテ起ル家兎卵巢ノ變化ヲ記載スルニ當リ、便宜上間質細胞ヲ上記ノ幼若型及ビ成熟型ノ2種ニ分チ、之ガ變化ヲ述ベント欲ス。

第5章 陰極線放射實驗及ビ其ノ成績

陰極線ノ卵巢ニ及ボス影響ニ關シテハ、未ダ報告ナキヲ以テ本實驗ノ所見ヲ比較の詳細ニ述ベント欲ス、但家兎卵巢ハ年齡 Phase、個性ニ依リ其ノ抵抗力ニ差異アラント信ジタルガ故ニ同一實驗ヲ2乃至

3頭ノ動物ニ就キ反覆實行シ其ノ所見ヲ檢シタリ。然レドモ同一成績ヲ得タル故ニ記事ノ冗長ヲ避ケ、各種實驗例中各其ノ1例ヲ選シ記載セント欲ス。

第1節 第1實驗

(30分間放射例)

(1) 動物番號: Nr. 37

放射時間 30 分, 左卵巣, 放射後ノ經過日數 1 日,
放射前體重 1640 g, 屠殺時體重 1530 g.

放射側卵巣ノ肉眼的所見

容積.	長さ	幅	厚
放射前	1.1 cm	0.3 cm	0.2 cm
屠殺時	1.2 cm	0.4 cm	0.3 cm

色澤. 放射側卵巣ハ輕度ニ充血シ暗赤紫色ヲ呈ス.

表面. 平滑ナリ.

硬度. 稍々軟.

放射側卵巣ノ顯微鏡的所見

イ. 胚上皮細胞ハ變性シ其ノ高サヲ減ジ扁平トナレリ.

ロ. 白膜. 放射ニ近キ部ノ白膜結締細胞ハ變性シ, 核ハ萎縮變形破壊シ胞體ハ aufquellen シ白膜ハ肥厚セリ.

ハ. 濾胞. 原始濾胞, 中, 成熟濾胞ハ全然之ヲ見ズ. 小濾胞ハ放射ニ近キ部ニハ存在セズ. 之ヲ離レタル部ニハ殘存セルモ卵及ビ濾胞上皮細胞共變性セリ.

ニ. 間質細胞. 一般ニ左右共發育弱ク成熟型ノモノヲ見ズ. 深層ノモノハ變化セザルモ, 表層ノ白膜下ニ位セルモノハ強ク變性シ染色力著シク減退シ, 胞體ハ減少乃至消失シ核ハ紡錘狀トナリ或ハ Karyolyse ニ陥リ或ハ全ク死滅壞死セルモノアルヲ見ル. 稍々深層ノ細胞ハ萎縮或ハ融合シ胞體ハ小トナリ顆粒ノ減少, 空胞ノ形成等ヲ示セリ. 核又縮小シ Pyknose, Karyorrhexis 或ハ Karyolyse ニ陥レルヲ見ル.

ホ. 間質結締組織 稍々増加ス.

ヘ. 血管. 髓質中ノ血管ハ血管壁ノ破壊, 管腔ノ消失等ヲ示シ, 其ノ周圍ニ出血ヲ生ゼリ. 其ノ他皮質中ニ多クノ小出血ヲ見ル. 又表面ノ白膜層中ニ大ナル出血アリ.

(2) 動物番號: Nr. 39

放射時間 30 分, 右卵巣, 放射後ノ經過日數 2 日,
放射前體重 1760 g, 屠殺時體重 1590 g.

放射側卵巣ノ肉眼的所見

容積.	長さ	幅	厚
放射前	1.1 cm	0.3 cm	0.2 cm
屠殺時	1.5 cm	0.3 cm	0.1 cm

色澤. 右側ノモノハ稍々蒼白色.

表面. 平滑.

硬度. 稍々硬.

放射側卵巣ノ顯微鏡的所見

イ. 胚上皮細胞. 變性シ扁平トナリ, 相融合シ大部分陷子樣變性ニ陥リ, 扁平トナレル核少數ヲ含ミ大部分ハ白膜ヨリ剝離セリ.

ロ. 白膜. 變化ナシ.

ハ. 濾胞. 大濾胞及ビ中濾胞ハ全ク之ヲ見ズ. 原始濾胞ハ對照側ヨリ著シク減數シ且殘留セルモノモ卵及ビ濾胞上皮細胞ノ變性ヲ示セルモノ多シ. 但小濾胞中ノ卵ハ變性セルモ濾胞上皮ハ變性輕度ナルカ或ハ全ク變化ナキモノ多シ.

ニ. 間質細胞. 對照側ニ比シテ特記スベキ變化ヲ認メズ.

ホ. 間質結締組織. 變化ヲ認メズ.

ヘ. 血管. 内膜變性シ管壁肥厚セルモノアルモ對照側ニテモ同様ノモノヲ認ム. 皮質中數多小出血アリ.

(3) 動物番號: Nr. 32

放射時間 30 分, 右卵巣, 放射後ノ經過日數 3 日,
放射前體重 1450 g, 屠殺時體重 1510 g.

放射側卵巣ノ肉眼的所見

容積.	長さ	幅	厚
放射前	1.3 cm	0.3 cm	0.3 cm
屠殺時	1.2 cm	0.2 cm	0.2 cm

色澤. 右側卵巣ハ稍々蒼白.

表面. 右側ハ左側ニ比シテ突隆稍々少シ.

硬度、變化ナシ。

放射側卵巢ノ顯微鏡の所見

イ、胚上皮細胞、變性シ菲薄トナリ融合シ、核ハ大部分消失シ、他ハ縮小シ扁平トナレリ。

ロ、白膜、變化ナシ。

ハ、濾胞、左側ニハ原始濾胞多數アリ。2乃至3列ニ排列シ大濾胞モ數箇アリ。放射側ハ原始濾胞ハ1箇モ之ヲ見ズ。大濾胞ハ6箇中5箇ハ充填性閉鎖濾胞トナリ、甚ダシキハ壞死ニ陥レルモノアリ。殘ル1箇モ變性濾胞トナリ、卵及ビ顆粒細胞ハ變性シ、内夾膜細胞ハ縮小シ或ハ紡錘狀ニ變形シ、其ノ核ハ縮小シ Pyknose、核ノ放壞或ハ Karyolyse ニ陥レルヲ見ル。

ニ、間質細胞、左右著シキ差異ヲ認メズ。

ホ、間質結締織、變化ナシ。

ヘ、血管、内膜變性シ管壁肥厚シ管腔狹隘トナリ小血管ハ全ク閉塞セリ。加之血管ノ一部ハ破壞シ消失セリ。髓質、内夾膜層、皮質間質結締織中ニ多數ノ大小出血竈ヲ見ル。

(4) 動物番號: Nr. 30

放射時間 30 分、右卵巢、放射後ノ經過日數 5 日、放射前體重 1800 g、屠殺時體重 1640 g。

放射側卵巢ノ肉眼の所見

容積	長さ	幅	厚
放射前	1.2 cm	0.3 cm	0.3 cm
屠殺時	1.0 cm	0.3 cm	0.2 cm

色澤、放射側ハ帶黃蒼白色、對照側ハ帶紅色ヲ呈ス。

硬度、放射側ハ對照側ニ比シテ *derb* ナリ。

放射側卵巢ノ顯微鏡の所見

イ、胚上皮細胞、融合シ、無構造硝子樣變性ニ陥リ菲薄トナル。核ハ大多數消失シ只極メテ少數ノ扁平ニ變形セルモノ殘留セルヲ見ル。

ロ、白膜、變化ナシ。

ハ、濾胞、原始濾胞ハ消失シ小空胞ノミヲ殘セル

モノアリ。成熟濾胞及ビ成熟ニ近キ濾胞モ又著シク變性セリ。之ニ反シ小濾胞及ビ中濾胞ノ卵ハ變性セルモ、其ノ濾胞上皮ハ抵抗強ク只僅ニ變性セリ。内夾膜細胞ハ膨大或ハ縮小セリ。其ノ核モ縮小、Pyknose, Karyorrhexis, Karyolyse 等ヲ示セリ。胞體ハ小トナリ、空胞形成ヲ示セリ。

ニ、間質細胞、對照側ニ比シテ發育弱ク細胞萎縮シ小トナリ空胞ヲ含メリ。核ハ Karyorrhexis 或ハ Karyolyse ニ陥リ、細胞互ニ融合シ核ノ消失セルモノアリ。

ホ、間質結締織、濾胞及ビ間質細胞ノ萎縮消失ニ伴ヒ比較的增加セリ。

ヘ、血管、内膜ハ變性シ中膜ハ肥厚シ、タメニ管腔ハ狹隘トナレリ。

(5) 動物番號: Nr. 12

放射時間 30 分、右卵巢、放射後ノ經過日數 7 日、放射前體重 2170 g、屠殺時體重 1960 g。

放射側卵巢ノ肉眼の所見

容積	長さ	幅	厚
放射前	1.2 cm	0.3 cm	0.2 cm
屠殺時	1.1 cm	0.2 cm	0.2 cm

色澤、放射側ハ蒼白色トナル。

表面、平滑トナリ極メテ少數ノ濾胞ヲ透見スルノミニシテ殆ド平等ナル外觀ヲ呈ス。

硬度、放射側ハ硬ナリ。

放射側卵巢ノ顯微鏡の所見

イ、胚上皮細胞、全部剝離消失セリ。

ロ、白膜、白膜結締織ノ増殖及ビ原始濾胞ノ消失ニ伴ヒ間質結締織増殖シ白膜肥厚セリ。

ハ、濾胞、對照側ニハ原始濾胞極メテ多數ニシテ 3 乃至 3 列ヲナシ表層ニ排列シ、大濾胞モ又表層及ビ深層ニ多數アリ。放射側ニテハ原始濾胞ノ大多數消失シ、大濾胞モ極メテ少數トナリ且變性セリ。顆粒細胞ノ變性ハ對照側ニ見ル生理的變性濾胞ノモノニ比シ著シク強ク、内層及ビ外層ハ一様ニ激シク變

性シ、内夾膜細胞ノ増殖、肥厚、間質細胞形成ヲ見ズ、中嚢胞ニ於テハ卵ハ變性セルモ嚢胞上皮ハ多ク無變ナリ。

ニ、間質細胞、變性萎縮シ或ハ互ニ融合セリ、且空胞形成ヲ見ル。

ホ、間質結締織、炎性反應ニヨリ増殖ス。

ヘ、血管、内膜ノ變性、中膜ノ肥厚ニヨリ管腔狹小トナリ、且血管ノ破壊消失セルヲ見ル。

(6) 動物番號: Nr. 21

放射時間 30 分、右卵巣、放射後ノ經過日數 14 日、放射前體重 1980 g、屠殺時體重 2240 g。

放射側卵巣ノ肉眼的所見

イ、胚上皮細胞、硝子様變性ニ陥ル。

ロ、白膜、放射ニ近キ部ノ白膜ハ變性シ、胚上皮細胞ト共ニ壊死ニ陥リ互ニ融合シ無構造組織トナレリ。

ハ、嚢胞、原始嚢胞ハ全ク消失シ、多數ノ圓形空胞ヲ殘シ、其ノ中ニ好「エオジン」性無構造凝塊ヲ見ル。此者空胞壁ニ凝着シ、周圍ノ結締織ハ増殖シ次第ニ空胞ヲ充填スルニ至ル。

ニ、間質細胞、萎縮シ細胞ノ境界不明トナリ、核ハ縮小シ Pyknose ノ狀ヲ呈シ或ハ Karyorrhexis 或ハ Karyolyse ニ陥レリ。而シテ細胞ハ互ニ廣ク融合シ漸次核ハ消失シ、終ニハ只少數ノ核ガ散在性ニ殘留スルヲ見ルノミ。表層ノ間質細胞ハ白膜ト共ニ壊死シ平等ナル無構造組織トナリ、其ノ中ニ少數ノ結締織細胞核ヲ含メリ。

ホ、間質結締織、強炎症性増殖ヲ呈シ、古キ血色素ヲ攝取セル多數ノ組織球ヲ含メリ。

ヘ、血管、髓質中ノ血管ノ内膜ハ變性シ中膜及ビ外膜ハ著シク肥厚シ、管腔ハ狹隘トナリ或ハ全ク閉塞セリ。其ノ他血管破壊シ出血セル部ヲ見ル。

(7) 動物番號: Nr. 26

放射時間 30 分、右卵巣、放射後ノ經過日數 21 日、放射前體重 1840 g、屠殺時體重 1960 g。

放射側卵巣ノ肉眼的所見

容積.	長さ	幅	厚
放射前	1.4 cm	0.5 cm	0.3 cm
屠殺時	0.5 cm	0.3 cm	0.3 cm

色澤、帶黃蒼白色。

表面、平滑平等ナル外觀ヲ呈シ末端部ニ只 1 乃至 2 箇ノ嚢胞ヲ透見ス。

硬度、硬。

放射側卵巣ノ顯微鏡的所見

イ、胚上皮細胞、所々ニ剝離消失シ殘留セルモノ硝子様變性ニ陥リ、或ハ骰子形乃至扁平トナリ、核モ扁平ニ變形セリ。

ロ、白膜、照射側ニ近キ部ハ壊死ニ陥リ anuklelen シ、染色力減退乃至消失セリ。結締織細胞ノ核ハ又減少シ染色力減退、膨大、或ハ縮小或ハ溶解等ノ變化ヲ顯ス。深層ノ結締織ハ増殖シ爲メニ白膜ハ肥厚セリ。

ハ、嚢胞、原始嚢胞ハ殆ド消失シ僅ニ殘留セルモノモ變性セリ。大嚢胞ハ消滅シ少數ノ充填性閉鎖嚢胞アルノミ。中嚢胞ノ卵ハ變性セルモ、其ノ嚢胞上皮ハ變性輕度ナリ。

ニ、間質細胞、著シク萎縮シ原形質減少シ細胞互ニ融合シ空胞形成著明ナリ。核ハ一般ニ縮小シ、Pyknose 或ハ Karyorrhexis ニ陥ル。

ホ、黃體細胞、萎縮セルノミニテ著變ヲ認メズ。

ヘ、間質結締織、増殖ス。

ト、血管、内膜變性シ管壁肥厚セリ。

(8) 動物番號: Nr. 27

放射時間 30 分、右卵巣、放射後ノ經過日數 28 日、放射前體重 2210 g、屠殺時體重 1780 g。

放射側卵巣ノ肉眼的所見

容積.	長さ	幅	厚
放射前	1.4 cm	0.5 cm	0.3 cm
屠殺時	0.6 cm	0.3 cm	0.2 cm

色澤、帶黃蒼白色。

表面、平滑ニシテ臙胞ハ末端部ニ1乃至2箇透見サルルノミニシテ、殆ド表面ヨリ臙胞ヲ見ル事能ハズ。對照側ニハ多數ノ臙胞ヲ透見ス。

硬度、硬。

放射側卵巣ノ顯微鏡的所見

イ。胚上皮細胞、硝子様變性ニ陥リ、一部ハ Karyolyse ヲ起シ Haematoxylin ニテ濃染スル無構造組織トナル。

ロ。白膜、肥厚セリ。

ハ。臙胞、原始臙胞、小臙胞ハ大部分消失シ圓形ノ空隙ヲ殘セリ。大臙胞ハ少數トナリ全部變性セリ。其ノ顆粒細胞ハ生理的閉鎖臙胞ノモノニ比シテ其ノ變性ノ程度著シク激烈ニシテ遍ク Karyorrhexis,

Karyolyse, 細胞ノ融合等ノ現象ヲ見ル。内夾膜細胞又高度ノ變性ニ陥リ増殖ヲ停止シ細胞ハ肥大シ或ハ縮小シ變形セリ。其ノ他空胞形成、核ノ萎縮或ハ紡錘狀變形、Pyknose, Karyorrhexis, Karyolyse 等ヲ見ル。

ニ。間質細胞、一般ニ萎縮シ細胞ノ境界不明トナリ原形質顆粒ハ減少シ或ハ消失セリ。更ニ廣汎ニ互リ細胞互ニ融合シテ網狀組織トナリ、核又變性消滅セルモノ多ク遺殘セルモノハ變性セリ。

ホ。間質結締織、強ク増殖シ赤血球ヲ攝取セル多數ノ組織球ヲ含ミ、著シク肉芽組織ヲ形成セリ。

ヘ。血管、内膜ハ變性シ、中膜、外膜ハ肥厚シ爲メニ間腔ノ閉鎖セルモノアリ。

第 2 節 第 2 實驗

(60 分 間 放 射 例)

(1) 動物番號: Nr. 47

放射時間 60 分, 右卵巣, 放射後ノ經過日數 1 日, 放射前體重 1920 g, 屠殺時體重 1800 g.

放射側卵巣ノ肉眼的所見

容積	長サ	幅	厚
放射前	1.4 cm	0.6 cm	0.3 cm
屠殺時	1.5 cm	0.5 cm	0.2 cm

色澤、暗紫赤色ヲ呈シ出血斑ヲ透見ス。

表面、突隆消失シ平坦ナリ。

硬度、稍々軟。

放射側卵巣ノ顯微鏡的所見

イ。胚上皮細胞、大部分硝子様性ニ陥リ、細胞核ハ極メテ少數トナリ變形シテ散在ス。

ロ。白膜、染色力減退セリ。

ハ。臙胞、原始臙胞及ビ小臙胞ハ殆ド消失シ殘存セルモノモ大部分萎縮變性ニ陥ル。中臙胞ハ比較的多數アリ。卵ハ多クハ變性セルモ臙胞上皮ハ抵抗強ク健康ナリ。成熟臙胞ハ對照側ニハ數箇ヲ見ルモ照射側ニハ1箇モナク只數箇ノ閉鎖臙胞ヲ見ルノミ。

ニ。間質細胞、一般ニ間質細胞ハ萎縮シ殊ニ幼稚型ハ變性著シク、細胞ノ境界不明トナリ、或ハ互ニ融合セリ、核ハ縮小變形シ Pyknose, Karyorrhexis, Karyolyse ニ陥レルヲ見ル。加之、一部ノ細胞ハ死滅シ核モ消失セルヲ見ル。殘留セル少數ノ核ハ網狀乃至無構造組織中ニ散在セリ。成熟型ノ細胞ニ於テハ原形質内顆粒減少シ細胞ノ境界不明トナリ、或ハ互ニ融合シ核ハ溶解消失シ空胞形成サルヲ見ル。

ホ。間質結締織、臙胞及ビ間質細胞ノ萎縮消滅ニ伴ヒ比較的増量セリ。

ヘ。血管、大小血管皆著シク擴張充血セリ。時ニハ血管壁破壊シ其ノ周邊ニ大ナル出血竈ヲ形成セルモノアリ。殊ニ胚上皮下ノ表層ニハ大出血竈アリ。其ノ他内夾膜層内及ビ間質細胞間ニ多クノ小出血ヲ見ル。或ハ之ニ反シ血管壁ノ變性肥厚ニヨリ管腔ノ狹隘トナレルモノアリ。

(2) 動物番號: Nr. 45

放射時間 60 分, 右卵巣, 放射後ノ經過日數 2 日 放射前體重 1960 g, 屠殺時體重 2020 g.

放射側卵巣ノ肉眼の所見

容積	長サ	幅	厚
放射前	1.6 cm	0.5 cm	0.4 cm
屠殺時	1.8 cm	0.8 cm	0.4 cm

色澤、暗紫赤色ニシテ出血斑ヲ透見ス。

表面、大嚢胞ノ突隆減ジ平滑トナレリ、對照側ハ之ニ反シ數多ノ成熟嚢胞著シク表面ニ隆起セリ。

硬度、稍々軟。

放射側卵巣ノ顯微鏡の所見

イ、胚上皮細胞、細胞ハ膨大シ屢々互ニ融合セリ。

ロ、白膜、結締織ハ一ハ淡染シ一部ハ濃染セリ。

ハ、嚢胞、原始嚢胞ハ皮質表層ニ2乃至3列ヲナシ排列シ、其ノ大多數ハ卵及ビ嚢胞上皮ノ變性ヲ示セリ。中及ビ小嚢胞ノ卵ハ變性セルモ其ノ嚢胞上皮ハ多クハ健康ナリ。成熟嚢胞ハ大部分消滅シ、之ニ代替好「エオジン」性無構造物質深層及ビ表層ニ互リ數多存在セリ。殘存セル少數ノ大嚢胞ハ皆變性シ充填性閉鎖嚢胞トナレリ。大ナル變性嚢胞ヲ檢スルニ顆粒細胞ハ外層ハ内層ヨリ強ク變化シ、外層ニハ Karyolyse ニ陥レル核ニ富ミ、内層ニハ Pyknose ノ狀ヲ呈セル核多シ。内夾膜細胞ハ増殖スル事ナク縮小シ、其ノ核ハ「クロマチン」ニ乏シク淡染シ或ハ Karyolyse ニ陥ル。數多ノ細胞ハ互ニ融合セリ。

ニ、間質細胞、輕度ニ變性シ萎縮、核ノ縮小、染色力不良、或ハ融合ヲ示セリ。

ホ、間質結締織、増加ス。

ヘ、血管、一般ニ擴張充血セリ。髓質結締織中ノ血管ハ内膜ノ變性、中膜ノ肥厚ヲ示シ、或ハ破壊シテ大出血竈ヲ形成セリ。皮質中ノ小血管モ同様ノ變化ヲ蒙リ大嚢胞ノ内夾膜層内、顆粒細胞間、間質細胞間ニ大小種々ノ出血竈ヲ顯セリ。

(3) 動物番號: Nr. 44

放射時間 60 分、右卵巣、放射後ノ經過日數 3 日、放射前體重 2020 g、屠殺時體重 1930 g。

放射側卵巣ノ肉眼の所見

容積	長サ	幅	厚
放射前	1.2 cm	0.4 cm	0.4 cm
屠殺時	1.1 cm	0.4 cm	0.2 cm

色澤、暗紅紫色ヲ呈シ大小種々ノ出血斑ヲ示セリ。

表面、突隆ナシ。

硬度、稍々軟。

放射側卵巣ノ顯微鏡の所見

イ、胚上皮細胞、大部分剝離シ附著セルモノモ變性セリ。

ロ、白膜、變性シ染色力減退、核ノ消失アリテ鬆疎トナル。而シテ深層ヨリ結締織増殖シテ白膜肥厚セリ。

ハ、嚢胞、原始嚢胞及ビ小嚢胞ハ殆ド消失シ照射部ヲ遠ザカレル部ニ少數ノ原始嚢胞及ビ小嚢胞ヲ見ル。大嚢胞ハ殆ド消失シ只、1 箇ノ變性囊狀嚢胞ヲ見ルノミ。

ニ、間質細胞、一般ニ萎縮シ表層ノ放射部ニ近キ所ニテハ間質細胞ハ Karyorrhexis, Chromatolyse 等ヲ示シ死滅融合セルモノアリ。

ホ、黃體細胞、左右兩側共退行變性ヲ見ルモ殊ニ放射側ニハ其ノ度稍々強ク細胞融合核ノ縮小變形或ハ消失ヲ多ク見ル。

ヘ、間質結締織、増殖ス。

ト、血管、一般ニ内膜變性シ中膜及ビ外膜ハ肥厚セリ。充血シテ血球ヲ充滿シ髓質中ニハ大ナル出血竈アリ。又皮質全般ニ互リ多數ノ小出血ヲ見ル。

(4) 動物番號: Nr. 24

放射時間 60 分、右卵巣、放射後ノ經過日數 5 日、放射前體重 1550 g、屠殺時體重 1620 g。

放射側卵巣ノ肉眼の所見

容積	長サ	幅	厚
放射前	1.3 cm	0.5 cm	0.3 cm
屠殺時	0.6 cm	0.4 cm	0.2 cm

色澤. 帶黃白色.

表面. 大臙胞消滅セルタメ平坦トナリ小臙胞ヲ透見ス.

硬度. 稍々硬.

放射側卵巣ノ顯微鏡の所見

イ. 胚上皮細胞. 剝離セリ.

ロ. 白膜. 壊死ニ陥リ染色力著シク減退セリ. 而シテ aufquellen シ, locker トナル. 白膜下ノ臙胞及ビ間質細胞ハ壊死ニ陥リ皮質ト白膜トノ境界不明トナレリ.

ハ. 臙胞. 原始臙胞及ビ小臙胞ハ殆ド消失シ残留セル小臙胞ノ卵ハ變性シ其ノ臙胞上皮モ輕度ノ變性ヲ示セリ. 大臙胞ハ2箇アルノミニシテ何レモ充填性閉鎖臙胞トナレリ. 而シテ其ノ内夾膜細胞ハ變性萎縮シ核ハ縮小, 變形, 「クロマチン」減少, Pyknose, Karyorrhexis, Karyolyse 等ノ現象ヲ示セリ.

ニ. 間質細胞. 強ク變性シ表層ノモノハ廣汎ナル範圍ニ亙リテ壊死シ, 深層ノモノハ萎縮, 顆粒減少, 空胞形成シ, 融合, 核ノ脱出, 變位, 縮小, 變形, Pyknose, 破壊, Chromatolyse, 消失等ヲ示セリ.

ホ. 間質結締組織. 表層ノ結締組織ハ間質細胞ト共ニ壊死ニ陥リ, 結締組織細胞ハ極メテ少數トナレリ. 深層及ビ臙胞消失部ハ反應性炎症ノタメニ二次的ニ増殖セリ.

ヘ. 血管. 内膜變性シ管壁肥厚シ所々ニ破壊出血ヲ見ル.

(5) 動物番號: Nr. 22

放射時間 60 分, 右卵巣, 放射後ノ經過日數 7 日, 放射前體重 1650 g, 屠殺時體重 1650 g.

放射側卵巣ノ肉眼の所見

容積.	長サ	幅	厚
放射前	1.1 cm	0.5 cm	0.2 cm
屠殺時	0.6 cm	0.4 cm	0.2 cm

色澤. 一般ニ帶黃白色ニシテ肉塊狀ヲ呈ス.

表面. 小臙胞ヲ透見セズ. 平滑ニシテ homogen ノ

外觀アリ. 但兩端部ニ少數ノ臙胞ヲ透見ス.

硬度. 硬.

放射側卵巣ノ顯微鏡の所見

イ. 胚上皮細胞. 消失セリ.

ロ. 白膜. 肥厚セリ.

ハ. 臙胞. 臙胞ハ著シク減少シ原始及ビ小臙胞ハ殆ド皆消失シ只照射部ヲ遠カレル部ニ少數ノモノヲ見ルノミ. 成熟臙胞ハ1箇モナク淺層及ビ深層ニ亙リ好「エオジン」性無構造物質塊多數存在セリ. 残留セル小臙胞ノ上皮ハ輕度ノ變性ヲ示セリ.

ニ. 間質細胞. 著シク變性シ萎縮, 融合, 空胞形成, 核ノ縮小, Pyknose, Karyorrhexis, Karyolyse, 消失等ニ陥レルモノ多シ. 概シテ左右兩側共間質細胞ノ發育弱ク放射側ハ對照側ニ比シテ發育稍々勝レルモ上述ノ變化ヲ示セリ.

(6) 動物番號: Nr. 20

放射時間 60 分, 右卵巣, 放射後ノ經過日數 14 日, 放射前體重 2130 g, 屠殺時體重 2060 g.

放射側卵巣ノ肉眼の所見

容積.	長サ	幅	厚
放射前	1.4 cm	0.5 cm	0.3 cm
屠殺時	0.7 cm	0.3 cm	0.2 cm

色澤. 帶黃白色ニシテ平等ナル肉塊狀ヲ呈ス.

表面. 平滑ニシテ臙胞ハ卵巣ノ一端ニ於テ只少數ヲ透見スルノミ.

硬度. 硬.

放射側卵巣ノ顯微鏡の所見

イ. 胚上皮細胞. 大部分剝離消失シ殘存セルモノハ硝子樣變性ニ陥リ, 其ノ内ニ稀ニ長扁平ニ變形セル核ヲ見ル.

ロ. 白膜. 白膜, 皮質表層ノ臙胞並ニ間質細胞ハ一樣ニ壊死ニ陥リテ見スル事ヲ得ズ.

ハ. 臙胞. 左側ノ對照側ニハ無數ノ原始臙胞及ビ多數ノ大, 小臙胞ヲ見ルモ放射側ニテハ臙胞ハ著シク減少シ殊ニ照射ニ近キ部ニテハ臙胞皆消失セリ.

然レドモ、照射ヲ遠ザカレル部ニハ少數ノ原始濾胞ト、夫レヨリ稍々多數ノ小濾胞残留シ變性セリ。但小濾胞ノ濾胞上皮ハ健康ナリ、大濾胞モ著シク減數シ只4箇ヲ見ルノミ。而モ此者變性濾胞トナリ其ノ内比較の照射部ニ近在セル1箇ノ如キハ充填性閉鎖濾胞トナリ、顆粒細胞及ビ増殖セル内夾膜細胞ハ強ク變性セリ。他ノ變性大濾胞モ放射部ニ近キ側ニ於テ顆粒細胞及ビ内夾膜細胞殊ニ強ク變性セリ。

ニ、間質細胞。表層ノ間質細胞ハ主トシテ幼若型ニシテ壞死ニ陥リ好「エオジン」性無構造物質トナリ、内ニ少數ノ變性破壊セル核ヲ有セリ。深層ノモノハ成熟型ニシテ細胞ノ萎縮、原形質及ビ顆粒ノ減少、空胞形成、核ノ萎縮、Pyknose 等ヲ示セリ。細胞ノ死滅融合、核ノ消失等ハ表層ノ幼若型ニ比シテ少キモ所々ニ之ヲ見ル。

ホ、間質結締織。増殖シ特ニ髓質中ニハ圓形核ヲ有スル Fibroblasten ヲ認ム。

ヘ、血管。管壁變性シ管腔ニ血球ヲ充滿ス。髓質及ビ放射部ニ近キ側ノ表層ニ大ナル出血竈アリ。皮質中ニモ多數ノ小出血竈ヲ見ル。

(7) 動物番號: Nr. 25

放射時間 60 分、右卵巣、放射後ノ經過日數 21 日、放射前體重 2000 g、屠殺時體重 1730 g。

放射側卵巣ノ肉眼の所見

容積・	長さ	幅	厚
放射前	1.4 cm	0.6 cm	0.4 cm
屠殺時	0.6 cm	0.3 cm	0.3 cm

色澤。平等ニ帶黃白色ヲ呈ス。

表面。平滑ニシテ一様ニ肉様塊ヲ呈ス。殆ド濾胞ヲ透見セズ。只兩端ニ少數ノ小濾胞ヲ透見スルノミ。硬度。硬。

放射側卵巣ノ顯微鏡の所見

イ、胚上窩細胞。所々剝離消失セルモ大部分ハ残留シ顆子様變性ヲ呈ス。

ロ、白膜。表層ハ變性シ染色力減退セルモ皮質表

層ノ濾胞消滅セルタメ二次的ニ結締織増殖シ白膜肥厚セリ。

ハ、濾胞。濾胞著シク減少シ、原始濾胞ハ皆無トナリ多數ノ圓形小濾胞ヲ殘セリ。中濾胞ノ卵及ビ濾胞上皮モ著シク變性シ内夾膜細胞モ又激シキ變性ヲ示セリ。成熟濾胞ハ大部分消滅シ残留セルモノハ變性シ其ノ卵及ビ濾胞液ハ變ジテ汚穢染色性ノ凝塊トナリ顆粒膜ハ内層殊ニ外層ニ於テ共ニ激シキ變性シ細胞ハ Karyorrhexis, Karyolyse, 融合等ヲ示セリ。内夾膜細胞モ萎縮、空胞形成、原形質減少、核ノ萎縮、「クロマチン」減少、Karyorrhexis, Karyolyse 等ヲ現セリ。

ニ、間質細胞。強ク變性縮小シ原形質顆粒ノ減少大空胞形成等ヲ示ス。核モ萎縮シ染色力減退シ或ハ Pyknotisch トナリ或ハ Karyorrhexis, Karyolyse, 核ノ脱出消失等ノ現象ヲ示セリ。細胞廣範圍ニ於テ互ニ融合シ壞死ニ陥レルヲ見ル。

ホ、黃體細胞。著シク膨大セルモノアリ、或ハ反テ萎縮シ多角形トナリ原形質内顆粒減少シ比較的透明トナレルモノアリ。核ハ染色力減退、縮小、Karyorrhexis, Karyolyse, 消失等ニ陥ルモノ多シ。或ル細胞ハ死滅膨大シ原形質及ビ核ハ全ク消失シテ細胞膜ノミトナレルヲ見ル。或ハ細胞ハ脂肪變性ニ陥リ細胞ハ廣汎ニ互リ融合シ好「エオジン」性無構造乃至網狀組織トナレルモノアリ。

ヘ、間質結締織。強ク増殖ス。

ト、血管。内膜變性シ、管壁肥厚シ管腔ハ狹隘トナレリ。一般ニ出血多ク胚上皮ノ白膜及ビ表層ノ濾胞内ニ大小種々ノ出血竈ヲ見ル。

(8) 動物番號: Nr. 16

放射時間 60 分、右卵巣、放射後ノ經過日數 28 日、放射前體重 1940 g、屠殺時體重 2020 g。

放射側卵巣ノ肉眼の所見

容積・	長さ	幅	厚
放射前	1.6 cm	0.5 cm	0.4 cm
屠殺時	0.4 cm	0.3 cm	0.2 cm

色澤。帶黃白色ニシテ肉塊狀ヲ呈ス。

表面。平滑ニシテ平等ナル外觀ヲ呈ス。

硬度。著シク硬。

放射側卵巢ノ顯微鏡的所見

イ。胚上皮細胞。一部ハ剝離消失シ殘部ハ硝子樣變性ニ陥ル。

ロ。白膜。結締組織強ク増殖シ肥厚セリ。

ハ。濾胞。原始濾胞。小。中濾胞ハ皆消失シ。多少多數ノ空胞ヲ殘セリ。其ノ内ニアリシ卵及ビ濾胞上皮ハ壞死融合シ。好「エオジン」性ノ凝塊トナリ凝縮シテ空胞壁ニ附着セリ。大濾胞ハ深層ニ3箇アルノミテ何レモ變性壞死ニ陥リ且著シク萎縮セリ。顆粒細胞ハ縮小。融合。Pyknose, Karyorrhexis, Karyolyse 等ニ陥リ特ニ外層ノモノハ強度ノ變性ヲ示セリ。内夾膜細胞モ又高度ニ變性シ其ノ多數ハ死滅シ其ノ殘セルモノモ核ノ著シキ緻縮或ハ膨大ヲ示シ。原形質ハ消失シテ變性核ノミトナレルモノアリ。或ハ結締組織細胞ノ如ク紡錘狀ニ變性セルモノアリ。

或ハ Karyorrhexis, Karyolyse ニ陥レルモノヲ見ル。而シテ内夾膜層ハ萎縮シテ著シク菲薄トナレリ。

ニ。間質細胞。著シク犯サレ壞死シ。或ハ萎縮セリ。殊ニ幼若型ノモノハ死滅融合シテ其ノ原形質ハ消失シ核ハ破壞或ハ溶解ニ陥リ増殖セル周圍ノ結締組織ニヨリ壓迫セラレテ著シク萎縮セリ。成熟型ノモノハ核ノ染色力減退溶解消失等ヲ示シ細胞ハ萎縮シ或ハ著シク膨大セリ。屢々核及ビ原形質ハ消失シ細胞膜ノミ殘留セル事アリ。或ハ2乃至3箇ノ細胞互ニ融合セルヲ見ル。

ホ。間質結締組織。強ク増殖セリ。間質細胞及ビ濾胞ノ死滅ト共ニ卵巢ノ大部分ハ瘢痕組織ニ變ル。殘留セル少數ノ濾胞及ビ間質細胞ハ漸次ニ壓迫セラレ萎縮セリ。新生セル結締組織中ニハ多數ノ組織球ヲ見。内ニ多量ノ變化セル血色素ヲ含メリ。

ヘ。血管。血管著シク萎縮シ内膜ハ變性消失セルモ管壁ハ著シク肥厚シ管腔ノ狹隘乃至消失ヲ來タセリ。

第3節 實驗成績ノ概括

開腹露出セル卵巢ヲ陰極線ニテ直接放射スル時ハ卵巢組織ニ一定ノ變化ヲ起スモ20分以内放射ニテハ其ノ度極メテ僅微ナルカ或ハ全然變化セズ。故ニ30分及ビ60分放射ノ實驗成績ニ就テ要點ヲ述ベント欲ス。

第1項 肉眼的變化ノ概括

容積。放射後1乃至2日ハ30分及ビ60分放射共増大ス。夫レヨリ時日ヲ經過スルト共ニ卵巢ハ萎縮ニ陥リ30分放射ニテハ14日以後ハ $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ 容積トナリ。60分放射ニテハ既ニ5日目ニハ萎縮著シク起リ。7日目ニハ $\frac{1}{2}$ 容積トナリ28日後ニテハ約 $\frac{1}{4}$ 容積トナル。

色澤。30分放射ニテハ放射後1日ヲ經過スレバ暗紫赤色ヲ呈シ小出血斑ヲ透見シ2日以後ニテハ帶黃蒼白色ヲ呈ス。1時間放射ニテハ放射後1乃至3日迄ハ同様ニ暗紫赤色充血性ニシテ大小出血斑ヲ透見ス。5日以後ハ帶黃蒼白色トナル。

表面。放射後第1日目ニハ既ニ大濾胞消失シ突隆ヲ減ジ平滑トナル。只卵巢端部ハ迂曲セル輸卵管ニテ被覆セラレテ放射線直接達セザル爲メ比較的大ナル1乃至2箇ノ濾胞ヲ殘シ正常ノ外觀ヲ呈セリ。放射後5日以上ヲ經過スレバ卵巢ハ萎縮シ蒼白色トナリ且小濾胞ヲモ透見セズ。表面平等ニシテ homogen ノ外觀ヲ呈スル肉塊狀トナル。

硬度。放射後1乃至3日間ハ寧ろ對照側ヨリ軟ナルモ以後硬度ヲ増シ *derb* 乃至 *hart* トナル。

第2項 顯微鏡的變化ノ概括

1. 卵巢内部ノ陰極線ニ對スル感度ハ大ニ強弱アリ。感度ノ高キモノヨリ列記スレバ次ノ如シ。

胚上皮細胞—臌胞—血管—間質細胞—黃體細胞—間質結締織。

2. a. 胚上皮細胞

常ニ高度ニ變性シ30分放射ニテ1日後ニテモ其ノ放射ニ近キ部ト否トヲ問ハズ著シキ變性ヲ示ス。細胞ハ高サヲ減ジ穀子形乃至扁平トナリ、屢々互ニ融合シテ硝子樣變性ノ狀ヲ呈シ其ノ核ハ縮小、染色力減退、溶解、消失等ニ陥ル。30分放射後28日目ノモノ竝ニ60分放射後3日目ノモノニテハ薄キ無構造ナル硝子樣層トナリ内ニ極メテ少數ノ扁平ナル變形核ヲ見ル。

b. 臌胞

臌胞ノ變性及ビ消失ノ遲速ハ其ノ發育ノ度ニ從ヒ差異アリ。速キモノヨリ列記スレバ次ノ如シ。

成熟臌胞—中、小臌胞—原始臌胞。臌胞中最モ速ク且強ク變性スルモノハ卵ニシテ臌胞上皮、内夾膜細胞之ニ相次ギ硝子膜ハ比較的抵抗強シ。

60分放射後1日目ニテハ成熟臌胞ハ消失シ原始臌胞小臌胞ハ減數シ残留セルモノハ多クハ變性萎縮セリ。中及ビ小臌胞ノ臌胞上皮ハ成熟臌胞及ビ原始臌胞ノ夫レニ比シテ抵抗甚ダ強ク輕微ナル變性ヲナスカ或ハ健康狀態ヲ比較的長ク保持ス。サレド放射後21日ヲ經ル時ハ臌胞細胞ノ排列亂レ細胞ハ萎縮、或ハ膨大シ、屢々融合シ核ハ縮小變形シ *Pyknose*, *Karyorrhexis*, *Karyolyse* 等ニ陥ル。

成熟臌胞ノ變化

陰極線ニヨル臌胞ノ變化ハ退行變性ニシテ、放射時間20分以内ニテハ極メテ輕微ニシテ生理的退行變性ト明カニ區別スル事困難ナルモ、30分以上放射シタルモノニテハ特有ナル次ノ諸點ヲ認ムル事ヲ得。

イ. 顆粒細胞。生理的閉鎖臌胞ニテハ其ノ變化ハ中心部ヨリ周圍ニ向ヒテ漸次波及スルモ陰極線放射ニヨル場合ニハ顆粒膜各層ノ細胞ガ同程度ニ強ク變性スルカ或ハ寧ろ先ヅ外層ノ細胞ニ激シキ變性ヲ起スヲ見ル。

ロ. 内夾膜細胞。生理的閉鎖臌胞ニテハ内夾膜細胞ノ増殖肥大ヲ來スモ、陰極線放射後ニハ斯カル事ナク放射2日目ニテ既ニ細胞ノ變性ヲ起シ細胞ハ崩縮變形シテ恰モ結締織細胞ノ如ク紡錘狀トナリ、或ハ原形質ノ減少、*Vakuolisierung*, *Karyorrhexis*, *Karyolyse* 等ヲ起シ、60分放射後28日目ニテハ細胞ハ壞死消滅シ内夾膜層ハ甚ダ菲薄トナル。

c. 血管

放射後1日ニテ既ニ血管ハ内膜ノ變性, 中膜ノ肥厚ヲ顯ス. 60分放射例ニテハ1乃至3日後迄ハ血管壁ノ變化ト共ニ著シキ擴張充血ヲ見, 特ニ髓質中ノ大血管所々ニ破壞セラレ周圍ノ結締組織中ニ大出血竈ヲ形成ス, 放射後5日目ニテハ上記内膜ノ變性中膜ノ肥厚ニ加フルニ周圍結締組織ノ増殖アリ. 爲ニ管腔著シク狹隘トナリ甚ダシキモノハ管腔ノ閉鎖消滅スルニ至ル. 皮質中ノ小血管ニモ同様ノ變化ヲ來シ間質細胞間, 内夾膜層内ニ多數ノ小出血ヲ見ル. 而シテ出血ヲ髓質, 皮質ノミナラズ血管ノ少キ表層ノ白膜内ニテ胚上皮下ニ大ナル出血竈ヲ見ル. 上記ノ陰極線ニヨル一次の充血ノ外60分放射後14日目ニテハ血管ノ二次の炎症性充血ヲ見ル. 初期ニ於ケル卵巢ノ容積増大ハ充血及ビ出血ニ因ス.

d. 間質細胞

常ニ可成高度ノ障礙ヲ受クルモノニシテ放射時間及ビ其ノ後ノ經過日數ニ比例シテ階段的變化ヲ認ム. 概シテ放射側ノ卵巢ハ對照側ニ比シテ間質組織ノ發育不良ナリ. 成熟型細胞ハ多クハ萎縮シ稀ニ膨大セリ. 原形質顆粒ハ減少シ細胞ハ透明トナリ空胞形成著明ニシテ殆ド細胞體ノ全部ヲ占メ, 變性進行スルト共ニ原形質及ビ核ハ全ク消失シ細胞死滅シテ空胞ノミヲ包藏スル細胞膜トナレルモノアリ. 或ハ2乃至3箇互ニ融合セルモノアリ. 或ハ廣汎ナル範圍ニ於テ互ニ融合シテ網狀乃至無構造組織トナリ, 核ハ大部分消失シ, 残留セル少數ノモノハ萎縮, 染色力減退, 變形, 變位, 脫出, 破壞, 溶解ニ陥レルヲ見ル. 内夾膜細胞ヨリ分化シタル幼若型細胞モ互ニ融合シ其ノ核ハ縮小, 染色力減退, 破壞, 濃染等ニ陥レルモノ多シ. 一般ニ幼若型細胞ハ成熟型ノモノヨリ抵抗力弱シ.

表層ノ白膜下ニ位セル間質細胞ハ特ニ激シキ障礙ヲ受ケ壞死, 消滅シ其ノ核ハ結締組織細胞ノモノノ如ク紡錘狀ニ變形シ或ハ aufquellen シ染色力減退セルモノアリ. 間質細胞ノ感度ハ臆胞ニ次デ可成強ク短時間放射後ニテハ5日目ヨリ始メテ變性現象著明トナルモ強放射後ニテハ既ニ1日目ヨリ幼若細胞ニ著明ノ變化ヲ見ル. 即チ細胞ハ壞死ニ陥リ互ニ融合シテ好「エオジン」性網狀乃至無構造物質トナリ, 核ハ破壞消滅ス. 更ニ時日ヲ經過スル時ハ全間質組織ガ壞死スルニ至ル.

e. 黃體細胞

黃體細胞ハ間質細胞ニ比シテ遙ニ抵抗強ク30分放射後21日目ニテハ僅カニ細胞萎縮スルノミ. 60分放射後3日目ニテモ細胞萎縮ノ外著シキ變化ヲ認メズ. 只核ノ縮小, 變形, 染色力減退, 消滅等ヲ見ルノミナリ. 60分放射後21日目ニテハ變性可成著明ニシテ且廣範圍ニ互レルヲ見ル. 而シテ黃體細胞中著シク肥大セルモノアルモ同細胞ハ一般ニ萎縮シ銳多角形トナリ, 原形質及ビ顆粒ハ減退シテ比較的透明トナリ, 核ハ染色力減退, 縮小, 破壞, 溶解等ヲ起ス. 或ハ核及ビ原形質消失シテ細胞膜ノミトナレルモノアリ. 或ハ廣範圍ニ互リ細胞互ニ融合シテ少數ノ核ヲ含メル好「エオジン」性無構造物質トナレルヲ見ル. 同時ニ脂肪顆粒ハ寧ロ増量シテ

脂肪變性ノ狀ヲ呈セル事アリ。

f. 結締織

イ. 白膜. 30 分放射後 1 日目ニハ結締織細胞ハ aufquellen シ肥厚セル事アルモ概シテ初期ニハ變化ナク, 放射後 7 日目ニ深層ノ結締織増殖ニヨリ肥厚シ, 14 日乃至 21 日目ニハ白膜ノ表層 Nekrose ニ陥リ染色力減退シテ平等ナル無構造組織トナレルヲ認ム. 60 分放射後 1 日目ニテハ白膜ハ既ニ染色力減退ヲ示シ, 2 日乃至 3 日目ニハ染色力減退ノ他ニ aufquellen シ或ハ反テ鬆疎トナレルモノアリ. 5 日目ニテハ白膜 Nekrose ニ陥リ表層ノ間質細胞ノ壞死セルモノト互ニ融合シテ細胞ノ認識困難トナリ. 更ニ 28 日目ニハ結締織再生ニヨリ癰痕化シ白膜ノ肥厚ヲ來ス.

ロ. 間質結締織. 間質結締織ハ抵抗甚ダ強ク一次的退行變性ハ僅微ニシテ主トシテ増殖ヲ起ス. 其ノ増量ハ放射後短時日ニテハ主トシテ臌胞, 間質細胞ノ萎縮消滅ニ伴フモノニシテ炎症性増殖ハ僅微ナリ. 強放射後 5 日目ニハ表層ノ間質結締織ニ壞死ヲ起シ同時ニ深層ノ皮質及ビ髓質結締織ハ反應性炎症ニヨリ著シク増殖シ, 更ニ時日ヲ經過スルト共ニ臌胞及ビ間質細胞ノ壞死退縮ニ隨伴シ益々結締織増殖ス. サレド間質ノ増殖ハ臌胞及ビ間質細胞ノ萎縮消滅ノ時期ヨリ遙ニ遅ク發現シ且其ノ度ハ臌胞及ビ間質細胞ノ變性ノ度ニ比シテ小ナリ. 加之放射後長時間ヲ經ル時ハ癰痕收縮ヲ成スタメ卵巢ハ正常卵巢ニ比シテ著シク容積ヲ減ジ且硬度ヲ増ス. 而シテ間質結締織ノ増殖ハ陰極線ノ一次的刺戟作用ノミニヨルニ非ズシテ又二次的炎症性反應ニ由テ起ルモノノ如シ. 放射後 21 日乃至 28 日目ニハ間質結締織中ニ組織球發現シ其ノ體內ニハ攝取セル多量ノ血色素ヲ含メリ. 60 分放射後 28 日目ニハ全卵巢ハ癰痕化シ壞死ニ陥レル臌胞及ビ間質細胞ヲ壓迫萎縮セシム. 從テ卵巢ハ容積ヲ減ジ硬度ヲ増ス.

g. 卵巢内各組織ノ再生機轉

再生機能ノ最モ旺盛ナルハ結締織細胞ニシテ臌胞ハ強放射後ニハ成熟ノモノノミナラズ, 原始臌胞ヲモ全部死滅セシムルヲ以テ其ノ後ノ臌胞發育及ビ間質細胞ノ再生ハ之ヲ見ザルモノト思考ス.

第 6 章 陰極線並ニ X 線ノ家兎卵巢ニ及ボス作用ノ比較研究

第 1 節 緒 言

陰極線ハ上述ノ變化ヲ卵巢ニ起スモノナルモ X 線, Radium, Diathermie モ一定ノ變化ヲ卵巢ニ起サシム.

1. X 線ニ就テハ 1903 年 Albers-Schönberg 家兎率丸ニ之ヲ放射シテ顯著ナル作用ヲ證明シ, 卵巢ニ對シテモ同様ノ作用アル事ヲ推定シ, 其ノ後 Halbe-

rstädter (1905), Bergonié, Tribondeau, Recamiér (1906), Ancel u. Bonin, Villemin (1906), Burkhard (1905), Krause u. Ziegler (1906), Lengfellner (1906), Ochintschitz (1906), Pagenstecher u. Hippel (1906), Zaretzky (1908), Reifferscheidt (1910), 我國ニテハ白木氏 (大正 10 年), 古谷氏 (昭和 3 年) ノ業績發表

アリ。X線ノ家兎卵巣ニ及ボス作用ハ白木氏ニ據レバ次ノ如シ。

硬X線ハ家兎卵巣ニ對シテ顯著ナル破壞作用ヲ及ボス。即チ

肉眼的ニハ容積ノ縮小、重量ノ減少、表面ノ突隆消失ヲ來シ表面平滑蒼白色トナル。但硬度ニ變化ナシ。

顯微鏡的ニハ 1. 濾胞組織ノ破壞。2. 胚上皮ノ脱落及ビ變性。3. 血管壁ノ變性肥厚及ビ之ニ伴フ管腔狹窄アリ。之ニ反シテ管腔ノ擴張充血ハ極メテ罕ニ之ヲ見ル。4. 間質細胞、黃體細胞ニモ變性ヲ起ス事アルモ比較的大量ヲ放射シタル後ト雖モ全ク變性ナキカ或ハ其ノ度輕微ナル事アルノミナラズ間質細胞ガ反テ對照側ヨリモ良好ノ發育ヲ示ス事アリ。5. 白膜及ビ間質結締組織ニハ變化ヲ認メズ。6. 再生機轉。原始濾胞ハ最も感度鋭敏ナルニモ拘ラズ比較的強放射後ニテモ全部消滅セズシテ多少殘留スルガ故ニ再

生機轉ヲ保有スルモノトス。

2. 「ラヂウム」γ線ノ卵巣ニ對スル作用ハ堤辰郎氏ニ據レバ次ノ如シ。

肉眼的ニハ重電、容積減少シ、表面滑澤、蒼白色トナル。

顯微鏡的ニハ 1. 濾胞中最モ強ク犯サレ就中卵細胞ハ最も鋭敏ニシテ、成熟ニ近キ濾胞及ビ「グラフ」氏濾胞ノ顆粒上皮之ニ次ギ、原始濾胞ノ上皮細胞最も抵抗性ヲ有ス。2. 胚上皮細胞ハ變性ニ陥ル事アルモ恒常的ナラズ。一般ニ脱落多シ。3. 血管ニハ選擇的ニ作用スルト認メズ。4. 間質細胞、黃體ニハ特別ノ變化ナシ。

3. 「デアテルミー」ノ卵巣ニ及ボス作用ハ川添、堤寛一兩氏ニ據レバ卵巣實質、間質ニ全般の充血ヲ起シ高溫度ヲ持續的ニ作用セシムル時ハ濾胞ノ萎縮及ビ壞死ヲ起スモ濾胞ニ選擇的ニ作用セズ。

第 2 節 X 線放射ノ自己實驗成績ノ概要

X線ノ爲メ卵巣ニ起ル變化ニ就テハ幾多ノ業績發表セラレ完成ノ域ニ達シタリト雖モ之ヲ確ムル爲メ放射實驗ヲ行ヒタルニ略ボ前述ト同様ノ結果ヲ見タリ。

放射ハ家兎ヲ背位ニ固定シ腹壁ヨリ放射セント欲スル側ノ卵巣ヲ中心トシ他側卵巣及ビ周圍ノ臟器ハ鉛「ゴム」ニテ被護ス。

放射方法ハ次ノ如シ。

機 械：Neosymmetric.

管 球：Coolidge H 型。

電 壓：110 Volt.

二次電壓：180 K. V.

管球電流：2 m. A.

波 長：0.085 Å.E.

濾 過：Zn. 0.5 mm. Aluminium 3 mm.

放射量 (HED.) 以下記ス放射量ハ深部量ヲ示ス。

(1) 動物番號：Nr. X, 10

放射量 20% HED. 右卵巣、放射後ノ經過日數 1 日、放射前體重 1720 g, 屠殺時體重 1550 g.

放射側卵巣ノ肉眼的の所見

容積.	長サ	幅	厚
放射側	1.5 cm	0.5 cm	0.3 cm
對照側	1.1 cm	0.4 cm	0.3 cm

色澤。放射側ハ稍々貧血性。

表面。硬度。左右異ナラズ。

放射側卵巣ノ顯微鏡的の所見

左右變化ヲ認メズ。

(2) 動物番號：Nr. X, 11

放射量 20% HED. 右卵巣、放射後ノ經過日數 2 日、放射前體重 1780 g, 屠殺時體重 1730 g.

放射側卵巣ノ肉眼的の所見

容積・	長さ	幅	厚
放射側	1.0 cm	0.4 cm	0.2 cm
對照側	1.0 cm	0.4 cm	0.3 cm

色澤. 放射側ハ對照側ヨリ蒼白色ナリ.

表面. 硬度. 左右同ジ.

放射側卵巣ノ顯微鏡の所見

左右差異ヲ認メズ.

(3) 動物番號: Nr. X, 12

放射量 20% HED. 右卵巣, 放射後ノ經過日數 3 日, 放射前體重 1960 g, 屠殺時體重 1960 g.

放射側卵巣ノ肉眼の所見

容積・	長さ	幅	厚
放射側	1.3 cm	0.5 cm	0.3 cm
對照側	1.5 cm	0.5 cm	0.4 cm

色澤. 變化ナシ.

表面. 放射側ハ大臙胞減少シ表面ノ突隆對照側ニ比シテ減ズ.

硬度. 左右異ナル事ナシ.

放射側卵巣ノ顯微鏡の所見

イ. 胚上皮細胞. 大部分附着セルモ硝子様變性ニ陥リ其ノ中ニ少數ノ扁平ナル變形核散在セル部ト, 核ノ染色力減退セル他著シキ變化ヲ認メザル所トヲ見ル.

ロ. 白膜. 異常ナシ.

ハ. 臙胞. 大臙胞及ビ原始臙胞著シク減數シ殘留セルモノモ大部分充填性閉鎖臙胞トナレリ. 閉鎖臙胞ハ生理的ニ閉鎖セルモノト殆ド差異ナク, 内夾膜細胞ノ増殖肥厚アリ. 顆粒細胞モ又各種程度ノ變性ヲ示シ殊ニ内層ハ變化著シク生理的臙胞變性現象ト同様ノ狀ヲ呈セリ.

ニ. 間質細胞. 細胞ハ萎縮シ原形質減量シ細胞多角形トナリ境界不明ナリ. 或ハ細胞ハ互ニ融合シ核ノ變性, 空胞形成ヲ見ル.

ホ. 間質結締織. 變化ナシ.

ヘ. 血管. 變化ナシ.

卵巣ノ容積ハ臙胞ノ消滅, 間質細胞ノ萎縮ニ由テ減少セリ.

(4) 動物番號: Nr. X, 13

放射量 20% HED. 右卵巣, 放射後ノ經過日數 5 日, 放射前體重 1930 g, 屠殺時體重 2060 g.

放射側卵巣ノ肉眼の所見

容積・	長さ	幅	厚
放射側	1.5 cm	0.4 cm	0.3 cm
對照側	1.5 cm	0.5 cm	0.5 cm

色澤. 放射側ハ貧血性蒼白ヲ呈ス.

表面. 成熟臙胞減少シ突隆ヲ減ズ.

硬度. 變化ナシ.

放射側卵巣ノ顯微鏡の所見

イ. 胚上皮細胞. 大部分ハ附着シー部ハ脱落セリ. 全般ニ互リ核ハ減數シ殘留セルモノハ染色力減退シ扁平ニ變形セリ.

ロ. 白膜. 變化ナシ.

ハ. 臙胞. 原始臙胞, 小臙胞著シク其ノ數ヲ減ジ, 成熟臙胞モ又減少セリ. 殘存セル原始臙胞ハ殆ド全部變性セル卵ヲ有シ且臙胞上皮モ變性セルモノ多シ. 中及ビ小臙胞ノ卵ハ變性セルモノ其ノ臙胞上皮ハ健康ナルカ或ハ變性輕微ナリ. 大臙胞ノ卵及ビ顆粒細胞ハ共ニ變性セルモノ對照側ノ變性臙胞ニ比シテ變性狀態ニ差異ヲ認メズ. 内夾膜細胞ハ増殖肥厚シ外側ヨリ次第ニ間質細胞ニ分化移行セルヲ見ル.

ニ. 間質細胞. 對照側ニ比シテ變化ヲ認メズ.

ホ. 間質結締織. 變化ナシ.

ヘ. 血管. 對照側ハ血管ニ血球ヲ充滿シ充血ノ狀態ヲ呈スルモ放射側ハ寧ロ貧血性ナリ.

(5) 動物番號: Nr. X, 9

放射量 20% HED. 右卵巣, 放射後ノ經過日數 7 日, 放射前體重 1690 g, 屠殺時體重 1570 g.

放射側卵巣ノ肉眼の所見

容積・	長さ	幅	厚
放射側	1.3 cm	0.4 cm	0.2 cm
對照側	1.3 cm	0.4 cm	0.3 cm

色澤、表面、硬度、變化ナシ。

放射側卵巢ノ顯微鏡的所見

イ。胚上皮細胞、大部分變性セリ、之ニ反シテ對照側ニテハ大部分脱落セルモ附着殘存セルモノハ健康ナリ。

ロ。白膜、變化ナシ。

ハ。濾胞、原始濾胞及ビ小濾胞ハ對照側ニ比シテ著シク其ノ數ヲ減ジ殘餘ノモノモ多クハ變性セル卵ヲ有ス。大濾胞ハ寧ロ放射側ニ於テ其ノ數多ク、其ノ卵及ビ顆粒細胞ハ變性セリ。然レドモ成熟濾胞ノ變性現象ハ生理的變性ニ比シテ差異ヲ認メズ。

ニ。間質細胞、發育ハ對照側ニ比シテ著シク劣リ個々ノ細胞ニ就テ變化ヲ認メズ。

ホ。間質結締織、變化ヲ認メズ。

ヘ。血管、充血セリ。サレド對照側ニ於テモ充血セルヲ見ルヲ以テ週期的卵巢變化ノ現象ト認ム。

(6) 動物番號: Nr. X, 6

放射量 20% HED. 右卵巢、放射後ノ經過日數 14 日、放射前體重 1930 g, 屠殺時體重 1500 g.

放射側卵巢ノ肉眼的所見

容積.	長さ	幅	厚
放射側	1.3 cm	0.4 cm	0.3 cm
對照側	1.3 cm	0.3 cm	0.3 cm

色澤、表面、硬度、左右差異ヲ認メズ。

放射側卵巢ノ顯微鏡的所見

イ。胚上皮、大部分脱落セルモ附着殘存セル部ハ健康ナリ。但僅ニ核ノ染色減退セル所アリ。

ロ。白膜、變化ナシ。

ハ。濾胞、原始濾胞ハ全部消失シ其ノ痕跡トシテ所々ニ圓形ノ小空隙ヲ見ル。小濾胞モ著シク數ヲ減ジ殘レルモノモ卵ノ變性、濾胞上皮ノ染色力減退、「クロマチン」ノ減少、Karyorrhexis, Karyolyse 等ヲ示セリ。成熟濾胞モ殆ド全部消失シ好「エオジン」性物質塊ノミ表層及ビ深層ニ互リ多數散在セリ。殘留セル少數ノ閉鎖濾胞ハ變性セル顆粒細胞ヲ有シ生理

的ノモノト異リタル所ナシ。但内夾膜細胞ノ染色力減退、増殖肥厚ノ停止ヲ見ル。

ニ。間質細胞、發育對照側ニ比シテ著シク劣リ、變性シテ數箇互ニ融合シ核モ縮小、變形, Karyorrhexis, Karyolyse, 脱出、消失ノ現象ヲ示セリ。但原形質顆粒ニハ變化ナシ。

ホ。間質結締織、變化ナシ。

ヘ。血管、變化ナシ。

(7) 動物番號: Nr. X, 7

放射量 20% HED. 右卵巢、放射後ノ經過日數 21 日、放射前體重 1550 g, 屠殺時體重 1600 g.

放射側卵巢ノ肉眼的所見

容積.	長さ	幅	厚
放射側	1.2 cm	0.4 cm	0.2 cm
對照側	1.2 cm	0.4 cm	0.4 cm

色澤、右側ハ左側ニ比シテ著シク蒼白色ナリ。

表面、硬度、左右同シ。

放射側卵巢ノ顯微鏡的所見

イ。胚上皮、變化ナシ。

ロ。白膜、變化ナシ。

ハ。濾胞、原始濾胞著シク減少シ、小濾胞次デ成熟濾胞モ著シク數ヲ減ゼリ。小濾胞ノ殘存セルモノ卵ハ變性セルモ濾胞上皮ハ抵抗強ク健康ナリ。成熟濾胞ノ殘留セルモノハ何レモ變性シ内夾膜細胞ハ對照側ノ變性濾胞ノ如ク増殖肥厚著シカラズ。又間質細胞ニ分化スル狀態ヲ見ズ。而シテ深層及ビ表層ニ多數ノ好「エオジン」性無構造質塊ヲ見ル。

ニ。間質細胞、萎縮シ互ニ融合セルモノアリ。核ハ一般ニ縮小シ Pyknose, Karyorrhexis ニ陥ル。

ホ。間質結締織、變化ヲ認メズ。

ヘ。血管、變化ヲ認メズ。

(8) 動物番號: Nr. X, 8

放射量 20% HED. 右卵巢、放射後ノ經過日數 28 日、放射前體重 1550 g, 屠殺時體重 1740 g.

放射側卵巣ノ肉眼の所見

容積.	長さ	幅	厚
放射側	1.2 cm	0.4 cm	0.1 cm
對照側	1.0 cm	0.4 cm	0.2 cm

色澤. 表面. 硬度. 變化ナシ.

放射側卵巣ノ顯微鏡の所見

イ. 胚上皮. 變性融合シ或ハ扁平トナリ硝子樣變性ニ陥ル. 核モ一部消失シ一部ハ扁平ニ變形シ散在セリ.

ロ. 白膜. 變化ナシ.

ハ. 濾胞. 原始濾胞ハ著シク減數シ中及ビ成熟濾胞モ對照側ニ比シテ著シク其ノ數ヲ減ゼリ. 變性濾胞多ク其ノ内夾膜細胞ハ萎縮シ増殖. 間質細胞形成ヲ見ズ. 形態モ扁平トナリ核ハ紡錘狀ニ變形シ恰モ結締組織細胞ノ如キ狀ヲ呈セリ. Pyknose, Karyorrhexis, Karyolyse ニ陥ルモノ極メテ稀ナリ.

ニ. 間質細胞. 全體ノ發育對照側ニ比シテ著シク劣リ細胞及ビ核ハ縮小シ且數多ノ核ハ變形. Pyknose, Karyorrhexis, Karyolyse, 消失. 空胞形成等ヲ示セリ. 但細胞原形質中ノ顆粒ニハ變化ナシ. 亦細胞互ニ融合シ無構造ノ好「エオジン」性トナリ其ノ中ニ少數ノ散在性變性核ヲ有スル部アリ.

ホ. 間質結締組織. 變化ナシ.

ヘ. 血管. 中膜ノ肥厚アリ. サレド對照側ニモ之ヲ見ル.

(9) 動物番號: Nr. X, 14

放射量 60% HED. 右卵巣. 放射後ノ經過日數 14 日. 放射前體重 1750 g, 屠殺時體重 2070 g.

放射側卵巣ノ肉眼の所見

容積.	長さ	幅	厚
放射側	1.3 cm	0.4 cm	0.2 cm
對照側	1.5 cm	0.5 cm	0.4 cm

色澤. 右側ハ著シク蒼白貧血性ナリ.

表面. 大濾胞減ジ表面突隆消失シテ平滑トナル.

硬度. 左右差異ヲ認メズ.

放射側卵巣ノ顯微鏡の所見

イ. 胚上皮. 一部分脱落シ大畧分ハ附着セルモ變性セリ. サレド陰極線放射ニ於ケル如ク細胞ノ原形ヲ失フ如キ著變ナク核ハ一般ニ Pyknotisch ナリ.

ロ. 白膜. 變化ナシ.

ハ. 濾胞. 原始濾胞ハ大部分消失シ成熟濾胞モ全部消失シ深部ニハ多數ノ好「エオジン」性無構造物質塊ヲ見ル. 小濾胞ハ極メテ少數ニシテ其ノ卵ハ變性シ濾胞上皮ハ多ク健康ナルモ排列紊亂シ Karyolyse ニ陥レルヲ見ル.

ニ. 間質細胞. 輕度ノ變性ヲ見ルモ對照側ニモ同様ノ變性ヲ見ル.

ホ. 間質結締組織. 變化ナシ.

ヘ. 血管. 内膜ハ變性シ管壁肥原セリ.

(10) 動物番號: Nr. X, 15

放射量 80% HED. 右卵巣. 放射後ノ經過日數 14 日. 放射前體重 1680 g, 屠殺時體重 1650 g.

放射側卵巣ノ肉眼の所見

容積.	長さ	幅	厚
放射側	1.5 cm	0.5 cm	0.4 cm
對照側	1.5 cm	0.5 cm	0.5 cm

色澤. 右側ハ稍々貧血性ナリ.

表面. 硬度. 變化ヲ認メズ.

放射側卵巣ノ顯微鏡の所見

イ. 胚上皮. 大部分ハ附着セルモ變性セリ. 即チ細胞ハ萎縮シテ散子形乃至扁平トナリ. 核モ縮小シ多角形乃至扁平トナリ. Pyknose 或ハ Karyolyse ニ陥レルヲ見ル. 然レドモ陰極線放射ノ場合ノ如ク激シカラズ.

ロ. 白膜. 變化ナシ.

ハ. 濾胞. 原始濾胞ハ對照側ニ比シテ其ノ數約半トナリ殘レルモノモ大部分卵及ビ濾胞上皮變性ヲ示セリ. 小濾胞ノ卵ハ變性シ其ノ濾胞上皮細胞ハ排列紊亂シ變形シ核ハ縮小シ. Pyknose 或ハ Karyolyse ニ陥レルモノ一般ニ抵抗強ク變性ノ程度ハ成熟濾胞ノ

顆粒細胞ヨリ輕度ナリ。中臚胞ノ卵細胞モ變性シ其ノ臚胞上皮ハ融合、排列紊亂、核ノ變位、脫出、萎縮、膨大、變形、Pyknose Karyolyse等ノ現象ヲ示シ其ノ一部ハ變性セル卵ト融合シテ凝縮シ臚胞ノ結構織ヨリ剝離セリ。成熟臚胞ハ少數ニシテ其ノ顆粒細胞ハ内層外層共ニ變性シ一般ニ染色力減退シKaryolyseヲ示セリ。内夾膜細胞ハ増殖セズシテ一般ニ萎縮シ其ノ核モ又萎縮シ橢圓形乃至紡錘狀トナリ結構織細胞ニ類似セル狀ヲ呈ス。

ニ。間質細胞。幼若型ノモノハ成熟型ニ比シテ變性高度ニシテ細胞、核ノ縮小、核ノ變形、染色力減退、Karyorrhexis, Karyolyse等ヲ示ス。但原形質ノ顆粒ニハ變化ナシ。

ホ。黃體。細胞及ビ核ノ萎縮アルモ變性ノ程度極メテ輕微ナリ。

ヘ。間質組織。變化ナシ。

ト。血管。内膜ハ變性シ中膜ハ肥厚セリ。

第3節 陰極線及ビX線ニヨル被放射卵巣ノ所見比較

臚胞組織

X線陰極線共ニ卵巣組織ニ及ボス影響中臚胞ノ變化ハ其ノ主ナルモノニシテ何レモ臚胞ノ變性減數ヲ來ス。X線ノ變化ノ絶頂ヲ検査スル時ハ陰極線放射ノ爲メニ起ル變化ト種々ノ點ニ於テ同様ノ狀ヲ呈スルモ其ノ經過及ビ臚胞各部ノ變化ヲ詳細ニ比較スル時ハ其ノ間ニ明瞭ナル差異ヲ認メ得ベシ。

1. 潜伏期

臚胞ガ照射後變性減數ヲ現ス迄ノ潜伏期ハ陰極線ニテハ短クX線ニテハ長ク前者ニアリテハ既ニ翌日ニテ著シキ變化ヲ起シ臚胞ハ著シク減數變性シ充填性閉鎖臚胞ノ數ヲ増ス。

2. 消滅ノ遲速ニ關スル各種臚胞ノ順序

極陰線ノ場合ニハ次ノ如シ。

成熟臚胞—中臚胞—小臚胞—原始臚胞

X線ノ場合ニハ分化程度ノ低キモノヨリ犯サレ次ノ順序ニ變性起ル。

原始臚胞—小、中臚胞—成熟臚胞

X線ノ場合ニハ原始臚胞、小臚胞ハ成熟臚胞ニ比シテ感度強ク、最早ク變性減數ヲ來スモ其ノ全部ガ消滅スル迄ノ經過ヲ注視スル時ハ成熟臚胞最早ク消滅シ或ハ變性臚胞トナル。原始臚胞及ビ小臚胞ハ一部ハ最モ長ク存在シ比較的大量放射後ニテモ卵

巢内ニ原始臚胞、小臚胞ノ若干ヲ見ルモノトス。

3. 成熟臚胞ノ各部ノ變化ニ就テ

陰極線或ハX線ヲ放射シタル場合ニ毎ニ先ヅ卵細胞犯サレ次デ臚胞上皮ノ變性ヲ來スヲ見ル。然レドモ臚胞各成分ニ起ル變性現象ニ於テX線ト陰極線トノ間ニ次記諸點ノ相違アリ。

イ。顆粒膜ノ變性狀態ハX線ニアリテハ生理的閉鎖臚胞ニ於ケル如ク内層最モ高度ニシテ、外層ニ至ルニ從ヒ輕度トナル。之ニ反シテ陰極線ニテハ内層外層共ニ一様ニ激シキ變性ニ陥リ、加之、時トシテ外層ハ内層ヨリモ變性高度ナル事アリ。且全體トシテ陰極線放射ノ場合ハX線放射ニ於ケルヨリ變性激シク顆粒細胞ハ一様ニKaryolyse, 融合, 崩壊等ニ陥リ其ノ原形ヲ失ヒ不規則網狀物ヲ形成スルヲ見ル。

ロ。内夾膜細胞。X線放射ニヨル變性臚胞ヲ檢スルニ初期ニハ内夾膜細胞ハ生理的閉鎖臚胞ニ於ケル如ク増殖シ内夾膜層ハ肥厚シ外層ノモノハ間質細胞ニ變ズルヲ見、放射後14日目ニ及ベバ僅ニ細胞ノ萎縮、變形、増殖停止アリ。然レドモ内夾膜細胞ノ變性度ハX線放射量ニ比例セズ。可成大量ノ放射後ニテモ少量放射後ト大差ナク比較的輕微ナリ。陰極線ヲ作用セシメタル時ハ内夾膜細胞ニ急激ナル變性ヲ起スモノニシテ30分放射ニテ既ニ3日目ニ細胞ノ

増殖停止シ可成激シキ變性表ハレ、60 分放射後 28 日目ニハ内夾膜細胞ハ膿胞ノ他部ト共ニ壞死セルヲ見ル

間質

間質ハX線ニ對シテ比較的抵抗強ク放射後 7 日以内ニテハ反テ對照側ヨリモ發育良好ナルヲ見ル。然レドモ放射後 14 日以上ヲ經過スル時ハ間質細胞ニモ變性表ハレ置々萎縮變形、融合、核ノ染色力減退、縮小、Pyknose, Karyorrhexis, Karyolyse 等ヲ示ス。以後更ニ核ノ消失減少シ、廣汎部ニ互リ細胞ハ互ニ融合シ網狀物ヲ形成スルヲ見ル。然レドモ變性度ハ大體ニ於テ陰極線放射ノ場合ヨリモ輕度ニシテ Nekrose ノ如キハ極メテ罕ナルニ反シ陰極線ハ小規模裝置ニテ放射スルモ屢々高度ノ變性壞死ヲ起サシメ 60 分放射後 28 日目ニハ全間質細胞ヲ死滅壞死ニ陥ラシムルニ反シX線ニテハ可成大量放射後ニテモ變性度ハ輕度ニシテ少量放射ノ場合ト大差ナキヲ見ル。

黃體細胞

極メテ抵抗強クX線ニテハ影響ヲ認メズ。陰極線放射ノ場合モ容易ニ變性ヲ呈セズ。然レドモ 60 分放射後 21 日目ニハ細胞ノ萎縮及ビ高度ナル壞死脂肪變性等ヲ見ル。

結締組織

間質結締組織中ノ血管ハX線放射後ニハ最初ヨリ收縮シ貧血ヲ來スモ、陰極線放射後 1 乃至 3 日間ニハ擴張シ充血ヲ呈ス。其ノ他殆ト常ニ血管壁破壞シテ髓質、皮質、表層ノ白膜内ノ所々ニ大小多數ノ出血ヲ起スモノトス。之ニ反シX線放射ニテハ大量放射後ニモ血管ノ擴張、充血、破壞、出血ノ如キ激烈ナル變化ヲ認ムル事ナシ。而シテ陰極線放射後ニハ後ニハ血管壁變性肥厚シ管腔ノ狹窄或ハ閉鎖ヲ來スヲ見ル。

元來結締組織ハ卵巣中最強ノ抵抗カヲ有シ卵巣ノ他

部ハ陰極線ニ由テ激シク破壞サルルニ拘ラズ結締組織ノミハ其ノ變化極メテ輕微ナル事多シ。然レドモ強放射後ニハ白膜及ビ間質ノ結締組織モ Nekrose ニ陥ル事アリ。概シテ陰極線ニ對スル結締組織ノ反應ハ主トシテ二次的炎症性増殖ニシテ一次的ノ退行變性ニ陥ルハ稀ニ見ル所ナリ。而シテ強放射ニテハ一時表層結締組織ノ Nekrose ヲ起ス時ニモ後ニハ結締組織ノ強キ再生増殖ヲ起シ全卵巣ヲ瘢痕化セシムルモノトス。之ニ反シテX線放射後ニハ炎症反應ニ由テ結締組織増殖ヲ起ス事ナク、又結締組織ノ退行變性ヲ全然見タル事ナシ。陰極線放射後 21 日乃至 28 日目ニハ組織球ノ出現ヲ見ルモX線ノ場合ニハ斯カル事ナシ。

透過力及ビ作用強弱ノ比較

X 線ハ透過力強キガ故ニ組織ヲシテ廣ク殆ト平等ニ徐々ニ變性ニ陥ラシムルモ陰極線ニテハ深達力弱ク變化ハ部分的ナリ。故ニ其ノ強放射ニテハ卵巣ノ如キ小臟器ハ殆ト全組織ニ變性ヲ起スモ弱放射ニテハ放射ニ遠キ部ト近キ部トニヨリ著シキ懸隔アリテ甲部ニ於テハ最も Radiosensibilität 強キ膿胞ト雖モ變化弱ク且多數殘存セルヲ見ル。斯クノ如ク陰極線ノ作用ハX線ノ深達的且漸進的ナルニ反シ爆發的ニシテ其ノ破壞作用ハX線ニ比シテ遙ニ激烈ナリ。故ニ組織ハ極メテ強度ノ變性ヲ起スモノトス。

感受性

X 線ニ對スル感受性ハ卵巣内各部門ニ著シキ懸隔アリ。陰極線ニ對シテモ各部ノ感度ニ強弱アリテ從テ變性消滅ニ遲速アリト雖モ其ノ差タルヤX線ノ場合ニ比シテ甚ダ僅少ナリ。即チ最も抵抗強キ結締組織ト雖モ陰極線ヲ強ク放射スル時ハ、Nekrose ニ陥ルモノニシテ同線ハ卵巣内各組織ヲ殆ト平等ニ犯スガ如キ性質ヲ有ス。之ニ反シX線ニハ選擇的作用アリテ、殆ト選擇的ニ作用セザル陰極線ト此點ニ於テ大差アルヲ見ル。

第4節 考 按

第1項 陰極線及ビX線ノ深達力比較

X線ノ深達力大ナル事ハ周知ノ事實ニシテ茲ニ贅言ヲ要セズ。之ニ反シテ陰極線ノ吸收率大ナル事ハ Lenard, Crook 等ニヨリ同線ノ重要ナルノ理學の性質ト見做サルモノニシテ管外ニ出ヅルモノ其ノ深達力ハX線ニ比シテ極メテ小ナル事論ヲ俟タズ。Guyer, M. F. Farrington Daniels ハ陰極線ノ透過力ハ高々0.5 mm ナリト云ヒ、Pauli, Hartmann, Grober, Baensch, Passow, 本城氏等ノ實驗モ同様ノ事實ヲ立證セリ。本實驗ニ於テモ陰極線深達力ノ極メテ小ナル事ヲ確メタルガ卵巢ノ如キ小臓器ニ於テハ強放射後ニハ全部殆ド一様ニ障礙ヲ受クルト雖モ少量放射後ニハ深層及ビ放射側ニ反對セル部ニハ變化極メテ弱キカ或ハ全ク之ヲ認メザルヲ常トス。臙胞ノ如キ感受性極メテ強キモノト雖モ放射部ニ遠カレル所ニ於テハ變化ハ極メテ輕微ナルヲ見ル。

第2項 陰極線及ビX線ノ作用ノ強弱

陰極線ハX線ニ比シテ破壊作用著シク且急激ナリ。

1. 潜伏期

臙胞ハ Radiosensibilität 極メテ大ナルニモ拘ラズX線ニ對シテハ相當ノ潜伏期ヲ示スト雖モ陰極線ニ對シテハ潜伏期ノ極メテ短キ事ハ既ニ先人ノ言ヘルガ如シ。

2. 臙胞組織

感受性最も強キ臙胞ノX線放射後ニ顯ス變性現象ハ殆ド生理的臙胞ノ變性ト異ナル所ナク同様ニ起ルモノニシテ放射後短時日内ニテハ内夾膜細胞ハ増殖肥大スルヲ見ル。然レドモ一定ノ時日ヲ經過スル時ハ同細胞ハ輕度ノ變性ヲ起シ其ノ増殖ハ停止ス。然ルニ陰極線ニテハ放射後翌日臙胞ノ變性消滅ヲ來シ、内夾膜細胞又著シキ障礙ヲ受ケ、顆粒細胞ノ變性ハ生理的閉鎖臙胞及ビX線放射變性臙胞ノモノト比較シテ著シク急激ニシテ顆粒膜ノ全層一般ニ激シキ變化ヲ起シ Karyolyse = 陥リ細胞融合シ無構造網狀物トナルヲ見ル。

3. 間質細胞

X線放射後時トシテ Nekrose = 陥ルモ概シテ變性ノ度ハ陰極線放射後ニ比シ極メテ輕微ニシテ Nekrose = 陥ル頻度モ頗ル稀ナリ。反之、陰極線ニテハ少量放射後ニモ屢々表層ノ間質細胞ノ廣汎ナル範圍ニ於テ壞死ニ陥リ殊ニ大量放射後ニハ完全ニ全細胞ノ壞死ヲ來スヲ見ル。

4. 黃體細胞

X線ニテハ殆ド變化ナキモ陰極線ニテハ廣汎ナル範圍ニ於テ脂肪變性、壞死ニ陥ル事アリ。

5. 結締組織

X線ニテハ結締組織ハ何等ノ變化ヲ示サズ、血管ハ最初ヨリ貧血性ナリ。陰極線ニテハ表層ノ結締組織ニ退行變性ヲ起シ且壞死ヲ起ス事アリ。サレド陰極線放射後ニ起ル結締組織ノ變化ハ主ト

シテ増殖ニシテ、表層ハ變性壞死ニ陥ルモ深層ハ炎症性反應ヲ起シ血管ノ擴張、充血、出血ニ次デ著シキ増殖ヲ起ス。既ニ變性壞死ニ陥リタル所モ結締組織再生シテ癰痕形成サレ終ニハ全卵巣ハ癰痕化スルニ至ル。

第 3 項 陰極線及ビ X 線ノ生物的作用ノ本態

X 線ノ生物的作用ノ本態

X 線ハ陰極線ガ高速度ニ對陰極ニ衝突シ突然其ノ運動ヲ停止スルニ由テ對陰極ヲ構成セル物質原子内電子ニ急激ナル變動ヲ起シ其ノ際起ル電磁的波動ガ「エーテル」ニ傳リ起ルモノトス。其ノ生物ニ對スル作用ノ本態ニ就テハ次ノ如キ種々ノ學說假說アルモ何レモ正鵠ヲ得タル説明ニアラズ。

1. Lecithin hypothese, Schwarz u. Werner.
2. Fermentabtötung u. Autolyse, Neuberg.
3. Entstehung besonderer Toxine, Linser u. Helber.
4. Physikalisch-chemische Änderung der Plasmahaut-colloid u. Stoffwechselstörung, Hertwig, Lewy, Bohn, Bardeen.
5. Punktwärmethorie, Dessauer.

陰極線ノ生物ニ對スル作用ノ本態

如何ナル physikalisch-chemische Wirkung ニ基クモノナルヤハ X 線ニ於ケルト同ジク不明ニシテ且之ニ關スル文獻モ之ヲ見ズ。サレド其ノ理學の性質ヨリ推シ考究スレバ陰極線ハ陰電荷ヲ有スル電子ノ飛行ニシテ、靜電場及ビ磁場ニ於テ曲折セラルル外常ニ直行シ衝突シタル物質内ニ電離作用ヲ起スモノナリ。陰極線ハ光線ノ如ク反射、屈折、干涉等ノ現象ナシ。電子ノ質量ハ $9 \times 10^{-28} \text{g}$ ナリ。電子 1 箇ノ電荷ハ靜電單位ニテ 4.77×10^{-10} ナリ。而シテ管外陰極線ノ速度ハ 6 Volt ノ電源ニテ 1500 Km/Sek ナリ。陰極線ハ生物的作用及ビ理學的作用ニ於テ Radium β 線ニ相似タル所アリ。即チ Radium β 線ハ磁石ニヨリ屈折セラレテ γ 線ヨリ分離スル事、吸收率ノ大ナル事 (0.5 mm ノ鉛板ニテ完全ニ吸收セラル) 等ナリ。而シテ Radium β 線ノ速度ハ 250000 Km/Sek ニシテ同速度ノ陰極線ハ 100 乃至 350 K.V. ニヨリテ生ズルト云フ (Pauli u. Knipping.)

陰極線ヲ組織ニ放射シタル際ニ次記ノ諸現象ガ顯ル。

1. Primäre Röntgenstrahlen.

陰極線ガ陰極ヨリ放射スル際對陰極ノ障子壁ニ衝突シテ茲ヨリ X 線ヲ發生ス。

2. 組織ニ吸收セラレテ熱ヲ發生ス。
3. 吸收セラレタル組織ヨリ X 線ヲ發生ス。
4. 吸收セラレタル組織ヨリ同時ニ二次的陰極線ヲ發生ス。
5. 吸收セラレタル組織ニ化學的作用ヲ及ボシ之ヲ破壊ス。

6. 電離作用.

第1ノ發生スル陰極線トX線トノ量的比例ニ就キ W. Baensch u. R. Finsterbusch (1929) ハ Coolige'sche Kathodenröhre ヨリ射出スル陰極線及ビX線ヲ Ionometer ニテ計リタルニ陰極線ハ其ノ 89—93% ヲ占有スル事ヲ證明シ、又 Walter, Schäfer, Ernst Witte (1930) ハ Lenard'sche Röhre ニテ同ジク Ionometer ニテ計リタルニ X線對陰極線ノ比ハ 11.1% 對 88.9% ナリト云ヘリ。本城氏ノ使用セラレタル管球ニテモ X線ハ極メテ微量ニシテ乾板ノ感應度ハ X線管ニ比シテ非常ニ低キ事ヲ立證セリ。余ノ成績モ殆ド之ト同ジ。故ニ假ニ X線ヲ陰極線中ニ含ムトスルモ其ノ作用ハ殆ド度外視シ得ルモノトス。

次ニ陰極線ガ組織ニ吸收セラレタル際熱ヲ發生シ被放射組織ノ溫度ヲ高メ爲ニ變性ヲ起スヤニ就キ考量スルニ、Pauli u. Grober ノ數量的計算ニ據レバ陰極線ヨリ生ズル熱「エネルギー」ハ極メテ微量ニシテ顧慮スルニ足ラズト。余ガ實驗ニ於テモ被放射組織ヲ管端ヨリ 2 cm ノ距離ニテ照射スル時ハ同組織ノ溫度ハ家兎ノ常溫ヨリ上昇スル事ナカリキ。

第3ノ組織中ニ陰極線ガ吸收セラレテ X線ヲ發生スル事ハ理論上肯定スベキモ該X線ハ甚ダ少量且軟ニシテ決シテ廣範圍ニ顯著ノ作用ヲ及ボス事ナシ。殊ニ余ガ使用シタルガ如キ小規模裝置ニシテ低キ電壓ヲ用ヒシ場合ニハ全ク之ヲ慮外視スル事ヲ得。故ニ陰極線ヲ放射シテ表ハルル破壊作用ハ主トシテ同線ノ作用ニヨルモノニシテ之ニ由テ被放射組織中ニ電離作用ヲ起シ生體組織ニ physikalisch-chemische Wirkung ヲ及ボスモノト推定ス。

Pauli, Knipping ニ據レバ陰極線ノ深達力ハ 0.5 mm ヲ越サズト云フモ余ノ實驗ニ於テハ比較的卵巢ノ深部ニモ變性ヲ起セルヲ見タリ是レ1ツハ二次的陰極線ノ發生ニ基クナラン。陰極線ハ極メテ小ナル電源ヲ以テ發生セシムルモ其ノ破壊作用激烈ニシテ X線, 「ジアテルミー」ノ比ニ非ザル事ハ實驗ノ示ス所ニシテ、且先人ノ業績ト一致スル所ナリ。Dorn u. Wien ニ據レバ X線放射ノ際陰極線ノ全「エネルギー」ノ $\frac{1}{1000}$ ガ X線トナリ殘餘ノ「エネルギー」ハ一部熱「エネルギー」ニ變換シ更ニ X線ハ大部分硝子、濾過板ニ吸收セラレ減量スト。Pauli ノ計算ニヨレバ X線ハ其ノ原「エネルギー」ナル陰極線ヨリ 400 萬分ノ 1 弱「エネルギー」ヲ有スルモノニシテ從テ其ノ原因タル陰極線ヲ用レバ 400 萬倍強キ作用ヲ被放射組織ニ及ボスト。サレド陰極線ト X線トノ作用ノ相違ハ單ニ放射「エネルギー」ノ多寡ヲ以テノミ説明スル事能ハズ。互ニ其ノ本態ニ相違アル事ハ實驗成績ノ示スガ如ク、陰極線ノ作用ニ關シテハ上述ノ如ク略物理學的ニ説明シ得ルモ、X線ノ作用ニ關シテハ未ダ闡明セザル所アリ。故ニ兩者ノ生物的作用ノ差異モ根本的ニ之ヲ説明シ能ハザルナリ。

第7章 總括的結論

1. 陰極線ヲ以テ成熟家兎ノ卵巢ヲ直接放射スル時ハ臙胞、胚上皮細胞、間質細胞、黃體、結締組織ニ變化ヲ起ス。但其ノ作用ハ限局的ナリ。

2. 臌胞、間質細胞、黃體、胚上皮細胞ノ變化ハ退行變性ニシテ甚ダシキ時ハ Nekrose ニ陥ル事アリ。換言スレバ陰極線ハ之等ノ部ニ破壞作用ヲ及ボスモノナリ。

3. 結締織中白膜及ビ表層間質結締織ハ變性壞死ニ陥リ、深層皮質及ビ髓質中ノ結締織ハ初期ニハ反應の増殖ヲ起シ後ニモ間質細胞及ビ臌胞ノ壞死或ハ萎縮ト共ニ著シク増殖シ瘢痕組織ヲ形成ス。

4. 血管ハ放射後擴張充血シ所々破壞シ出血ス。

5. 卵巣中陰極線ニヨリ犯サレ易キモノヨリ抵抗強キモノヲ順次ニ列舉スレバ次ノ如シ。

胚上皮細胞—成熟臌胞—中、小臌胞—原姓臌胞—血管—間質細胞—黃體—結締織

6. 陰極線及ビ X 線ノ成熟家兎卵巣ニ及ボス作用ヲ比較スレバ次ノ如キ差異アリ。

イ. 陰極線ニ基ク變化ハ放射後比較的迅速ニ表ハレドモ、X 線ニ基ク變化ニハ一定ノ潜伏期後初メテ現出ス。而シテ陰極線ノ作用ハ X 線ノモノニ比スレバ遙ニ急速ニ現ルルノミナラズ、照射部ニ著シク激烈ナル作用ヲ呈スルモノトス。

ロ. 卵巣中 X 線ニ由テ犯サレ易キモノヨリ抵抗強キモノヲ列記スレバ

原始臌胞—中臌胞—成熟臌胞—間質細胞—血管—胚上皮細胞—黃體

即チ陰極線ハ分化シタル成熟臌胞ヲ先ヅ犯スニ反シ、X 線ハ最モ分化セザル原始臌胞ヲ先ヅ犯スノ差アリ。且成熟臌胞ノ内夾膜細胞ハ X 線ニ由リテ殆ド變化ヲ受ケズ。放射後數日ヲ經過シタル後只輕度ノ變性萎縮ニ陥ルニ過ギズシテ而モ其ノ度ハ X 線ノ量ニ比例セズ。可成大量放射後ニモ其ノ變化比較的輕度ナルニ反シ同細胞ハ陰極線ニテハ放射後迅速ニ且著シキ變性破壞ニ陥ルヲ見ル。

ハ. 陰極線及ビ X 線ニヨル變化ハ其ノ破壞作用ニ基クモノナレドモ此作用ハ殊ニ陰極線ニ於テ頗ル強烈ナリトス。之ニ反シ X 線放射後ニハ間質細胞ノ増殖ヲ來ス事アリ。故ニ X 線ハ少量放射ニテハ單ニ卵巣ヲ刺戟シ其ノ組織ヲ増殖セシムルモノナリトノ說アルモ余ノ實驗成績ニ據レバ此増殖ハ一時的ノモノニ過ギズト信ズ。何ントナレバ X 線少量放射ノ場合ニモ後ニハ間質細胞ノ發育ハ對照側ヨリ著シク劣リ、且内夾膜細胞ヨリ分化シタル間質細胞ノ變性ヲモ認ムルヲ以テナリ。

ニ. X 線ニ對スル卵巣諸細胞ノ感受性ノ差ハ陰極線ニ對スルモノヨリ著シク大ニシテ X 線ハ極メテ選擇的ニ作用ス。反之陰極線ニ對シテハ各細胞ノ感受性ニ大差ナシ。

ホ. X 線ニ對シテ臌胞及ビ間質細胞ガ壞死性變化ニ陥ル事アルモ罕ニシテ且其度輕シ。之ニ反シ陰極線放射後ニハ壞死ハ頗ル強度ナルモノトス。

ヘ. 胚上皮細胞ハ X 線放射後ニハ只輕度ノ脱落及ビ變性ヲ示スモノニシテ、上皮中多クハ健康細胞ヲ多數認ム。而モ其ノ變性ハ必然的ノモノニ非ザルニ反シ陰極線放射後ニハ同上皮ハ毎常壞死ニ陥リ硝子様無構造物質トナル。

ト. 黃體細胞ハ X 線放射後ニハ變化ヲ認メザルモ陰極線放射後ニハ脂肪變性、壞死ニ陥ル事

アリ。

チ。血管。陰極線放射後ニハ常ニ間質結締織中、殊ニ髓質中ノ血管ハ擴張充血シ所々ニ破壊シ出血ヲ起ス。而シテ一般ニ管壁ハ肥厚變性シ管腔狹隘トナリ或ハ閉塞セルヲ見ル。加之、表層ノ血管ニ乏シキ白膜内ニモ大出血竈ヲ見ル。然ルニX線放射後ニハ之等ノ變化ヲ見ズシテ只血管壁ニ時トシテ輕度ノ肥厚變性ヲ認ムルノミ。而モ斯カル狀ハ對照側ニモ見ル所トス。

リ。間質結締織及ビ白膜ハX線ニテハ何等ノ影響ヲ蒙ラザルモ陰極線ニテハ白膜及ビ間質結締織ノ表層ニ變性壞死ヲ起ス事アリ。

ヌ。然レドモ後ニハ結締織ハ反應性炎症ニ由リテ増殖スルヲ常トス。

卵巣ノ癥痕化ハ陰極線放射後ニハ之ヲ認ムルモX線ニテハ決シテ斯カル變化ヲ見ズ。

ル。再生現象。陰極線ヲ大量ニ放射シタル場合ニハ臙胞全部壞死消滅シ再生ヲ見ル事ナキモX線放射後ハ可成大量ヲ用ヒタルニ原始臙胞ト雖モ全ク消滅セズ。故ニ其ノ再生機能アル事ヲ推知シ得ベシ。但結締織ハ陰極線放射ニテ壞死ニ陥ルモ全ク之ヲ死滅セシムル事能ハズシテ後ニハ却テ其ノ再生、増殖ヲ見ルモノナリ。

拙筆スルニ臨ミ御懇篤ナル御指導竝ニ御校閲ヲ賜リタル恩師上坂博士ニ滿腔ノ謝意ヲ表ス。

主 要 文 獻

- 1) *Angel et. Bouán*, Ref. Frommels Jahresbericht für 1908.
- 2) *Angerer, Pauli, v. Redwitz*, D. Zeitschr. für Chir., 193, S. 330—342, 1925.
- 3) *A. Passow, u. W. E. Pauli*, Klin. Wochenschr., Nov. 1925.
- 4) *Bergonié, Tribondeau u. Recamiér*, Comptes rendues Soc. biol., 1904—1905.
- 5) *Baensch u. Finsterbusch*, M. m. W., Nr. 51, S. 2171, 1927.
- 6) *Dieselbe*, Klin. Wochenschr., Nr. 15, S. 681—683, 1928.
- 7) *Baensch*, Fortschr. f. Röntgenstr. 41, 1930.
- 8) *Baker, Lillian E., and Robert B. Corey*, J. of exper. med. 50, 1929.
- 9) *Cohn, F.*, Arch. f. mikr. Anat. u. Entwicklungsgesch. Bd. 62, 1903.
- 10) *Fränkel, L.*, Arch. f. Gyn. Bd. 75, H. 3, S. 443—507.
- 11) *Derselbe*, Arch. f. Gyn. Bd. 81, H. 2, S. 271.
- 12) *Guyver, M. F. Farrington Daniels*, J. Cancer. Res. 12, 1928.
- 13) *Gentner, W.*, Fortschr. f. Röntgenstr. 41, 1930.
- 14) *Halberstädter, L.*, Berliner klin. Wochenschr. Nr. 3, 1915.
- 15) *Krause, P., u. Ziegler, K.*, Fortschr. a. d. Gebiet. d. Röntgen.
- 16) *Knipping, P.*, Fortsch. Röntgenstr. 41, 1930.
- 17) *Knipping, Pauli*, Strahlentherapie. 35, 1930.
- 18) *Okintschitz*, Ref. Zentralbl. f. Gyn. 1907.
- 19) *Potitzer, G., u. W. E. Pauli*, Fortschr. Röntgen. 40, 1929.
- 20) *Pauli u. Grober*, D. m. W. Nr. 31, S. 841—844, 1919.
- 21) *Pauli u. Härtmann*, Arch. f. mikr. Anat. 103, 1924.
- 22) *Schäfer, Walter, Ernst Witte*, Strahlentherap., 31, 1929.

- 23) *Stenstrom, Wilhelm, Charles, H., Watkins*, Proc. Soc. exper. Biolog. u. Medizin. 26, 1928. 24) *T'aller, Rudolf*, Physik. Zeitschr., 29, 1928. 25) *Dieselbe*, Strahlentherapie, 33, 1929. 26) *Taylor, Lawinston, S.*, Radiologie, 12, 1929. 27) *Sobotta*, Arch. f. mikr. Anat., Bd. 47, 1826. 28) *Derselbe*, Anat. Hefte, Bd. 8, 1897. 29) *W. Baensch u. R. Finsterbusch*, Strahlentherap., 33, 1929. 30) *Weterer*, Handbuch der Röntgen u. Radiumtherapie, Bd. 1, 1913. 31) 白木, 日本婦人科學會雜誌, 第16卷. 32) 關場, 岡醫雜, 第371號. 33) 堤辰郎, 日本婦人科學會雜誌, 第17卷. 34) 古谷, 農應レントゲン學叢書, 第6卷, 昭和3年. 35) 向井, 愛知醫學會雜誌, 第31卷, 第4號, 大正13年. 36) 飯田, 愛知醫學會雜誌, 第35卷, 昭和3年. 37) 飯田, 日本婦人科學會雜誌, 第26卷, 昭和6年. 38) 本城, 岡醫雜, 第477號. 39) 本城, 岡醫雜, 第482號. 40) 本城, 岡醫雜, 第484號. 41) 本城, 岡醫雜, 第487號.

附 圖 說 明

第1圖 健康家兎卵巣ノ顯微鏡的所見.

Zeiss Okul. 7, Obj. 40, Kameralänge 20 cm

第2圖 同上.

Zeiss Okul. 7, Obj. 10, Kameralänge 20 cm

第3圖 陰極線放射例.

放射時間60分, 經過日數28日

全間質組織, 膿胞ノ壊死, 消滅ヲ示シ結締織ノ強キ増殖アリ.

Zeiss Okul. 7, Obj. 10, Kameralänge 20 cm

第4圖 同上.

Z = 壊死ニ陥レル間質細胞 G = 血管

Zeiss Okul. 7, Obj. 40, Kameralänge 20 cm

第5圖 同上.

膿胞壊死ニ陥リ結締織ノ強キ増殖ヲ示ス.

P = 壊死セル原始膿胞 Bdg = 結締織

Zeiss Okul. 7, Obj. 40, Kameralänge 20 cm

第6圖 同上.

血管壁變性肥厚シ管腔狹隘乃至閉塞ヲ來セリ.

G = 血管

Zeiss Okul. 10, Obj. 40, Kameralänge 20 cm

第7圖 陰極線放射例.

放射時間60分, 經過日數14日

膿胞消滅シ所々ニ出血竈ヲ見ル.

P = 原始膿胞消失ノ跡 B = 出血竈

Z = 間質細胞

Zeiss Okul. 7, Obj. 10, Kameralänge 25 cm

第8圖 陰極線放射例.

放射時間60分, 經過日數21日

胚上皮細胞變性シ膿胞減數シ間質細胞, 黃體細胞變性萎縮シ結締織増殖ス.

L = Luteinzellen.

Zeiss Okul. 5, Obj. 10, Kameralänge 23 cm

第9圖 陰極線放射例.

放射時間60分, 經過日數5日

膿胞消滅シ表層ノ組織ハ壊死ニ陥リ深部ハ反應性炎症ニ由リ結締織ノ増殖ヲ示ス.

N = Nekrose

Zeiss Okul. 7, Obj. 10, Kameralänge 30 cm

第10圖 陰極線放射例.

放射時間60分, 經過日數14日

膿胞ノ顆粒細胞及ビ内夾膜細胞ノ強度ノ變性狀態ヲ示ス.

Thi = 内夾膜細胞

Zeiss Okul. 7, Obj. 40, Kameralänge 30 cm

第11圖 陰極線放射例.

放射時間 30 分, 経過日数 28 日

臌胞及ビ間質細胞萎縮消滅シ間質結締組織強ク増殖ス.

Zeiss Okul. 5, Obj. 10, Kameralänge 23 cm

第12圖 陰極線放射例.

放射時間 30 分, 経過日数 1 日

白膜及ビ白膜下ノ間質細胞ハ著シク變性, 壊死ニ陥リ, 間質細胞核ハ結締組織細胞核ノ如ク紡錘狀ニ變形セリ.

Al = 白膜 Z = 間質細胞

Zeiss Okul. 7, Obj. 40, Kameralänge 22 cm

第13圖 陰極線放射例.

放射時間 60 分, 経過日数 1 日

充填性閉鎖臌胞ノ増殖セル内夾膜細胞ハ強ク變性シ核ノ濃染, 破壊, 溶解, 細胞ノ融合等ヲ示ス.

Thi = 内夾膜細胞 G = 血管

Zeiss Okul. 7, Obj. 40, Kameralänge 30 cm

第14圖 X線放射例.

放射量 20% H. E. D., 経過日数 14 日

臌胞ノ減數ヲ示ス.

Z = 間質細胞 F = 臌胞

Zeiss Okul. 5, Obj. 20, Kameralänge 23 cm

第15圖 X線放射例.

放射量 20% H. E. D., 経過日数 28 日

臌胞變性シ増殖セル間質細胞又變性ヲ示ス.

Z = 間質細胞

Zeiss Okul. 7, Obj. 40, Kameralänge 22 cm

守屋論文附圖

第 1 圖

第 2 圖

第 3 圖

守屋論文附圖

第 4 圖

第 5 圖

第 6 圖

守屋論文附圖

第 7 圖

第 8 圖

第 9 圖

守屋論文附圖

第 10 圖

第 11 圖

第 12 圖

守屋論文附圖

第 13 圖

第 14 圖

第 15 圖